

# M E R O P S

PAR

H. SCHLEGEL.

Juni 1863.

---

Bec noir. Point de différence dans les formes et les teintes des deux sexes. Les jeunes ne se distinguent souvent des adultes que par des teintes moins pures; dans les espèces à pennes mitoyennes de la queue allongées, ces pennes n'acquièrent ce développement qu'avec l'âge. Les femelles sont tant soit peu plus petites que les mâles. Ces oiseaux habitent l'Afrique, l'Europe et l'Asie chaude jusqu'aux Philippines, à la Nouvelle Guinée et l'Australie. L'époque de la propagation passée, ils mènent, réunis par bandes nombreuses, une vie vagabonde, et se rendent souvent, à la recherche de leur nourriture, dans des contrées très distantes de leur séjour habituel. Nous avons cru devoir proposer une classification des espèces plus ou moins différente de celles adoptées par nos devanciers.

I. Paire mitoyenne des pennes caudales allongée dans les adultes.

A. Teinte dominante verte; gorge sans écharpe foncée.

Très reconnaissable à sa gorge d'un bleu clair, mais vif, et au brun rouge foncé qui recouvre, dans les adultes, le manteau, la nuque et le dessus de la tête. Au premier plumage ces parties sont vertes. Aile 4 pouces à 4 pouces 4 lignes. Queue 2 pouces 9 lignes à 5 pouces; pennes moyennes 5 pouces 5 lignes. Bec 15 à 15 lignes.

Observé à Malacca, à Bangka, à Sumatra et à Bornéo.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, Mantop, Bornéo, voyage de Schwaner. — 3, 4 et 5. Adultes, Bangka, présentés par Mr. J. F. R. S. van den Bossche. — 6 et 7. Adultes, Sumatra, voyage de Mr. S. Müller. — 8. Individu dans la livrée de passage, Sumatra. — 9. Jeune, premier plumage, Sumatra, S. Müller.

10. Squelette, Sumatra, S. Müller.

B. Teinte dominante verte; une écharpe noire ou bleue au bas de la gorge dans les adultes.

#### MEROPS APIASTER, Linné.

Gorge jaune, écharpe noire en arrière de la gorge étroite. Aile 5 pouces et 4 à 9 lignes. Queue 5 pouces et 1 à 4 lignes; pennes moyennes 4 pouces 4 lignes. Bec 15 à 16 lignes.

Observé dans l'Europe méridionale, l'Asie mineure et l'Afrique septentrionale.

1. Adulte, Hongrie. — 2. Mâle adulte, tué près de Guriëff, bouches de l'Oural, acquis en 1861. — 3 et 4. Mâle et femelle adultes, tués en Mai 1862, près de Sarepta, Wolga inférieur. — 5. Mâle adulte, Asie mineure, acquis en 1862. — 6. Adulte, Égypte, acquis en 1862.

#### MEROPS ORNATUS, Latham. — *Merops melanurus*, Lewin.

Rappelle en général le *Merops apiaster*; mais sa taille est moins forte, la gorge est d'un jaune plus foncé et offre une écharpe beaucoup plus large, le brun rouge de la tête et de la nuque est remplacé par un vert jaune tirant plus ou moins

au roux, le vert en général tire fortement au jaune, tandis que les scapulaires passent au bleu blanchâtre. Aile 3 pouces 11 lignes à 4 pouces 4 lignes. Queue 2 pouces et 8 à 11 lignes; pennes mitoyennes 4 pouces 10 lignes. Bec 15 à 15 lignes.

Observé dans l'Australie, à Timor, Lombok, Sumbawa, à la Nouvelle Guinée, à Halmahera et dans les îles avoisinantes.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, Australie, voyage de Mr. Gould. — 3. Adulte, Australie, 1860. — 4. Individu dans la livrée de passage, Australie, 1862. — 5. Mâle adulte, tué le 5 Août 1829, Timor, voyage du Dr. S. Müller. — 6. Mâle adulte, tué en Juillet 1829, Timor, S. Müller. — 7. Jeune femelle, tuée le 16 Juillet 1829, Timor, S. Müller. — 8. Femelle, livrée pas tout à fait parfaite, Bima à Sumbawa, voyage du Dr. Forsten. — 9. Mâle adulte, Lombok, voyage de Mr. Wallace, 1858. — 10. Mâle, livrée imparfaite, Havre Dorey, Nouvelle Guinée, voyage de Mr. Wallace, 1859. — 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Femelles, toutes à queue pourvue des pennes mitoyennes allongées et à teintes plus ou moins semblables à celles de la livrée parfaite, mais moins pures; tuées en Avril 1861, Ternate, voyage du Dr. Bernstein. — 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Mâles, tous dépourvus des pennes allongées de la queue et au premier plumage; l'écharpe noire de la gorge ne commençant à se montrer que dans le N<sup>o</sup>. 17; tués en Avril 1861, Ternate, Bernstein. — 24. Femelle, livrée parfaite, tuée le 24 Avril 1862, Dodingo à Halmahera, Bernstein. — 25 et 26. Femelles, livrée parfaite, tuées en Juillet, Galéla à Halmahera, Bernstein. — 27. Mâle, livrée à peu près parfaite, tué le 25 Mai 1862, Dodingo, Halmahera, Bernstein. — 28. Femelle, premier plumage, tuée le 6 Juillet 1861, Galéla, Halmahera, Bernstein.

29. Crâne, Novembre 1828, Timor, S. Müller.

**MEROPS ALBICOLLIS**, Vieillot. — *Merops Cuvieri*, Lichtenst.  
Très reconnaissable à sa gorge, son front et ses sourcils d'un blanc tirant un peu au jaune. Pennes mitoyennes de la queue

Absolument semblable au *Dacelo pulchella*, qu'il remplace à Bornéo, excepté que la teinte rousse du front, des joues et du collier se trouve, dans la livrée parfaite, remplacée par un noir profond.

1. Mâle adulte, Banjer à Bornéo, voyage de Schwaner. — 2. Jeune mâle, à teintes semblables à celles de l'adulte, mais au noir du front et du collier remplacé par une teinte d'un brun rouge et à bec tirant fortement au brun; même origine que le N<sup>o</sup>. 1.

II. Queue un peu plus longue que d'ordinaire. Taille moyenne ou peu forte. Espèces assez différentes les unes des autres. Patrie: l'Archipel Indien.

**DACELO MACRORHINA.** — *Dacelo macrorhinus* et *Melidora Euphrosiae*, Lesson. — *Melidora macrorhina*, Reichenbach.

Bec gros, large, à pointe en crochet, pourvu en dessus d'une carène creusée en gouttière.

Observé à la Nouvelle Guinée.

1. Individu semblable à celui de Lesson: aile 4 pouces 6 lignes, queue 5 pouces 1 ligne, bec depuis le front 16 lignes; Nouvelle Guinée, voyage de Mr. Wallace, 1865.

**DACELO CYANOTIS**, Temminck, Pl. col. 262.

Aile 3 pouces 8 lignes à 4 pouces 2 lignes. Queue 5 pouces à 5 pouces 6 lignes. Bec 13 à 14 lignes. Bec large, aplati en dessus, rougeâtre. Dessus de la tête et queue roux. Une raie surciliaire et joues couleur de rose pâle. Une raie postoculaire très large et les couvertures des ailes d'un bleu de cobalt très foncé remplacé, dans les jeunes, par une teinte noirâtre. Les autres parties supérieures d'un brun jaunâtre, les inférieures d'un blanc tirant au roux jaunâtre.

Observé dans l'île de Célèbes.

1. Mâle adulte, tué près de Kema à Célèbes, voyage du Dr. Forsten. — 2. Femelle, en partie au plumage imparfait,

Observé à la Nouvelle Guinée (Hayre Doré et Baie Lobo), aux îles Arou et à la Côte Nord de l'Australie.

1. Mâle, à plumage à peu près parfait, tué sur les bords de la Baie Lobo, Côte occidentale de la Nouvelle Guinée, voyage de Mr. S. Müller. — 2 et 3. Femelles, même origine que le N<sup>o</sup>. 1.

**DACELO PRINCEPS**, Forsten (in litteris). — *Dacelo cyanocephalus*, Forsten, in litteris et monachus, Temminck, Mus. Nederl. (juv.). — *Monachalcyon princeps*, Reichenbach, Alced., p. 58, pl. 425, fig. 3157 (jeune mâle).

L'adulte a le bec rougeâtre et la gorge blanche; les autres parties inférieures et un collier nuchal d'un brun rouge clair; côtés de la tête d'un bleu verdâtre; dessus de la tête bleu d'indigo. Dos et ailes d'un vert olivâtre. Queue d'un vert bleuâtre terne. Dans notre individu femelle le front et les joues sont d'un brun rouge. Aile 5 pouces 5 lignes. Queue 5 pouces 8 lignes à 4 pouces 1 ligne. Bec 1 pouce 7 lignes.

Les individus que le prince Bonaparte a considéré, à mon instigation, comme les jeunes du *Dacelo princeps*, ont le bleu de la tête plus foncé; le collier et les parties inférieures à partir de la gorge sont d'un blanc roussâtre interrompu par des lignes brunes en zig-zag; le dos, les ailes et la queue sont brunes, aux bords des plumes roussâtres. Bec tirant fortement au brun. Aile 4 pouces et 5 à 5 lignes. Queue 5 pouces et 2 à 5 lignes. Bec 1 pouce 6 lignes.

Observé à Célèbes.

1 et 2. Mâles adultes, Kema, Célèbes, voyage du Dr. Forsten. — 3. Femelle adulte, même origine. — 4 et 5. Mâle et femelle jeunes, Menado, Célèbes, voyage du Dr. Forsten.

**DACELO FULGIDUS**. — *Halcyon fulgidus*, Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1857, p. 65.

Très reconnaissable à ses teintes. Bec rouge. Dessus et plumes des jambes d'un noir tirant au bleu, passant au bleu

de cobalt sur la queue et remplacé, sur l'arrière-dos, par un blanc argenté bleuâtre. Dessous blanc. Aile 4 pouces 9 lignes. Queue 4 pouces 1 ligne. Bec 1 pouce 7 lignes.

Observé dans l'île de Lombok.

1. Mâle adulte, Lombok, voyage de Mr. Wallace.

III. Queue plus ou moins courte. Formes robustes. Taille moyenne. Croupion d'un blanc bleuâtre. Patrie: les Indes jusqu'au Japon, Bornéo et Java.

**DACELO COROMANDELIANA.** — *Alcedo coromandeliana*, Scopoli: Sonnerat, Indes, II, p. 118, pl. 104. — *Alcedo coromanda*, Latham. — *Halcyon coromandeliana*, G. R. Gray. — *Halcyon coromanda major*, Schlegel, Fauna japonica, pl. 59. — *Halcyon (Callialcyon) lilacina*, Bonaparte, Consp., I, p. 156.

Bec rouge. Dessus d'un roux foncé tirant fortement au rouge lilas et remplacé, sur le croupion, par une large raie longitudinale d'un blanc bleuâtre ou bleu clair. Dessous d'un roux clair. Aile 4 pouces 4 lignes. Queue 2 pouces 3 à 7 lignes. Bec 21 à 26 lignes.

Observé sur le Continent de l'Inde, au Japon, aux Philippines et à Java.

1. Adulte, Japon, voyage du Dr. Bürger: individu figuré Fauna japonica, pl. 59, fig. 1. — 2. Jeune individu, même origine que le N°. 1, l. c., fig. 2. — 3. Adulte, du Cabinet de Mr. Temminck, noté comme provenant de Java. — 7. Individu des Philippines, Verreaux, 1865.

4. Squelette, Java, voyage Kuhl et van Hasselt. — 5. Squelette, Japon, von Siebold. — 6. Crâne, Java, Kuhl et van Hasselt.

**DACELO COROMANDELIANA MINOR.** — *Halcyon coromanda minor*, Schlegel, Fauna japonica. — *Halcyon Schlegeli*, Bonaparte, Consp., I, p. 156.

Absolument semblable au *Dacelo coromandeliana*, qu'il paraît

Absolument semblable au *Dacelo chloris*; mais le bandeau noir entourant le sommet de la tête précédé par un bandeau blanc ou roussâtre. Aile 3 pouces et 8 à 9 lignes. Queue 2 pouces et 4 à 5 lignes. Bec 17 lignes.

Observé dans les Nouvelles Hébrides.

1. Adulte, tué le 15 Novembre 1853, Aneiteum, Nouvelles Hébrides, voyage du *Hérald*: parties claires d'un blanc pur, acquis en 1861. — 2. Adulte, tué le 15 Novembre 1853, même origine que le N<sup>o</sup>. 1: bandeau clair entourant le sommet de la tête roussâtre; collier et parties inférieures blancs comme dans le N<sup>o</sup>. 1, acquis en 1861. — 3. Individu, tué dans les Nouvelles Hébrides, acquis en 1862: la teinte blanche partout lavée de roux, le bandeau de la tête d'un roux assez prononcé.

**DACELO SACRA.** — *Alcedo sacra et tutu*, Gmelin. — *Halcyon sacra*, G. R. Gray.

Très reconnaissable à son bec fortement aplati, et au bandeau blanc entourant le sommet de la tête très large, tandis que le bandeau foncé est étroit, interrompu et tirant au vert. Aile 3 pouces et 6 à 10 lignes. Queue 2 pouces et 8 à 9 lignes. Bec 14 à 15 lignes.

Observé dans les îles de la Société et aux îles Marquises.

1. Adulte, O Taiti. — 2. Adulte, îles Marquises. — 3. Individu au premier plumage, îles Marquises.

**DACELO CORONATA.** — *Halcyon coronata*, S. Müller, *Verh. Ned. Ind., Ethnogr.*, p. 175. — *Todirhamphus coronatus*, Ch. Bonaparte, *Consp.*, I, p. 157; Cassin, *Un. Serv. Expl.*, tab. 19, fig. 2. — *Paralcyon coronata*, Reichenbach, *Alcedineae*, p. 55, pl. 420, fig. 5142.

Taille peu forte. Bandeau clair de la tête très large et d'un roux foncé. Toutes les autres parties claires et rousses.

Observé à Timor et à Lombok.

*a.* Individus de Timor. Aile 5 pouces 2 lignes, queue 2 pouces 2 lignes, bec 17 lignes. — 1 et 2. Mâle et femelle adultes, Timor, voyage du Dr. S. Müller.

*b.* Individu de Lombok. — 3. Adulte, Lombok, voyage de Mr. Wallace: aile 2 pouces 10 lignes, queue 2 pouces, bec 15 lignes.

**DACELO PYRRHOPYGIA.** — *Halcyon pyrrhopygia*, Gould, *Birds of Austr.*, II, pl. 22.

Très reconnaissable à son arrière-dos d'un roux-jaune vif, à son bec arrondi, aux plumes du dessus de la tête ornées d'une flamme noirâtre et à ses rémiges secondaires bordées de blanc. Bandeau blanc de la tête étroit.

Observé dans l'Australie méridionale et occidentale.

1. Individu au plumage terne et, à ce qu'il paraît, imparfait, Australie occidentale; aile 3 pouces 9 lignes, queue 2 pouces 6 lignes, bec 14 lignes.

**DACELO CINNAMOMINA.** — *Halcyon cinnamominus*, Swainson, *Zool. Illustr.*, pl. 67.

La teinte verte du dessus de la tête plus ou moins rétrécie ou nulle, en sorte que le roux du bandeau occupe alors toute la partie supérieure de la tête. Collier et dessous, en partie ou totalement, d'un roux jaunâtre.

Observé aux îles Mariannes et à la Nouvelle Guinée.

1. Individu du Havre Doré, Nouvelle Guinée, voyage de la Coquille; dessus de la tête avec quelques taches vertes. Toutes les teintes claires d'un roux jaunâtre vif: aile 5 pouces 9 lignes, queue 5 pouces, bec 17 lignes. — 2. Jeune, île Guam, voyage de la Coquille; sommet de la tête en partie d'un vert foncé; bandeau de la tête d'un roux vif; collier, dessous à partir du jabot, couvertures inférieures des ailes et bords des couvertures supérieures roussâtres; gorge blanche; aile 5 pouces 9 lignes, queue 2 pouces 10 lignes, bec 15 lignes.

1862, Galéla à Halmahera, voyage de Bernstein. — 14. Femelle adulte, tuée le 20 Novembre 1861, Kaou à Halmahera, voyage de Bernstein. — 15. Mâle avec une indication de l'écharpe bleue du jabot, tué le 25 Avril 1862, Dodingo à Halmahera, voyage de Bernstein. — 16. Jeune mâle, tué le 2 Août 1862, Galéla à Halmahera, voyage de Bernstein. — 17. Jeune mâle, tué le 31 Août 1861, ile Morotay, voyage de Bernstein. — 18. Mâle, tué le 16 Janvier 1861, ile Batjan, voyage de Bernstein.

**DACELO LAZULL** — *Alcedo lazuli*, Temminck, Pl. col. 508. — *Halcyon lazuli*, G. R. Gray.

Très reconnaissable à ses parties inférieures, à partir du jabot, d'un bleu-vert. Gorge et côtés du cou d'un blanc pur, qui s'étend quelquefois sur toute la poitrine. Aile 3 pouces et 5 à 7 lignes. Queue 1 pouce 10 lignes à 2 pouces 2 lignes. Bec 15 à 17 lignes.

Observé à Amboine et à Céram.

1. Adulte, individu figuré Pl. col. 508, Amboine. — 2. Mâle à poitrine blanche, Amboine, voyage du Dr. Forsten. — 3. Femelle, à poitrine tapirée de blanc, Amboine, voyage du Dr. Forsten. — 5 et 6. Adultes, Wahaai à Céram, voyage du Dr. Forsten. — 7. Adulte, à poitrine d'un blanc lavé de vert bleu, Céram, voyage de Mr. Wallace.

D. Tête et cou blancs, comme les parties inférieures.

**DACELO ALBICILLA**, Lesson. — *Alcedo albicilla*, G. Cuvier. — *Halcyon albicilla*, G. R. Gray. — *Halcyon saurophaga*, Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1845, p. 105.

Blanc; dos, ailes, queue et souvent le bord supérieur de la région des oreilles d'un vert-bleu. Les jeunes individus ne diffèrent des vieux que par la présence de quelques taches d'un vert noirâtre dont le milieu du sommet de la tête est orné. Adultes : aile 4 pouces 7 lignes à 5 pouces; queue 2 pouces 10 lignes à 3 pouces; bec 2 pouces et 1 à 3 lignes. Très

1861, Bernstein. — 50. Individu au premier plumage, tué le 29 Décembre 1861, Bernstein. — 51 et 52. Mâles dans la première livrée, tués en Février 1861, Bernstein.

*f.* Squelettes. — 55. Nouv. Guinée, voy. de Mr. S. Müller.

**DACELO HYDROCHARIS.** — *Tanysiptera hydrocharis*, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1858, p. 172.

Petite espèce à manteau sans tache blanche. Teintes et leur distribution, ainsi que la forme de la queue en tout point comme dans le *Dacelo dea*; mais d'une taille beaucoup moins forte. Aile 3 p. 2 l. Queue 2 p. 7 l.; les pennes moyennes de plus du double plus longues que les autres. Bec 11 lign.

Observé aux îles Arou.

1. Mâle, plumage parfait, voyage de Mr. Wallace; acquis en 1839. — 2. Femelle, plumage en partie imparfait, même origine que le N<sup>o</sup>. 1.

**DACELO SABRINA.** — *Tanysiptera sabrina*, G. R. Gray, List, Proc., June 26, 1860, p. 7, pl. 170. — *Tanysiptera doris*, Wallace, Ibis, 1862, p. 44.

Taille et distribution des teintes comme dans le *Dacelo dea*; mais à manteau pourvu, dans les adultes, d'une tache blanche, et à teintes bleues du dessus de la tête tirant au vert argenté. Dans la première livrée cette tache blanche est indiquée par des taches roussâtres, ce qui sert à distinguer les jeunes de cette espèce de ceux du *Dacelo dea*. Il est toutefois bon d'observer que l'intensité de cette teinte bleue et l'étendue de la tache blanche du manteau varient suivant les individus, et que les teintes des pennes caudales subissent des variations individuelles semblables à celles que l'on observe dans le *Dacelo dea*.

Observé dans l'îlot de Kajoa voisin de Batjan, dans l'île de Morotay et dans l'îlot Raou voisin de cette île.

*a.* Individus de l'île de Morotay. *Tanysiptera doris*, Wallace. Le blanc occupe presque toute la barbe interne du premier