

# REVUE

DE LA

COLLECTION DES PERROQUEMS (PSITTACI) FAISANT  
PARTIE DU

MUSÉE DES PAYS-BAS.

PAR

H. SCHLEGEL.

Mai 1874.

---

## COMPAREZ: PSITTACI.

1864, No. 26.

---

ARARA.

**ARARA.**

**ARARA HYACINTHINA.** Voir Psittaci, 1864, p. 2.  
Trois individus montés.

**ARARA GLAUCA.** Voir Psittaci, 1864, p. 3.  
Un seul individu.

Ajoutez: 2. Crâne, Brésil, prés. en 1865 par M. I. T. ter Meer.

Femelle, tuée en Avril 1869, von Rosenberg. — 63, 64. Mâles, tués en Avril 1869, von Rosenberg.

b. Bords foncés des plumes rouges du dessous étroites. Observés dans les groupés d'Arou, de Key, aux Nouvelles Hébrides et à la Nouv. Calédonie.

Individus du groupe d'Arou. Aile 5 pouces 3 lignes à 5 pouces 9 lignes. Queue 4 pouces 3 lignes à 4 pouces 11 lignes. — 65. Femelle adulte, Arou, Wallace: c'est *Trichogl. nigrigularis*, N<sup>o</sup>. 1, Psittaci, 1864, p. 110. — 66, 67, 68. Adultes, Arou, 1866. — 69. Mâle, tué le 21 Avril 1864, Wokam, Hoedt. — 70, 71. Mâles, tués en Février 1865, Wammer, von Rosenberg. — 72. Femelle, tuée le 8 Févr. 1865, Wammer, von Rosenberg. — 73, 74. Mâle et femelle, tués en Mars 1865, Wammer, von Rosenberg. — 75. Femelle, tuée le 18 Mai 1865, Wonoumbai, von Rosenberg. — 76. Mâle, tué le 17 Juin 1865, Wonoumbai, von Rosenberg. — 77, 78. Femelles, tuées le 17 Juin 1865, Wonoumbai, von Rosenberg.

Individus de l'île Grand-Key. Aile 5 pouces 7 lignes. Queue 4 pouces 9 lignes à 4 pouces 11 lignes. — 79. Mâle, tué le 24 Août 1865, von Rosenberg. — 80. Femelle, tuée le 16 Mai 1864, Hoedt.

Individu de l'île Petit-Key. — 81. Femelle, tuée le 26 Août 1865, von Rosenberg: aile 5 pouces 7 lignes. Queue 4 pouces 9 lignes.

Individus des Nouvelles Hébrides et de la Nouvelle Calédonie. Aile 5 pouces à 5 pouces 6 lignes. Queue 3 pouces 6 lignes à 4 pouces 4 lignes. — 82. Adulte, Erromango, Nouv. Hébrides: c'est *Trichogl. Massena*, N<sup>o</sup>. 1, Psittaci 1864, p. 111. — 83, 84. Mâles, Nouv. Calédonie, acquis en 1867 de M. Verreaux sous le nom de *Trichogl. Deplanchii*. — 85. Femelle, Nouv. Calédonie, Verreaux, 1867.

**TRICHOGLOSSUS FORSTENI.** Voir Psittaci, 1864, p. 111.

Rappelant le *Trichogl. haematotus*; mais d'une taille moins

mes du dessous du tronc et du devant de la nuque jaunes avec de larges bordures vertes.

**TRICHOGLOSSUS CHLOROLEPIDOTUS**, Voir Psitt. 1864, p. 111.

Habite l'Australie.

Ajoutez. 4. Adulte, Port Makay, 1869.

D. Tête rouge. Sommet de la tête et région des oreilles bleu d'outremer.

**TRICHOGLOSSUS ORNATUS**. Voir Psittaci, 1864, p. 112.

Observé dans les îles de Célèbes et de Bouton.

Individus de Célèbes. — 1. Adulte, Wallace, 1862. — 2. Femelle, Menado, Forsten. — 3. Individu tué en Déc. 1859, Boni. — 4. Variété à plumage tapiré de jaune: c'est N<sup>o</sup> 5 du Catal. de 1864. — 5. Mâle, tué le 26 Sept. 1863, Negrielama, von Rosenberg. — 6. Femelle de l'année, tuée le 12 Sept. 1863, Panaby, von Rosenberg. — 7, 8. Femelles, tuées le 18 Avril 1863, Gorontalo, v. Rosenberg. — 9. Mâle de l'année, tué le 24 Mai 1864, Gorontalo, von Rosenberg. — 10, 11. Femelles de l'année, tuées en Mai 1864, Gorontalo, von Rosenberg. — 12. Mâle, tué le 20 Juillet 1863, Gorontalo, von Rosenberg. — 13. Adulte, Menado, prés. en 1870 par M. Riedel. — 14. Mâle, Macassar, 1861, Bernstein. — 15. Individu à plumage tapiré de jaune, Macassar, Bernstein, 1861.

Individu de l'île de Bouton. — 16. Mâle adulte, S. Müller: c'est le N<sup>o</sup>. 4 du Catal. de 1864.

17. Squelette, Célèbes, 1864. — 18. Squelette, Bouton, S. Müller.

E. Dessus de la tête jaune.

**TRICHOGLOSSUS FLAVOVIRIDIS**, Sclater.

Aile 4 pouces à 4 pouces 5 lignes. Queue 2 pouces 10 lignes à 3 pouces 1 ligne.

Patrie: le groupe de Soula.

1, 2. Mâles, tués en Déc. 1864, Soula-Bessie, Hoedt. —  
 3, 4. Mâle et femelle, tués en Janvier 1864, Soula-Bessie. —  
 5, 6. Mâle et femelle, tués en Février 1864, Soula-Mangoli,  
 Bernstein. — 7, 8. Mâles, tués en Février 1864, Soula-Man-  
 goli, Bernstein. — 9, 10. Femelles, tuées en Février 1864,  
 Soula Mangoli, Bernstein.

F. Sommet de la tête d'un brun tirant au jaune verdâtre.  
 Region des oreilles jaune.

**TRICHOGLOSSUS MEYERI**, Walden, Trans. Zool. Soc. Lon-  
 don, 1871, p. 32, Pl. 4.

Très semblable au *Tr. flavoviridis* qu'il remplace à Célèbes ;  
 mais d'une taille moins forte, à tête différemment teinte, et  
 aux bords verts des plumes du dessous beaucoup plus larges.

Aile 3 pouces 9 lignes à 4 pouces. Queue 2 pouces 4 lig-  
 nes à 2 pouces 6 lignes.

1. Adulte, Menado, prés. en 1866 par Jonkh. R. v. Duy-  
 venbode. — 2, 3. Adultes, Menado, 1873.

**NANODES**. Voir Psittaci, 1864, p. 112.

**NANODES EUTELES**. Voir Psittaci, 1864, p. 112.

Plumage d'un vert tirant, sur la tête, plus ou moins forte-  
 ment au jaune brunâtre.

Aile 4 pouces 4 lignes à 4 pouces 11 lignes. Queue 3 pouces  
 8 lignes à 3 pouces 10 lignes.

Observé dans les îles de Timor, Wetter et Lettie.

Ajoutez : 5, 6. Mâle et femelle, tués en Mai 1866, île de  
 Lettie, Hoedt. — 7. Mâle, tué le 30 Avril 1866, Wetter,  
 Hoedt. — 8, 9, 10, 11, 12. Femelles, tuées en Mai 1866,  
 Wetter, Hoedt.

**NANODES PLACENS**. Voir Psittaci, 1864, p. 133.

Observé à Halmahéra, à Ternate, à Amblaou (île au Sud