

8^o Zoolog ~~2297~~ IX 3050


HG-FB

SUB Göttingen


7

211 968 706





CONSPECTUS AVIUM.



HERMANNO SCHLEGELO:

Opusculum, cui praefandi gratia haec verba subiungo, fructus complectitur disquisitionum atque investigationum, quas per Europae Americaeque Musea silvasque viginti quinque continuis annis institui, quasque iam disposui et in corpus collegi Musei Lugdunensis thesauris tamquam norma usus. Quod quum Tibi dico, utinam id efficere potuerim, ut gnaviter occupatus in iis, quae in nominibus constituendis synonymisque iuxta se ponendis versantur disciplinae nostrae partibus et tamquam propylaeis, aliquantulum pretioso otio Tuo prospexerim, quod hisce missis graviori iam oneris humeris Tuis impositi parti poteris impendere atque ipsum adytum naturae intrare, cuius morum atque historiae accuratam descriptionem a Te exspectamus. Quo in opere, difficili profecto ac laborioso, nolo esse, hoc volumine edito, nisi praecursor Tuus. Coram Te praeterea, qui ab unaquaque praeiudicata opinione quam longissime abes, non dubito ingenue confiteri, qualem clamorem magnam partem disciplinae nostrae asseclarum arbitrer esse edituros: Genera scilicet dicent atque dictabunt in hoc opere nimis multa statui atque enumerari. Quod quam qui maxime et ipse agnosco. Sed sua ipsius magnitudine ac redundantia malum natur. Itaque tranquillo sunto ac imperturbato animo ac demittant altam vocem critici severi: Subfamiliae enim sint, sed semper et ubique sint genera vera et magna. Duo sunt, quae habeo adiicienda; alterum, quod asterisco notavi nova genera et species; alterum, quod artificio typographico in hoc opere sum usus, quo odiosum illud plagium (ne graviori vocabulo utar) evitatur, ne am-

plius opus sit, nomine tantum mutato, aliorum non solum pennis,
sed omni, quae ex Ave parari potest, gloriola sese ipsum exornare.
Quod vero Tibi p̄ae ceteris huncce librum meum sacrum esse vo-
lo, eo grato insuper animo impulsum me sentio, quem Tibi habeo
neque habere desinam ob insignia officia, quae et eximia doctrina
et egregia humanitate Tua mihi praestitisti per omne tempus, quod
inter Batavos degi. Neque a me impetrare possum, quin Te ro-
gem, ut meo nomine sinceras gratias agas omnibus Viris istis, qui
ut praecclara doctrina et fervido disciplinarum severiorum amore
Batavorum nomen apud exteros reddunt illustre, ita me, peregrinum
ac hospitem, in propositis meis exsequendis gratiosissime ad-
iuverunt atque promoverunt. Inter quos summa veneratione pro-
sequor senem venerabilem, REINWARDTIUM, cuius gloria meo praec-
conio non eget; neque mihi ipsi ignoscerem, si JANI VAN DER HOE-
VEN, qui celebratae gentis gloriam sua laude auget, si proposito-
rum ad rigidum usque tenacissimi KORTHALSHII amicissimi, si mo-
destissimi WESTERMANNI, si officiosissimi et elegantissimi VAN
BREDA, si VROLICKII obliviscerer, egregii professoris Amsteloda-
mensis. Virorum vero clarorum quod TEMMINGRIUM, Musei Lug-
dunensis illustrem moderatorem, agmen claudere iubeo, inde hoc
factum putas, quod ei p̄ae ceteris me devinctum sentio ob in-
signem hospitalitatem atque haud vulgarem, quam expertus sum,
in cuiusvis generis officiis praestandis, liberalitatem.

*Dabam Lugdunai Batavorum
Kalendas April, MDCCL.*

CAROLUS L. BONAPARTE.

CONSPECTUS GENERUM AVIUM.

SUBCLASSIS 1. INSESSORES.

Ordo 1. Psittaci.

FAMILIA 1. PSITTACIDAE.

SUBFAMILIA 1. MACROCERCINAE.

1. **Macrocercus**, Vieill. (Ara, Br. Gr.- Sittace, part. Wagl.
Anodorhynchus, Spix.) America m. 16.
Psittacus macao, L. - Levaillant, Perr. tab. 1.

2. **Conurus**, Kuhl. (Psittaca, Br. - Aratinga, Spix. - Psitta-
cara, Vig. - Sittace, p. W.) America. 40.

1. **Psittacus carolinensis**, L. (Jodovicianus, Gm. - illi-
niaca? Br.) Pl. ent. 499. - Wils. Am. Orn. t. 26. 1.
Levaill. Perr. t. 33. - Audubon, B. of Am. t. 26.

- *2. **Conurus xanthogenius**, Bp. ex Brasilia.
Viridis, subitus flavido-pistacinus, capite colloque omnino
aureis: remigibus glaucis, iatus nigrescentibus.

3. **Enicognathus**, Gr. (Leptorhynchus, Sw.) America m. 1.
Psittacus leptorhynchus, King (rectirostris, Meyen.
ruficaudus, Sw. - cheroyeus? Molina) Lear Parr. t. 11.
Nov. Act. Acad. N. C. Bonae 1834. t. xv. - Bourj.
Perr. t. 22.

SUBFAM. 2. PEZOPORINAE.

4. **Pezoporus**, Ill. Australia. 1.
Psittacus formosus, Lath. (terrestris, Shaw) Levaill.
Perr. t. 32. - Gould, Birds of Australia, t. 45.

SUBFAM. 3. PLATYERCINAE.

5. **Nymphicus**, Wagl. (Calopsitta, Less. - Leptolophus, Sw.) Australia. 1.
PSITTACUS norae-hollandiae, Gm. (gau, Less. - auricomis, Sw.) Lear, Parr. t. 27. - Less. Ill. Zool. t. 112.
Sw. Zool. Ill. n. s. t. 112. - Nat. Libr. Parr. t. 30.
Gould, Austr. t. 44. - Bourj. St. Hil. Perr. t. 12.13.
6. **Barrabandius**, Bp. (Polytelis, Wagl. - Palaeornis et Platycercus p. Gr.) Australia. 2.
1. B. rosaceus, Bp. (Psittacus barrabandi, Sw. - Pal. roses, Vig.) Horsf. Zool. Ill. t. 59. - Nat. Libr. Parr. t. 1. - Lear Parr. t. 30. - Bourj. Perr. t. 5. et 7.
Gould, Austr. t. 15.
- 2. B. melanurus**, Bp. (Polytelis melanurus, Gould. - Palaeornis anthopephus, Vig.) Lear, Parr. t. 28. 29.
G. Austr. t. 16. - Bourj. Perr. t. 6.8.
7. **Palaeornis**, Vig. (Psittinus, Blyth.) As. m. Oc. 14.
PSITTACUS alexandri, L. (guianensis, Scopol. - sonneratii et eupatria, Gm. - Palaeornis nepalensis, Hodgs.) Pl. ent. 642 et 239. - Edw. B. t. 292. - Sonn. Voy. t. 43.
Ler. Perr. t. 30.73. - Nat. Libr. Parr. t. 2. - Bourj. t. 3.
8. **Melopsittacus**, Gould (Nanodes part. Vig.) Australia. 1.
PSITTACUS undulatus, Shaw, Nat. Misc. t. 673. - Gould, Austr. t. 43. - Nat. Libr. Parr. t. 28. - Bourj. Perr. t. 9.
9. **Euphema**, Wagl. (Nanodes part. Vig. - Lathamus p. Less.) Australia. 8.
PSITTACUS pulchellus, Shaw (chrysogaster, Lath. - edwardsii, Bechst. - Lathamus azureus, Less.) Nat. Misc. t. 96. - Lev. Perr. t. 68. - Sw. Ill. t. 73. - Gould, Austr. t. 35.
10. **Psephotus**, Gould (Platycercus p. Gr.) Australia. 10.
PSITTACUS multicolor, Brown. - Gould Austr. t. 35.
11. **Platycercus**, Vig. Oceania. 15.
PSITTACUS pennantii, Lath. (elegans, Gm. - glorirosus et splendidus, Shaw) Philips, Botany-Bay, t. p. 154.
Nat. Misc. t. 53. - Mus. Lever. t. 7. - Lev. Perr. t. 78 et 79. - Nat. Libr. Parr. t. 25. - Gould, Austr. t. 23.

12. **Aprosmictus**, Gould (Platycercus p. Gr.) Oceania. 8.

PSITTACUS erythropterus, Lath. nec Kuhl (melanotis, Shaw. - Platycercus erythropterus, Vig.) *Nat. Misc.* t. 653. - *Lear. Parr.* t. 14. 15. - *Bourj. Perr.* t. 35. 35a. *Gould, Austral. Birds.* t. 18.

SUBFAM. 4. TRICHOGLOSSINAE.

13. **Lathamus**, Less. p. Gould (Euphema, p. Gr.) Australia. 1.

PSITTACUS discolor, Shaw (humeralis et lathami, Bechst. banksianus, Vieill. - australis, Kuhl. - Lathamus rubrifrons, Less.) *White Journ. t. p.* 263. - *Levaill. Perr.* t. 50. 62. - *Sw. Zool. Ill. t. 62.* - *Gould Austr.* t. 46.

14. **Charmosina**, Wagl. (Pyrrhodes, Sw.) Nova Guinea. 1.

PSITTACUS papuensis, Gm. (javanicus, Gm. - japonicus et bontii, Lath. - omnicolor, Licht. - lichtensteini, Bechst. - Charmosina papuensis, Wagl. - Ch. papua, Gr. ex Scop.) *Sonn. Voy. t. 111.* - *Levaill. Perr. t. 77.*

15. **Coriphilus**, Wagl. Polynesia. 10.

PSITTACUS taitianus, Gm. (porphyrio, Shaw. - saphirinus, Forst. - Lorus vini, Less. - Coriphilus saphirinus, Wagl. - C. notatus, Gr. ex Bodd.) *Pl. ent.* 455. 2. - *Nat. Misc. t. 7.* - *Lev. Perr. t. 65.*

16. **Trichoglossus**, Vig. (Australia, Less. - Brotogeris, Vig.) Oceania. 12.

1. 1. **PSITTACUS haematodus**, L. nec Kuhl (capistratus, Bechst. - Trichoglossus haematodus, Wagl.) *Edwards Birds t. 232.* - *Levaill. Perr. t. 47.*

* 2. **PSITTACUS forsteni**, Temm. *Mus. Lugd. ex Sumbava.* *Similis precedenti, sed gula rubra (non undulata sicut in affini Tr. chlorolepidoto), et ab domine nigro et flavo (minime viridi).*

10. * 17. **Chalcositta**, Bp. (Platycercus p. et Eos. p. Gr.) Molucc. Ins. 3.

1. 1. **PSITTACUS novae-guineae**, Gm. (ater, Scopoli. - Platycercus novae-guineae, Wagl. - Platycercus ater, Gr.) *Sonn. Voy. t. 110.* - *Lev. Perr. t. 109.*

2. **PSITTACUS scintillatus**, Temm. (Eos scintillata, Gr.) *Pl. col. 569.* - *Bourj. St. Hilaire, Perr. t. 51.*

* 3. **Chalcositta rubiginosa**, Bp. *ex Insulis Barabay et Guebe. Purpureo-badia, capite obscuriore, sub-tus fasciolatus plumis singulis lunula mediana et opiculis nigrante: remigibus rectricibusque virescentibus; cauda apicem versus gradatim lutescente.*

Rostrum rubrum: pedes nigri: irides albae. Magnit. Turdi.

18. **Eos**, Wagl.

1. **PSITTACUS ruber**, Gm. (caeruleatus, Shaw. - borneus, Lath.
cyanotus, Vieill. - Eos rubra, Wagl.) Pl. enl. 519.

Edw. B. t. 173. - Nat. Misc. t. 937. - Lev. t. 93 et 44.

* 2. **Eos cyanogenia**, Bp. Rubra; macula magna periophthalmica cyanea; humoris ex toto, remigibus rectricibusque magna ex parte, nigra.

* 3. **Eos semilarvata**, Bp. Rubra; vitta angula ultra oculos, macula utrinque scopulari, crissaque cyaneis: remigibus rectricibusque tantum apico nigris.

SUBFAM. 5. *LORIINAE.*19. **Lorius**, Br. (Domicella, Wagl.)

Born. N. Guin. 5.

PSITTACUS **domicella**, L. (raja, Shaw. - rex, Bechst. - radea, Vieill.) - Pl. enl. 119. 84. - Lev. t. 95. 94. 95*. Lear. Parr. t. 37.

20. **Eclectus**, Wagl.

Molucc. Ins. 3.

PSITTACUS **grandis**, Gm. (janthinus, Gm. - guehiensis var. Lath. - Eclectus grandis, Wagl. - E. ceylonensis! Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 683. - Brown, Ill. Zool. t. 6. Levaill. Perr. t. 126. 127. 128.

* 21? **Stavorinius**, Bp. (Psittacodis, p. Wagl. - Mascarinus, p. Less. - Eclectus p. Gr.)

Molucc. Ins. 2.

PSITTACUS **paragua**, Gm. ex Maregr. (stavorini, Less. Psittacodis paragua, Wagl. - Eclectus paragua, Gr.) Abb. Akad. Munchen 1832. p. 574. t. xxiii. Conf. cum Ps. tarabe, Gm.-fieldii, Sw.-et Dasyptilo!

22. **Psittacodus**, Wagl. part. (Eclectus part. Gr. - Mascarinus p. Less.)

Malasia. 5.

1. PSITTACUS **magnus** et **sinensis**, Gm. (viridis, Latham. lateralis, Shaw. - Mascarinus prasinus, Less. - Psittacodus magnus, Wagl. - Ecl. polychloros, Gr. ex Scopoli) Pl. enl. 514. - Edw. B. t. 231. - Levaill. Perr. t. 132. Major: illis rubris: margine alarum cyaneo: cauda apice subconcolori.

* 2. **Psittacodus intermedium**, Bp. Mus. Lugd. Minor: illis rubris: margine alarum rubro: cauda apice subconcolori.

* 3. **Psittacodus westermanni**, Bp. Minor: illis concoloribus: margine alarum caeruleo: cauda apice flavo. Optimo, modesto viro, Amstelodamensis Societas Zoologicae Directori meritissimo, ubi vivam conspexi avem rarissimam, dicatus.

SUBFAM. 6. PSITTACINAE.

23. **Tanygnathus**, Wagl. (Erythrostomus, Sw.) Mol. N. Guin. 3.
 1. **PSITTACUS macrorhynchus**, L. (nasutus, Lath. - megalorhynchus, Bodd. - Tanygnathus macrorhynchus, Wagl.) Pl. enl. 713. - Lev. Perr. t. 83. *Alis coeruleo-, nigro et luteo variis.*
2. **PSITTACUS mülleri**, Temm. (Tanygnathus mülleri, Bp.)
Minor; rostro minus robusto: alis subunicoloribus.
3. **PSITTACUS marginatus**, et olivaceus, Gm. (pileatus, Scopoli. - Tanygnathus marginatus, Wagl. - *T. gala*, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 287. - Sonn. Voy. N. Guin. t. 44. Lev. Perr. t. 60.
24. **Chrysotis**, Sw. (Amazona, Less. - Androglossus? Vig.)
 Psittacus, p. Wagl. - Chrysotis et Psittacus p. Gr.) America m. 20.
PSITTACUS festivus, L. Pl. enl. 840. - Lev. Perr. t. 88.
 89. 129.
25. **Pionus**, Wagl. p. (Psittacus, p. Gr.) America m. 6.
 PSITTACUS *purpureus*, Gm. (violaceus, Bodd. - cyanoccephalus, Scop.) Pl. enl. 408. - Edw. Birds t. 315.
 Lev. Perr. t. 115.
26. **Berotypus**, Wagl. (Psittacus, part. Gr.) America m. 1.
 PSITTACUS *accipitrinus*, L. Pl. enl. 526. - Spix, Av. Bras. t. 32 a. - Bourj. St. Hilaire, Perr. t. 62.
27. **Caique**, Less. (Pionus, p. Wagl. - Psittacus, part. Gr.) America m. 6.
 PSITTACUS *melanocephalus*, L. (leucogaster, Kuhl. - Pionus melanocephalus, Wagl.) Pl. enl. 527. - Edw. B. t. 169. - Levaill. Perr. t. 119. 120.
28. **Poiocephalus**, Sw. (Pionus, p. Wagl. - Psittacus, p. Gr.) Africa. 8.
 1. **PSITTACUS senegalus**, L. (Pionus senegalus, Wagl.) Pl. enl. 288. - Levaill. Perr. t. 116. 117. 118.
 * 2. **Poiocephalus magnirostris**, Bp. *Similis* P. Vailantii, *at rostro ingenti!*
29. **Psittacus**, L. (Jaco, Less.) Africa. 1.
Psittacus erythacus, L. - Pl. enl. 311. - Levaill. Perr. t. 99. 100. 101. 102.
30. **Tricoloria**, Wagl. (Chrysotis, p. Gr.) America m. 1.
 PSITTACUS *cyanogaster*, Vieill. (malachitaceus, Spix) Av. Bras. t. 28. - Bourj. Perr. t. 57.

31. **Prioniturus**, Wagl. Philipp.Celeb. 2.

1. **PSITTACUS platurus**, Vieill. (setarius, Temm. - spatuliger mas, Bourj.) Pl. col. 15. - Bourj. Perr. t. 57.
Collari flavo: humeris glaucis: fascia alarum pallida.
2. **PSITTACUS discosurus**, Vieill. (spatuliger fem. Bourj.) Gal. ois. t. 24. - Bourj. Perr. t. 58. *Collari et fascia humerali nullis: humeris concoloribus.*

32. **Geoffroyus**, Less. Wagl. (Psittacula p. Gr.) Oceania. 2.

1. **PSITTACUS BATAVENSIS**! Lath. (**personatus**, Shaw. geoffroyanus, Vieill. - geoffroyi, Kuhl.) Lev. Perr. t. 112. 113. ex Ins. Moluccis. *Viridies; nucha dorso concolor. Mas genis abrupte rubris.*
2. **PSITTACUS cyanicollis**, Müll. ex Gilolo. *Viridis; nucha cyanea. Mas genarum rubro colore per violaceum sensim in cyaneum transiente.*

33. **Psittacula**, Br. Am.m.Afr.As. 0. 8.

1. **PSITTACUS pileatus**, Scopoli (erythrocephalus, Vieill. mitratus, Wied. - maitaca, Spix.) Pl. col. 207. - Av. Bras. t. 29. 1. 30. - Bourj. t. 55. 55a.
2. **PSITTACUS passerinus**, L. (Agapornis cyanopterus, Sw. ex Bodd. - gregarius, Spix.) Edw. B.t. 235. - Av. Bras. t. 33. 1. 2. et 34. 2. 3. 4.

34. **Loriculus**, Blyth. (Psittacula p. Gr.) Afr. As.m.Oc. 8.

- PSITTACUS galgulus**, L. (flavigula, Bodd. - pumilio, Scop.) Pl. ent. 190. - Edw. B.t. 293. 2. - Sonn. Voy. N. Guin. t. 38. f. inf. - Bourj. Perr. t. 88.

35. **Agapornis**, Selby (Psittacula, p. Gr.) Afr. As. m. Oc. 6.

- PSITTACUS MALACCENSIS**! Lath. nec Gm. (incertus? Shaw. macropterus, Mus. Paris. - **azureus**, Temm.) Nat. Mise. t. 769. - Sw. Zool. Ill. t. 154. - Pl. col. 520. Bourj. Perr. t. 92. - ex Borneo.

SUBFAM. 7. PLYCTOLOPHINAE.

36. **Nasitera**, Wagl. (Micropsitta, Less.) Nova Guinea. 1.

- PSITTACUS pygmaeus**, Quoy et Gaim. Astrol. t. 21. 1. 2. 3. 4.
Bourj. St. Hil. Perr. t. 100.

37. **Mascarinus**, Less., p. (Coracopsis p. Wagl. Gr.) Madagascar. 1.
Psittacus mascarinus, Br. (*M. madagascariensis*,
Less.) Pl. enl. 35. - Levaill. Perr. t. 139.
- Coracopsis? personata, Gr. Pr. Z. Soc. 1848. Av. t. 3. est
Trichoglossis species insignis.
38. **Coracopsis**, Wagl. p. (Vasa, Buff. - Vigorsia, Sw.) Madagascar. 2.
1. **C. vasa**, Bp. (*Psittacus vasa?* Shaw. - obscurus,
Bechst. - Coracopsis nigra, Wagl. part.) Lev. Perr.
t. 81. Major.
*2. **C. nigra**, Bp. (*Psittacus niger*, L. - Coracopsis nigra,
Wagl. part. - *Psittacus madagascariensis niger*, Br.)
Edw. B. t. 5. - Lev. Perr. t. 82. Minor.
39. **Microglossus**, Geoffr. (Probosciger, Kuhl. - Solenoglos-
sus, Ranzani. - Eurhynchus, Latr.) N. Guinea. 2.
1. **M. aterrimus**, Wagl. (*Psittacus aterrimus*, Gm.
gigas, Lath. - griseus, Bechst. - goliath, Kuhl. - Micro-
glossus atter, Less.) Edw. B. t. 316. - Levaill. Perr.
t. 11. 12. 13.
*2. **M. alecto**, Temm. Mus. Lugduno-Batav. *Multo minor:*
genae minus denudatae.
40. **Calyptorhynchus**, Vig. (Banksianus, Less.) Austr. N. Guin. 10.
Psittacus funereus, Shaw, Nat. Misc. t. 186. - Mag.
Zool. 1834. t. 26. - Bourj. St. Hilaire, Perr. t. 70.
Gould, Austr. t. 11.
41. **Callocephalon**, Less. (Corydon, Wagl. - Calyptorhyn-
chus, p. Gr.) Australia. 1.
Psittacus galeatus, Lath. (*phaemocephalus*, *Mus. Paris.*
Callocephalon australe, Less. - *Corydon galeatus*, Wagl.)
Zool. Thetis t. 47. 48. - Bourj. t. 75. 75a. 75b.
Gould, Austr. t. 14.
Quid Call. fulgidum, Less. (Calyptorhynch. fulgidus, Gr.)?
42. **Plyctolophus**, Vieill. (Cacatua, Br. Gr.) Austr. Molucc. 13.
Psittacus cristatus, L. (*leucolophus*, Less. - *Cacatua*
cristata, Wagl. Gr.) Pl. enl. 263. - Bourj. St. Hil. t. 82.
43. **Licmetis**, Wagl. Australia. m. 2.
1. **L. tenuirostris**, Wagl. (*Psittacus tenuirostris*, Kuhl.
nasicus, Temm.) Brown, Ill. Zool. t. 5. - Pl. col. 331.
Bourj. St. H. Perr. t. 76. - Gould Austr. t. 5. Minor.
2. **L. pastinator**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1840. Major.

FAMILIA 2. STRIGOPIDAE.

SUBFAM. 8. NESTORINAE.

44. **Dasyptilus**, Wagl. (*Psittichas, Less.*) Nova Guinea. 1.
Psittacus pecquetii, Less. (*Dasyptilus pecquetii, Wagl.*)
Ill. Zool. t. 1. - Bourj. St. Hilair. Perr. t. 67.
Nat. Libr. XVIII. Parr. t. 17.

45. **Nestor**, Wagl. (*Centrourus, Sw.*) Austr. N. Zel. 2.

1. **Psittacus australis**, Shaw (*meridionalis, Gm.* - *hypopolius, Forst.* - *Nestor novae-zelandiae, Less.* - *N. hypopolius, Wagl.* - *N. australis Gr.*) Lever. *Mus. tab. p. 87. - Bourj. St. Hil. t. 68. - Gould Syn. t. 18.*

2. **Nestor productus**, Gould, Austr. t. 6. - Bourj. St. Hil. Perr. t. 59.

Speciem fossilem ex Nova Zelandia describit
Cl. Owenus.

SUBFAM. 9. STRIGOPINAE.

46. **Strigops**, Gr. (*Strigopsis!*) Oceania. 1.
S. habroptilus, Gray et Mitchell, Gen. of Birds t. 95.

Ordo 2. Accipitres.

FAMILIA 3. VULTURIDAE.

SUBFAM. 10. CATHARTINAE.

47. **Sarcoramphus**, Dum. (Gypagus, Vieill.) America. 2.
1. **VULTUR papa**, L. (monachus, Klein - elegans, Gerini.
sacer, Bartr.) Pl. enl. 428. - Levaill. Afr. t. 13.
Spix, Av. Bras. t. 1.
2. **VULTUR gryphus**, L. (magellanicus, Shaw - cunctur, Dum.
condor, Less.) Pl. col. 133. 408. 404. - Humb. Obs.
Zool. t. 8. - Bp. Am. Orn. t. 10. jun. - Voy. Bonit.
Ois. t. 2. jun.
48. **Cathartes**, Ill. p. (Catharista, Vieill.) America. 5.
1. **VULTUR californianus**, Shaw. (Cathartes vulturinus,
Temm. - Sarcoramphus californianus, Vig. - Gypagus
californianus, Vieill.) Pl. col. 51. - Aud. Am. t. 411.
Gr. et Mitch. Gen. t. 2. - Nat. Misc. t. 301. ex Cali-
fornia. Maximus; ad Sarcoramphus accedens.
2. **VULTUR atratus**, Wils. (Cathartes urubu, Vieill. - aura,
Vieill. p. 23. nec auct. - iota, Bp. Ord. nec Molina.)
Am. Orn. t. 75. 2. - Vieill. Am. s. t. 2. - Aud. Am.
t. 106. - Orb. Voy. fig. tantum. - ex Amer. sept.
Major: cauda aequali: capite nigro, oblique denudato.
3. **VULTUR brasiliensis**, Ray. Br. (Cathartes factens, Ill.
Wied. - Cath. aura, Spix, nec Auct.) Pl. enl. 187. ex
Amer. merid. Antill. Minor: niger splendens: cauda
aequali: capite nigro, cute sub laevigata.
4. **VULTUR iota**, Molina (Cathartes ruficollis, Spix, exclus.
tab. Catesb. - C. aura, Wied, nec Auct. - C. burrovianus,
Cassin.) ex Amer. merid. - Minor: cauda rotundata: capite
rubro, cute corrugata.
5. **VULTUR aura**, L. (Cathartes aura, Ill. - Catharista aura,
Vieill. - Cath. septentrionalis, Wied.) Catesb. Car. t. 6.
Vieill. Am. 1. t. 2 bis. - Gal. Ois. t. 4. - Wils. Am.
Orn. t. 75. f. 1. - Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 1. f. 1.
Audub. Am. t. 151. ex America sept. Major: cauda
longa, rotundata: capite rubro, circulariter denudato.

SUBFAM. II. VULTURINAE.

49. **Gyps**, Savign. (Vultur, Keys et Bl.) Eur. As. Afr. 6.
1. **VULTUR fulvus**, Gm. (pernopterus, Pall. nec L. - leucocephalus, Mey. - trinacris, Bechst.) Gould, Eur. t. 1.
Regn. An. ed. Orb. Av. t. 7. - Susemihl, Vog. Eur. t. 3. et 3. a. - ex Eur. or. Dalmatia. Corpore intense fulvo.
 2. **Gyps occidentalis**, Bp. (Vultur fulvus, p. Auct.-Vultur fulvus occidentalis, Schleg.) Susemihl, Vog. Eur. t. 2. ex Pyrenaeis, Sardinia. Corpore pallide cinereocinnamomeo.
 3. **Gyps vulgaris**, Sav. (Vultur kolbi, Cretschm. nec Daud. - Vultur rüppeli, Natter. Mus. Windob. - Vultur fulvus Rüppeli, Schleg.) Rupp. Atl. t. 32. ex Africa sept. et or. Rostro flavo: alis maculis magnis nigris.
 4. **VULTER kolbi**, Daud. nec Temm. (Chassefiente, Lev.) Ois. Afr. t. 2. ex Africa meridionali. Rostro nigro: corpore pallido, immaculato, vel maculis paucis, obsoletis.
 5. **VULTER indicus**, Scop. Lath. - Sonnerat, Voy. t. 105. ex Asia meridionali. Similis Gypi occidentali, sed colore vidiore.
 6. **VULTER bengalensis**, Lath. (leuconotus, J. Gr. adult. changoun, Daud. adult. - indicus et bengalensis Temm. juv. - tenuirostris, Hodgs. ex specimine. - Gyps tenuirostris, Gr. - Gyp bengalensis, Bp.) Pl. col. 26. Levaill. Afr. 11. - J. Gr. Ill. Ind. Zool. t. 14. adult. t. 15. jun. - Gr. et Mitoh. Gen. B. t. 3. jun. ex Asia meridi. Valde minor. Adult. nigricans, dorso albo.
50. **Vultur**, L. p. (Ægyptius, Savign. - Gyps, err. Keys. et Bl. Polypteryx, Hodgs. - Otogyps, Gr.) Eur. As. Afr. 5.
1. **Vultur auricularis**, Daud. (Otogyps auricularis, Gr.) Lev. Afr. t. 9. ex Africa merid. Plicis auricularibus.
 2. **Vultur nubicus**, H. Smith. (imperialis, Temm. ex specimine - aegyptius, Temm. juv. - Otogyps auricularis, Gr. part.) Griff. An. Kingd. t. p. 64. - Pl. col 407. jun. 426. adult. ex Nubia, Abyssinia. Plicis auricularibus nullis.
 3. **Vultur calvus**, Scopoli (ponticerianus, Lath. - Hemigyps ponticerianus, Hodgs. - Otogyps calvus, Gr.) Sonner. Voy. t. 104. - Ann. Mus. I. t. 20. - Shaw, Nat. Misc. t. 941. - Pl. col. 2. - J. Gr. Ill. Ind. Zool. t. 15. 1. ex Asia meridionali.

4. **Vultur monachus**, L. (cinereus, Gm. - leporarius
Gesn. - niger, Br. nec Gm. - arrianus, Temm. - Egypius
niger, Savign.) Pl. enl. 425. - Edw. B. t. 290. - Exp.
Eg. Ois. t. 11. - Gould, Eur. t. 2. - Gr. Ill. Ind. Zool.
t. 15. 2. ex Eur. As. Afr. or.
5. **Vultur occipitalis**, Burchell. (galericulatus, Temm.
Percnopterus niger, Less.) Pl. col. 13. - Lev. Afr. t. 12.
Rupp. Atl. t. 22. ex Afr. or. et merid.
51. **Neophron**, Savign. (Percnopterus, Cuv.) Eur. As. Afr. 2.
 1. **VULTUR pileatus**, Burchell. (carunculatus, Smith.
Cathartes monachus, Temm. - Percnopterus niger, Less.)
Pl. col. 222. ex Afr. occ. et merid. Niger, semitor-
quatus; rostro graciliore.
2. **VULTUR percnopterus**, L. (meleagris, Pall. - leucoce-
phalus et aegyptius, Br. - fuscus, Gm. - ginginianus et
albus, Daud. - fulvus, Bodd. - stercorarius, La Peyr.
Percnopterus aegyptiacus, Steph.) Pl. enl. 427. 429.
Levaill. Ois. Afr. t. 14. - Lath. Hist. t. 5. - Jard.
et Selb. Ill. Orn. t. 33. - Gould, Eur. t. 3. Albus, haud
torquatus; rostro robustiore.
- SUBFAM. 12. GYPAETINAE.
52. **Gypaetus**, Storr. (Phene, Savign.) Eur. As. Afr. 3.
 1. **VULTUR barbatus** L. (aureus, Gesn. - haetiens, Aldr.
alpinus, Br. - niger, magnus, et barbarus, Gm. - Gyp.
grandis, Storr. - alpinus, castaneus, et aureus, Daud.
leucocephalus et melanocephalus, Meyer. - hemachala-
nus, Hutt. - Phene osisfraga et gigantea? Sav.) Edw.
B. t. 106. - Pall. Zoogr. t. 13. - Gould, Eur. t. 4. - Gr.
Gen. B. t. 1. ex Alpibus Helvet. Caucaso,
Mont. Himalayanis. Major: tarsis vestitis.
2. **Gypaetus occidentalis**, Schleg. ex Mont. Pyre-
næus, Sardinia. Minor, coloribus vividioribus; tarsis
vestitis.
3. **Gypaetus nudipes**, Brehm. (meridionalis, Keys. et
Bl. - Schleg.) Rüpp. Vog. N.-Ost Afr. t. 1? ex Africa
merid. Abyssinia? Minor: tarsis inferne nudis.
Quid Gypaetus altaicus, Gebler, ex Siberia, pallidior?

SUBFAM. 13. GYPOHIERACINAE.

53. **Gypohierax**, Rüpp. (Racama, J. E. Gr.) Africa. 1.
FALCO angolensis, Gm. (Polyborus hypoleucus, Bonn.
Gypaetus angolensis, Daud.) *Shaw, Lev. Mus. t.p. 153.*
Jard. et S. Ill. Orn. new ser. t. 13. - Gr. Gen. B.t. 4.

FAMILIA 4. GYPOGERANIDAE.

SUBFAM. 14. GYPOGERANINAE.

54. **Gyogeranus**, Ill. (Serpentarius, Cuvier. - Sagittarius,
Vosmaer. - Secretarius, Dumeril. - Ophioteres, Vieill.) Africa. 1.
FALCO serpentarius, Gm. (Otis secretarius, Scopoli.
Serpentarius reptilivorus, Daud. - S. africanus, Shaw.
Ophioteres cristatus, Visill. - Gypog. africanus, Smith.
capensis, gambensis et philippensis, Ogilby.) Sonn.
Foy. Nouv. Guin. t. 50. - Lev. Ois. Afr. t. 25.

FAMILIA 5. FALCONIDAE.

SUBFAM. 15. POLYBORINAE.

55. **Polyboroides**, Smith. (Gymnogenys, Less.) Madag. Afr. 1.
VULTUR radiatus, Scop. (*F. madagascariensis*, Daud.-gym-
nogenys, Temm. - *Polyboroides typus*, Smith.) Sonn.
Voy. Ind. t. 103. - Pl. col. 307. - Ill. S. Afr. Zool.
B. t. 81. 82.
56. **Ibycter**, Vieill. (Daptrius, Vieill. - Gymnops, Spix). America m. 2.
1. **FALCO equulinus**, Gm. (formosus, Lath. - nudicollis,
Daud. - Ibycter leucogaster, Vieill. - Ibycter americanus,
Gr. ex Bodd.) *Pl. enl. 417. - Gal. Ois. t. 6. Niger,*
tiliius tetricibus caudis inferioribus albis.
2. **DAPTRIUS atter**, Vieill. (aterrimus, Kaup. - Falco aterri-
mus, Temm.) *Pl. col. 37. 342. - Gal. Ois. t. 5. Niger,*
cauda basi late alba.
57. **Milvago**, Spix (Parasifalco, Less. - Senex, Gr.) America m. 2.
1. **POLYBORUS chimachima**, Vieill. (crotophagus, Wied.
Milvago ochrocephalus et Gymnops strigilatus, Spix.
Falco degener, Ill.) - *Av. Bras. t. 4. jun. t. 5. ad. - Jard.*
et Selb. Ill. Orn. t. 2. Tarsis brevioribus, caerulecentibus.

2. **POLYBORUS chimango**, Vieill. (Aquila pezoporus, Meyen) Nov. Act. Nat. Cur. XVI. t. 6. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 5. Tursis longioribus, flavescentibus.

58. **Phalcobaenus**, Lafr. (Milvago, p. Gr.) America m. 1.

AQUILA **megaloptera**, Meyen (Phalcobaenus montanus, Orbigny. - albicularis, Gould. - Milvago megalopterus, Gr.) Nov. Act. Ac. Nat. Cur. 1834. t. 8. - Foy. Am. m. Ois. t. 2. Albo nigro quo varius; facie nuda; capite plumis crispis: alis cauda longioribus; remigum 1-4 distincte emarginatis.

59. **Polyborus**, Vieill. (Caracara, Cuv. - Aetotriorchis, Kaup.) America m. 2.

1. FALCO **australis** et ambustus, Gm. (leucurus, Lath. novae-zelandiae, Temm. - Vultur planucus, fem. Forster. - Circætus antarcticus, Less. - Milvago australis, Gr.) Pl. col. 29. ad. 192. 224 jun. - Lath. Syn. 1. t. 4. Jard. et Selb. Ill. Orn. n. s. t. 24. Corpore nigro unicolori.
2. FALCO **brasiliensis**, Gm. (tharus, Molina. - cheriway, Jacq. - Vultur planucus, Lath. - Polyborus vulgaris, Vieill.) Miller, Cimel. Ph. t. 17. - Gal. Ois. t. 7. Av. Bras. t. 3. - Sw. Zool. Ill. n. s. t. 2. Corpore ex toto fasciato.

SUBFAM. 16. AQUILINAE.

60. **Aquila**, Br. (Ætos, Nitzsch. - Neopus, Hodgs. - Uroætus, Hieroætus, Pteroætus, Onichoætus, Kaup.) Cosmopol. 11.

1. FALCO **chrysaëtos**, fulvus, canadensis et melanætus, L. (niger, americanus, albus, Gm. - melanotus, cygneus, Lath. - regalis, Temm. - Aquila nobilis, Pall. - fulva, Mey. - regia, Less. - daphaenia? Hodgs.) Pl. enl. 409. 410. - Edw. B. t. 1. - Brown. Ill. t. 2. - Wils. Am. Orn. t. 55. 1. - Gould. Eur. t. 6. - Aud. Am. t. 81.
2. **Aquila heliaca**, Savign. (chrysætos, Leisl. nec Auct. imperialis, Cuv. - mogilnik, Gr. nec Auct. - Falco imperialis, Bechst. Temm.) Pl. col. 151. 152. - Exp. Egypt. H. Nat. t. 12. - Gr. Ill. Ind. Zool. 11. t. 28?
Gould, Eur. t. 5. - ex Eur. As. Afr. Rostro ultra oculum fissum: alis cauda brevi longioribus: digito medio quinque squamato.

3. *Aquila bifasciata*, J. Gr. nec Hornsch. (chrysactos,
Jerdon. - nepalensis? Hodgs. - crassipes vel naevia?
Hodgs.) Ill. Ind. Zool. t. 17. - As. Res. xviii. t. 13?
ex Asia centrali. Praecedenti similis; sed alarum
fusca dupl. distincta.
4. *Aquila naevia*, Br. (pomarina, Brehm.-planga, Vieill.
Pall.-bifasciata, Hornsch. nec Gr. - melanaetos, Savgn.
nec Auct. - longipes? Hornsch. - vittata? Hodgs Gr.
fusca? Brehm.) Sav. Exp. Egypt. t. 1 et 2. f. 1.
Naum. tab. 342. f. 1. 27. - Gould, Eur. t. 8. ex Eur.
Afr. As. nec Amer. sept.
5. *Aquila naevioides*, Cuv. (choka, Smith. - vindhiana,
Frankl. - fulvescens, fusca et punctata, J. Gr. - Falco
naevioides et senegalensis, Cuv. - rapax, Temm. - albicans,
Rüppel.) Pl. col. 455. - Faun. Abyss. t. 13. - Ill. Ind.
Zool. 11. t. 29. 27. 16. ex Afr. et As. m. Rostro ob-
tuse dentato.
6. *Aquila audax*, Gr. (fuscosa, Cuv. Gould. - albirostris,
Vieill. - cuneicaudata, Brehm. - Uroaetus audax, Kaup.)
Pl. col. 32. - Gould, Austr. 1. t. 1. ex Australia.
Cauda cuneiformis!
7. *FALCO vulturinus*, Daud. (niger, Jameson. - Aquila
verreauxii, Less. - Gypaetus cafer, Temm. Ranzani.
Pteroactus vulturinus, Kaup.) Levavill. Afr. t. 6. - Less.
Cent. Zool. t. 38. ex Afr. mer.
8. *FALCO bonellii*, Temm. (ducalis, Licht. Nitzsch. - Aquila
intermedia, Boitard. - fasciata, Vieill. Degland. - nepa-
lensis vel rubriventer, Hodgs. - Talmacetus bonelli.,
Blyth. - Hieraaetus bonelli, Kaup. - Nisactes grandis,
Hodgs. - N. niveus, Jerdon) Pl. col. 288. - Marmora,
Mem. in Act. Taurin. 1840. fig. var. - Gould, Eur. t. 7.
Eur. mer. As. Afr. sept.
9. *FALCO pennatus*, Gm. (Aquila pennata, Cuv. - minuta,
Brehm. - Spizaetus milvooides, Jerd. - Hieraaetus pen-
natus, Kaup.) Pl. col. 33. - Gould. Eur. t. 9. ex Asia
et Eur. orientali.
10. *Aquila morphnoides*, Gould. (Hieraaetus morphnoi-
des, Kaup.) Aust. 1. t. 2. ex Australia. Prae-
denti perornis, nec major: capite postico cristato!
11. *FALCO malayensis*, Reinwardt (Aquila malayana,
Less. - Heteropushinc Neopus perniger, Hodgs. - Nisae-
tus hinc Ictinaetus malayensis, Jerd. - Onichaetus ma-
layensis, Kaup.) Pl. col. 117. Nigricans; alis candoque
elongatis: dígito medio, interno breviori, longitudine exter-
num valde superante!

61. **Haliaetus**, Savigny. (Cuncuma, Hodgs.-Pontosætus, Kaup.) Ear. As. Am. Oc. 7.

1. **FALCO albicilla**, L. (albicaudus, ossifragus et melanctus, Gm. - hinnularius, Lath. - orientalis, borealis, islandicus, et groenlandicus, Brehm. - Haliaetus nisus, Savigny.) Pl. enl. 112. 415. - Kittl. Kupf. der Vog. t. 2. f. 2. - Gould, Eur. t. 10. ex Eur. et Asia sept.
 2. **FALCO leucocephalus**, L. pygargus, Daud. - ossifragus, Wils. jun. - Aquila leucocephala et washingtoni, Audub.) Pl. enl. 411. - Vieill. Ois. Am. s. t. 3. - Wils. Am. Orn. t. 36. ad. t. 55. 2. jun. - Aud. Am. t. 31. 126. adult. et jun. t. 11. juven. adultefact. - Gould, Eur. t. 11. ex Am. s.
 3. **AQUILA pelagica**, Pall. (Falco imperator, Kittl. - leucopterus? Temm. - Thalassactes pelagicus, Kaup.) Zoogr. As. 1. t. p. 343. - Pl. col. 489. adult. - Kopf. Vog. t. 2. f. 1. adult. - Faun. Jap. t. 4. junior. ex Asia orient.
 4. **FALCO macei**, Temm. (leucoryphus, Pall. - Hal. fulviventer, Vieill. - unicolor, Gr. - albipes et lanceolatus, Hodgs. - Cuncuma macei, Gr.) Pl. col. 8. 223. - Ill. Ind. Zool. t. 19.
 5. **FALCO vocifer**, Daud. (Cuncuma vocifera, Gr.) Levaill. Afr. t. 4. - O des Murs, Pl. p. 8. ex Afr. m.
 - 6? **Haliaetus vociferoides**, O des Murs, Iconogr. Ornith. Pl. p. 17.
 7. **FALCO blagrus**, Daud. (leucogaster, Gm. - albicilla var. Lath. - Haliaetus sphenurus, Gould. - Ichthyetus cultrunguis, Blyth. - Cuncuma leucogastra, Gr., Pl. col. 49. - ex Afr. As. Oc.
62. **Geranoætus**, Kaup. (Heteroætus, Kaup. - Cuncuma, p. Gr.) America m. 1.
- FALCO **aguia**, Temm. (Spizaëtus melanoleucus et fuscescens, Vieill. ex Azara 8. - Cuncuma menoleaca, Gr. Haliaetus aguia, Cue. - Buteo aguia, Caban.) Pl. col. 302.
63. **Haliastur**, Selby (Ictinoætus, Kaup. - Dentiger, Hodgs.) Asia m. Oc. 3.
1. **FALCO ponticerianus**, Gm. (Haliaetus girrenara, Vieill. garuda, Less. - Milvus rotundicaudus, Hodgs. - Haliastur indus, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 416. - Gal. Ois. t. 10.
 2. **FALCO PONTICERIANUS**, Shaw. (Haliaetus **leucosternus**, Gould.) Nat. Misc. t. 389. - B. of Austr. t. 4. ex Austral.
 3. **MILVUS sphenurus**, Vieill. (Haliaetus canorus, Vig.) Ictinoætus canorus, Kaup., Gal. Ois. t. 15. - Gould, Austral. t. 1. t. 5. ex Australia.

64. **Pandion**, Savigny. (Ichthyaetus, *Zafr.* - Polioæetus, *Kaup.*) Cosmopol. 5.1. **FALCO haliaeetus**, L. (Pandion flavialis, *Savigny*. - ichthy-ætus, *Kaup.* nec *Horsf.* - alticeps et planiceps, *Brehm.*Aquila halbuzardus, *Dum.* Pl. enl. 416. - *Gould. Eur.*t. 12. ex *Eur. As. occ.*2. **FALCO carolinensis**, cayanensis et arundinaceus, *Gm.*(piscator, *Br.* - Aquila piscatrix, *Vieill.* - haliaeta,Richards. - Pandion americanum, *Vieill.*) Ois. Am. s.t. 4. - Gal. Ois. t. 11. - Pl. enl. 414. - *Wils. Am. Orn.*t. 37. 1. - *Aud. Am. t. 81. ex America.*3. **Pandion leucocephalus**, *Gould*, (gouldii, *Kaup.*)*Austr. t. 6. ex As. or. Oceania.*4. **FALCO ichthyaetus**, *Horsf.* (Haliaetus plumbeus,Hodgs. - Ichthyaetus hucorius, *Hodgs.* - bicolor, *Gr.*Pontactus ichthyaetus, *Gr.* - Polioæetus ichthyaetus,*Kaup.) Horsf. Res Java cum fig. ex As. Ocean.*5. **Pandion humilis**, Temm. (Ichthyaetus nanus, *Blyth.*Polioæetus humilis, *Kaup.) Schleg. et Müll. Verh.**Nederl. t. 6. ex As. m. Ocean.*65. **Helotarsus**, Smith (Teratopus, *Less.*) Africa m. 1.**FALCO ecaudatus**, Daud. (Helotarsus typus, *Smith*)*Lev. Afr. t. 7. 8.*

SUBFAM. 17. BUTEONINAE.

66. **Circaetus**, Vieill. Eur. As. Afr. 4.1. **FALCO gallicus**, Gm. (leucopsis, *Bechst.* - longipes, *Nilss.*brachidactylus, *Temm.* - Aquila pygargus, *Br.* - leu-camphomma, *Borkh.* - Accipiter hypoleucus? *Pall.*ferox? *Gm.* - Circaetus leucopsis et anguum, *Brehm.)*Pl. enl. 413. - *Gould. Eur. t. 13.*2. **Circaetus thoracicus**, Cuv. (pectoralis, *Smith.*fasciolatus? *Gr.* - Aquila undulata? *Licht.*) ex Afr. m.3. **Circaetus cinereus**, Vieill. (funereus, *Rüpp.*)Gal. Ois. t. 12. - *Fn. Abyss. t. 14. ex Afr. orient.*67. **Spilornis**, Gr. (Haematornis, *p. Vig.*) Asia. Ocean. 3.1. **FALCO bacha**, Daud. (albidus, *Cuv.* - *bibo*, *Horsf.*) Pl. col.19. juv. - *Levaill. Ois. Afr. t. 15. ex Malaya s. a.*

2. **FALCO cheela**, Daud. (Haematornis undulatus, Vig.

Circaetus nepalensis; mithilensis, tarayensis et maculatus, Hodgs. - Spilornis undulata, Gr. - Buteo melanotis, Jerd. - B. bacha, Frankl.) As. Res. XVIII. t. 2. Gould, Cent. Him. B. t. 1. ex Asia centralis.

3. **BUTEO holospilus**, Vig. (Circaetus holospilus, Kaup.) Gray et Mitch, Gen. B. t. 7. ex As. or. Ocean.

68. **Tachytriorchis**, Kaup. (Buteo, p. Gr.) America m. 4.

1. **FALCO pterocles**, Temm. (Buteo albicaudatus et nigricollis, Vieill. - Spizaetus leucurus; Vieill.) Pl. col. 56. 139.

2. **Haliaetus erythronotus**, King. (Buteo tricolor et unicolor, Orb. - varius, Gould. - erythronotus, Gr. - Falco polysomus, Quoy. - Aquila braccata, Mey. - Tachytriorchis pterocles p. hinc Paecilopternis erythronotus, Kaup.) Voy. Am. m. t. 3. f. 1. 2. - Voy. Uranie, Ois. t. 14? - Nov. Act. Ac. Nat. Cur. 1833. t. 8? ex Amer. mer.

3. **BUTEO albinotatus**, Gr. Brit. Mus. - Kaup, Isis 1847.
ex Mexico.

4. **BUTEO leucops**, Gr. Brit. Mus. - Kaup, Isis 1847.

69. **Buteogallus**, Less. (Icthyoborus, Kaup. - Buteo, p. Gr.) America m. 2.

1. **FALCO buson**, Daud. (aequinoctialis, Lath. - Aquila urubitinga? Spix. - Circaetus solitarius? Tschudi, adult. Buteogallus cathartoides, Less.) Levaill. Afr. t. 21. Av. Bras. t. 1. 1?

2. **FALCO busarellus**, Daud. (nigricollis, Lath. - melano-bronchus, Shaw. - Circus leucocephalus, Vieill. - Aquila milvoidea, Spix. - Buteo aequinoctialis! p. Kaup. Buteo nigricollis, Gr.) Lev. Afr. t. 20. - Av. Br. t. 1. d.

70. **Archibuteo**, Brehm (Butaetes, Less. - Butaquila, Hodgs.

Triorchis, Kaup.) Cosmopol. 4.

1. **FALCO lagopus**, Brunn. (plumipes, Daud. - sclavonius, Lath. - pennatus, Cuv. - planiceps et alticeps, Brehm. Butaetes lessoni, Smith) Lev. Afr. t. 18. - Gould, Eur. t. 15. ex Europa, As. sept. Tarsis valde plumatis.

2. **FALCO sancti-johannis** et novae-terrae, *Gm.* (*lagopus*
et *niger*, *Wils.* - *spadicetus*, *Forst.* - *ferrugineus*, *Licht.*
Buteo ater, *Vieill.* - *Lagopus ferrugineus*, *Fraser* - *Ar-*
chibuteo ferrugineus, *sancti-johannis* et *regalis*, *Gr.*)
Arct. Zool. n. t. 9. - *Am. Orn.* t. 53. 1. adult. 2. juv.
t. 33. 1. juv. - *Richards.* et *Sw. Faun. Bor. Am.* t. 28.
Aud. Am. t. 166. 422. - *Gr. et Mitch. Gen. B.* t. 6.
ex Amer. sept. Tarsis minus plumatis.
3. **Archibuteo strophiatus**, *Gr.* (*Falco asiaticus*?
Lath. - *hemilasius*? *Schlegel* - *Aquila strophiata*, *et But-*
taquila leucocephala, *Hodgs.* - *Buteo leucocephalus* *et*
aquilinus, *Hodgs.*) *Faun. Jap.* t. 7. *ex Asia.*
- 4? **Archibuteo hemiptilopus**, *et griseogenys?* *Blyth*
1845 - *cryptogenys*, *Hodgs.* 1847) *Calcutta Journ.*
Nat. Hist. 1847. t. 3. f. 1.
71. **Poliornis**, *Kaup.* (*Butastur*, *Hodgs.*) Asia or. Oc. 3.
1. **FALCO poliogenys**, *Temm.* (*Buteo pyrrhogenys*, *lapsu-*
calami, *Schleg.* - *Circaetus poliogenys hinc indicus*,
Kaup. - *Poliornis indicus* *et pyrrhogenys*, *Gr.*) *Pl.*
col. 325. - *Faun. Jap.* t. 7. b. *ex As. orient.*
2. **FALCO liventer**, *Temm.* (*buteo pallidus*, *Less.* - *Circae-*
tusliventer, *Kaup.* - *Astur hinc Poliornis liventer*, *Gr.*)
Pl. col. 438. *ex Malaia s.a.*
3. **CIRCUS teesa**, *Franklin* (*Buteo teesa*, *J. Gr.* - *Astur*
hyder, *Sykes.* - *Butastur teesa*, *Hodgs.* - *Circaetus teesa*,
Kaup. - *Poliornis teesa*, *Gr.*) *Ill. Ind. Zool.* t. 30.
ex Asia centr. et merid.
72. **Buteo**, *Vieill.* (*Paecilopternis*, *Kaup.*) Cosmopol. 12.
1. **FALCO BUTEO**, *L. (cinereus)*, *obsoletus*, *variegatus*, *versico-*
lor, *Gm.* - *glaucopis*, *Merr.* - *pojana*, *Savi.* - *Buteo vul-*
garis, *Bechst.* - *mutans* *et fasciatus*, *Vieill.*) *Pl. enl.* 419.
Gould, Eur. t. 14. ex Eur. As. occ.
2. **Buteo japonicus**, *Schleg.* *Fn. Jap.* t. 6. *ex Asia*
orient. *Tarsis magis plumatis.*
3. **FALCO tachardus**, *Daud.* (*Buteo tachardus*, *Vieill.*
capensis, *Schleg.* *in Fauna [Jap.] Lev. Afr.* t. 19.
ex Africa merid.
4. **CIRCUS rufinus**, *Rupp.* (*Buteo rufinus*, *Kaup.*) *Zool.*
Atl. t. 29. - *Faun. Abyss.* t. 7. *ex Africa orient.*
5. **Buteo canescens**, *Hodgs.* (*longipes* *et rufiventer*,
Jerd.) *ex Asia cont.* *Simillimus praecedenti, at colo-*
ribus pallidioribus.

6. **FALCO jackal**, Daud. (Buteo jackal, Cuv.) *Lev. Afr.*

t. 16. ex Afr. merid. Niger, albo rufoque varius: humeris cinereis, maculis fuscis marginisque nigro: cauda rufa, fascia apicali nigra.

7. **FALCO augur** et hydrophilus, Rüpp. *Faun. Abyss.*

t. 16. 17. Humeris cinereis nigro fasciatis: cauda rufa, fascia apicali nigra.

8. **CIRCUS plumipes**, Hodgs. *Icon. ined. Acc. 8. 28.*

Fuscofuliginosus: tarsis plumis elongatis tectis.

9. **FALCO borealis**, leverianus et jamaicensis, Gm. (Buteo ferrugineicaudus, americanus et fulvus, Vieill. - Accipiter ruficaudus, Vieill. - B. ventralis, Gould. - B. harlani, Audubon - Paeциlopternis borealis, Kaup.) *Ois. Am. s. t. 6. et 14. bis. - Wils. Am. Orn. t. 52. 1. adult. 52. 2. juv. - Aud. Am. t. 51. ad. t. 86. var. ex Amer. s.*10. **Buteo swainsoni**, Bp. (vulgaris, Richards. - montana, Nutt.) *Sw. Faun. Bor. Am. t. 372. ex Amer. bor.*11. **FALCO lineatus** et hyemalis, Gm. (buteoides, Nutt. Circus hyemalis, Bp. - Buteo fuscus, Vieill. - Paeциlopternis lineatus, Kaup.) *Wils. Am. Orn. t. 35. 1. et 53. 3. - Vieill. Ois. Am. I. t. 5. - Aud. Am. t. 56.*12. **FALCO PENNSYLVANICUS**, Wils. nec L. (**wilsoni**, Bp. latissimus, Ord. - Sparvius platypterus, Vieill. - Paeциlopternis wilsonii, Kaup.) *Am. Orn. t. 51. 1. - Aud. Am. t. 91. ex America.*73. **Leucopternis**, Kaup. (Buteo, p. Gr.) America m. 6.1. **FALCO melanops**, Lath. *Pl. col. 105.** 2. **Leucopternis Kuhli**, Bp. *Similis praecedenti, sed capite nigricante: unguibus albis.*3. **FALCO albicollis**, Lath. (picatus, Shaw.)4. **FALCO lacernulatus**, Temm. (scotopterus, Wied.) *Pl. col. 437.*5. **BUTEO polionotus**, Gr. (melanotus? Vieill.)6. **BUTEO paccilonotus**, Cuv. (brachyrus? Vieill. ghiesbrechtii, Dubus) *Esquiss. Orn. t. 1. - Pl. col. 9.*74. **Gypoictinia**, Kaup. (Buteo part. Gr.) Australia. 1.**BUTEO melanosternum**, Gould *B. of Austr. 1. t. 20.*

SUBFAM. 13. MILVINAE.

75. **Pernis**, Cuv. Eur.or.As.Afr. 2.

1. **FALCO apivorus**, L. (poliorhynchos, Bechst. - dubius, Sparrm. - incertus, Lath. - Accipiter lacertarius, Pall. Pernis apium et vesparum, Brehm. - madagascariensis? Smith.) Pl. enl. 420. - Gould, Eur. t. 16. - Jard. et S. Ill. Orn. n. s. t. 1.
2. **Pernis cristata**, Cuv. (elliottii, Jameson. - maculosa, Less. - bharatensis, Hodgs. - torquata, ruficollis, et albicularis? Less. - Falco ptilorhynchus, Temm.) Pl. col. 44. - O des Murs, Pl. p. 13. 14. ex Asia.

76. **Avicida**, Sw. (Lophotes, Less. - Baza, Hodgs. - Lepidogenys, Gr. - Hyptiopus, Hodgs. - Ichthierax! Kaup. Lophastur, Blyth.) As.m. Afr. Oc. 5.

1. **FALCO lophotes**, Cuv. (lathami, Gr. - Buteo cristatus, Vieill. - Lophotes indicus, Less. - Baza syama, Hodgs. Lophastur jerdoni? Blyth.) Pl. col. 10. ex Asia, Ocean.
2. **LOPHOTES reinwardtii**, Schleg. et Müll. (sumatrensis? Lafr. - forsteni, Temm. Mus. Lugd.) Verh. Nederl. t. 5. ex Celebes. Major, fuscus, cauda fasciata.
3. **FALCO frontalis**, Daud. (piscator, Gm. - galericulatus, Shaw. - Avicida euculoides, Sw. - verreauxii et buteoides Lafr.) Lev. Afr. t. 28. - Birds of West. Afr. t. 12. ex Africa.
4. **LEPIDOGENYS subcristatus**, Gould, Austr. i. t. 25. ex Australia.
5. **PERNIS magnirostris**, Kaup. ex Insulis Philip. pinis.

77. **Rosthramus**, Less. America m. 1.

- FALCO hamatus**, Ill. (leucopygus, Spix. - Herpetotheres sociabilis? et Buteo hamatus, Vieill. - Rosthramus niger, Less. - R. sociabilis, Orb.) Temm. Pl. col. 61. 231. Spix, Av. Br. t. 2. - Mag. Zool. 1835. Ois. t. 20.

78. **Cymindis**, Cuv. (Leptodon, Sundeval. - Odontiorchis et Regerhinus, Kaup.) America m. 3.

- FALCO cayanensis**, Gm. (palliatus, Wied. - Asturina cyanopus, Vieill. - Sparvius monachus, cinereus, bicolor et griseus, Vieill. - Cymindis buteonides, Less.) Pl. enl. 473. ad. - Pl. col. 270. juv. 204. ad. - Spix, Av. Br. t. 8. c. d. Mag. Zool. 1835. Ois. t. 22.

2. **FALCO uncinatus**, Ill. (vitticandus, Wied. - *Cymindis ceculoides*, Sw. - Regerhinus uncinatus, Kaup.) *Pl. col.* 103. 104. 115. - *Mag. Zool.* 1835. *Ois. t. 21.*

3. **Cymindis wilsoni**, Cassin. *Journ. Acad. Philad.* 1847. *t. 7.*

79. **Gampsonyx**, Vig.

America m. 1.

Gampsonyx swainsonii, Vigors (Elanus torquatus, Cuv. - Falco rufifrons, Wied. - Gampsonyx holmi, Sundeval, *Mus. Lugd.*) Gray et Mitchell, *Genera of Birds* t. 9.

80. **Milvus**, Cuv. (Hydroictinia, Kaup.)

Eur. As. Afr. Oc. 6.

1. **FALCO MILVUS**, L. (austriacus, Gm. - *Milvus regalis*, Br. ictinus, Sav. - castaneus et russicus, Daud. - jaicensis, Lepech. - vulgaris, Flem. - ruber, Brehm) *Pl. enl.* 422. Gould *Eur. t. 28. ex Europa.*

2. **Milvus govinda**, Sykes, (cheele, Jerd. - indicus vel cheela, Hodgs. - melanotis, Temm. - Ictiaetus lineatus, Gr. - Hydroictinia govinda, Kaup.) *Ill. Ind. Zool. t. 18. Faun. Jap. t. 5. ex Asia.*

3. **Milvus niger**, Br. (ater, Daud. - aetolius, Vieill. fuscus, Brehm - Falco ater, Gm. - migrans, Bodd. fuscus-ater, Meyer. - cinereo-ferrugineus? Forst. - Accipiter milvus, Pall. - Hydroictinia atra, Kaup.) *Pl. enl.* 472. - Gould, *Eur. t. 29. ex Eur. Asia. Afr.*

4. **Milvus affinis**, Gould, (Hydroictinia affinis, Kaup.) *Austr. l. t. 21.*

5. **FALCO parasitus**, Daud. (aegyptius et forskalii, Gm. parasiticus, Lath. - Hydroictinia parasitica, Kaup. - Milvus aegyptius, Gr. Degland, Ornith. Europ.) *Lev. Afr. t. 22. - Exp. Egypt. Ois. t. 3. 1. ex Africa. Rostro flavo!*

6. **Milvus isurus**, Gould, (Falco pacificus? Latham) *Austr. l. t. 22. ex Australia. Tarsis reticulatis: cauda vix emarginata!*

81. **Nauclerus**, Vig. (Elanoides, Gr. - Chelidopteryx, Kaup.) Am. Afr. 2.

1. **FALCO furcatus**, L. (Milvus carolinensis, Br. - Elanoides furcatus, et yetapa ex Azara, Vieill.) *Cat. Car. t. 4. Pl. enl. 72. - Wils. Am. Orn. t. 51. 3. - Gould, Eur. t. 30. Aud. Am. t. 72.*

2. **ELANOIDES riocouri**, Vieill. (*Nauclerus riocouri*, Vig.
Chelidopteryx riocouri, Kaup.) *Gal. Ois.* t. 16. - *Pl.*
col. 85.

82. **Elanus**, Savign. (*Elanoides*, Vieill.) Cosmopol. 5.

1. **FALCO melanopterus**, Daud. (*vociferus etsonnensis?*
Lath. - *Elanus caesius*, Sav. - *Buteo vociferus et Ela-*
noides caesius, Vieill.) *Leach. Zool. Misc.* t. 122.
Exp. Egt. t. 2. 2. - *Lev. Afr.* t. 36. 37. - *Gould, Eur.* t. 31.
ex Afr. et in Eur. accidentaliter.

*2. **Elanus minor**, Bp. *ex Asia*. *Similis praecedenti,*
sed minor.

3. **FALCO axillaris**, Lath. (*Elanus melanopterus*, Vig. *nec*
Daud. - *notatus*, Gould) *Austr.* t. t. 23. *ex Austr.*

4. **Elanus scriptus**, Gould. *Austr.* t. t. 24. *ex Austr.*

5. **MILVUS leucurus**, Vieill. (*Falco dispar*, Temm. - *me-*
lanopterus, Bp. *nec* Daud. - *Elanoides leucurus*, Vieill.
Elanus dispar, Kaup. - *Elanus leucurus*, Bp.) *Am.*
Orn. t. 11. f. 1. *ex America.*

83. **Ictinia**, Vieill. (*Nertus*, Boie - *Paeциlopteryx*, Kaup.) Am. calid. 2.

1. **FALCO plumbeus**, Gm. (*Milvus cenchris*, Vieill. *Pae-*
циlopteryx! *plumbea*, Kaup.) *Ois. Am. s. t. 10. bis.*
Temm. Pl. col. 180. juv. - *Spix, Av. Br.* adult.
ex Amer. merid. *Cauda albofasciata.*

2. **FALCO mississippiensis**, Wils. (*Ictinia ophiophaga*,
Vieill.) *Gal. Ois.* t. 17. - *Wils. Am. Orn.* t. 25. f. 1.
Aud. Am. t. 117. *ex Amer. sept.* *Cauda unicolor.*

SUBFAM. 19. FALCONINAE.

84. **Ieraciden**, Gould. Ocean. 3.

1. **FALCO norae-seelandiae**, Gm. (*brunneus*, Gould
harpe, Forst. - *australis*, Hombr.) *Syn. B. Austr.* III.
tab. f. 3. - *Voy. Pole sud*, *Ois. t. 1. f. 1.*

2. **FALCO berigora**, Vig. (*Ierac. berigora*, Gould) *B. of*
Austr. t. t. 11. *ex Austr. or. Ceracinerascenti.*

3. **Ieracidea occidentalis**, Gould. *Austr.* t. t. 12.
ex Austr. occid. Minor: cera flava: pectore albo.

85. **Falco**, L. (Hierofalco, Cuv. - Rhynchodon, Nitsch. - Gen-naja, Kaup.)

Cosmopol. 19.

1. **FALCONES**, Kaup.

Cauda brevis: digitus elongati: macula mysta-calis dilatata.

1. **Falco peregrinus**, Auct. (**communis**, Br. et Gm. abietinus, Bechst. - calidus? Lath. - cornicum, Brehm.)
Pl. enl. 430. 421. 469. - Naum. t. 24. 25. - Gould, Eur. t. 21. - Schleg. Fauconn. fig. optima. - Susem. Vog. Eur. t. 8.

2. **Falco peregrinus**, Vig. et Horsf. (**melanogenys**, Gould, - macropus, Sw.) Austr. i. t. 8. ex Oceania.
An varietas Falconis communis qui etiam in Europa, inter-dum genis nigris gaudet, praecipue in faeminis senescentibus?

3. **Falco peregrinator**, Sundev. (rhombeus? Lath. shaheen, Jord. - sultaneus, Hodges. - lugger, Aliororum.)
Fig. nulla. ex Asia centrali et merid.
Varietas F. communis? non semper subtus fulvus immaculatus.

4. **Falco peregrinus**, Wils. (**anatum**, Bp.) Am. Orn. t. 76. - Aud. Am. t. 16. ex Amer. sept.
Forsan a F. communis specie haud diversus!

5. **Falco peregrinus**, Smith. (**peregrinoides**, Aliororum. **communis minor**, Schlegel) *Fig. nulla. ex Afr. mer.*
Magis a Falco communis quam praecedentes distinctus! Mi-nor, maribus ipsis eorum magnitudine ejus faemina sem-per superantibus.

6. **Falco peregrinoides**, Temm. Pl. col. 470. - Susem.
Vog. Eur. t. 9. f. 1. ex Africa sept. orient. Mi-nor: nucha rufescens; subtus flavo-rufescens.
Similis F. communis, sed cauda brevi ut in praecedentibus, quamevis digitis brevioribus sequentium! Species optima minime europaea.

2. **HIEROFALCONES et GENNAJAE**, Kaup.

Cauda elongata: digitus breves: macula mysta-calis circumscripta.

7. **Falco canicollis**, Gm. (groenlandicus, Brehm, Hanc.) Pl. enl. 446. - Hanc. tab. x. - Gould, Eur. t. 19. Schleg. Fauconn. tab. - Susem. Eur. Vog. t. 6. a. ex Arctic. utriusque continentis, Groenlandia.
Subtus semper immaculatus. Adult, albus.

8. ***Falco islandicus***, Brunn. (gyrfalco, Keys. et Bl.
nec Auct.) Hanc. tab. x. - Schlegel, Fauconn. tab. ex-
mia. - Susemihl, Vog. Eur. t. 7. f. 1. adult. f. 2. juv.
ex Islandia tantum. Similis praecedenti, sed semper
subtus maculatus, etiam hornotinus, et adultus quamevis
albicans.
9. ***Falco gyrfalco***, Schlegel, ex Falconaris, vix L.
(lanarius? L. Fn. Suec.) Buff. Hist. nat. tab. 13.
Pl. enl. 462. ex Norvegia et accident.
Europa occid. Minor; colore, numquam albicante,
F. communis accedit.
10. ***Falco subniger***, Gr. (Hiero-falco subniger, Gould.)
Austr. l.t. 9. - Gr. et Mitch. Gen. B.t. 8. ex Austr.
11. ***Falco hypoleucus***, Gould, Birds of Austr. l.t. 7.
ex Australia.
12. ***Falco mexicanus***, Lichtenstein, Mus. Berolin.
ex Mexico.
13. ***Falco sacer***, Schlegel. ex Belon (orientalis? Gm.
stellaris, Auct. - lanarius, v. d. Muhle, Temm. Gr.
nec L? - lanarius, Susemihl. - cyanopus, Tiedem.
milvipes, Hodgs. - cherrug, Gr. - Gennaja lanarius,
Kaup.) Buff. Hist. Nat. Ois. t. 14. - Ill. Ind. Zool.
t. 25. - Naum. t. 23. f. 1. 2. - Gould, Eur. t. 20.
Schlegel, Fauconn. tab. optima. Susem. Vog. Eur. t. 7. a.
f. 1. adult. f. 2. juv. ex Eur. orient. Asia. Immuta-
bilis, numquam fasciatus.
14. ***Falco jugger***, Gr. (lugger, Jerdon. - thermophilus,
Hodgs. - Gennaja jugger, Kaup.) Ill. Ind. Zool. t. 26.
Gould, B. of Asiat. 1. - Schlegel, Abh. t. 15. ex Asia
centrali.
15. ***Falco lanarius***, Schlegel. ex Belon. vix L! (fel-
deggii, Schlegel). Pl. enl. 470. jun. - Naum. t. 14. f. 28.
Susem. Eur. Vog. t. 8. a. - Schlegel, Fauconn. tab.
pulcherr. - Abhand. tab. 10 et 11. ex Eur. orient.
merid. Dalmatia.
16. ***Falco barbarus***, L. (alphanet, Schlegel. - peregrin-
oides, v. d. Muhle. - puniceus? Levaillant, jun.)
Expl. Alger. Ois. t. 1? - Schlegel, Abhand. tab. 14.
ex Afr. Eur. merid. or? F. lanario similis, sed
magis et ex toto rufescens.
17. ***Falco cervicalis***, Licht. (biarmicus, Temm. - chi-
queroides, Smith) Pl. col. 324. - Gennaja cervicalis,
Kaup. ex Afr. m. Cap. Bonae Spet. Haud dissimili-
atis F. lanario, ut subtus immaculatus.

18. ***Falco tanypterus***, Licht. - Schlegel, Abhand.
tab. 12 et 13. ex Africa or. Nubia. Major, pallidior:
pedibus luteis.
19. ***Falco chicquera***, Daud. (ruficollis et macrodactylus, Sw.) Lev. Afr. t. 30. - Gould, Cent. Hist. B. t. 2.
B. of western Afr. t. 2. ex Afr. et Asia.

* Quid Falco tibialis, Daud. ex Lev. Afr. t. 29. Cap. Bon. Spec?

86. ***Hypotiorchis***, Boie (Æsalon, Kaup. - Dendrofaleo, Gr.) Cosmop. 10.

1. **DENDROFALCONES**. (*Hypotr. Gr.*) *Alis elongatis*.

1. **FALCO eleonorae**, Gené (concolor, v. d. Mühle, nec Temm. - arcadicus, Linderm.) Mem. Acad. Taur. 1840. t. 1. 2. - Bp. Faun. Ital. t. 1. - Susem. Vög. Eur. t. 53 et 54. fig. variis optimis. 1. mas. 2. faem. 3. var. nigra. 4. var. cinerea. ex Sardinia, Graecia et Africa. s. Major: nigro plus minus cinerascens, sub-tus fuscescens: alis elongatis: cauda fasciis sub-quindocim: rostro subdepresso: unguibus gracilioribus.
2. **FALCO concolor**, Temm. exclus. Pl. col. 330. - Gould, Eur. t. 25. - Susem. Vög. Eur. t. 9. 2. ex Africa s. or. nec Eur. I. Minor, cinereo plus minus fuscescens, sub-tus pallescens: alis elongatis: cauda fasciis sub-decem: rostro compresso: unguibus gracilioribus.
3. **FALCO subbuteo**, L. (barletta, Daud. - pinetarius? Shaw. hirundinum, Brehm.) Pl. enl. 432. - Gould Eur. t. 22. Susem. Vög. Eur. t. 10. f. 1. ex Eur. As. Afr.
4. **FALCO frontatus** etruviventer, Gould (lunulatus? Lath. subbuteo? Brehm, Isis, 1845. - longipennis, Sw.) Austr. I. t. 10. ex Australia.
5. **FALCO severus**, Horst. (aldrovandii, Reinw. - rufipedoides, M. Celle. - guttatus, Gr. - religiosus, Temm. Mus. Lugd. var. nigra. ex Coram.) Pl. col. 128. ex Malaya et Asia.
6. **FALCO aurantius**, Gm. (aurantius var. Lath. - rufigularis, Daud. - cucullatus, Sw. - thoracicus, Donor. deiroleucus, Temm. faem. - Hypotiorchis aurantius, Kaup. - Hyp. rufigularis, Gr.) Nat. Rep. t. 45. - Pl. col. 348. - Penn, Gen. B. t. 1. ex Amer. merid.

2. LITHOFALCONES (Æsalon Gr.) *Alis brevibus.*

7. **FALCO ardesiacus**, Vieill. (concolor, *Sw.* nec *Temm.*
unicolor, *Sw.* - *tibialis* var. *Kaup.*, nec *Daud.* ex *Lev.*
Afr. t. 29. - Æsalon *concolor* *Kaup.* - *Hypotriorchis*
concolor, *Gr.*) *Pl. col.* 330. - *Sw.* *B.* of *western*
Afr. t. 3. ex *Africa* occ. *minime* *Europ!*
Cinerous, *subtus dilutior*, *saepe striolis nigricantibus*: *alis*
brevibus: *cauda*, *fuscis sub-duodecim albicantibus*: *rostro*
depresso: *unguis validis*.
Falco concolor *Temminchi* non est, sed tantum ejus pictoris.

8. **FALCO femoralis**, Temm. (aurantius var. *Lath.* - *thor-*
acicus, *Ill.*-*cyanescens*, *Vieill.* - *elegans*, *Sw.* - *haemor-*
rhoidalis, *Hahn* - Æsalon *femoralis*, *Kaup.*) *Pl. col.*
121. 143. - *Hahn*, *Vög.* *As. Am.* x. t. 1. ex *Amer.*
mer. Mexico.

9. **FALCO columbarius**, L. (temerarius, *Aud.* - *æsalon*
Richards. - *intermixtus*, *Daud.* - *Accipiter carolinensis*,
Br. - *Tinnunculus columbarius*, *Vieill.* - *Nisus columbarius*, *Cuv.* - *Astur columbarius*, *Boie* - $\text{Æsalon columbarius}$, *Kaup.* - *Hypotriorchis columbarius*, *Gr.*)
Ois. Am. s. t. 11. - *Wils. Am. Orn.* t. 15. 3. - *Faun. Bor. Am. t. 25.* - *Aud. Am. t. 75.*

10. **FALCO æsalon** et lithofalco, Gm. (caesius, *Mey.*
regulus, *Pall.* - *sibiricus*, *Shaw.* - *smirillus*, *Savign.*
 Æsalon lithofalco, *Kaup.* - *Hypotriorchis lithofalco*, *Gr.*)
Pl. enl. 447. - *Zoogr. Ross. As. t. 7.* - *Gould, Eur.*
t. 24. - *Susem. Vög. Eur. t. 10. 2. 3. ex Eur. Asia.*

87. **Poliherax**, Kaup. (*Tinnunculus p. Gr.*) Africa. 1.
FALCO semitorquatus, Smith *Ill. S. Afr. Zool.* t. 1.

88. **Erythropus**, Brehm (*Panychistes*, *Kaup.* - *Tinnunculus p. Gr.*) Eur. or. Asia. 1.

FALCO vespertinus, L. (rufipes, *Beseke* - *Cerchnies vespertinus*, *Boie* - *Tinnunculus vespertinus*, *Gr.*) *Pl. enl.* 431. - *Pall. Zoogr.* t. 6. - *Kittl. Kupf. der Vög.* t. 3. 1. - *Gould, Eur.* t. 23. - *Naum. t. 28.* - *Susem. Vög. Eur.* t. 13. mas. faem. et juv.

89. **Tinnunculus**, Vieill. (Cerchneis, Boie - Falcula, Hodgs.

Ægyptius, Kaup. - *Tichornis et Paecilornis*, Kaup.) Cosmop. 12.

1. **FALCO TINNUNCULUS**, L. (Accipiter *alaudarius*, Br.

F. brunneus, Bechst. - *fasciatus*, Retz - *rufescens?* Sw.
interstinctus? Mc. Clell. - Cerchneis *tinnuncula*, mu-
rum et media, Brehm.) Pl. enl. 401, 411. - Gould
Eur. t. 26. ex Eur. As. Afr. sept.

2? **Tinnunculus japonicus**, Schleg. Faun. Jap.

t. 1. et 1.a. ex Japon. *Simillimus* preecedenti, at coloribus
semper obscurioribus.

3. **Tinnunculus moluccensis**, Schlegel. - Hombr.

et Jacq. Voy. au Pole Sud, Ois. t. 1. 2. ex Ocean.
Mas et faemina haud inter se dissimiles! Species optima!

4. **FALCO rupicolus**, Daud. (capensis, Shaw.) Lev. Afr.

t. 35. ex Africa mer.

5. **FALCO rupicoloides**, Smith, Ill. S. Afr. Zool. Birds,
t. 92. ex Africa mer.6. **FALCO punctatus**, Cuv. Pl. col. 45. faem. ex Madag.7. **FALCO gracilis**, Less. nec Sw. - O. des Murs, Pl. p. 25.
mas. ex Ins. Africanis Seychelles.8. **FALCO cenchroides**, Vig. et Horsf. (Cerchneis im-
maculatus, Brehm.) Gould, Austr. I. t. 13.9. **FALCO cenchris**, Naum. (tinnunculoides, Schinz. - tin-
nuncularius, Vieill. - xanthonyx, Natter. - naumannni,
Fleischer - *Ægyptius hinc* Tichornis! cenchris, Kaup.)
Gerin. St. Ucc. t. 25. - Vög. Nachtr. t. 29. - Vieill.
Faun. Fr. t. 36. - Bory, Exp. Mor. Ois. t. 2. 3.
Gould, Eur. t. 27. - O. des Murs, Pl. p. 25? ex Eur.
m. or. As. occ. *Unguibus albis!*10. **FALCO sparverius**, L. (dominicensis? Gm. - Cerchneis
sparverius, Boie. - Paecilornis! sparverius, Kaup.)
Vieill. Ois. Am. s. t. 12. - Wils. Am. Orn. t. 31. 1.
et t. 16. 1. - Rich. Faun. Bor. Am. B. t. 24. - Audub.
Am. t. 42. - ex Amer. sept. - *Macula pilei rufa*.11? **FALCO sparveroides**, Vig. (gracilis? Sw. nec Less.
isabellinus? Sw. - Bidens sparverius? Spix) Voy. Isl.
Cuba, Ois. t. 1. - Vieill. Ois. Am. s. t. 13? - Fraser,
Zool. typ. t. 11? ex *Insulis Antillarum*, Mexico,
et proxima Am. merid. *Macula occipitali nulla*.12. **FALCO cinnamomeus**, Sw. (Tinnunculus cinnamo-
meus, Gr.) ex Amer. merid. Chili, Patagonia.

90. **Harpagus**, Vig. (Bidens, *Spix.* - Diodon, *Less.* - Diplodon, *Nitzsch.*) American. 2.

1. **FALCO bidentatus**, Lath. (Bidens rufiventer et albiventer, *Sp.* - Diodon brasiliensis, p. *Less.*) *Pl. col.* 28. ad. 228. jun. - *Ac. Bras.* t. 6. 7.
2. **FALCO diodon** Temm. (Bidens femoralis et cinerascens, *Spix* - Diodon brasiliensis, p. *Less.*) *Pl. col.* 198. - *Av. Brasil.* t. 8.

91. **Ierax**, Vig. Asia m. Oc. 3.

1. **FALCO caeruleoescens**, L. (fringillarius, *Drapiez* - malayensis, *Strickl.*) *Edw. B.* t. 108. - *Gal. Ois.* t. 18. *Pl. col.* 97. - *Kittl. Kupf. Vög.* t. 3. 2. ex *Malaia asia.*
2. **FALCO bengalensis**, Br. (caeruleoescens, var. *Lath.* - *Jerax erythrogenys*, *Vig.* - eutolmus, *Hodgs.* - melanoleucus, *Blyth.*) ex *Asia continentali.*
3. **FALCO sericeus**, Kittl. (giromnieri, *Eydoux et Soul.*) *Mem. Ac. Pet.* 1835. t. 1. - *Kupf. Vög.* t. 3. 3. faem. *Voy. Bonite, Ois.* t. 1. ex *Ins. Philippinis.*

SUBFAM. 20. ACCIPITRINAE.

92. **Spizaetus**, Vieill. (Plumipeda, *Flem.* - Spizastur, *Less.*

Limnaetus *Vig.* - *Nisaetus*, *Hodgson* - *Lophaetus et Pteronura*, *Kaup.*)

Calid. Region. 11.

1. **FALCO ornatus** et *mauduytii*, Daud. (superbus et corona-tus, *Shaw.* - *Harpyia braccata?* *Spix* - *Aquila urutauana*, *Dum.*) *Lev. Afr.* t. 26. - *Gal. Ois.* t. 21. - *Av. Bras.* t. 37. - ex *Amer. merid.*
2. **FALCO hellicosus**, Daud. (armiger, *Shaw.* - *Aquila bellicosa*, *Auct.*) *Levaill. Afr.* 1. - *Smith, Ill. S. Afr. Zool.* t. 42. ex *Africa merid.*
3. **FALCO coronatus**, L. (albescens *Daud.* - *Aquila corona-tata*, *Smith.*) *Edw. B.* t. 224. - *Lev. Afr.* t. 3. - *Smith, Ill. S. Afr. Zool.* t. 41. ex *Africa merid.*
4. **BUTEO melanoleucus**, Vieill. (*Falco atricapillus*, *Cuv.* - *Spizastur atricapillus*, *Less.* - *Morphnus, Spizastur*, vel *Spizaetus atricapillus*, *Kaup.* - *Spizaetus melanoleucus*, *Gr.*) *Pl. col.* 79. - *Gal. Ois.* t. 14. ex *America merid.*
5. **FALCO occipitalis** et *senegalensis*, Daud. (*Morphnus occipitalis*, *Cuv.* - *Harpyia occipitalis*, *Sw.* - *Lophaetus occipitalis*, *Kaup.*) *Lev. Afr.* t. 2. ex *Afr. merid.*

6. **FALCO *tyrannus***, Wied. (Spizaëtus braccatus? *O. des Murs* - Piernura tyrannus, *Kaup.*) *Pl. col. 73.* - *Pl. p. 67* ex America merid.
7. **AQUILA *isidorii***, O. des Murs, *Pl. p. 1.* ex Amer. m.
8. **FALCO *cirrhatus***, Gm. (ceylonensis, *Lath.* - caligatus, *Raffles* - lynnactus, *Horsf.* - niveus? *Shaw*, *Temm.* faem. - cristatellus, *Temm.* mas adult. - Spizaëtus cristatellus, *Jard.* - punctatus? *Jerd.* - Nisaëtus pallidus, nipaensis et pulcher, *Hodgs.* - alboniger, *Blyth.* - Limnaëtus horsfieldii et caligatus, *Vig.* - Morphnus hastatus, *Less.*) *Pl. col. 134 et 127.* faem. jun. 282. mas ad. *Selb. Ill. Orn. t. 66?* ex Asia mer. et orient.
9. **Spizaëtus *orientalis***, *Temm.* Schleg. *Faun. Jap. tab. 3.* figura eximia. ex Japan.
- * Adult. Capite cristato: gula nigra, superciliis albis.
10. **Spizaëtus *lanceolatus***, *Temm.* *Mus. Lugd.* (bor-neonensis? *Gr. Mus. Britann.*) *Faun. Jap. p. 7.* ex Borneo? et Celebes. Similis Sp. ornato quoad colores: stria nigragulari mediana.
11. **Spizaëtus *Kiteneri***, Gerv. (albigularis, *Blyth*) *Mag. Zool. 1835. Ois. t. 35.* ex Asia m. Minimus.
93. **Thrasaëtus**, Gr. (Harpia, *Vieill.* - Harpyhaliaeetus, *Lafr.*) America m. 2.
1. **VULTUR *harpinia***, L. (Falco destructor, *Daud.* - imperialis, regalis, calquin et caracca, *Shaw* - jacquini et cristatus, *Gm.* - Harp. ferox, *Less.* - maxima, *Vieill.*) *Pl. col. 14.*
 2. **HARPIA *coronata***, *Vieill.* (Falco* coronatus, *Temm.* nec *L.* - Circaëtus! coronatus, *Cuv.* - Asturina azarae, *Kaup.* - Harpyhaliaeetus coronatus *Lafr.* - Haliaetus unifasciatus, *Gr.*) *Pl. col. 234.*
94. **Urubutinga**, Less. (Morphnus, p. *Cuv.* - Hypomorphnus, Caban. - Spizogranus, *Kaup.*) America m. 3.
1. **FALCO URUBUTINGA**, Gm. (*longipes*, *Ill.* - Aquila brasiliensis, *Br.* - picta? *Sp.* - Pandion fulvus, *V.* - Spizaetus niger, atet et maculatus, *Vieill.*) *Pl. col. 55.* jun. *Av. Br. t. 1.* adult.
 2. **FALCO *unicinctus***, *Temm.* (anthracinus? *Licht.* - Polyborus taeniurus, jun. *Tschudi.* - Astur unicinctus, *Cuv.* Buteo hinc Astur unicinctus, *Gr.* - Asturina vel Spizogranus unicinctus, *Kaup.*) *Pl. col. 313.* juv. - *Faun. Peruan.* t. 1? ex Amer. maxime merid.
- * Adult. in *Mus. Lugd.* Urubit. minor: fascia caudali alba, angusta.

3. **FALCO meridionalis**, Lath. (Falco rutilans, Licht.
Aquila buson, Spix. - Circus rufulus, Vieill. - Hypo-
morphus rutilans, Caban.) *Pl. col. 25.* - ex Amer. mer.
95. **Morphinus**, Cuv. (Thrasætus p. Kaup.) America m. 1.
FALCO **guianensis**, Daud. (sonnini, Shaw - Morphinus
cristatus, Less. - Spizaetus variegatus, Vieill.) *Less. Tr.*
Orn. t. 11. 12.
96. **Herpetotheres**, Vieill. (Macagua, Less. - Cachinna,
Fleming. - Physteta? Vieill.) Amer. calid. 1.
FALCO **cachinnans**, L. (Astur cachinnans, Cuv.) *Gal.*
Ois. t. 19. - Av. Bras. t. 3.
97. **Micrastur**, Gr. (Brachypterus vel Brachypteryx hinc Car-
nifex, Less. - Climaconurus, Caban.) America m. 4.
1. FALCO **brachypterus**, Temm. (leucomelas, Ill. - Spar-
vius semitorquatus, ruficollis et melanoleucus, Vieill.
Herpetotheres melanoleucus et brachypterus, Kaup.)
Pl. col. 141. 116.
2. FALCO **xanthothorax**, et leueachen, Temm. *Pl. col.*
92. et 306.
3. FALCO **concentricus**, Ill. (Sparvius gilvicollis, Vieill.)
ex Amer. merid. Mexico.
4. **Micrastur guerilla**, Cassini, *Proc. Acad. Philad.*
1848. p. 87.
98. **Geranospiza**, Kaup. (Ischnoscelis, Strickl.) America m. 2.
1. FALCO **gracilis** et hemidactylus, Temm. (F. wiedii bras-
iliensis? Griff. - Sparvius caerulescens, Vieill. ex Azara).
Pl. col. 91. et 3.
2. **Geranospiza nigra**, Gray, ex Dubus, *Bulletin*
Acad. Belg. 1848.
99. **Asturina**, Vieill. (Rupornis, p. Kaup.) America m. 5.
1. FALCO **leucorrhous**, Quoy et Gaim. *Voy. Uranie*,
t. 13. ex *Caracas.*
2. FALCO **poliogaster**, Temm. (Nisus pileatus, Tschudi)
Pl. col. 294. 225. ex Brasil.
3. FALCO **nitidus**, Lath. (striolatus, Temm. - Asturina
cimerea, Vieill. - Asturina nitida, Kaup. - Astur nitidus, Gr.) *Pl. col. 87. 294.* - *Gal. Ois. t. 20. ex Brasil.*
et Mexico.

* 4. *Asturina albifrons*, Kaup, Mus. Francf. Niger,
fronte et corpore subtus albus.

5. *Falco magnirostris*, Gm. (insectivorus? Spix.) Ru-
pornis magnirostris, Kaup.) Pl. enl. 464. - Pl. col. 86.
Av. Bras. t. 8 a.

100. **Astur**, Lacèp.³ (Daedalion, Savign. - Leucospiza et Lo-
phospiza, Kaup.) Cosmopol. 8.
1. **Falco radiatus**, Lath. (Haliaetus calei, Vig. et Horsf.
Astur testaceus, von Ern. - A. radiatus, Gr.) Gould,
Austr.i. t.16. ex Australia. Species abnormis!
 2. **Falco novae-hollandiae**, Gm. (albus, Shaw. - leu-
caetos, Forst. - clarus, Lath. - Sparvius niveus, Vieill.
Daedalion candidum, Less. - Astur albus, Sw. - Leu-
cospiza novae-hollandiae, p. Kaup.) White, Voy. t.250.
Jard. et Selb. Ill. Orn. i. t. 1. - Gould, Austr.i. t.15.
ex Australia. Candidus!
 3. **Astur rufi**, Vig. et Horsf. (Leucospiza novae-hol-
landiae, Kaup. part. - Astur novae-hollandiae, Gr. part.)
Gould, Austr.i. t.14. ex Australia. Griseous; sub-
tus albus, fasciis pectoralis et abdominalibus fuscis.
 4. **Falco trivirgatus**, Temm. (Astur cristatus, Gr. - pa-
lumbarius, Jerd. - indicus, Hodgs. - anceps, Temm.
Mus. Lugd. ex Sumatra, faem. - griseiceps? Temm.
Mus. Lugd. ex Celebes juv? - Lophospiza trivirgata,
Kaup.) Pl. col. 303. ex Insulis Philippinis.
 5. **Astur melanoleucus**, Smith (smithii, Kaup.) Ill.
S. Afr. Zool. t. 18. ex Africa merid.
 6. **Falco palumbarius** et gentilis, L. (gallinarius, Gm.
albescens, Bodd. - Accipiter astur, Pall. - Astur palum-
barius, Bechst. - Astur gallinarum, Brehm) Pl. enl. 418.
adult. 461. 423. jun. - Zoogr. Ross. As.t.11. - Gould,
Eur. t. 17. ex Eur. Asia, Afr.
 7. **Falco atricapillus**, Wils. (regalis, Temm. - Daeda-
lion pictum, Less. - Sparvius atricapillus, Vieill. - Astur
palumbarius! Kaup. part.) Am. Orn. t. 52. 3. - Rich.
Faun. Bor. Am. t. 26. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 121.
ex Amer. sept.
 8. **Falco cooperi**, Bp. (Astur stanleyi, Aud. - A. cooperi,
Bp. - Accipiter pileatus! junior, Kaup.) Am. Orn.
t. 10. l. - Audub. Am. t. 36. ex Amer. sept.

101. **Accipiter**, Br. (Nisus, Cuv. - Jerax, Leach. - Hieraspiza et Urospiza, Kaup.) Cosmopol. 15.
1. **FALCO pileatus**, Wied. (beskei, Licht. - Nisus pileatus et variatus, Cuv. - Sparvius guttatus et major? Vieill. ex Azara) *Voy. Am. m. III. t. 24?* - *Pl. col. 205. ex Amer. maxime merid.*
 2. **FALCO fuscus**, dubius et obscurus, Gm. (velox, Wils. Accipiter fuscus, Gr. - striatus, Vieill. - pensylvanicus et mexicanus, Sw. - fringilloides? Vig. - Nisus malfini, Less. - pensylvanicus, Cuv. - Sparvius lineatus, striatus et ardosiacaeus, Vieill.) *Mill. Ill. t. 18.* - *Pl. col. 67. - Ois. Am. s. t. 14. - Am. Orn. t. 45. t. 46. t. - Aud. Am. t. 374. ex Amer. sept.*
 - 3? **Accipiter erythronemius**, Gr. (nisoides? Cuv.) *ex Amer. merid.*
 4. **FALCO nisus**, L. (lacteus, Gm. - Acc. nisus, Pall. - fringillarius, Ray. - maculatus, Br. - nisosimilis, Tick. subtypicus, Hodgs. - Nisus communis, Cuv. - fringillarius, Kaup. - elegans, fringillarius et peregrinus, Brehm. - Sparvius nisus, Vieill. - Astur nisus et major! Degland.) *Pl. enl. 467. 412. - Gould, Eur. t. 18. ex Eur. Asia. Afr.*
 5. **FALCO tachiro**, Daud. (polyzonus, Temm. - unduliventer, Rüpp.) *Faun. Abyss. t. 18. 1. - Lev. Afr. t. 24. Pl. col. 337. 420. ex Africa mer. et orient.*
 6. **Accipiter rufiventris**, Smith. (Falco exilis, Temm. perspicillaris, Rüpp.) *Faun. Abyss. t. 18. 2. - Pl. col. 496. - Ill. S. Afr. B. t. 93. ex Afr. mer. et or.*
 7. **Accipiter madagascariensis**, Verr. S. Afr. *Journ. 1833. ex Madagascar.*
 8. **FALCO tinus**, Lath. (superciliosus? L. - Sparvius minutus et subniger, Vieill. - Hieraspiza tinus, Kaup.) *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 10. ex Amer. mer.*
 9. **FALCO minullus**, Daud. (Nisus minullus, Cuv. - Accipiter minullus, Gr. - Hierospiza minulla, Kaup.) *Lev. Afr. t. 34. ex Africa mer.*
 10. **FALCO virgatus**, Temm. (minutus, Less. nec L. brissonianus? Shaw. - Accipiter besra, Jerd. - affinis, Hodgs. - nisoides? Blyth. - Hieraspiza virgata, Kaup.) *Pl. col. 109. mas. - Ill. Ind. Orn. t. 4. ex America mer. Ocean.*

11. **FALCO torquatus**, Cuv. (nisus, var. et melanops? Lath.
Nisus australis, Less. - Sparvius cirrhocephalus, tricolor, et melanops? Vieill. - Accipiter torquatus, Vig.
A. cirrhocephalus, Gr.) Pl. col. 43.93. - Gould, Austr. t. 19. ex Australia.
12. **ASTUR crenatus**, Gould, (perlatus? Temm. Mus. Lugd.)
Austr. t. 18. ex Austr. et Timor. specim. majora!
13. **ASTUR approximans**, radiatus et fasciatus, Vig. et
Horsf. (Falco radiatus, Temm. nec Lath. - Urospiza
radiata 1845, et approximans 1847, Kaup.) Pl. col. 123.
Austr. t. 17. ex Australia et Terr. antarctic.
- * 14. **ASTUR trinotatus**, Temm. Mus. Lugd. ex Celeb.
Fusco-ardesiacus, gula dilatior; corpore subtus cinereo-
vinaceus; testriculus alarum corpori proximioribus, rectrici-
busque magna alba pogonii interni, tres notas insig-
nes, aliis et cauda non explicatis, constituentibus.
Juv. Supra rufescens; pectore albo, fusco striato.
- * 15. **FALCO hiogaster**, Müll. (Épervier océanien, Hombr.
et Jacq.) Voy. au Pole Sud, t. 2. - ex Amboina.
Fusco-ardesiacus; subtus castaneus; humerum maculis spe-
ciei praecedentis; cauda immaculata.
102. **MICRONISUS**, Gr. (Nisastur, Bl. - Tachyspiza, Scelospiza, K.) As. Afr. Oc. 7.
1. **FALCO soloensis**, Horsf. (cuculoides, Temm. - Tachy-
spiza soloensis, Kaup.) Pl. col. 110. 129. ex Asia
orient. Ocean.
 2. **ACCIPITER francesii**, Smith. (Scelospiza francesii,
Kaup.) ex Madagascar.
 3. **FALCO badius**, Gm. (brownii, Shaw - dussumieri, Temm.
Accipiter dukhunensis, Sykes - fringillarius, Jerdon.
scutarius et fringillarioides, Hodg. - Nisus manillensis,
Meyen.) Brown, Ill. t. 3. - Pl. col. 308. 336. - Nov.
Act. Ac. Nat. Cur. 1834. t. ix. - Jerd. Ill. Ind. Orn.
t. 4. ex Asia.
 4. **FALCO sphenurus**, Rüpp. (Accipiter brachydactylus,
Sw. - polyzonoides, Smith - Micronisus rüppellii,
Kaup.) Syst. Nord-Ost-Afr. t. 2. - Ill. S. Afr. Zool.
B. t. 11. ex Africa merid. et orient.
 5. **FALCO gabar**, Daud. (Accipiter erythrorhynchus, Sw.)
Pl. col. 122. 140. - Levail. Afr. t. 33. - Vieill.
Ois. t. 22. ex Africa merid.
 6. **SPARVIUS niger**, Vieill. (Micronisus gabar, var. Kaup.)
Gould, Syn. B. Austr. III. pl. f. 1. ex Africa merid.

7. **FALCO monogrammicus**, Temm. (Astur monogrammicus, Cuv. - Micronisus monogrammicus, Kaup.) *Pl. col. 314.* - *Sv. B. west. Afr. t. 4. ex Africa occid.*

103. **Mellerax**, Gr. Africa. 2.

1. **FALCO musicus**, Daud. (canorus? Thunb. - Nisus musicus, Cuv. - canorus, Less. - Astur cantans, Kaup.) *Lev. Afr. t. 27. ex Africa merid. Major.*

2. **FALCO polyzonus**, Rüppel. (Mellerax musicus, Kaup, part.) *Fauna Abyss. t. 15. i. nec O. des Murs, Pl. p. 61. ex Africa orient. sept. Minor: fasciis angustis, cæbrioribus.*

SUBFAM. 21. CIRCINAE.

104. **Craxirex**, Gould (Accipiter, p. Kaup. - Buteo, p. Gr.) Amer. m. 1.
Craxirex galapagoensis, Gould, *Voy. Beagl. t. 2.*

105. **Circus**, Lacép. (Pygargus, Koch. - Busarellus? *Lafr. Spizacircus*, Kaup.) Cosmop. 5.

1. **FALCO aeruginosus**, L. (rufus, Gm. - arundinaceus, Bechst. - Kramer, Kram. - Circus palustris et rufus, Br. - indicus, Lath. - variegatus, Sykes - sykesi, Less. Accipiter circus, Pall. - Pygargus rufus, Koch) *Pl. enl. 460. 424.* - *Gould, Eur. t. 32. ex Eur. Asia. Africa sept.*

* 2. **Circus gouldii**, Bp. (assimilis, Kaup, Gray, partim) ex Austr. Similis C. aeruginoso, nec Strigicipi jardini, sed major.

3. **FALCO ranivorus**, Daud. (Circus ranivorus, Vieill. Pygargus ranivorus, Kaup.) *Lev. Afr. t. 23. ex Afr. m.*

4? **Circus spilonotus**, Kaup, *Mus. Soc. Zool. Londin. ex Asia.*

5. **Circus macrourus**, et C. albicollis ex Azara 31, Vieill. (superciliosus, Less. nec Temm. - Falco palustris, Wied. - Spizacircus macrourus, Kaup. - Circus megapsilus? Gould, fæm. adult.) *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 11. - Pl. col. 22. ex Amer. merid.*

106. **Strigiceps**, Bp. (Spilocircus et Glaucopteryx, Kaup.) Cosmop. 8.

1. **Circus jardini**, Gould (assimilis, Jard. Gould, juv. Kaup, et Gr. part. - Spilocircus jardini, Kaup.) *Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 51. jun. - Gould, Austr. t. 26. adult. t. 27. jun. ex Austr.*

2. **CIRCUS ASTER**, *Vieill.* (lalandii, *Smith* - *Falco maurus*,
Temm. - *Strigiceps maurus*, *Kaup.* - *Strigiceps ater*,
Bp.) *Pl. col. 461.* - *Ill. S. Afr. Zool. t. 58.* ex *Afr. m.*
3. **FALCO MELANOLEUCUS**, *Gm.* (*Circus melanoleucus*,
Vieill. - *Strigiceps melanoleucus*, *Kaup.*) *Ind. Zool. iv.*
t. 2. - *Lev. Afr. t. 32.* ex *Asia*.
4. **FALCO HISTRIONICUS**, *Quoy et Gaim.* (frenatus? *Illig.*
Circus cinereus et campestris? *Vieill.* ex *Azara* 32. - *Strigiceps histrionicus*, *Kaup.* - *Str. acoli!* *Kaup.* ex *specim.*
nec Lev. - *Circus cinereus et acoli*, *Gray*) *Voy. Uranie*,
Ois. t. 15. 16. ex *Amer. merid.*
Quid Falco acoli, Daud. (Circus acoli, Vieill. nec Kaup.) Leraill.
Ois. Afr. t. 31. ex Afr. mer?
5. **FALCO HUDSONIUS**, *L.* (uliginosus, variegatus, albidus et
 buffoni, *Gm.* - europogistus, *Bosc.* - *Circus hudsonius*,
 variegatus et europogistus, *Vieill.* - *Circ. cynneus?* var?
 americanus, *Sw.* - *Strigiceps uliginosus*, *Kaup.* - *Str.*
hudsonius, *Bp.* *B. t. 107. 8.* - *Vieill.* *Ois. Am.*
s. t. 8. 9. - *Faun. Bor. Am. t. 29.* - *Wils. Am. Orn.*
t. 51. 2. juv. - *Bp. Am. Orn. t. 8. ad.* - *Aud. Am. t. 356.*
6. **FALCO CYANEUS**, *L.* (boemicus, albicans, griseus et
 montanus, *Gm.* - cinereus et rubiginosus, *It. Posse.*
 strigiceps, *Nils.* - *Accipiter variabilis*, *Pall.* - *Circus cyaneus*,
Boie - *gallinarius*, *Sav.* - *pygargus*, *Cuv.* - *Pygar-*
gus dispar, *Koch.*) - *Edw. B. t. 225.* - *Pl. enl. 450.*
 adult. 443. faem. - *Naum. t. 38. 39* - *Susem. t. 37.*
Gould, Eur. t. 33. ex Eur. Afr. sept. et Asia.
7. **FALCO CINERASCENS**, *Montag.* (*Falco pygargus* *L.* - *Buteo cinerascens*, *Flem.* - *Circus montagui*, *Vieill.* - *cine-*
rascens, *Cuv.* - *pallidus*, *Hodgs.* nec *Sykes* - *nepalensis*,
Hodgs. - *Glaucopteryx!* *cineraceus*, *Kaup.*) *Gal. Ois.*
t. 13. - *Naum. t. 40.* - *Susem. t. 38.* - *Gould, Eur.*
t. 35. ex Eur. Asia. Africa.
8. **CIRCUS SWAINSONI**, *Smith* (*albescens*, *Less.* - *aequipar*,
Cuv. - *pallidus*, *Sykes* - *dalmatinus*, *Rupp.* - *feldeggii*,
Bruch. nec *Schlegel* - *Glaucopteryx!* *swainsoni*, *Kaup.*)
Ill. S. Afr. Zool. t. 43. 1. mas adult. 2. faem. t. 44.
 faem. jun. - *Mus. Senckenb.* 1834. t. 11. - *Susem. t. 39.*
Gould, Eur. t. 34. ex Eur. orient. Asia.

FAMILIA 6. STRIGIDAE.

SUBFAM. 22. SURMINAE.

107. *Surnia*, Dum. *Media*: *digitis longe plumosis: cauda valde elongata, gradata.* Eur. As. Am. s. 1.

STRIX ulula, L. (*funerea*, *Lath. nec L.* - *hudsonia*, *Gm.* - *candensis* et *freti hudsoni*, *Briss.* - *doliata*, *Pall.* - *arctica*, *Sparrm.* - *nistoria*, *Meyer.* - *Surnia borealis*, *Less.* - *funebris*, *Cuv.* - *Syrnium nisorum*, *Kaup.* - *Surnia ulula*, *Bp.*) *Pl. enl. 463.* - *Edw. B. t. 62.* - *Wils. Am. Orn. t. 50. 6.* *Aud. Am. t. 378.* - *Gould, Eur. t. 45.* ex *Euro. op. A.s. et Am. bor.*

Quid Strix choucou, *Lath. (africana, Shaw.)* - *Surnia choucou*, *Less.* *Levaill. Afr. t. 38.* ex *Afr. mer?*

Quid Strix nisella, *Lath. (Surnia nisella, Less.)* *Levaill. Afr. t. 39.* ex *Afr. mer?*

108. *Nyctea*, Steph. *Magna*: *digitis longe plumosis: cauda brevi.* Eur. As. Am. bor. 1.

STRIX NYCTEA, L. (*nivea*, *Daud.* - *candida*, *Lath.* - *erminea*, *Shaw.* - *wapacuthu*, *Vieill.* - *arctica*, *Bartr.* - *Nyctea erminea* et *cinerea*, *Steph.* - *Surnia nyctea*, *Selby.*) *Pl. enl. 458.* - *Edw. B. t. 61.* - *Vieill. Am. s. t. 18.* - *Lev. Afr. t. 45.* - *Wils. Am. Orn. t. 32. l.* - *Audub. Am. t. 121.* - *Gould, Eur. t. 43.* ex *Eur. A.s. Am. bor.*

109. *Glaucidium*, Boie. (*Athene*, p. *Gr.*) *Parva: digitis dense vestiti: cauda elongata.* Eur. As. Am. s. 2.

1. *STRIX passerina*, L. (*pusilla*, *Daud.* - *pygmaea*, *Bechst.* - *acadica*, *Temm. nec Gm.* - *Athene acadica* hinc *Glaucidium passerinum*, *Boie.* - *Athene passerina* et *africana*, *Gr.*) *Levaill. Afr. t. 46.* - *Nilss. Skandin. Faun. t. 3.* - *Gould, Eur. t. 50.* ex *Eur. or. A.s. sept.*

* 2. *STRIX elata*, Natter. (*Athene elata*, *Bp.*) *Mus. Windob.* ex *Mexico.* *Similis Str. passerinae, sed cauda longiori.*

110. **Athene**, Boie (Noctua, Sav. - Carine, K. - Nyctipetes, Sw.)

Statura variae: digitii pilosi: cauda modica. Cosmopol. 40.

a. **AFRICANAEE. Parvae: cauda longula: tarsi ex toto vestiti; digitii crebre pilosi!** Glaucidiis proxime accedunt.

1. **STRIX pertata**, Vieill. nec Licht. (occipitalis, Temm.

Noctua occipitalis, Cuv. - Nyctipetes perlatus, Sw.

Athene perlata, Gr.) Pl. col. 34. - Levaill. Ois. Afr.

t. 244. ex Afr. mer. et occ. Senegal. Sennaar?

Minor (long. 7-poll.): brunnea, collaris subobsoleta, verticis maculatis albis disciformibus: cauda cuneiformis, alas longe excedente, macularum albarum seriebus septem: digitis dense pilosis.

Athene vel Glaucidium africanum, Bp. in litteris et verb. unde

Athene pusilla, Gr. minime vero Strix pusilla, Daud. ex Levailantii Chevêchette, quae Strix passerina, L. species haud africana.

2. **STRIX leucia**, Licht. Verz. Berl. 1842. p. 12. Mus.

Lugd. ex Africa mer. Media (longit. 8-pollic.): cauda alas valde excedente, macularum albarum seriebus sex: digitis sparsim pilosis.

3. **NOCTUA capensis**, Smith 1834. (Athene capensis, Sm.)

Ill. S. Afr. Zool. t. 33. - Mus. Britann. ex Afr. m.

Major (longitud. 9-pollicar.): brunnea, albo lineolata et maculata: cauda alas longe excedente fasciolis linearibus albidis, subduodenis.

b. **AMERICANAEE. Parvae, aut vix mediae: cauda brevis: tarsi saepe partim denudati; digitii pilis sparsis.** Typicae.

4. **STRIX infuscata**, Temm. 1820. Man. Orn. 1. p. 97.

(passerinoideus! Temm. 1824. - Glaucidium gnoma, Wagl. 1832. mas. jun. - Surnia passerinoideus? Audub.

Athene passerinoideus et gnoma, Gr. - A. infuscata, Bp.)

Pl. col. 344. - Aud. Am. t. 432. 4. ex Amer. mer. Mexico, California? - Parva (longit. 6½ pollic.): fuscata albo maculata, capite albo punctata; collaris albo nigroque vario: cauda rotundata alas longe excedente, maculis albis disciformibus in fascias quinque dispositis.

Quid Surnia passerina, Aud. Am. t. 432. 5. ex Amer. bor. occ.

Similis Athen. noctuae? ... an species? ... an americana??

5. **STRIX nana**, King, Zool. Journ. (Glaucidium nanum,

Boie. - Athene nana, Gr.) Genera of Birds. t. 12.

ex Amer. mer. Chili. Similis praecedenti, sed major! (longit. 7½ pollic.) et cauda fasciolis rufis linearibus numerosis, uti in minori Ath. ferruginea jun.

6. **Strix ferruginea**, Wied. (pumila, *Licht.* ex Ill! nec *Temm.* - *Noctua ferruginea*, *Cuv.* *Tschudi* - *Athene ferruginea*, *Gr.* - A. *pumila*, *Aliq.*) *Pl. col. 199.* ex Amer. m.
B r a s i l i a. *Parva* (*longit. 6½ pollic.*): *ferruginea* rarius *fuscescens*: cauda alas longe excedente, maculis albis dentata, fasciolis fuscis aetate evanescientibus.
- Quid Strix phalaenoides*, *Daud.* *Vieill.* *Ois.* *Am. s. l. t. 15.* fig.
 pessima, ex *Antilliz?*
7. **STRIX minutissima**, Wied. (pumila, *Temm.* ex Ill!
 nec *Licht.* - *ferox*, *Vieill.* ex Azara 49. - *Athene pumila*,
Gr. - A. *minutissima*, *Bp.*) *Pl. col. 39.* ex Amer. m.
Minima! (*longit. 5½ pollic.*) brunnea, capite albo-punctata:
remigum margine exteriori maculis quadratis rufis: *cauda* *alas* *vix* *excedentia*, *maculis* *albis* *disciformibus* *in series*
tres digestae; *rectricibus tribus extimis supra immaculatis*.
8. **STRIX fusca**, Vieill. (maugei, *Temm.* - *Athene maugei*,
hinc *suadente Pucherano*, *Ath. fusca*, *Gr.*) *Pl. col. 46.*
 ex *In s. Antill.* *Media* (*longitud. 10½ pollic.*): *fusco-rufescens* *maculis* *alarum* *albis*; *subtus* *alba*, *maculifuscis* *plus minus confluentibus*: *cauda* *alas* *vix* *excedentia*; *rectricibus* *externo* *fusci* *albo-maculatis*, *interne* *albis* *fuso-fasciatis*.
9. **STRIX dominicensis**, Gm. (cunicularia? Vieill.
Athene dominicensis, *Gr.*) ex *Antill.* ubi cuniculos
 sibimet excavat! *Longitud. 9½ pollic.* *cineracea* *rufoque varia*,
punctata, *maculata*, *et superciliis late albis*; *subtus* *albo-rufescens* *fusco variegata*: *cauda* *cineracea* *albo-fasciata*: *tarsis* *medicis*, *digitisque lanuginosis*.
- Quid Strix nudipes*, *Daud.* *Vieill.* *Ois.* *Am. s. t. 16.* ex *Ant.*
Longitud. 7½ pollic. *brunnea* *albo-maculata*; *subtus* *alba*,
maculis *lyriformibus* *fusci*: *pedibus* *elongatis*, *nudis*, *squamosis?*
10. **STRIX cunicularia**, Molina (grallaria, *Temm.* - californica? *Aud.* *exclusa patria!* - *Noctua coquimbana*, *Briss.*
N. urucurea, *Cuv.* *Less?* *Tschudi* ex Azara 47. - *Athene cunicularia*, *Gambel*, *Cassin.*) *Pl. col. 46.* mas. fig.
mala. - *Aud.* *Am. t. 412?* ex *Am. m. San Paulo*,
Coquimbo. *ia* *Dasyptodium* *cuniculus* *nidificans!*
Longit. 9-pollic.: *rufo-cineracea* *albido* *maculata*: *cauda* *alas* *paulum* *excedente*, *fasciis* *quinque* *albidiis* *interruptis*: *tarsis* *elongatis* (*1½ pollic.*) *ad* *digitos usque lanuginosis*.

11. STRIX CUNICULARIA, Say (Noctua urucurea, Aliorum).

Athene **hypogaea**, Bp. - A. socialis, Gambel. - Surnia cunicularia, Aud. part. - Athene cunicularia, Gr. part.) Bp. Amer. Orn. t. 7. 2. ex Amer. sept. occid. in Spermophilorum cuniculis nidificans! Longitud. 9-polllicar: griseo-cinnamomea, albido maculata: cauda alas paulum excedente, fasciis quinque albidis interruptis: tarsis valde elongatis, superne tantum vestitis, inferne cum digitis tuberculato-pilosus.

c. EUROPAEA. Media: cauda brevis: tarsi dense vestiti; digitii sparsim pilosi. Typica.

12. STRIX noctua, Retz. (passerina, nudipes, Nilss. - aucuparia, Bonelli. - persica? Vieill. - numida, Lavaill, jun. meridionalis, Riss., specimina minora griseo-rufescens. Noctua glaux, Sav. - N. passerina, Cuv. - veterum, Licht. Carine passerina, Kaup. - A. passerina, Boie. - A. psylodactyla, Brehm. - Ath. noctua, Bp.) Pl. enl. 439. Edw. B. t. 228. - Gould, Eur. t. 48. ex Eur. mer. et media, Afr. sept. As. o.c. Fusco-cinerea vel griseo-cinnamomea (Str. meridionalis, Riss.) maculis albis rotundatis: cauda alas paullo excedentes, fasciis quatuor albidis interruptis.

* Quid Athene nudipes vel gymnopus, Hodgs. Mus. Britann. n. 876. - Icon, ined. Accipitr. 80. ex Thibet, Cachar?

d. ASIATICA ET OCEANICA. Parvae aut staturaem mediae.

† Typicae. Parvae: cauda brevis: tarsi dense vestiti; digitii pilis sparsis aut nullis.

13. STRIX brama, Temm. (Noctua brama, Cuv. - tarayensis, Hodgs. - indica, Franklin. - Athene indica, Blyth. tarayensis, J. Gr. - bactriana? Hutton 1847.) Pl. col. 68. ex Asia mer. Minor A. noctuae (longit. 9-pollic.): fusca, tota albo-maculata; superciliis et vitta nuchali e plumis albis nigro-marginatis; subtus alba, collari et maculis transversis fuscis: cauda maculis albis fasciata: digitis pilosis.

14. STRIX superciliaris, Vieill. (sonnerati, Temm. Athene superciliaris, Gr.) Pl. col. 21. ex Asia mer. Major A. noctuae (long. 11-pollic.): fusca, capitis punctis, alarumque maculis albis; subtus albo-fuso-fasciata: cauda alas longe excedente; remigibus rectricibusque immaculatis: digitis pilosis.

* 15. *Athene leucolaima*, Hombr. et Jacquin, Voy. au

Pole Sud, Ois. t. 4. 2. 3. ex Ocean. Minima: fusco-brunnea; maculis magnis rotundis albis; subtus alba; lateribus nigro-guttatis, pectore rufescens area mediana albo-cretacea; alis brevissimis; cauda fasciolis angustis, numerosis nigris; digitis pilosis.

* 16. *Strix sylvatica*, Müll. (*Athene sylvatica*, Bp.)

Mus. Lugd. ex Sumatra. Minima! (Long. vix 6-pollic.): castaneo-fusca, rufescens-undulata; capite fuscens, albo punctato: subtus alba; lateribus maculis castaneis magnis, confluentibus: cauda brevi; alis brevissimis: digitis nudis!

†† Radiata e. Mediae: plus minus fasciato-lineatae: cauda elongata.

17. *Noctua brodiei*, Burton, 1835. (tubiger, Hodgs. 1837.

Athene brodiei, Blyth. 1842.) Proc. Zool. Soc. 1835. p. 152. - Icon. ined. Accipitr. 82. 2. 3. et 83. ex Asia centrali. Minima ex Radiata (longit. 6½ pollic.): brunnea rufo-fusciata, capite rufo maculata; jugulo et regione post auriculari albisi; collaris cervicali lato ex albo nigro rufoque: cauda fasciolis linearibus rufis subsepten.

18. *Strix radiata*, Tickell (erythroptera, Gould. - cuculoides, Jerdon, nec Vig. - Noctua perlimenta, Hodgs. Athene undulata, Blyth, nec Spix. - A. radiata, Gr. A. erythroptera, Blyth) Hodgs. Icon. ined. Accipitr. 84. ex Asia centrali. Minor (longit. 7½ pollic.): rufescens, ex toto lineata: cauda fasciis angustis numerosioribus.

19. *Strix castanoptera*, Horsf. (spadicea, Reinw. Noctua castanoptera, Cuv. - Athene malabarica hinc castanoptera, Blyth. - Ath. castanotus? Aliquot?) Pl. col. 98. ex Insula Java. Media (longit. 8½ pollic.): humeris et interscapulis pure castaneis.

20. *Noctua cuculoides*, Vig. (auribarbis, Hodgs. - Athene cuculoides, Blyth) Gould, Cent. Him. B. t. 4. ex Asia centrali. Major (longit. 9-pollic.): fuscens, ex toto lineata.

21. *Athene humeralis*, Hombron et Jacquinot, Voy. au Pole Sud, Ois. t. 4. 1. ex Oceania. Magna: fusca, subtus albida, rufescens undulata; genis nigris, gula alba; capite pectoreque rufis nigro-fasciatis; humerum margino externo albo; pedibus setulosis! Ad sequentes accedit.

††† *Hirsutae. Mediae: cauda longa: pedes breves, partim nudi aut tantum pilosi; digiti setis rigidis sparsis hirsuti.*

22. **STRIX hirsuta**, Temm. (Iugubris, Tickell. - Ninox nepalensis, 1837, et jeridius, 1844, Hodgs. - scutellatus et jeridius, Bl. - Athene scutellata, p. Gr.) *Pl. col. 289. ex Asia centr. et mer. Nepal, Ins. Ceylon. Media (longit. 10-poll.): cinnamomeo-brunnea; subtus alba maculis cordiformibus rufis: alis octo-pollicaribus, caudaque paulo excedente, fuscis; remigibus parum conspicue, rectricibus distinctissime, cinereo-fasciatis; remigum quarta omnium longissima, quinta tertia breviori secundam longitudine valde superante: tarsis vestitis.*
- * 23. **STRIX hirsuta borneensis**, Schlegel, Mus. Lugd. (Athene malayensis? Eyton. - A. scutellata, Gr.) *ex Malaisia, Borneo. Minor: fuscenti-brunnea, capite cinerascente; subtus alba, maculis magnis, crebris, confluentibus, rufis: alis pollices octo longitudine superantibus; remigum quarta tertiana et quinta emarginatam subaequales non excedente: cauda rotundata, submarginata, fasciis quinque obscurioribus: tarsis vestitis.*
24. **STRIX hirsuta japonica**, Schleg. *Faun. Japon. t. 9. n. ex Japon. Major: fuscenti-brunnea, capite cinerascente; subtus alba, maculis magnis, crebris, confluentibus, rufis: alis pollices octo longitudine superantibus; remigum tertia et quarta subaequibus: quinto valde breviori, vix emarginata, secundam subaequante: tarsis vestitis.*
Quid Strix scutulata (nec scutellata), Raffles, ex Sumatra?
- * 25. **Athene guteruhii**, Müll. Verh. Nederl. Ethnogr! p. 79. *ex Timor. Longitud. 12-pollic: ex rufescenti cinereo-brunneae, maculis rotundis albis; subtus alba, maculis longitudinalibus rufis: tarsis inferno subnudis.*
- * 26. **Athene squamipila**, Bp. Mus. Lugd. *ex Ceram. Longit. 12-pollic: rufa; subtus albida, nigricanti undulato-fasciata; tarsis, sicut et digitis, pilis brevissimis sparsis squamulosis.*
27. **STRIX punctulata**, Quoy et Gaim. (Athene punctulata, Gr.) *Voy. Astrolab. Ois. t. I. 1. - Mus. Lugd. a Lessonio, ex Celebes. Nigricans, punctis albidis numerosis sparsa; superciliis, gula late, ab domine, tarsisque plu-mosis, albis: digitis setulosis.*
28. **STRIX variegata**, Quoy et Gaim. (Athene variegata; Gr.) *Voy. Astrol. Ois. t. 1. 2. ex Nova Hibernia. Major: fuscо-rufescens, maculis albidis; subtus albo-rufoque fasciata: tarsis dense vestitis; digitis setulosis.*

29. *Athene occellata*, Hombr. et Jacquin, *Voy. au Pole Sud*, Ois. t. 3. 2. ex Oceania. Media: brunnea, rufescens varia; subtus rufescens, maculis magnis, rotundis, albis: gula pure alba: alis modico longis: tarsis rufescens; digitis cinereis, basi tantum pilosis.
30. *Athene jacquinoti*, Hombr. *Voy. au Pole Sud*, Ois. t. 3. 1. ex Ocean. Media (longit. 11-pollic.): brunnea rufo-maculata, facie subtusque alba; torque latissimo rufa, nigro-undulata: alis elongatis; remigibus rectriciibusque maculis rufis in series digestis: tarsis albis, fusco-undulatis; digitis lateis, sparsim pilosis.
31. *Strix novae-zelandiae*, Gm. (fulva, Forst. -bubuk, Aliq. - Noctua novae-zelandiae, Quoy et Gaim. - Athene novae-zelandiae, Gr.) *Voy. Astrol. Ois. t. 2. 2. ex Nova Zelandia*. Media (longit. 10-pollic.): ex toto brunno-nigricans, maculis, supra albidis, subtus fulvis: fronte et superciliis rufo-notatis: cauda cinereo-fasciata: tarsis rufis; digitis lateis, pilosis.
32. *Athene albifacies*, Gr. Ereb. et Terr. Birds. t. 1. *Mus. Britann. ex Nova Zelandia mer. Major praecedens (longitud. 1½ ped.): fuscobrunnea plumis fulvo-marginatis; fronte genisque albis plumarum rachide nigra: cauda rufo-fasciata: tarsis albidis.*
Quid A. sandwichensis, Bloz, Byron, Voy. p. 250. ex Polynesia?
33. *STRIX BAKKAMUNA?* Forst. (*Athene forsteni*, Bp. nec ceylonensis Strix bakkamuna, Lath. indica, Gmel.) *Descr. Anim. p. 157. ex Ins. Tonga-tabu, Namocaka, Tupai et Tanna, minime in Zeylona!* Magna (longit. ultra 15-pollic.): fulvo fuscoque nebula, subtus alba, plumis omnibus nigro-punctatis: cauda brevi, fasciis quatuor fuscis: pedibus flavescens-pilosus.
- e. *AUSTRALASIANAE. Magnae: cauda longa: tarsi dense vestiti: digitii subnudi.*
34. *NOCTUA maculata*, Vig. et Horsf. (*Athene maculata*, Gould) *Austr. t. 32. ex Austr. Minor: brunnea rufescens, maculis magnis albis.*
35. *Athene marmorata*, Gould, *Austr. Introd. fig. nulla. ex Austr. merid. Simillima praecedenti sed valde major.*
36. *STRIX boobook*, Lath. (*Noctua boobook*, Vig. *Athene boobook*, Gould) *Austr. t. 32. ex Austr. mer. or. et s. Tasman. Major: rufescens-brunnea, nec maculata.*

37. FALCO! **connivens**, Lath. (Buteo!! connivens, Vieill.
Athene frontata, Less. - A. fortis, Gould. - A. conni-
vens, Gr.) Austr. t. 34. ex Austr. mer. or. et occ.
Magnat. cinereo-fusca, maculis magnis albis.
38. **Athene strenua**, Gould, Austr. t. 35. ex Austr.
mer. or. Maxima! fusco-nigricans: cauda valde elongata:
digiti sere omnino nudis!
39. **Athene rufa**, Gould, Austr. 1. t. 36. ex Austr. s.
Maxima: fusco-brunnea; subtus ferruginea rufo-undulata.
111. **Ciecaba**, Wagl. (Ninox? Hodgs. - Athene, part, Gr.) Media:
cauda longa: digiti nudi. Am. m. Ocean. S.

a. AMERICANA. *Typicæ.*

1. STRIX **huhula**, Daud. (lineata, Shaw - albumarginata,
Spix - Surnia lineata, Less. - Athene huhula, Gr.)
Levaill. Afr. t. 41. - Gen. Zool. t. 36. - Av. Bras. t. 10. a.
ex Amer. merid. Nigra, ex toto albo-lineata: digitis ad
basim usque nudis.
2. STRIX **torquata** et personata, Daud. (perspicillata, Lath.
jun.-superciliosa, ad. et larvata, Shaw jun. - Athene tor-
quata, Gr. adult. - Surnium personatum, Gr. juv. - Cie-
caba perspicillata, Cassin. - Ciecaba torquata, Bp.)
Levaill. Afr. t. 42. adult. t. 44. jun. - Gen. Zool. t. 32. adult.
Nat. Misc. t. 80. jun. - Hist. of B. II. t. 15. - Syn.
Suppl. II. t. 107. junior. ex Guiana. Longit. sesqui-
pedal: castaneo-fusca; superciliis, gula, abdomineque albo-
rufescens: remigibus rectricibusque multifasciatis, apice
albidis: digitis basi vestitis, apice tantum nudis.
Juv. alba, alis caudaque brunneis; orbitis nigris.
3. NOCTUA **melanonota**, Tschudi (Athene affinis? Mus.
Paris. - A. melanota? Pucheran, Revue et Magaz. Zool.
1849. p. 28.) Faun. Peruana. t. 4. ex Brasil. Peru:
Similis præced. sed fasciis caudalibus paucibus, linearibus.
4. STRIX **lathami**, Bp. 1830. (Athene lathami, Gr. - Ciecaba
lathami, Bp.) Osserv. R. Anim. Cuv. ex Rufous Owl,
Lath. Gen. Hist. p. 375. sp. 83. ex patria incerta,
Minor (longitud. vix 7-pellie.): rufa, subtus albo ferrugineo-
que undulata; alis albo-maculatis caudam excedentibus: tar-
sis elongatis, dense pilosis; digitis nudis.
- Quid Athene leucopsis, Hartl. Mus. Hamburg. 1849 ex Afr.
occ. Guin. o. a. Longit. 8-pallid: ex fulvoventri rufa, albo
nigro fuscoque varia; gula, superciliis, plumis faciei ad
basim, albis; subtus albida, pectore fuscescenti nigro-marmo-
rato; abdomine rufescens; maculis fuscis; tarsis rufis; digitis
flavidis.

* 5. **Ciccaba gisella**, Bp. Mus. Lugd. ex Amer. mer.

Braziliæ. Minima inter congeneres: fusco-badia, capite nigricante; fronte, genis, torque cervicali, corpore subtus, tibiosisque fulvois; disco faciali et macula gulare badiis: alis caudaque maculis rotundis albis in series dispositis: digitis nudis, flavis.

b. OCEANICÆ. *Digitæ apice tantum nudi. Minus Typicae, ad Syrnia accedunt: cum Athenis radiatis autem bene conjunctæ.*

6. **STRIX leptogrammica**, Temm. (Syrnium! leptogrammicum, Cassin.) Pl. col. 525 ex Borneo. Minor (longitud. 15-pollic.). rufo-nigroque omnino fasciata; subtus albo-rufa fasciolis numerosis fuscis; pectore vireido castaneo. Adult. capite nigricante; torque cervicali rufa. Juv. capite et cervice cinnamomeis.

* 7. **Ciccaba myrtha**, Bp. (Strix leptogrammica var. ex

Sumatra, Schleg.) Mus. Lugd. ex Sumatra. Major (long. sesquipedali): rufo-nigroque fasciata; subtus albida fasciis nigris; pectore intus castaneo-brunneo-nigro/fasciolato. Adult. collaris angusto rufa. Juv. collaris late albido-rufescens. Similis coloribus Ciccaba leptogrammicae, sed valde major, et magis aberrans, id est facie minus quam in illa fulconina!

8. **STRIX pagodarum**, Temm. (sclo-puto? Horsf.) Pl. col. 230. ex Insula Java. Major (longitudine sesquipedali): brunnea, ex toto albo stellata; subtus alba brunneo-fasciolata: facie et gula cinnamomeis. Facies fere Ululina! Quid Syrnium ocellatum, Less. ex Asia mer. minime juv. Circ. pagodarum cui similis, at magis fuscescens et stellulis albis dorsaliis ocellatus?

* 112. **Scotopelia**, Bp. Permagna: plumae auriculares nullæ: tarsi digitique nudi.

Africa occ. 1.

* **STRIX PELI**, Temm. Mus. Lugd. Figura nulla, ex Ashantee. Longit. 22-pollicar. rufo-cinnamomea nigro undulata; subtus dilutior, maculis nigris paucis: tarsis digitisque flavis.

113. **Ketupa**, Less. (Cultrunguis, Hodgs.) Magnæ: auriculatae: tarsi digitique nudi.

As. m. Ocean. 3.

1. **Strix ceylonensis**, Gm. (leschenaultii, Temm. - hardwickii, J. Gr. - dumeticola, Tick. - Cultrung. nigripes, Hodgs.) Brown, Ill. t. 4. - J. Gr. Ill. Ind. Zool. t. 31. Pl. col. 20, ex Asia merid.

2. **STRIX KETUPA**, Horsf. (ceylonensis, Temm. an Lath?
nec Gm.-Se.ketupa, Cuv. - **Ketupa javanensis**,
Less.) Pl. col. 74. ex Malaisia.

3. **CULTRUNCUS flavigipes**, Hodgs. (Ketupa flavipes, Gr.)
Fig. nulla. ex Asia mer.

114. Lophostrix, Less. (Ephialtes, p. Gr.) Media: plumae auriculares longissimae: alae elongatae: tarsi vestiti: digiti nudi. America m. 1.

STRIX cristata, Daud. (griseata, Lath. - Bubo griseatus,
Cuv. - Syrnium griseatum, Less. - Ephialtes cristata,
Gr.) Levail. Afr. t. 48. - Jard. Contr. Orn. cum
fig. variet.

***115. Ephialtes**, Bp. (Ephialtes, p. Gr.) Rostrum robustum:
digiti crassi: discus facialis parum conspicuus: plumae auriculares elongatae: remiges vix emarginatae; secunda,
tertia et quarta subaequales: plumae corporis compactae,
inferiores lanceolatae. Afr.occ.Ocean. 2.

1. **STRIX leucotis**, Temm. (Otus leucotis, Cuv. Schlegel.
Scops leucotis, Sw. - Ephialtes leucotis, Gr. Cassin.
Scops leucotis, Auct.) Pl. col. 16 ex Afr. occ.

2? **Ephialtes megalotis**, Gr. Mus. Britann. ex Ma-
nilla. Avis junior.

116. Scops, Savign. (Ephialtes, Keys. et Bl.) Parvi: rostrum de-
bile: digiti graciles: alae breves: tarsi vestiti: plumae
corporis laxae, omnes apice rotundatae. Cosmopol. 20.

1. *Aisiones*, Schlegel. Majores: tarsi partim salem vestiti;
digiti lanuginosi, pilosi, vel nudi: discus facialis latior: plumae auriculares longiores, erectiles: remiges primae quatuor utrinque emarginatae; quarta omnium longissima.

a. *AMERICANI*. Remiges profunde emarginatae;
prima et secunda pogonio externo serratae:
tarsi plerumque vestiti; digiti saepius pilosi.

1. **STRIX asio**, L. (naevia, Gm. - Scops carolinensis, Briss.
Scops asio, Bp. - Otus naevius, Cuv. - Otus asio, Schleg.
Bubo asio, albifrons, et striatus? Vieill. - Eph. asio, Gr.)
Wils. Amer. Orn. t. 19. i. et t. 42. i. - Aud. Am. t. 97.
ex Amer. sept. Albido vel rufofuscque varius; alis plus
quam semipedalibus; tarsis dense vestitis; digitis pilosis.

2? **EPIHALTES grammicus**, Gosse, Birds of Jamaica, et

Illustrat. t. 19. ex Antillis.

3. **Astro brasiliensis**, Briss. (Strix brasiliiana? Gm.
choliba, Vieill. ex Azara 48. - crucigera et undulata,
Spix - decussata, Licht. - Ephialtes choliba, Gr. - Otus
brasiliensis, Schleg. - Scops brasiliensis, Bp. - porto-
riensis, Less.) Spix, Av. Bras. t. 9 et 10. - O. des
Murs, Pl. p. 26. ex Amer. mer. Brasilia, Antill.
Simillimus Scopias; statura tantum minor, et coloribus
distinctus; abdomine albo, lineis angustis, fuscis, decussatis;
Longit. 9 poll. caudae 3", tarsi 1½.

4. **STRIX atricapilla**, Natter. (Scops atricapillus, Cuv.
Ephialtes atricapillus, Gr.) Pl. col. 145. ex Amer. mer.
Similis praecedenti quod formam et staturam: pileo nigro:
digitis nudis?

5. **EPIHALTES watsoni**, Cassini (Scops lophotes, Puche-
ran, nec Mus. Musser. nunc Philad.) Proc. Acad. Philad.
1848. p. 123. ex Amer. mer. Similis praecedenti, pileo
etiam nigricante; sed major, tarsis longioribus, corpore sub-
tus magis rufescens; cauda aequali alas paullo excedente!
Quid Bubo nudipes hinc psilopodns, Vieill. (Ephialtes nudipes,
Cassini, certe Scops species, forsitan pedibus denudatis) Ois.
Am. s. t. 22. ex Antillis, tarsis nudis flavi?

6. **Scops lophotes**, Less. (Ephialtes lophotes, Cassin.
ex Mus. Musser.) Tr. Orn. p. 107. fig. nulla. ex Amer. m.
Quid Ephialtes assimilis et Eph. albo-punctatus, Gr. Brit. Mus.
ex Amer. mer?

7? **Scops trichopsis**, Wagl. (Tlalquipati? Hernandez)
Isis 1832. p. 276. Mus. Wurzburg. ex Mexico.
Cinerous albo nigroque varius: alis quinque-pollicularibus: pla-
mis rigidis anteocularibus in pilum longissimum productis!

b. **ASIATICI et OCEANICCI. Remiges parum emar-
ginatae; prima tantum externe serrata:
tarsi dense vestiti: digitii plerumque nudi.**

8. **OTUS semitorques**, Schleg. (Ephialtes semitorques,
Cassin. - Scops semitorques, Bp.) Faun. Japon. t. 8,
ex Japon. Albo-rufescens fuscoque varius, collari lato
cervicali pallido: alis plus quam semipodalibus; remigibus
distincte emarginatis: tarsi digitisque vestitis.

*9. **OTUS magicus**, Müll. (Ephialtes magicus, Gr.) Schleg.
Faun. Japonic. p. 25. ex Amboina et Celebes.
Albo-rufescens fuscoque varius, cervice concolori: alis plus
quam semipodalibus; rectricibus distincte emarginatis: tar-
sis superne tantum vestitis, inferne digitisque nudis.

10. STRIX *lempiji* et rufescens Horsf. (noctula, Reinw.

Temm. - javanicus, Less. - Otus noctula, Schlegel.
 Ephialtes lempiji, Gr. - Scops lempiji, Bp.) Pl. col. 99.
ex Malaisia. Cinereo, fuso, nigroque varius: alis 5½
pollic.: remigibus parum emarginatis: tarsis omnino dense
vestitis; digitis nudis.

11. OTUS *mantis*, Müll. (Ephialtes mantis hinc lempiji!

part. Gr.) Schlegel, Faun. Japonic. p. 25. fig. nulla.
ex Borneo. Affinis praecedenti, sed minor: alis vix quinque-
pollicaribus ferrugineis, albo-rufescenti fuscoque varius, ma-
culis supra parvis, pallidis, sagittatis, subtus minimis,
elongatis; fronte albo-rufescente.

12. EPHIALTES *sagittatus*, Cassini (gymnopus? Gr.

Strix bakkamana? Penn. Lath? nec Vieill? indica? Gm.
 Scops letta? Hodgs. - malabaricus, griseus et letoides?
 Jerdon. - Scops sagittatus, Bp. in litt.) Penn. Ind.
Zool. t. 3? ex Asia meridional. India. Zeylona.
Simillimus praecedenti, sed major; alis septem-pollicaribus!
Quid Ephialtes spilocephala, Gr. ex Blyth, Journ. As. Soc.
Beng. 169. p. 8?

13. SCOPS *novae-zelandiae*, Bp. Mus. Lugdunens.

ex Nova Zelandia. Similis sequenti, at obscurior, ut
passim Strigidae hujus Insulae: nigricans, fulvo va-
rius: plumis auricularibus longioribus.

14. STRIX *menadensis*, Quoy et Gaim. (Otus manaden-

sis, Schleg. - Ephialtes minadensis, Gr.) Voy. Astrol.
Ois. t. 2. 2. ex Celebes. Similis, etiam magnitudine,
Scopi lempijio: digitis autem non elongatis; plumis auricula-
ribus brevioribus, depresso, coloribusque ad Scopes veros ac-
coden: medius quasi inter illos et Asiones!

2. *Scopæ*, Schlegel. Minores: tarsi vestiti; digitæ nudi: discus
 facialis parvus: plumæ auricularæ parum explicatae, vix erectiles:
 remigum tres tantum utrinque emarginatae; tertia omnium lon-
 gissima.

15. STRIX *scops*, L. (*zorca* et carniolica, Gm. ex Cetti - pul-

chella, Pall. - giù, Scopoli. - Scops zorca, Sw. - aldron-
 vandi, Flem. - ephialtes, Sav. - europaeus, Less. - pen-
 nata? Hodgs. - Bubo scops, Boie. - Ephialtes scops,
 Keyserl.) Pl. enl. 436. - Gould, Eur. t. 41. *ex Eur.*
mer. Afr. sept. Asia occ. Albo-rufescenti fuscoque
varius: alis sex-pollicaribus; remigum secunda quartam exce-
dente, prima quinquatum subaequantem: tarsi ad phalangenem digitæ
medii secundam usque vestitis.

167. **Scops sunia**, Hodgs. (Ephialtes sunia, Gr.) Jerdon,
Ill. Ind. Zool. t. 41. ex Asia mer. Nonne potius var.
praecedentis?
17. **Scops japonicus**, Temm. et Schlegel, Faun. Ja-
pon. t. 9. ex Asia orient. Rubiginoso fuscusque varius;
alii 5½ pollicaribus: remigium secunda quarta paulo breviori;
prima septimam longitudine aquanti; tarsis ad pollicis tan-
tum originem vestitis.
18. **Scops senegalensis**, Sw. (capensis, Smith - afri-
canus! Schlegel) ex Afr. mer. et o.c. Minor: allo-
cineo fuscusque varius: alii quinque-pollicaribus; remige se-
cunda quintam subaequante, prima octava vix longiori; tar-
sis phalangem secundam digiti medii usque vestitis.
19. **Scops rutilus**, Pucheran, Mus. Parisiens. ex Ma-
dagascar. Similis Sc. zorae, sed magis rufescens, et sca-
pularibus fascia longitudinali alta.
117. **Ascalaphia**, Is. Geoffr. (Bubo, p. Gr.) Afr. Eur. m. 1.
STRIX ASCALAPHUS, Audouin. (Bubo ascalaphus, Savigny.
Otus ascalaphus, Cur. - **Ascalaphia savignyi**,
Geoffr.) Pl. col. 57. - Expedit. Egypt. Ois. t. 3. 2.
Gould, Eur. t. 38.
118. **Bubo**, Cuv. (Asia, Sw. ex Briss. - Heliaptes, Sw. - Urrua et
Huhua hinc Etaglaux et Mesomorpha, Hodgs.) Cosmopol. 12.
a. AMERICANA.
1. STRIX **virginiana**, Gm. (pyihanus, Bartram. - ma-
corhyncha, Temminck, ex specimine, mas, obscurus, male-
factus - crassirostris? Vieill. - Bubo ludovicianus,
Daudin - B. virginianus et arcticus, Richardson.
B. crassirostris? Cassin. - Asio virginiana et Heliaptes arcti-
cus, Sw.) Edw. B. t. 60. - Ois. Am. s.t. 19. - Wils.
Am. Orn. t. 50. 1. - Faun. Bor. Am. t. 30. - Aud.
Am. t. 61. ex Amer. sept.
2. STRIX BUBO var. ♂ **magellanicus**, Gm. (nacurutu,
Vieill. ex Azara 42. - Bubo magellanicus, Cur. - B. vir-
gianus, Tschudi) Pl. enl. 385. ex Amer. mer.
- b. EUROPAEUS.
3. STRIX BUBO, L. (**Bubo atheniensis**, Aldrov. - itali-
cus, Briss. - maximus, Sibbold. - atheniensis et albus,
Daud. - europaeus, Less. - microcephalus, Leach. - ger-
manicus et septentrionalis, Brehm.) Pl. col. 435.
Edie. B. t. 227. - Gould, Eur. t. 37. ex Eur.

c. ASIATIC.

4. **Bubo sibiricus**, Eversm. (cinereus er. Gr. - Strix sibirica, Licht. - turcomana? nec leucomanna, Eversm. Isis, 1830. p. 70.) *Susenmihl, Vög. Eur.* t. 44. - Mitch. Gen. B. t. 13. ex Asia sept. A praecedenti *vix distinctus*; coloribus dilatioribus.
5. **Otus bengalensis**, Franklin 1831 (Bubo hinc Urreae cavearia, Hodgs. 1837. - Bubo bengalensis, Gr.) Gould, Cent. Himal. B. t. 3. ex Asia centrali.
6. **STRIX coromanda**, Lath. (Bubo coromandus, Gr. Urrea coromanda, Hodgs. 1837. - umbrata? Blyth, 1844.) J. Gr. Ill. Ind. Zool. t. 20, fig. mala. ex Asia centr.
7. **STRIX orientalis**, Horsf. (sumatrana, Raffles. - strepitans, Temm. - Bubo hinc Huhua nepalensis, Hodgs. 1837. - Bubo strepitans, Cuv. - B. orientalis, Gr. - Syrnum strepitans, Less.) Pl. ent. 174. 229. ex Asia centr. et m. nec non Malaisia. Digits nudis!
- 8? **Bubo pectoralis**, Jerd. Madr. Journ. Sc. 1839. t. 1. ex Asia mer.

d. AFRICAN.

9. **Bubo capensis**, Daud. (africanus, Steph.) Levaill. Ois. Afr. t. 40. - Ill. S. Afr. Zool. B. t. 70. ex Africa m. or id. Similis Baboni atheniensi, sed minor.
10. **STRIX maculosa**, Vieill. (africana, Temm. - Otus! africanus, Cuv. - Bubo africanus, Boie. - B. maculosus, Cassin.) Gal. Ois. t. 23. - Pl. col. 50. ex Africa m.
- * 11. **Bubo verreauxii**, Bp. (Bubo lacteus, Gr. Mus. Brit.) Mus. Lugd. ex Africa mer. Similis B. lacteo, sed major, dilatior, plumis auricularibus valde longioribus, retropositis.
12. **STRIX lactea**, Temm. (Bubo lacteus, Cuv. - Otus lacteus et Bubo sultaneus, Less.) Pl. col. 4. ex Africa occid. Senegal. Sierra Leonae. Longitud. bipedalis! obscurior; plumis auricularibus brevibus, anticus: tarsis albis nigro-fasciatis; digitis nudis, caeruleis.
13. **Bubo cinerascens**, Guérin, 1843. (lacteus! Rüpp. nec Temm. - dillonii, O des Murs, 1846.) Ferret et Galin. Voy. Abyss. Ois. t. 2. ex Afr. or. Satis similis B. lacteo, at valde minor. Sesquipedalis. Fuscus albido-rufescens et fusco-vermiculato-fasciatus; gula et spatio pectorali albis, collari nigricanti: remigibus rostriciliis que brunnescit griseo-rufescenti fasciatis: tarsis rufis.

14. *Otus madagascariensis*, Smith, South African

Mus. 1835. ex Madagascar. Longitud. sesquipedal: nigrescens albo fulvoque valde variegatus; subtus ferrugineus maculis tantum longitudinalibus fuscis: tarsis dense vestitis, rufis, fusco-undulatis.

SUBFAM. 23. ULULINAE.

119. *Otus*, Cuv. (Asio, Strickl. - Nyctalops, Wagl. - Egolius,

Keys et Bl.)

Cosmopol. 5.

1. *STRIX OTUS*, L. (deminuta? Pall. - soloniensis? Gm. - *Otus vulgaris*, Flem. - europaeus, Steph. - communis, Less. - albicollis, Daud. - sylvestris, arboreus et gracilis, Brchm. - Asio otus, Strickl. - *Bubo otus*, Boie.)
Pl. enl. 29. - Gould, Eur. t. 39. ex Eur.

2. *STRIX americana*, Gm. (otus, Wils. - peregrinator?
Bartr. - *Otus americanus*, Bp. - *vulgaris*, Aud. - wilsonianus, Less. - wilsonii, Gr.) Am. Orn. t. 51. 3. - Bp.
Am. Orn. tab. inedit. - Aud. Am. t. 383. ex Amer. s.
Simillimus O. vulgaris ex Europa: O. mexicanus paulo minor,
magis variegatus: facie alba; linea circumfacialis nigra,
externe marginata plumulis albo-nigris: maculis inferioribus
angustis, duplo decussatis: aliis cauda longioribus.

3. *STRIX mexicana*, Gm. (longirostris, Spix. - maculosa,
Wied. 1831. nec Vieill. - *Otus mexicanus*, Cuv. - *Bubo clamator*, Vieill.) Ois. Am. s. t. 20. fem. - Av. Bras. t. 9. a. - Bp. Am. Orn. tab. ined. - Aud. Am. t. 412.
ex Amer. sept. et mer. Mexico. Paullo major
praecedentis, minus variegatus: facie alba; linea circumfa-
cialis, ex albo abrupte nigra, immarginata: maculis inferio-
ribus latiss., simplicibus: aliis cauda multo brevioribus.

4. *Otus signatus*, Orb. Voy. Cuba t. 2. figura bona. ex
Insula Cuba e. Obscurior; facie nigra: cauda conspicue
fasciata: digitis nudis!
Species optima, distinctissima: ob digitos nudes perinsignis!
minimo Scop. sive Ephialtes, nec var. Oti vulgaris!
Quid Nyctalops stygius, Wagl. Isis 1832. (*Otus communis* var.
brasiliensis, Less. - *Ostygius*, Gr. Pucheran) ex Brasilia,
Sesquipedalis, nigricans, digitis nudis?

5? *Otus philippensis*, Gr. Mus. Brittan. ex Oceania.

120. **Brachyotus**, Gould. (*Otus*, p. Gr.) Cosmopol. 4.

1. **STRIX BRACHYOTUS**, Gm. (*negolius*, *ulula* et *accipitrina*,
Pall. - *caspia*, *Shaw* - *arctica*, *Sparrm.* - *tripennis*,
Schrank. - *palustris*, *Smies* - *brachyura*, *Nilss.* - *Otus*
brachyotus, *Boie*. - *ulula*, *Cuv.* - *palustris* et *agrarius*,
Brehm - **Brachyotus palustris** *europeus*, *Bp.*)
Pl. enl. 438. - *Gould*, *Eur. t.* 40. ex *Eur. As.*
Afr. sept.

2? **STRIX BRACHYOTUS**, Wils. (**Brachyotus palustris**
americanus, *Bp.*) *Am. Orn. t.* 33. 3. - *Aud. Am. t.* 410.
ex *Amer. sept.*

3. **OTUS galapagoensis**, Gould, 1837. - *Voy. Beagle*,
B. t. 3. ex *Insulis Galapagoens. et Falkland.*

4. **OTUS capensis**, Smith, 1835. (*abyssinicus?* *Guérin*,
1843. - *Strix brachyotus* ex *Nubia*, *Licht.* 1822. - *Brachyotus helvolus*, *Licht.* 1842. - *Br. africanus*, *Aliqu.* - *falcoides?* *Mus. Lugd.*) *Ill. S. Afr. Zool. t.* 67. - *Ferret et Galinier*, *Voy. Abyssinie*, *Ois. t. 3.* ex *Afr. mer.*
et orient? *Brunneo-canescens*, *albido-fuscoque obsoletus vermiculatus*; *facie cinerascente*; *oculis nigro-cinctis*; *abdomine ochraceo striis fuscis et maculis albis marmorato*; *remigibus rectricibusque fuscis rufo-fasciatis*; *caudae fasciis sex:*
tarsis albo-straminis; *digitis superne tantum vestitis!*

121. **Syrnium**, Savigny. (*Aluco*, *Cuv.* - *Scotiaptex*, p. *Sic.* - *Bulaca hinc Mesidas*, *Hodgs.*) Cosmopol. 13.

a. **EUROPAEUM**. *Typicum: digitis dense vestitis.*

1. **STRIX aluco et stridula**, L. (*sylvatica*, *Shaw* - *sylvestris*,
alba, *noctua*, *et rufa*, *Scopoli* - *Syrnium ululans*, *Sav.*
stridulum, *Brehm*) *Pl. enl.* 441. 437. - *Gould*, *Eur. t.* 47.
ex *Eur. As. Afr. sept.*

b. **ASIATICA**. *Vix Typica: digitis dense vestitis.*

2. **Syrnium nivicolum**, Hodgs. (*Urrua hinc Mesamorphia nivicola*, *Hodgs.*) *Icon. ined. Accipitr.* 96.
ex *Asia centrali.*

3. **STRIX indrance**, Sykes (*Ulula?* *hinc Bulaca newa-rensis*, *Hodgs*, 1837. - *Urrua umbrata?* *Blyth* - *Bulaca monticola*, *Jerdon*, 1840. - *Syrnium indrance*, *Gr.*)
Mitchill, *Gen. of B. t.* 14. ex *Asia centrali.*

4. STRIX *einensis*, Lath. (orientalis, Shaw nec Horsf. - joun-
gou, Cat. Massen. Mus. - Otus sinensis, Steph. - Bulaca-
sinensis, Jerdon. - Syrnium sinense, Gr. - S. ocella-
tum? Less. 1839.) Ill. Ind. Zool. t. 21. ex Asia mer.
5? *Syrnium philippense*, Gr. (minime bubo!) Mus.
Britann. ex Insulis Philippinis.

c. AFRICANA. Typica: *digitis vestitis*.

6. NOCTUA *woodfordii*, Smith, 1834. (Athene!! wood-
fordii, Smith, 1840. - Syrnium woodfordii, Cassin.)
Ill. South. Afr. Zool. Ac. t. 71. ex Afr. mer. Brun-
neum, maculis crebris albis; subtus album, fasciolatum, plu-
mis singulis linolis quinque fuscis et apice rufescens:
remigibus rectricibusque brunneis, rufo-cinereofasciatis.

d. AMERICANA. Typica: *digitis nudis!*

7. STRIX *hylophila*, Temm. (Syrnium hyophilum, Gr.
Ulula fasciata, O. des Murs, 1840!) Pl. col. 373. - Pl.
peint. 37. ex Brasilia, Chili. Longitud. 14-pollic.
fusco-brunneum, rufo-fasciatum, remigibus rectricibusque
subconformibus; subtus albidum, pectore rufo, fusco undulato-
fasciatum: tarsis rufescitibus fusco-variegatis: digitis
eineois.
Affinis Syrnio aluconi, facie immo Ululae! cui geaeri apertura ou-
riculari grandiori accedit.

8. STRIX *suinda*, Vieill. (Noctua dominicensis!! Caban.
Tschudi, nec Gm.) Azara 45. - Faun. Peruan. p. 115.
sp. 2. fig. nulla. ex Amer. mer. centr. et occ.
Longitud. 15-pollic. fuscum, rufo cinereoque varium, capite
cum gula obscuriore; subtus cinereo-rufescens, pectore striis,
lateribus maculis, fuscis.

9. STRIX *fasciata*, Vieill. nec O. des Murs (rufipes? King.
Syrnium zonocercum, Gr. - S. fasciatum, Cassin.)
Fig. nulla. ex Amer. mer. Venezuela, Antilllis.
Longitud. 14-pollicar: brunneum, superciliis et gula albican-
tilis; pectore ex fusco rufescente; cauda fusco-brunnea fasciis
subtus albis, supra angustioribus cinerascentibus vel rufes-
centibus: tarsis rufis; digitis luteis.

- 10? STRIX *cayennensis*, Gm. (Athene hinc Strix! cayen-
nensis, Gr.) Pl. enl. 442. ex Amer. mer. Longitud.
14-pollic: ex toto fulcescens nigro-vermiculatum.

- 11? *Syrnium albifarse*, Gr. Mus. Britann. ex Amer.
mer id. tarsis splendido albis.

- * 12. *STRIX squamulata*, Licht. (*Syrnium squamulatum*,
Bp.) *Mus. Lugdun.* ex *Mexico*. *Longitud. 14-pollic.*
rufo-brunneum, maculis parvis albo-cinnamomeis sparsum;
subtus album, maculis longitudinalibus fuscis; cauda brunnea
fasciis quinque albidis, supra cinereis angustioribus; digitis
cinerascentibus. Jav. *Torques cervicali magno cinnamomeo.*
Quid Syrnium virgatum, Cassin. Proc. Ac. Philad. 1848. p. 124.
ex Mexico?
- * 13. *Syrnium macabrum*, *Bp. Mus. Lugd.* ex *Amer.*
merid. Minor (longitud. 11-pollic.) ex toto brunneo-fuscum,
minutissime albo-rufescens punctato-variegatum, cauda quo-
que concolori! gula late alba; abdomine rufa fusco-striato:
tarsis rufis.
- Quid Syrnium albigulare, Cassin. Proc. Acad. Philad. 1848?*
Quid Syrnium polygrammicum, Gr. Mus. Brit. ex Brasilia?

122. *Ptynx*, Blyth. (*Scotiaptex*, p. *Sw.* - *Syrnium*, p. *Gr.*) Eur. As. s. 2.
Cauda elongata. Analogiam cum Surnia Familiae
praeced. praebet.

1. *STRIX uralensis*, Pall. (*liturata*, *Gr.*-*maerura*, *Natter.*
macrocephala, *Meisner.* - *Surnia uralensis et Ulula litu-*
rata, *Cuv.* - *Syrnium macrocephalon*, *Brehm*) *Lepech.*
Itin. t. 3. - *Pl. col. 27.* - *Gould*, *Eur. t. 44. ex Eur.*
orient. sept. et Sibiria.
2. *STRIX fuscocencs*, Temminck et Schlegel, *Faun.*
Japon. t. 10. ex Japon. Minor; magis rufescens.

123. *Ulula*, Cuv. (*Scotiaptex*, p. *Sw.* - *Syrnium*, p. *Gr.*) Eur. As. Am. s. 2.
 1. *STRIX cinerea*, Gm. (*acclimator?* *Bartr.* - *lapponica*,
Retz. - *barbata*, *Pall.* - *fuliginosa*, *Shaw.* - *microph-*
thalma, *Tyzenski.* - *Syrnium cinereum et microph-*
thalmum, *Gr.* - *Scotiaptex cinerea*, *Sw.*) *Sparrm. Mus.*
Carls. t. 5. - *Pall. Zoogr. Ross. As. I. t. 11.* - *Nilss.*
Ill. Fig. Skand. Faun. t. 71. - *Bp. Am. Orn. t. ined.*
Aud. Am. t. 351. - *Faun. Bor. Am. t. 31. ex Arc-*
ticas utriusque continentis.
Analog. cum Surnia nyctea Familiae praecedentis.

2. *STRIX nebulosa*, Gm. (*chichicli*, *Gmel.* ex *Hernandez*
fernandina, *Shaw.* - *Syrnium nebulosum*, *Boie*, *Gr.*)
Vicill. Ois. Am. s. t. 17. - *Wils. Amer. Orn. t. 33. 2.*
Aud. Am. t. 46. - *Gould*, *Eur. t. 46. ex Amer. sept.*
minime Europea!

124. **Nyctale**, Brehm (*Aegolius, Kaup.* - *Scotophilus, Sw.*) Eur. As. Am. s. 4.

1. **STRIX funerea**, L. (*passerina, Pall.* - *noctua, Tengmalm.*
tengmalmi, Gm. - *dasypus, Bechst.* - *Nyctale pinetorum, abietum et planiceps, Brehm*) Edw. B. t. 228.
Gould, Eur. t. 49. ex Eur. As. sept. Major: (longit.
10-pollic.) fuscocinerea, maculis albis, rotundatis: cauda
alas paulo excedente, maculis albis per paria positis, interdum obsoletis: rostro flavescenti.
2. **NYCTALE richardsoni**, Bp. (*Strix tengmalmi, Richards.* - *Ulula temgalmi, Aud.* - *Death-bird, Indianorum Cree dictis.*) Faun. Boreal. Am. t. 32. - *Aud.*
Am. t. 380. - Mus. Soc. Zool. Londin. ex Amer.
boreal. Similis precedenti, sed cauda longiore.
3. **STRIX acadica**, Gm. (*acadiensis, Lath.* - *albifrons? Turton.*
nec Vioill. - *passerina, Wils.* - *tengmalmi, Jameson, Mus.*
Edinb. - *wilsonii, Boie.* - *frontalis, Licht. Mus. Berlin.* 1838. *senescens.* - *Ulula acadica, Bp.* - *Noctua acadica,*
Rich. - *Scotophilus acadicus, Sw.*) Am. Orn. t. 34. 2.
Aud. Am. t. 199. ex Amer. sept. Major: (longit.
7-pollic.) brunnea albo maculata: cauda brevi, alas vix excede-
dente, fasciis linearibus duabus et apice albis; rostro nigro.
4. **NOCTUA stix**, Orb. (*Athene! siju, Gr.*) De la Sagra, Cuba,
Av. t. 3. ex Insula Cuba. Minima!
Quid Strix phalaenoides, Vicill. Ois. Am. s. t. 15. ex Antill.
Longit. 6-pollic?
Quid Nyctale harrisii, Cassin. Proc. Acad. Philad. 1848. p. 157?

SUBFAM. 24. STRIGINAE.

125. **Strix**, L. (*Aluco, Flem.* - *Hybris, Nitzsch.* - *Stridula, Selys.*) Cosmopol. 11.

126

a. AUSTRALASIANAE. Magnae.

1. **Strix castanops**, Gould, 1836. Austr. t. 28. ex
Tasmania. Maxima! rufescens.
2. **Strix personata**, Vig. 1831. (*cyclops, Gould, 1836*
mas ad.) Austr. t. 29. ex *Austr. merid. et sept.*
Tasmania. Permagna (Faemina statuta maris pra-
cedentis): fuscocinerea, valde variegata.
3. **Strix tenbricosa**, Gould, 1845. (*megarea, Mus.*
Luggd. ex Cat. Massen.) Austr. t. 30. ex *Austr. mer.*
et sept. Magna: nigricans, albo stellata.
4. **Strix flammea**, Vig. et Horsf. (*delicatula, Gould.*)
Austr. t. 31. ex Austr. sept. et mer. Media: pal-
lescens; subtus albo, nigro-punctata. Similis Str. flammea
ex Europa!

b. MALAIASIANAE et ASIATICAE.

5. *Strix javanica*, Gm. (flammea, Hogds. 1837.) Gr.
et Mitch. Gen. B. t. 15. ex *As. mer.* et *Malaiasia*.
6. *Strix candida*, Tickell (longimembris, Jerd. 1839.)
Ill. Ind. Orn. t. 30. ex *Asia mer.*

c. AFRICANAЕ.

7. *Strix capensis*, Smith, 1836. (flammea ex Africa m.
Licht. - flammeoides, Cat. Massen.) Ill. South Afr.
Zool. t. 45. ex *Afr. mer.* Valde affinis Str. candidae.
Quid *Strix pectinata*, Fraser, Proc. Zool. Soc. 1842. p. 187. ex
Insula Fernando Po?


d. AMERICANAЕ.

8. *Strix punctatissima*, Gr. Voy. Beagle, Av. t. 4.
ex *Ins. Galapagoens.*
9. *Strix perlata*, Licht. nec Vieill. (furcata, Temm.
Azara 48.) Pl. col. 432. ex *Amer. mer.* Cuba Ins.
California? Simillima Str. flammea ex *Europa*
et Str. pratincola ex *Amer. sept.* at tarsis longioribus
et coda magis emarginata.
10. *Strix flammea*, Wils. (*pratincola*, Bp. - ameri-
cana, Audub. - perlata, p. Gr.) Am. Orn. t. 50. 1.
Audub. Am. t. 171. ex *Amer. sept.*

e. EUROPAЕA.

11. *Strix flammea*, L. (guttata, Brehm) Pl. enl. 440.
Gould. Eur. t. 36. ex *Eur. As. occ. Afr. sept.*

126. *Phodilus*, Is. Geoffr. Malaiasia. 1.
STRIX *badia*, Horsf. Zool. Res. Java tab. 36. - Pl. col. 318.
ex *Asia mer. Ocean.*



Ordo 3. Passeres.

TRIBUS 1. VOLUCRES.

FAMILIA 9. CAPRIMULGIDAE.

SUBFAM. 25. STEATORNITHINAE.

127. **Steatornis**, Humboldt. Am. trop. 1.
CAPRIMULGUS STEATORNIS, hinc **Steatornis caripensis**,
Humb. Obs. Zool. 11. t. 44. - Ann. Mus. 1834. t. 15.
128. **Podargus**, Cuv. Austr. N. Guin. 8.
1. **Podargus cuvieri**, Vig. et H. - Gould, Aust. II. t. 4.
2. **Podargus brachypterus**, Gould, Intr. Aust. p. 26.
3. **Podargus stanleyanus**, Vig. et Horsf. (megace-
phalus, Gould). Introd. B. of Austr. p. 26.
4. **Podargus humeralis**, Vig. et Horsf. (australis,
Steph. - cinerous, Cuv. - gracilis et strigoides, Lath.)
Règn. Anim. t. 4. 1. - Gal. Ois. t. 123. - Jard. Ill.
Orn. t. 88. - Gould, Austr. II. t. 3.
5. **Podargus phalaenoides**, Gould, Austr. II. t. 5.
6. **Podargus papuensis**, Quoy et G. Astrol. Ois. t. 13.
7. **Podargus ocellatus**, Quoy et G. Astrol. Ois. t. 14.
8. **Podargus plumiferus**, Gould, Austr. II. t. 6.
129. **Batrachostomus**, Gould (Bombycistomas, Hay) Malaisia. 4.
1. PODARGUS auritus, Vig. (fullertoni, Hay) Griff. An.
Kingd. II. t. 114. - Gould, Icon. Av. t. 7.
2. PODARGUS javanicus, Horsf. (cornutus, Temm.
stellatus, Gould) Zool. Res. Java cum fig. - Steph. Gen.
Zool. XIII. t. 41. - Pl. col. 159. Mas et Faem. inter se
colore different ut Scops asio differt a Str. naevia, Auctorum.
* 3. PODARGUS parvulus, Temm. Mus. Lugd. Similis pra-
cedenti, sed minor.
* 4. PODARGUS crinifrons, Temm. Mus. Lugd. Similis
P. javanensi, at major, et rostri setis valde productis, erectis.

130. *Egoteles*, Vig. Australia. 2.

1. *Caprimulgus novae-hollandiae* et vittatus, Lath. (cris-
tatus, Shaw. - *Egoteles lunulatus*, Jard. - australis,
Sv. - cristatus, Gr. - *novae-hollandiae*, Vig.) *White*
Voy. t. 29. - *Philip. Botan. Bay, t. p. 270.* - *Selby,*
Ill. Orn. t. 149. - *Mag. Zool. 1837. Ois. t. 82.* - *Gould,*
Austr. II. t. 1.

2. *Egoteles leucogaster*, Gould, B. Austr. II. t. 2.

131. *Nyctibius*, Vieill. (Ibjau, Azara - Nictornis? Nitzsch.) America m. 6.

1. *Caprimulgus grandis*, Gm. (maximus, Shaw) *Pl. Len. 335.*
Lever. Mus. t. 9. - *Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 89.*

2. *Nyctibius pectoralis*, Gould, *Icon. Av. t. 8.*

3. *Caprimulgus aethereus*, Wied, (sphenurus? Vieill.
ex Azara 316. - azarae? Merr. - longicaudatus, Spix.) *Av.*
Bras. II. t. 1.

4. *Caprimulgus cornutus*, Vieill. (urutau, Laf.) *Azara 303.*

5. *Caprimulgus jamaicensis*, Gm. - Lath. *Syn. t. 57.*
Gosse, Ill. B. Jamaica t. 8.

6? *Nyctibius pallidus*, Gosse, *Ill. B. Jam. t. 7.*

7. *Nyctibius bracteatus*, Gould, *Pr. Zool. Soc. 1846.*
*ex S. t. F. de Bogata. Minimus omnium: longitud.
9-pollciar.*

132. *Selochusa*, Gr. (hinc Nyctibus p. Gr.) Africa. 1.

Caprimulgus furcatus, Vieill. (furcatus, Cur.) *Levaill.*
Afr. t. 47. 48.

SUBFAM. 26. CAPRIMULGINAE.

133. *Hydropsalis*, Wagl. (Psalurus, Sie. - Caprimulgus, p. Gr.) Amer. m. 7.

1. *Hydropsales*. Cauda simpliciter furcata; rectricibus
gradatim crescentibus.

1. *Caprimulgus furcifer*, Vieill. ex Azara (Hydr. azarae?
Wagl.) *ex Brasilia. Paraguay. Minor (longitud.
vix pedali): alis remigum secunda omnium longissima: cau-
da semipedalis; rectrice extima secundam duobus tantum pol-
licibus excedente.*

* 2. *Hydropsalis creagra*, Bp. Mus. Lugd. *ex Bra-
silia. Medius: alis longioribus, acutis; remige prima om-
nium longissima: cauda sesquipedalis; rectricibus extimis
rectis, apicibus divergentibus, secundas pede et ultra exce-
dentibus.*

Quid Hydropsalis boliviensis, Gr. Mus. Brittan, ex Bolivia?

* 3. *Hydropsalis tyra*, Gould, ex S. t. Fe de Bogota.

Major: alis brevioribus rotundatis; remige tertia omnium longissima: cauda sesquipedali; rectricibus extimis curvis, apicibus convergentibus, secundas pede et ultra excedentibus.

2. *Psaluri*. Cauda duplicitate furcata: rectricibus mediis longioribus (an d e c i d u s ?), extimis longissimis.

4. *Caprimulgus psalurus*, Temm. (furcifer? Gr. nec Vieill.

ex Brasilia. Major (Tardi visceri magnitudine): colliari cervicali rufo: alis remigibus tribus primis subaequalibus: cauda 14-pollicari; rectrice extima caeterum plus duplo longiori.

5. *Caprimulgus manurus*, Vieill. N. Dict. II. Nat. x. p. 239.

ex Brasilia. Minor (magnitudine Passeri domestici): cauda octo-pollicari; rectrice extima caeterum ultra duplo longiori; tertia et quarta utrinque brevissimis; mediis quintas ipsas longitudine excedentibus.

6. *Hydropsalis climacocercus*, Tschudi, Faun.

Per. t. 6. 1. Alis elongatis, acutis, rectricibus mediis cincero-nebulosis, et extimis albo nigroque dimidiatis, aequo longissimis.

7. *Hydropsalis trifurcatus*, Natt. Mus. Vindob.

Tschudi, Faun. Peruana. p. 4.

Quid Caprimulgus enicurus, Vieill. (cordicilla, Merr. - Tetroura enicura, Less.) ex Azara 315?

134. *Caprimulgus*, L. (Nyctichelidon, Rennie)

Eur. As. Afr. Oc. 24.

a. EUROPAE.

1. *C. europaeus*, L. (vulgaris, Vieill. - punctatus, Meyer - maculatus, Brehm) Pl. enl. 193. - Gould, Eur. t. 51.

2. *C. ruficollis*, Temm. (rafitorques, Vieill.) Wern. Icon. Man. Temm. fig. ex Eur. merid. Africa.

b. AFRICAN.

* 3. *C. smithi*, Bp. Mus. Lugd. (C. europaeus, Smith) Ill.

S. Afr. Zool. B. t. 102. faem. ex Afr. merid.

Ac. europaeo coloribus dilutioribus, griseis, valde distinctus. Quid C. pallidus, J. Gr. Zool. Misc. p. 1?

4. *C. tristigma*, Rüpp. Faun. Abyss. (poliocephalus, Rüpp. Syst.) Vög. Ost. N. Afr. t. 3. ex Afr. orient.

5. *C. poliocephalus*, Rüpp. Faun. Abyss. (tetragramma, Rüpp. Syst.) Vög. Ost. N. Afr. t. 4. ex Afr. orient.

6. *C. infuscatus*, Rüpp. (nubicus, Licht.) Zool. Atl. t. 6. ex Afr. orient.

7. *C. isabellinus*, Temm. (aegyptius, Licht.) *Pl. col.* 379.
ex Afr. orient.
8. *C. eximus*, Rüpp. *Pl. col.* 398. *ex Afr. orient.*
9. *C. tentiginosus*, Smith. *Ill. Zool. Afr.* t. 101. *ex Afr. m.*
10. *C. natalensis*, Smith. *Ill. Zool. Afr.* t. 99. *ex Afr. m.*
11. *C. rufigena*, Smith. *Zool. S. Afr.* B. t. 100. *ex Afr. m.*
12. *C. pectoralis*, Vieill. (africanus, Steph.) *ex Afr.*
- * 13. *C. concretus*, Temm. *Mus. Lugd.* *ex Ashantee,*
Nigricans, abdomine late albido-undulatus: spatio gulari ma-
gno albo: remigibus fuscis immaculatis: rectricibus extimis
utrinque duabus unicoloribus intus opice albis, Faem. rufa.
14. *C. madagascariensis*, Sganz. *Mem. Strasb.* ill. p. 28.

c. ASIATICI.

15. *C. albo-notatus*, Tickell. *J. As. S. Beng.* II. p. 580.
16. *C. monticola*, Frankl. (*gymnopus*, Hodgs.) *Pr.*
Zool. Soc. 1831. *ex Asia centr.*
17. *C. mahrattensis*, Syk. (*indicus*, Jerd.) *Ill. Ind.* t. 24.
18. *C. indicus*, Lath. (*cinerascens*, Vieill.) *ex Asia.*
19. *C. asiaticus*, Lath. - *Gr. Ind. Zool.* t. 34. 2. *ex Asia.*
20. *C. jotaka*, Temm. et Schleg. *Faun. Jap. Ois.* t. 12. 13.

d. OCEANICI.

21. *C. affinis*, Horsf. *Linn. Tr.* XIII. p. 42. *ex Java.*
22. *C. arundinaceus*, Hombr. et J. *Polo Sud*, t. 21. 2.
- * 23. *C. binotatus*, Temm. *Mus. Lugd.* *ex Borneo. Nigri-*
cans, abdomine subtiliter rufo-vermiculatus: collis macula
utrinque alba: remigibus fuscis rufo-maculatis: rectricibus
omnibus atro rufoque variis, sine maculis albis.
24. *CAPRIMULGUS macrourus*, Horsf., Gould. *Austr. Ill.* t. 9.
ex Java, Australia. Similis C. albo-notato Asiac
continentalis, sed minor, obscurior.

135. *Antrostomus*, Gould (Caprim. p. Gr.-Encopripodus? Less.) America. 15.

a. AMERICANI SEPTENTRIONALES.

1. *CAPRIMULGUS carolinensis*, Briss. (rufus, Vieillot)
Catesb. Car. t. 1. - Vieill. Ois. Am. s.t. 25. - Wils. Am.
Orn. t. 54. 2. - Aud. Am. t. 52. ex Amer. sept.
2. *CAPRIMULGUS vociferus*, Wils. (virginianus, Vieillot,
nec Br.) clamator, Vieill. Am. Orn. t. 41. - Ois. Am.
Sept. 23. - Audub. Amer. t. 82. ex Amer. sept.

* 3. *Antrostomus dominicus*, Bp. Mus. Lugd. ex Insula S.ti. Dominici. Similis praecedenti, sed obscurior, magis et pulcherrime variegatus.

* 4. *Antrostomus californianus*, Bp. (Confer Capr. nuttallii, Aud. Am. 2da edit. t. 4951) ex California. - Vix Turdi magnitudine. Mas. Griseus; nucha fulvescenti; abdomine cervino, nigro-undulato; gula macula utrinque alba nigro terminata: remigibus fuscis, macula mediana alba: rectricibus lateralibus nigricantibus, extima late ad apicem candida.

B. AMERICANI MERIDIONALES.

5. *Caprimulgus rufus*, Gm. nec Vieill. (brachypterus, Steph. ex Azara 311? - Chordeiles! rufus, L. r.) Pl. enl. 735.

6. *Caprimulgus cayanensis*, Gm. (cayanus, Lath. - leucurus, Vieill. - leopetes, Jard.) Pl. enl. 760. - Ill. Orn. t. 87. ex Amer. mer.

7. *Caprimulgus guianensis*, et griseus? Gm. (variegatus, Vieill. - jaspideus, Merr.) Pl. enl. 733.

Pulcherrimum specimen in Collectione Lugdunensi Lansbergianal

8. *Caprimulgus albicollis*, Gm. (Eucapripodus albicollis, Less.) Azara 310.

9. *Caprimulgus odonopteron*, Less. Rev. Zool. 1839. p. 105.

10. *Caprimulgus semitorquatus*, Gmelin (pruinosus, Licht.) Pl. enl. 734. - Tschudi, Faun. Per. t. 6. 2.

11. *Caprimulgus longirostris*, Bp. J. Ac. Phil. iv. p. 384.

12. *Caprimulgus decussatus*, Tschudi, Faun. Per. t. 5. 1.

13. *Caprimulgus ocellatus*, Tschudi, Faun. Per. t. 5. f. 2.

14. *Caprimulgus bifasciatus*, Gould, 1837. - Beagle Voy. p. 38. sp. 1. ex Chili.

15. *Caprimulgus parvulus*, Gould, 1837. - Beagle Voy. p. 37. sp. 2. ex La Plata.

Quid Caprimulgus torquatus, Gm. (brasiliensis, Briss.) Wilhughby, Orn. t. 14. ex Amer. m. Minimus (magnit. Alaudae): occipitis annulo aureo, torque albido-maculato; rectricibus duabus intermediis multo longioribus.

Quid Caprimulgus macromystax, Wagl. Isis 1831. ex Mexico. a specimine cauda destituto!

136. *Nyctidromus*, Gould.

Amer. calid. 2.

* 1. *CAPRIMULGUS grallarius*, Wied, Mus. Lugd. ex Bras.

Mas. Rufescens-griseo eleganter variegatus, subtus cervinus nigro-undulatus: genis pure rufescens: vitta gulari continua, speculoque claram albis: cauda elongata, valde rotundata, rectrice extima nigrinante, secunda et tertia albis. Pedes elongati. Faem. lunula gulari, speculo alarum, rectricibusque lateralibus rufis, nec albis.

2? *Nyctidromus derbyanus*, Gould, Icon. Av. t. 2.

Major: vitta gulari alba interrupta.

137. *Eleothreptus*, Gr. (Ambypterus, Gould, nec Agass.) America m. 1.

AMBYPTERUS *anomalous*, Gould, Pr. Zool. Soc. 1837.

Icon. Av. t. 1.

138. *Eurostopodus*, Gould.

As. m. Oc. 2.

1. *CAPRIMULGUS albicularis*, Vig. (albimaculatus, Cuv.

mystacalis, Temm.) Pl. col. 412. - Gould, Austr. II. t. 7.

2. *CAPRIMULGUS guttatus*, Vig. - Gould, Austr. II. t. 8.139. *Lyncornis*, Gould (Eurostopodus, p. Gr.)

As. m. Ocean. 4.

1. *L. cervicalis*, Gould, Icon. Av. t. 4.2. *L. macrotis*, Vig. Gould. Icon. Av. t. 5.3. *L. temminckii*, Gould, (Capr. pulcher, Hay. - imberbis, Temm.) Icon. Av. t. 6. ex Borneo. Alis cauda multo brevioribus.* 4. *L. macropterus*, Temm. Mus. Lugd. ex Celebes.

Niger, dorso aureo-ruso vermiculato-pulverulento: subtus pallide rufescens nigro-undulatus: pileo ruso-griseo-reflectente; genis juguleque badio-nigris; collaris suprorno ruso, inferne candido: remigibus rectricibusque nigris, punctulis rufis in fasciis plus minus regulariter dispositis.

Similis L. temminckii (conf. descriptionem), sed major et alis cauda longioribus!

140. *Scotornis*, Sw.

Africa. 2.

1. *CAPRIMULGUS climacurus*, Vieill. (longicaudus, Steph.

wiederspergi! Reichenb.) Gal. Ois. t. 114. - Lath.

Hist. IV. t. 114. - All. Deutsch. Nat. Zeit. 1846. t. 5.

2. *Scotornis trimaculatus*, Sw. B. of west Afr. p. 70.

141. **Macrodypteryx**, Sw. (*Semeiophorus*, *Gould*. - *Cosmetornis*, *Gr.*) Afr. or. Madag. 2.

1. **CAPRIMULGUS longipennis**, Shaw (macrodipterus, *Afzel.* - *Macrodipterus africanus*, *Sw.*) *Nat. Misc.* t. 265.
2. **SEMEIOPHORUS vexillarius**, *Gould*, *Icon. Av.* t. 3.

142. **Chordelles**, Sw. America. 11.

1. **CAPRIMULGUS virginianus**, Br. nec *Vieill.* (popetue, *Vieill.* - *americanus*, *Wils.*) *Edu. B.* t. 63. - *Vieill.* *Ois. Am.* t. 24. - *Wils.* *Am. Orn.* t. 40. - *Aud.* *Am.* t. 147. ex *Amer. sept.*

*2. **CAPRIMULGUS sapiti**, Natter. *Mus. Vindobonens.* ex *Amer. m.* *Satis similis* praecedenti, *at minor, dilutior, cinerascens* nec *nigricans*.

3. **CAPRIMULGUS americanus**, L. - *Sloan. Jam.* t. 255. 1.

4. **CAPRIMULGUS acutus**, Gm. (acutipennis, *Boddart*) *Pl. enl.* 722. *Rectricibus acutis!*

5. **CAPRIMULGUS labeculatus**, Jard. *Ann. N. H.* 1846. p. 119.

6. **CAPRIMULGUS rupestris**, Spix, *Av. Bras.* II. t. 2.

7. **CAPRIMULGUS hirundinaceus**, Spix, *Av. Br.* t. 3. 1.

8. **CAPRIMULGUS exilis**, Less. *Rev. Zool.* 1839. p. 44. sp. 5. ex *Chitti. Rostro exili, minutissimo: juguli macula triangulari, fasciolis alaribus binis, et singula caudali, allis: coda furcata.*

*9. **CAPRIMULGUS minutus**, Natter, *Mus. Vindob.* ex *Brasil.* *Avis junior?* *Totus subtilissime variegatus, absque notis allis: remigibus maculis magnis rufis: coda brevissima, aequali. Pedes vestiti. Statura parva, sed non minima.* *Vix hujus generis!*

10. **CAPRIMULGUS brasiliianus**, Gm. (noitibo? *Vieill.* - *pruinosus?* *Tschudi*) *Faun. Peruan.* t. 6. 2.

11. **CAPRIMULGUS leucopterus**, Wied. (*leucopygius*, *Spix.*) *Av. Bras.* t. 3. 2.

143. **Podager**, Wagl. (*Proithera*, *Sw.*) America m. 3

1. **CAPRIMULGUS nacunda**, Vieill. (*diurnus*, *Wied.* - *campestris*, *Licht.*) *Pl. col.* 182.

2. **CAPRIMULGUS nattereri**, Temm. *Pl. col.* 107.

3. **Podager gouldi**, Gr. et Mitch. *Gen. of Birds*, t. 18.

FAMILIA 10. CYPSELIDAE.

SUBFAM. 27. CYPSELINAE.

144. *Acanthylis*, Boie (Chaetura, Steph. - Hirundapus, Hodgs.
Pallene, Less. - Hemiprocnæ, Nitzzsch.) As. Am. Oc. 15.

1. *Acanthylis. Minores: fuliginosi.*

1. *Hirundo pelasgia*, L. (Cypselus acutus, Temm. Mus.

Lugd. nec Gm. ex Pl. enl. 544. 12) Vieill. Am. S.t. 33.

Wils. Am. Orn. t. 39. 1. - Aud. Am. t. 58. ex Am. s.

2. *Cypselus rauxi*, Towns. ex *Columbia*.

3. *CHAETURA brunneitorques*, Lafr. (ruficollis? Natter.)

Rev. Zool. 1844. ex Amer. mer.

Quid Hirundo acuta, Gm. Pl. enl. 544. 1. ex Amer. merid.

Minima sine torque brunnesc?

4. *Cypselus poliorcites*, Temm. (Ac. brachyurus? Jard.)

Pl. enl. 726. 2. ex Amer. mer.

- * 5. *Cypselus coracinus*, Müll. Mus. *Lugd. ex Borneo.*

*Viridi-niger: tectricebus caudae protractis, griseo-lacteis,
rachide nigricante. Magnitud. Chelidonis urbicae.*

6. *Cypselus spinicaudus*, Temm. (Hirundo pelasgia var.

Lath.) Pl. enl. 726. 1. ex Amer. mer.

- 7? *Hirundo oxyurea*, Vieill. ex Azara 307. ex *Parag.*

2. *Pallene. Majores: cinerascentes: alae et
cauda atro-chalybeae.*

8. *Cypselus giganteus*, v. Hass. - Temm. *Pl. col. 304.*
ex Malaisia.

9. *Cypselus collaris*, Wied. (torquatus, Licht. - Hirundo
albicollis, Vieill. - zonaris, Shaw.) *Mill. Cim. Phys.*
t. 55. - Gal. Ois. t. 120. - Pl. col. 195. ex Amer. m.

10. *CHAETURA sebinii* et bicolor, Gr. (Pallene leucopygia,
Boie. ex Griff. Anim. Kingd.)

Quid Acanth. robinii, Boie a Less! ex Insula Trinidad?

11. *CHAETURA nudipes*, Hodgs. (Cypselus leuconotus,
Deless. 1839) *Mag. Zool. 1840. Ois. t. 20. - Souven.*
Voy. Inde, Ois. t. 9. ex Asia contin. Bootan.

12. *Hirundo caudacuta*, Lath. (Ii. fusca, Shaw. - Chaetura
australis, Steph. - macroptera, Sw.) *Ill. Orn. n. s. t. 42.*
Gould, Austr. II. t. 10. ex Austr. accident. Europa!!!

13. *CHAETURA albifrons*, Jard. et Selby *Ill. Orn. t. 56. 1. 2.*

142 **HIRUNDO ciris**, Pall. *Zoogr. Ross.* Az. I. p. 541. a Steller.
ex Dauria. Irkutsk. Magnitudine Turdi merulae!

15. **CYPSELUS senex**, Temm. Pl. col. 397. *ex Brasilia.*
Rectricibus minime mucronatis sed rigidis!
Est inter congeneres quod Lachesis inter Serpentes Crotalinos!

145. **Cypselus**, Ill. (Apus, *Scopoli* - *Micropus*, *Wolf.* - *Brahypus*, *Meyer* - *Tachornis*, *Gosse*) Cosmopol. 18.

a. EUROPAEI.

1. **HIRUNDO melba**, L. (*alpina*, *Scopoli* - *Cypselos alpinus*,
Temm. - *gutturalis*, *Vieill.* - *gularis*, *Steph.*) *Edw. B.*
t. 27. - *Levaill. Afr. t. 243.* - *Vieill. Gal. Ois. t. 121.*
Gould, Eur. t. 53. 2. ex Eur. mer. Afr.

2. **HIRUNDO apus**, L. (*Cypselus murarius*, *Temm.* - *vulgaris*,
Steph.) *Pl. enl. 242. 1.* - *Gould, Eur. t. 53. 1.*
ex Eur. As. Afr. sept. et or.

b. AFRICANI.

3? **Cypselus cafer**, *Licht.* (*apus* var. β *Pall.*) *ex Afr. m.*

4. **Cypselus leucorrhous**, *Steph.* (*Hirundo nigra*,
Vieill.) *Lev. Afr. t. 244. 1.* *ex Afr. m.*

5. **C. unicotor**, *Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 83.* *ex Ins. **
Madeira, et aliis Africae occ.

6. **C. pygargus**, *Temm. Pl. col. 460. 1.* *ex Cap. b. spei.*

c. ASIATICI.

7. **C. vittatus**, *Jard. et Selb. Ill. Orn. n. st. 39.* *ex As. or.*

8. **C. affinis**, *J. Gr.* (*nepalensis*, *Hodgs.* - *montanus*, *Jerd.*)
Ill. Ind. Zool. t. 35. 2. *ex Asia centr.*

9. **C. subsarcatus**, *Blyth.* (*affinis* var. *Strickland*) *ex*
Asia merid.

10. **C. palmarum** et *balasiensis*, *J. Gr.* (*Atticora palma-*
rum, *Boie*) *Ill. Ind. Zool. t. 35. 1.* *ex Asia mer.*

11. **HIRUNDO sinensis**, *Gm.* (*Cypselus sinensis*, *Cuv.*) *ex*
Asia orient.

Quid C. gularis et C. plumiferus, Boie, a Gould! ex Asia?

12? **C. leuconyx**, *Blyth. J. As. Soc. Beng. 1848.* *ex As. m.*

d. OCEANICI.

13. **HIRUNDO pacifica**, *Lath.* (*Cypselus australis*, *Gould*)
Austr. II. t. 11.

e. AMERICANI.

14. **HIRUNDO cayananensis**, Gm. Pl. enl. 725. 2. ex Amer.
mer. Nigerrimus; macula utrinque ad latera rostri parva,
uroptygi magna, gula, pectore, torque lato, rectricisque ex-
tima pogonio externo ad basin, albis. Pedes digitique plu-
multis nigris dense vestiti.
15. **HIRUNDO nigra**, Gm. - Briss. Orn. II. t. 46. 3. - Gosse,
Ill. Orn. Jam. t. 10. ex Amer. calid.
16. **TACHORNIS phaenicobia**, Gosse, Ill. B. Jamaic. t. 9.
ex Antill.
17. **Cypselus andecolus**, Orb. (Chelidon andicola,
Boie.) Voy. Am. m. Ois. t. 42. 2. ex Amer. mer. or.
18. **Cypselus montivagus**, Orb. (neq noctivagus!
minime Acanthylis!) Voy. Am. m. t. 42. 1. ex Amer. m.
Quid Cypselus fumigatus, Boie a Temminck! ex Brasil. nisi
Hirundo fucata?..
146. **Dendrochelidon**, Boie (Macropterus, hinc Macropteryx!
Sic. - Pallestre, Less.) As. m. Afr. Oc. 5.
1. **HIRUNDO ambrosiaca**, L. (Cypselus parvus, Licht.)
Tamm. Pl. col. 460. 2. ex Afr. or.
Quid Cypselus parvus, Less. Tr. Orn. p. 268? Quid Pl. enl. 725. 1?
2. **HIRUNDO klecho**, Horsf. (Cypselus longipennis, Tamm.)
Pl. col. 83. 1. mas. - Sv. Zoologic. Ill. n. s. t. 74. ex
Malaiasia. Mas. genis rufis. - Faem. genis nigris.
- * 3. **Dendrochelidon schisticolor**, Bp. (Macropte-
ryx longipennis? Jerdon, nec Tamm. - Conf. cum Hirund.
coronata, Tickell, Dendr. velata, Less.) Mus. Lugd. ex Ne-
pal, ab Hodgson! Virescenti-ardesina, subtus cum scopula-
ribus dilutior; alis caudaque purpureo-virescentibus.
Mas. loris nigrit; genis castaneo-rufis; superciliis albicantibus.
Fem. vitta oculari nigra; mystacibus albicantibus.
4. **CYPSELUS comatus**, Tamm. Pl. col. 268. ex Sumatra.
5. **CYPSELUS mystaceus**, Less. Voy. Coquill. Ois. t. 22.
ex Nova Guinea.

FAMILIA 11. TROCHILIDAE.

SUBFAM. 23. TROCHILINAE.

147. **Grypus**, Spix (Ramphodon, Less.) Am. m. or. 1.

TROCHILUS *næcivius*, Dumont (squamosus, Licht. nec Tomm.)

Grypus ruficollis, Spix. - Ramphoden maculatum, Less.)

Pl. col. 120. 3. - Ar. Bras. t. 80. 3. - Nat. Libr. XIV. t. 1.

ex montuosis Brasil. mer.

148. **Glaucis**, Boie (Polytmus, p. Gr.) America m. 3.

1. TROCHILUS *hirutus*, Gm. p. (brasiliensis? Lath. nec Br.

rufus, Aliquor. - mazeppa? Less.) Vieill. Ois. dor.

t. 20. 68. - Less. Ill. Zool. t. 143. - Hist. Colibr. t. 21.

Trochil. t. 3? - Nat. Libr. xv. t. 29. ex Brasil.

Ins. Tabago? Guiana?

2. TROCHILUS *leucurus*, L. (ruficollis, Less.) *Pl. ent. 600. 4.*

Edw. B. t. 256. 2. - Less. Colibr. t. 22. ex Brasil.

Guiana. Surinam.

3. TROCHILUS *aquila*, Loddig. 1847. - Gr. et Mitch. Gen.

B. t. 36. ex Nova Granada. Bogota.

149. **Phaëtornis**, Sw. Amer. trop. 20.

1. TROCHILUS *superciliosus*, L. - *Pl. ent. 600. 3. - Vieill.*

Ois. dor. t. 18. 19. - Less. Colibr. t. 6. mas. 7. fem.

Nat. Libr. xv. t. 26. 27. ex Brasil. Guiana.

2. TROCHILUS *malaris*, Nordmann, in Erman, Verz.

Thier. Vieill. Ois. dor. t. 17.

3. TROCHILUS *melanotis*, Nordm. in Erman, Verz.

Thiere, p. 2.

4. TROCHILUS *leucophrys*, Nordm. in Erman, Verz.

Thiere, p. 2.

5. TROCHILUS *eury nome*, Less. (Phaetornis eurynomus,

Gr.) Troch. t. 31. - Nat. Libr. xv. t. 28. - Gould,

Trochil. I. t. 5. ex Brasil. Rio Janeiro.

6. TROCHILUS *guy*, Less. Troch. t. 44. ex Brasil.

7. TROCHILUS *emiliae*, Bourc. Ann. Sc. Lyon, 1846.

ex Bogota.

8. TROCHILUS *intermedius*, Less. Troch. t. 19. ex Bras.

9. TROCHILUS *bourcieri*, Less. Troch. t. 18. ex mon-

tuosis Bras.

10. TROCHILUS *longuemareus*, Less. Troch. t. 2. et 62.

ex Guiana.

11. *Trochilus squalidus*, Natter. (*Polytmus brasiliensis?*
Br. nec Lath. - *Phaeornis brasiliensis*, *Gr.*) *Pl. col.*
 120. 1. - *Less. Colibr. t. 8. ex Brasilia.*
12. *Trochilus eremita*, Gould, (*brasiliensis*, *Temm. nec*
Auct. - rufigaster, *Less. an Vieillot?*) *Pl. col. 120. 2.*
Colibr. t. 9? - Gould, Monogr. I. t. 6. ex Brasilia.
13. *Trochilus pygmaeus*, Spix (*davidianus?* *Less.*) *Troch.*
 t. 13? - *Av. Bras. t. 80. 1. ex Guiana. Brasil. s.*
14. *Phaeornis hispidus*, Gould, *Pr. Zool. Soc.*
 1846. *ex Peru?*
15. *Trochilus pietrii*, Delattre, *Rev. Zool.* 1839. - *Gr.*
et Mitch. Gen. B. t. 35. ex Brasil. Minas Geraes.
16. *Trochilus anthophilus*, Bourc. *Rev. Zool.* 1843. p. 71.
ex Columbia: ex valle sup. Magdalena.
17. *Trochilus apicalis*, Licht. - Tschudi, *Faun. Pe-*
ruan. p. 243. ex Peru.
18. *Trochilus philippi*, Bourc. *in Ann. Sc. Lyon*, 1847.
19. *Trochilus augustae*, Bourc. *in Ann. Sc. Lyon*, 1847.
- 20? *Phaeornis conurus*, Gr. (*Trochilus pavoninus*,
Lath.) *ex Wedge-tailed Humming-bird, Lath. Hist.*
iv. p. 305.
- 21? *Phaeornis ciliatus*, Gr. *ex Buff-striped Hum-*
ming-bird, Lath. Hist. iv. p. 294. ex Cayenna.
*Quid Phaeornis swainsoni, Jard. (*Trochilus swainsoni alter*,*
Less.) Troch. t. 66. - Nat. Libr. xv. t. 30. ex Brasil?
Quid Phaeornis maxillesus, Nordin. in Erm. Verz. Thier. p. 2?

- * 150. *Lafresnaya*, Bp. (*Calothorax*, p. *Gr.*) Amer. trop. 3.
1. *Trochilus lafresnayi*, Boiss. *flavicaudatus*, Fraser.
Calothorax lafresnayi, Gr. *Rev. Zool.* 1848. p. 8. *Spe-*
cies vix a sequenti distincta.
2. *Trochilus gayi*, Bourc. *Ann. Sc. Lyon*, 1846.
3. *Trochilus saulae*, Bourc. *Rev. Zool.* 1846, *ex Quito.*
151. *Dorifera*, Gould (*Mellisuga*, *Gr.*) America m. 2.
1. *Trochilus ludoviciae*, Bourc. et Muls. *Ann. Sc. Lyon*,
 1847, p. 126. *Fronte viridi: corpore subtus aureo-viridi.*
Avem, cui a donis ferendis est nomen, cui spes est in fronte, salu-
*tare jubeo *Ludoviciam* illam, quae spem attulit exsuli,*
cui debet auxilia consolationemque!!!
2. *Trochilus johannae*, Bourc. (*Dorifera violifrons*,
Gould) *Proc. Zool. Soc.* 1847. *ex Peru. Fronte viola-*
cea: corpore subtus nigra.

152. **Petasophora**, Gr. (Colibri, p. Spix - Polytmus, p. Gr.) America m. 2.

1. **TROCHILUS serrirostris**, Vieill. (petasophorus, Wied

Grypus vieilloti, Steph. - Colibri crispus, Spix. - Ramphodon petasophorus, Less.) Pl. col. 203. 3. - Ois. Mouch. t. 1. mas. - Trochil. t. 59. faem. - Nat. Libr. XIV. t. 13. mas. xv. t. 15. faem. ex Brasil.

* 2. **Petasophora gouldii**, Bp. ex Bolivia. Similis praecedenti; rectricibus extimis apice late albis: abdome cinerascente; auriculis restrictis.

* 153. **Colibri**, Bp. ex Sp. (Polytmus, Gr. - Petasophora, Gould) America m. 7.

1. **TROCHILUS cyanotis**, Bourc. Rev. Zool. 1843. nec Less. (Petasophora cyanotus, Gould) ex Bogota.

2. **TROCHILUS thalassinus**, Sw. 1827. (Petasophora thalassina, Gould) Less. Troch. t. 55. 56. 57. - Ois. Mouch. t. 3 - Nat. Libr. xv. t. 1. 2. ex Mexico. Minor.

3. **ORNISMYA anais**, Less. part. (Ramphodon anais, Less. Grand Anais-Petasophora anais, Gould) Ois. Mouch. Suppl. t. 2. ex Venezuela, Cordiller. prope Bogota.

4. **PETASOPHORA jolata**, Gould (Trochilus jolatus, Gr.) Pr. Zool. Soc. 1847. ex Bolivia. Affinis praecedenti, sed major et pulchrior.

5. **TROCHILUS corruscans**, Gould. (Petasophora corruscans, Gould, 1847.) Pr. Zool. Soc. 1846. ex Amer. me

6. **ORNISMYA delphinae**, Less. (Petasophora delphinae Gould) Rev. Zool. 1839. - Ill. Zool. t. 64.

7. **TROCHILUS geoffroyi**, Bourc. (Petasophora geoffroyi, Gould.) Ann. Sc. Lyon. 1843.

Avis inter congeneres singularis, uti vir doctus cui dicata in perdiscendis naturae moribus et amicitiae officiis prestandis!

154. **Meliothrix**, Boie, (Les Jacobines, Less. - Colibri, p. Spix.) America m. 4.

1. **TROCHILUS auritus**, Gm. - Briss. Orn. III. t. 37. 3.

Vieill. Ois. dor. t. 25. 26. - Shaw, Nat. Misc. t. 977.

Less. Ois. Mouch. t. 10. - Sw. B. Bras. t. 29. ex Brasil. Guiana.

2. **ORNISMYA nigroris**, Less. Ois. Mouch. t. 11. ex Guiana.

3. **ORNISMYA poucheti**, Less. (Trochilus auriculatus, Licht.) Rev. Zool. 1841. - Erman, Verz. von Thier. t. 2. 1. 2.

4. **TROCHILUS barroti**, Bourc. Rev. Zool. 1843. - Ann. Sc. Lyon, 1843. t. 4. ex Columbia. Carthagena.

- * 155. **Delattria**, Bp. (Caeligena, Less. 1829. - Topaza et Polymnus, p. Gr.) America m. 4.
 1. **ORNISHYA henrica**, Less. (Topaza henrica, Gr.) Rev. Zool. 1839. p. 17. ex Mexico. Guatopec.
 2. **TROCHILUS viridi-pallens**, Bourc. (Polytmus viridipallens, Gr.) Ann. Sc. Lyon. 1846. p. 321. ex Guatim.
 3. **CAELIGENA clemenciae**, Less. (Mellisuga clemenciae, Gr.) Ois-Mouch. t. 80. - Suppl. t. 8. ex Mexico.
 4. **TROCHILUS fulgens**, Sw. (Ornithya rivolii, Less.) Ois-Mouch. t. 4. - Nat. Libr. xv. t. 18. ex Mexico. Species abnormis: an propr. genus?
- * 156. **Leadbeatera**, Bp. (Mellisuga, p. Gr.) America m. 3.
 1. **TROCHILUS jacula**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1849.
 2. **TROCHILUS LEADBEATERI**, Bourc. (**Leadbeatera grata**, Bp.) Bourc. in Ann. Sc. Lyon. 1843. t. 5.
 3. **Leadbeatera** —— Gould, nov. spec.
- * 157. **Heliomaster**, Bp. (Mellisuga et Calothorax, p. Gr.) America m. 5.
 1. **ORNISHYA angelae**, Less. Ill. Zool. t. 5. mas. ad. 46. faem. ex Chili.
 2. **TROCHILUS longirostris**, Vieill. (superbus, Shaw. nec Vieill. - Ornithya corinna, Less.) Nat. Misc. t. 517. Pl. col. 299. 1. - Ois. dor. t. 59. - Less. Ois-Mouch. t. 2. - Colubr. Suppl. t. 23. - Trochil. t. 34. ex Antillias. Ins. Trinitatis.
 3. **TROCHILUS mesoleucus**, Temm. (longirostris, Natter. nec Vieill. - squamosus, Temm. nec Licht. - mystacinus, Vieill. - Ornithya temminckii, Less. nec Boiss.) Pl. col. 317. mas. adult. 203. 1. juv. - Less. Ois-Mouch. t. 20. jun. 29. mas. 30. faem. - Trochil. t. 45. mas. ad. Nat. Libr. xv. t. 17. ex Brasil.
 4. **TROCHILUS rubineus**, Lath. (obscurus, Gm. - ruficardatus, Vieill.-Mellisuga rubinea, Briss. - Ornithya rubinea, Less.) Orn. ill. t. 37. 4. - Pl. ent. 276. 4. - Ois. dor. cidual, Shaw. - azureus, Licht. - splendidus? Vieill.) t. 27. 28. - Ois-Mouch. t. 44. mas. ad. 45. faem. 46. jun. ex Brasil. Gujara.
 5. **TROCHILUS rubinoides**, Bourcier, Ann. Sc. Lyon, 1846. p. 22. ex Nova Granada.
158. **Pterophanes**, Gould. (Mellisuga, p. Gr.) Am. m. ecc. 1.
 TROCHILUS **temmincki**, Boiss. nec Less. (cyanopterus, Loddig.) Rev. Zool. 1839. - Magaz. Zool. 1849. Ois. t. 14. - Gould, Monogr. Trochil. t. 7. ex Columbia. Pasto: summ. Cordiller.

159. **Campylopterus**, Sw. (Polytmus, p. Gr.) America. 10.

1. **TROCHILUS CAMPYLOPTERUS** et cinereus? Gm. (**tatipennis**, Lath. - Polytmus largipennis, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 672. 2. - Vieill. Ois. dor. t. 5. 21. - Less. Ois. Mouch. t. 34. - Sw. Zool. Ill. t. 130. 131. - Nat. Libr. xiv. t. 34. ex Guiana? Tabago Ins.
2. **Campylopterus obscurus**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1848. p. 13. ex Brasil. Flum. Amazon.
3. **TROCHILUS ensipennis**, Sw. Zool. Ill. t. 107. - Less. Ois. Mouch. t. 35. - Trochil. t. 46. 47. ex Brasil? Antilles.
4. **Campylopterus rufus**, Less. Rev. Zool. 1840. p. 73.
5. **TROCHILUS lazulus**, Vieill. (falcatus, Sw.) Gal. Ois. t. 179. Zool. Ill. t. 83. - Less. Ois. - Mouch. t. 36. ex Ins. Jamaic.
6. **ORNISMYA pampa**, Less. Ois. Mouch. Suppl. t. 15. ex Paraguay.
7. **Campylopterus delattre**, Less. Rev. Zool. 1839. p. 14. ex Mexico. Jalapa, in Sylvia.
8. **TROCHILUS cirrhochloris**, Vieill. (campylopterus, Licht. - Ornismya simplex, Less.) Ois. Mouch. t. 33. ex Brasil. San Paulo. Species haud typica, sed hujus generis!
9. **TROCHILUS curvirostris**, Delattre, Rev. Zool. 1846. p. 310. ex Isthm. Panama et Telemanc. Species abnormis, vix hujus generis!

160. **Lampornis**, Sw. (Anthracothorax, Boie. - Polytmus, p. Gr.) America m. 13.

1. **TROCHILUS mango**, L. (albus et punctulatus? Gm. - violaceus, Bodd. - fasciatus, Shaw. - atricapillus, quadricolor, punctatus et nigricollis? Vieill.) Pl. enl. 671. 2. 680. 2. 3. - Vieill. Ois. dor. t. 7. 8. 11. - Sw. Bras. B. t. 27. 28. - Less. Hist. Colibr. t. 12. 13.* 14. 15. Aud. Am. t. 184. - Nat. Libr. xv. t. 20. ex Antilles.
2. **TROCHILUS dominicus**, L. (gramineus et maculatus, Gm. pectoralis et gularis, Lath. - maculatus? Vieill. ex Azara 298. - Polytmus dominicus, Briss.) Orn. III. t. 34. 4. - Pl. enl. 671. 1. - Ois. dor. t. 9. 10. 40? 44. 70. ex Ins. S. ti Dominic. Guiana.
- 3? **TROCHILUS viridis**, Vieill. (cyanurus, Less. - aureo-viridis, Shaw.) Ois. dor. t. 15. - Less. Colibr. t. 11. ex Ins. Porto rico.

- 4? **TROCHILUS elegans**, Vieill. (*Ornithomya swainsoni*, Less.)
Ois. dor. t. 14. - *Ois.-Mouch. t. 70.* ex *Brasil.*
5. **TROCHILUS margaritaceus**, Gm. (*aurulentus*, Vieill.
nec Lath? - *striatus?* Gm. - *hypophaeus?* Lath.) *Pl.*
enl. 680. 1. - *Ois. dor. t. 12. 13. 16.* ex *Porto Rico.*
6. **TROCHILUS prevosti**, Less. (*hypophaeus?* Lath. adult).
Colibr. t. 24. jun. praeced? ex *Ins. Tabago.*
7. **TROCHILUS floresi**, Bourc. (*porphyrurus?* Shaw. - *bro-*
micolor? Less. - *Polytmus porphyrurus*, Gr.) *Nat.*
Misc. t. 333? ex *Jamaica.*
8. **TROCHILUS antoniae**, Bourc. *Ann. Sc. Lyon*, 1846.
9. **TROCHILUS buffoni**, Less. *Trochil. t. 5.* - *Nat. Libr. xv.*
t. 19. ex *Brasil.*
10. **TROCHILUS caeruleigaster**, Gould, *Pr. Z. S.* 1847.
Species 9. 10. inter se similes, valde abnormes, vix hujus generis!
11. **TROCHILUS cyanopectus**, Gould, *Proc. Zool. Soc.*
1846. ex *Venezuela.*
12. **TROCHILUS aurescens**, Gould, *Proc. Zool. Soc.* 1846.
ex Brasil. Rio negro.
Species 11. 12. sunt Lampomithes aberrantes!
13. **ORNITHOMYA rhami**, Less. *Rev. Zool.* 1838. - *Delattre,*
Rev. Zool. 1839. ex *Mexico.* *Species sui generis!*
161. **Eulampis**, Boie. (*Polytmus*, p. *Gr.*) America m. 3.
 1. **TROCHILUS jugularis**, L. (*auratus et cyanomelas*, Gm.
granatinus et bancrofti, Lath.) *Edu. B. t. 266.* 1. - *Vieill.*
Ois. dor. t. 4. - *Less. Colibr. t. 10.* ex *Ins. S. Tho-*
mae? *Gujana. Cayenna.*
2. **TROCHILUS holosericeus**, L. (*atrigaster*, Shaw.) *Edu.*
B. t. 36. 1. - *Ois. dor. t. 6.* et *65.* - *Less. Ois.-Mouch.*
t. 20? ex *Mexico?* *Gujana?* *Antillias.*
3. **Eulampis** — Gould. nov. sp.
162. **Polytmus**, Br. p. Less. Bp. ex L. (*Trochilus*, *Gr. ex L'*) Ins. Jamaica. 2.
 1. **TROCHILUS POLYTMUS**, L. (*Ornithomya cephalatra*, Less.)
Edu. B. t. 34. - *Vieill. Ois. dor. t. 67.* - *Less. Ois-*
Mouch. t. 17. - *Nat. Libr. xv. t. 21.* - *Gosse, Ill. B.*
Jam. t. 20. - *Gould, Monogr. Trochil. t. 1.* ex *Ins.*
Jamaica.
2. **Polytmus** — Gosse, nov. sp. sub nomine, ni fallor,
TROCHILI STELLATI. - *Ill. B. Jam. cum fig.* ex *Ins.*
Jamaica.

163. **Topaza**, Gr. (Les Topazes, p. *Less.*) America m. 2.
 1. **TROCHILUS pella** et paradiseus? *L.* (*violaceus?* *Gm.*) *Pl.*
enl. 599. 1. - *Edw. B. t.* 32. 1. - *Shaw, Zool. Misc.*
t. 513. - *Vieill. Ois. dor. t.* 2. 3. - *Less. Colubr.*
t. 2. 3. 4. 5. - *Nat. Libr. xv. t.* 24. 25. var. *ex Guiana.*
 2. **TROCHILUS pyra**, *Gould*, *Proceed. Zool. Soc.* 1846. *ex*
Brasil. Rio negro. *Inter Trochilides pulcherimus!*
- *164. **Caeligena**, Bp. vix *Less.* (*Trochilus, Siw.* - *Mellisuga, Gr.*) America m. 2.
 1. **ORNISMYA CAELIGENA**, *Less.* (*Caeligena typica*, Bp.
Mellisuga caeligena, Gr.) *Trochilid. t.* 53. - *Nat. Libr.*
xv. t. 4. *ex Mexico.* *Colore rubenti! nec virescenti!*
 2. **Caeligena** — *Gould*, nov. sp. *ex Bolivia.*
- *165. **Leucippus**, Bp. (*Polytmus*, p. *Gr.*) America m. 2.
 1. **TROCHILUS fallax**, *Bourc.* (*Lampornis fulviventris, Gould*)
Rev. Zool. 1843. *ex Venezuela.*
 2. **TROCHILUS turneri**, *Bourc.* (*hypoleucus, Gould*) *Proc.*
Zool. Soc. 1846. *ex Bolivia.*
- *166. **Bourcieria**, Bp. (*Mellisuga*, p. *Gr.*) America m. 4.
 1. **TROCHILUS prunellii**, *Bourc. Ann. Sc. Lyon.* 1843. *t. 1.*
ex Columbia.
 2. **TROCHILUS torquatus**, *Boissonn.* (*insectivorus, Tschudi*)
Rev. Zool. 1840. *p. 6.* *ex Peru.*
 3. **TROCHILUS conradi**, *Bourc. Pr. Zool. Soc.* 1748. *p. 45.*
ex Caracas. *Species abnormis.*
 4. **TROCHILUS wilsoni**, *Bourc. Rev. Zool.* 1846. *p. 305.*
ex Nova Granada. Juntas. *Vix hujus generis!*
167. **Aglaeactis**, *Gould* (*Mellisuga et Hylocharis*, p. *Gr.*) America m. 4.
 1. **TROCHILUS cupripennis**, *Bourc. et Muls. R. Zool.* 1843.
ex Columbia.
 2. **TROCHILUS pamela**, *Orb. Voy. Am. m. Ois.* *t.* 60. 1.
 3. **Aglaeactis caumatonotus**, *Gould*, *Proc. Zool.*
Soc. 1848. *ex Peru.*
 4. **Aglaeactis castelnaudi**, *Bourc. Rev. Zool.* 1848.
ex Columbia.
- *168. **Florisuga**, Bp. (*Topaza*, p. *Gr.*) America m. 3.
 1. **TROCHILUS mellivorus**, *L.* (*Mellisuga surinamensis*,
Steph.) *Pl. enl.* 640. 2. - *Edw. B. t.* 35. 1. - *Vieill.*
Ois. dor. t. 23. - *Less. Ois-Mouch.* *t.* 21. 22. - *Nat.*
Libr. xiv. t. 30. *ex Cayenne. Surinam. Antillis.*

2. *Trochilus aten*, Wied, (atratus, *Licht.* - niger, *Siv. nec L.*
fuscus, *Vieill.* - leucopygius, *Spix.* - *Ornismya lugubris*,
Less.) *Zool. Ill. t. 82.* - *Av. Bras. t. 81. 3.* - *Ois-Mouch.*
t. 38. 39. ex *Brasil.*
3. *Trochilus flabelliferus*, Gould. ex *Mexico.*
169. *Hylocharis*, Boie (Les Saphirs, *Less.* - Smaragdites, *Boie*). America m. 11.
 1. *Trochilus sapphirinus*, Gm. (fulvifrons, *Lath?*)
Vieill. Ois. dor. t. 35. 58. - *Less. Ois-Mouch. t. 55. mas.*
56. var. 57. faem. - *Trochilid. t. 15.* - *Nat. Libr. XIV. t. 28.*
ex *Gujana, Cayenna, Brasil. Berbice Ins.*
2. *ORNISMYA lactea*, Less. *Ois-Mouch. t. 106.*
3. *Trochilus grayi*, Delattre, *Rev. Zool.* 1846 ex *Nova*
Granada. Popayan.
4. *Trochilus similis*, Bourc. 1846.
5. *Trochilus viridigaster*, Bourc. *Rev. Zool.* 1843. p. 105.
ex *N. Granada.*
6. *Trochilus mariae*, Bourc. *Ann. Sc. Lyon*, 1843. ex
Venezuela.
7. *Trochilus chrysogaster*, Bourc. *Rev. Zool.* 1843. ex
N. Granada. Carthagena.
9. *Trochilus caroli*, Bourc. *Proc. Zool. Soc.* 1847.
9. *Trochilus versicolor*, Nordm. in Erman, *Verz. von*
Thieren, t. 2. 1. 2. 3.
10. *ORNISMYA prasina*, Less. (*Trochilus viridissimus?*
Lath?) *Ois-mouch. t. 65.* - *Nat. Libr. XIV. t. 8.* ex *Bras.*
11. *Trochilus portmani*, Bourc. *Rev. Zool.* 1843. ex
Columbia.
Quid Trochilus cyanocephalus, Molina. ex Chilli.
- Amer. m. occ. 1.
170. *Doci master*, Gould. (*Mellisuga*, p. *Gr.*)
- TROCHILUS ensiferus*, Boiss. (*derbyanus, Fras.*) *Mag.*
Zoolog. 1841. *Ois. t. 15.* - *Gould, Mon. Trochil. t. 8.*
ex *S. Fe de Bogota, Quito.*
- America m. 5.
171. *Helianthea*, Gould. (*Mellisuga*, p. *Gr.*)
1. *ORNISMYA HELLIANTHEA*, Less. (*HELIANTHEA typica*,
Gould, 1848.) ex *S. Fe de Bogota.*
2. *Trochilus bonapartii*, Bourc. (*aurigaster, Loddig.*)
Ann. Sc. Lyon, 1842. p. 307. t. 14. ex *S. Fe de Bogota.*
3. *Trochilus lutetiae*, Bourc. (*Comte de Paris, Delattre*)
Rev. Zool. 1846. p. 307. ex *Columbia. Popayan.*

4. **TROCHILUS violifer**, Gould, *Pr. Zool. Soc.* 1846. p. 87.
ex Bolivia.

5. **TROCHILUS eos**, Gould, *P. Zool. S.* 1841. p. 11. *Av. t. 2.*
ex Montibus Novaes Granadae et Venezuela.

172. **Patagona**, Gr. (*nunc Hylocharis, p. Gr.*) America m. 1.

TROCHILUS gigas, Vieill. (*Ornismya tristis, Less.* - *gigantea, Orb.*) *Gal. Ois. t. 180.* - *Less. Ois.-Mouch. t. 3.* - *Nat. Libr. xv. t. 3.* *ex Chili.*

173. **Metallura**, Gould. (*Mellisuga, p. Gr.*) America m. 5.

1. **TROCHILUS cupreicaudus**, Gould, *Proc. Zool. Soc.* 1846. *ex Bolivia.*

2. **TROCHILUS aeneicaudus**, Gould, *Proc. Zool. Soc.* 1846. *ex Bolivia.*

3. **TROCHILUS smaragdinicollis**, Orb. *Voy. Am. m. Ois. t. 59. 2.* *ex Brasil.*

4. **TROCHILUS tyrianthinus**, Loddig. (*Ornismya allardi, Bourc.* - *paulinae, Boiss.*) *Ann. Sc. Lyon,* 1840. *t. 3. 4.* *Mag. Zool.* 1840. *t. 13.* *ex S. Fe de Bogota.*

5. **TROCHILUS williami**, Bourc. *Rev. Zool.* 1846. p. 308. *ex Columbia. Popayan.*

*174. **Avocettinus**, Bp. (*Les Avocettes, Less.* - *Campylopterus, p. Sw.* - *Hylocharis, p. Gr.*) America m. 2.

1. **TROCHILUS recurvirostris**, Sw. *Zool. Ill. t. 105.* *Less. Ois.-Mouch. t. 37.* et *Suppl. t. 34.* - *Nat. Libr. xiv. t. 3.* *ex Peru.*

2. **ORNISMYA AVOCETTA**, Less. (*Avocettinus lessoni, Bp.*) *Colibr. Suppl. t. 24.* - *Trochil. t. 23.* - *Nat. Libr. xiv. t. 2.* *ex Cayenna.*

*175. **Chrysuronia**, Bp. (*Les Chrysures, Less.* - *Polytmus, p. Gr.*) America m. 4.

1. **ORNISMYA aenone**, Less. *Ois.-Mouch. Suppl. t. 30.* *ex Ins. Trinitatis.*

2. **ORNISMYA chrysura**, Less. *Ois.-Mouch. Suppl. t. 4.* *ex Brasil.*

3. **TROCHILUS eliciae**, Bourc. *Ann. Sc. Lyon.* 1846. (*Quid Ornismya feliciae, Less?*) *ex Brasil.*

4. **TROCHILUS phaeopygus**, Licht. - *Tschudi, Faun. Peruan.* *ex Peru.*

176. **Heliangelus**, Gould. (Mellisuga, p. Gr.) America m. 6.
1. **TROCHILUS clarisse**, Longuem. Mag. Zool. 1842. Ois.
t. 26. ex Sta Fe de Bogota.
 2. **TROCHILUS spencii**, Bourc. Pr. Zool. Soc. 1847. ex
Merida.
 3. **Heliangelus mavortius**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1848.
Av. t. 2. ex Cordilleris N. Granadas et Ve-
nezuelae.
 4. **ORNISMYA parvudaki**, Less. Rev. Zool. 1840. p. 72. ex
Sta Fe de Bogota.
 5. **TROCHILUS strophianus**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1846.
p. 45. ex Amor. mer. Minor congenorum!
 6. **TROCHILUS amethysticollis**, Orb. Voy. Am.m.t. 60. 2.
177. **Oreotrochilus**, Gould. Nivicolae! Am. m. occ. 6.
1. **TROCHILUS estella**, Orb. (Ornismya ceciliae, Less.)
Voy. Am. m. Ois. t. 6. 1. - Gould, Mon. Troch. t. 2
ex Bolivia.
 2. **Oreotrochilus leucopleurus**, Gould, 1847. Mon.
Troc. l. t. 3. ex Chilens. Cordilleris.
 3. **TROCHILUS chimborazo**, Bourc. (Oreotrochilus chim-
borazo, Gould). Rev. Zool. 1846. p. 305. ex Peru mer.
Lima.
 4. **TROCHILUS pichinchae**, Bourc. (Oreotrochilus jamesoni,
Jard.) Pr. Zool. Soc. 1849. ex Peru sept. Quito.
 5. **ORTORHYNCHUS adela**, Orb. (Oreotrochilus adela, Gould)
Voy. Am.m.Ois.t.61.2.-Mon. Troch.l.t.4. ex Bolivia.
 6. **Oreotrochilus melanogaster**, Gould, Pr.
Zool. Soc. 1847. p. 10. ex Bolivia.
178. **Thalurania**, Gould. (Les Glaucomes, Less. - Smaragdites
et Mellisuga, p. Bois. - Polytmus, p. Gr.) America m. 9.
1. **TROCHILUS furcatus**, Gm. - Pl. enl. 599. 2. - Briss.
Orn. ill. t. 37. 6. - Vieil. Ois. dor. t. 34. - Less. Ois.
Mouch. Suppl. t. 18. - Nat. Libr. XIV. t. 23. ex Brasil.
Guiana. Cayenna. Jamaica?
 2. **TROCHILUS nigrofasciatus**, Gould, Proc. Zool.
Soc. 1846. ex Brasil. Rio Negro.
 3. **Thalurania viridipectus**, Gould, Proc. Zool.
Soc. 1848. p. 13. ex Andes columbianis.
 4. **TROCHILUS watertonii**, Bourc. Pr. Zool. Soc. 1847. ex
Guiana, in rivis Fluminis Essequibo.

5. **TROCHILUS glaukopis**, Gm. (frontalis, Lath. - Cynan-thus glaukopis, Bp. Act. Ital. Mediol. 1844.) Briss.
Orn. III. t. 36. 5. - Less. Ois.-Mouch. t. 58. mas. 59. fem.
ex Brasil.
6. **ORNISHYA wagleri**, Less. (Trochilus sapphirinus ? Vieill.) Ois.-Mouch. t. 73. - Ois. dor. t. 57. - Nat. Libr. xv. t. 16. *ex Brasil.*
7. **ORNISHYA eriphile**, Less. Ois.-Mouch. Suppl. t. 25.
ex Brasil.
8. **TROCHILUS cyanifrons**, Bourc. (otero? Tschudi). Rev. Zool. 1843. *ex Peru.*
9. **TROCHILUS schrebersi**, Loddiges, Proc. Zool. Soc. 1847. p. 43. *ex Brasil. Rio Negro.*
- *179. **Saucerottia**, Bp. (Polytmus, p. Gr.) America m. 6.
1. **TROCHILUS saucerottii**, Bourc. (**Saucerottia ty-pica**, Bp.) Rev. Zool. 1846. p. 311. *ex N. Granata.*
 2. **ORNISHYA erythronota**, Less. Ois.-Mouch. t. 61.
ex Mexico.
 3. **TROCHILUS cyanogenys**, Wied. (viridissimus, var. β Lath. - Ornismya wiedi, Less. Ois.-Mouch. Suppl. t. 26.
ex Brasil.
 4. **TROCHILUS atala**, Less. Trochil. t. 42. *ex Brasil.*
 5. **TROCHILUS caligatus**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1848. p. 14.
ex N. Granada.
 6. **TROCHILUS goudoti**, Bourc. Rev. Zool. 1843. p. 100. *ex N. Granada.*
Quid Trochilus minullus, Vieill. Enc. meth. p. 574?
- *180. **Amazilius**, Bp. (Polytmus, p. Gr.) America m. 13.
1. **ORNISHYA amazili**, Less. (*latirostris*, Sw.) Voy. Cog. t. 31. 1. - Ois.-Mouch. t. 12. 13. *ex Peru.*
 2. **ORNISHYA arsinoe**, Less. Ois.-Mouch. Suppl. t. 28. 29.
ex Mexico.
 3. **ORNISHYA dumerili**, Less. Ois.-Mouch. Suppl. t. 36.
 4. **TROCHILUS viridissimus**, Gm? (viridicaudus, Saucer. Ornismya viridis, Less.) Trochil. t. 33. *ex Brasil?*
 5. **TROCHILUS corallirostris**, B. Ann. Sc. Lyon, 1846.
ex Guatimala.
 - *6. **TROCHILUS erythrorhynchus**, Bp. Mus. Bonap.
 - *7. **TROCHILUS haematorhynchus**, Bp. Mus. Bonap.
 8. **TROCHILUS norrissii**, Bourc. Pr. Zool. Soc. 1847. p. 47.
ex Peru. Guayaquil.

9. **TROCHILUS flarescens**, Loddig. (*Ornismya paradisea*,
Boiss. 1840.) *Pr. Zool. Soc.* 1832. *Species abnormis!*

10. **TROCHILUS riefferi**, Bourc. *Rev. Zool.* 1843. p. 103. *ex
N. Grana da.*

11. **TROCHILUS aglaiae**, Bourc. *Ann. Sc. Lyon*, 1846. *Pa-
tria ignota.*

12. **TROCHILUS sophiae**, Bourc. *Ann. Sc. Lyon*, 1846. *ex
S. Fe de Bogota.*

13. **TROCHILUS edward**, Delattre, *Rev. Zool.* 1846. p. 308.
ex Isthm. Panama.

*181. **Thaumatis**, Bp. *ex L.* (*Les Emeraudes*, Less. - *Basi-
linna*, p. *Boie*. - *Polytmus*, p. *Br. Gr.*) America m. 14.

1. **TROCHILUS THAUMATIAS**, L. (*Ornismya albiventris*, Less.)
Pl. enl. 600. 1. - *Ois.-Mouch.* t. 76. - *Trochil.* t. 32.
ex Guiana.

2. **TROCHILUS brevirostris**, Less. *Ois.-Mouch.* t. 77.
ex Guiana.

3. **TROCHILUS candidus**, Bourc. *Ann. Sc. Lyon*, 1846.
ex Coban.

4. **TROCHILUS milleri**, Lodd. *Proc. Zool. Soc.* 1847. p. 43.
ex Brasil. Rio Negro.

5. **TROCHILUS mellisugus**, L. (*leucogaster*, Gm. - *Mellisuga
concinna*, Steph. - *Ornismya albirostris*, Less.) *Br.
Orn.* ill. t. 41. 2. - *Pl. enl.* 273. 3. et 672. 3. - *Ois.
dor.* t. 39. et 43. *ex Guiana.*

6. **TROCHILUS leucogaster**, Tschudi, *Faun. Peruan.* fig.
nulla. *ex Bolivia.*

7. **TROCHILUS albicollis**, Vieill. (*Colibri albicularis*, Spix)
Av. Bras. t. 82. 1. - *Pl. col.* 203. 2. - *Ois.-Mouch.* t. 63.
ex Brasil.

8. **TROCHILUS leucotis**, Vieill. (*leucocrotaphus*, Shaw.
melanotis, Siv. - *Ornismya arsenii*, Less.) *Ois.-Mouch.*
t. 9. - *Suppl.* t. 27. - *Nat. Libr.* xiv. t. 29. *ex Brasil.*

9. **ORNISMYA caniceti**, Less. *Ois.-Mouch.* *Suppl.* t. 37. 38.
ex Brasil.

10. **TROCHILUS cyaneus**, Vieill. - Less. *Ois.-Mouch.* t. 71.
Suppl. t. 23. - *Nat. Libr.* xiv. t. 7. *ex Brasil.*

11. **TROCHILUS doubledayi**, Bourc. *Pr. Zool. Soc.* 1847.
ex Brasil. Rio Negro.

12. **TROCHILUS caeruleus**, Vieill. (*Ornismya audeberti*,
Less.) *Ois. dor.* t. 40. - *Ois.-Mouch.* t. 51 - *Ann. Sc.
Lyon*, 1842. *cum fig.* *ex Guiana.*

13. **TROCHILUS bicolor**, Guy. (smaragdo-sapphirinus et lucidus, Shaw - azureus, Licht. - splendidus? Vieill.)
Ois. dorés, t. 36. - *Less. Ois.* - *Mouch. t. 49. 50.* - *Trochil. t. 16.* ex *Gujana. Antillæ?*

14? **TROCHILUS ourissia**, L. (maugeus, Vieill. - tabaci?
Gm. - *tabagensis?* Lath. - *Ornismya maugei*, Less.)
Pl. enl. 227. 3. - *Edw. B. t. 35. 2.* - *Ois. dor. t. 37. 38.*
Ois. Mouch. t. 68. 69. ex *Ins. Porto Rico.*
Quid Trochil. guimeti ex Venezuela, et Tr. juliae, ex Columbia, Bourcieri?
Quid Ornismya lessoni, Delattre?
Quid Trochilus azarae, Vieill?
Quid Trochilus fuscicauda, Fraser, ex Peru?
Trochilus angustipennis, Fraser, non est species, sed saemina.

*182. **Ramphomicron**, Bp. (Mellisuga p. Gr.) Amer. m. 7.

1. **ORNISMYA microrhyncha**, Boiss. (brachyrhynchus,
Fraser) Mag. Zool. 1840. *Ois. t. 16.* ex *S. t. a Fe de Bogota.*

2. **ORNISMYA heteropagon**, Boiss. (corrucus, *Fraser*)
Rev. Zool. 1839. - *Mag. Zool. 1840.* *Ois. t. 12.* ex *S. t. a Fe de Bogota.*

3. **TROCHILUS ruficeps**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1846. ex
Bolivia.

4. **TROCHILUS abeillii**, Delattre. Rev. Zool. 1839. p. 16.
ex Jalapa. Ramphomicron aberrans, forsitan genus constitutum. Abeillia typicalis! Bp.

5. **TROCHILUS sabinae**, Bourc. Ann. Sc. Lyon 1846. ex
N. Granada.

6. **TROCHILUS inornatus**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1846. p. 89.
ex Bolivia.

7. **TROCHILUS melanogenys**, Fraser, Pr. Zool. Soc.
1840. p. 18. *Species 5, 6, 7, bona, sed valde abnormes!*

183. **Oxypogon**, Gould (Mellisuga, p. Gr.) America m. 2.

1. **ORNISMYA guerini**, Boiss. (parvirostris, *Fraser* jun.
Oxypogon guerini, Gould) Monogr. *Trochil. t. 11.*
ex S. t. a Fe de Bogota.

2. **ORNISMYA lindeni**, Parzudaky, (*Oxypogon lindenii*,
Gould) Monogr. *Trochil. t. 12.* ex *Venezuela.*
Merida.

- *184. **Loddigesia**, Gould, 1850. (*Mellisuga*, p. *Gr.*) America m. 1.
Trochilus mirabilis, Loddig. *Pr. Zool. Soc.* 1847. - *Gr.*
et Mitch. Gen. B. t. 37. ex Peru, Chachapoyas.
185. **Spathura**, Gould (Platurus, p. *Less. nec Auct.* - *Ocreatus*, p. *Gould* - *Mellisuga*, p. *Gr.*) Amer. m. 3.
1. **ORNISMYA underwoodii**, Less. (*ventilabrum*, *Lath.*)
Trochil. t. 37. - Nat. Libr. xv. t. 22. - Gould, Mon.
Troch. t. 1. t. 9. ex S.t.a Fe de Bogota et Caracas.
2. **Spathura peruviana**, Gould, 1849. - *Monogr. Tro-*
chil. t. 10. ex Peru.
3. **TROCHILUS addae**, Bourc. (*Ocreatus rufocalligatus*, *Gould*,
1846) *Monogr. Troch. t. 11. ex Montuosis La Paz.*
Bolivia.
186. **Eriopis**, Gould (Vestipedes, p. *Less.* - *Hylocharis et Mel-*
lisuga, p. *Gr.*) America m. 9.
1. **ORNISMYA vestita**, Longuem. (*glomata*, *Less. juv.* - *Tro-*
chilus uropygialis, *Fraser*). *Rev. Zool.* 1838. p. 314.
ex S.t.a Fe de Bogota.
2. **TROCHILUS exortis**, Fraser, (*Cynanthus exortis*, *Bp.*)
Act. Ital. Congr. Mediolanens. 1844. ex S.t.a Fe de
Bogota. Viridi-aureus, mento late atro-virens; gula vi-
ridis amethystina: crissis albo: alis caudaque fuscis: rectrici-
bus apice dilatatis, acutis. Rostrum breve, rectum: pedes
fusco-vestiti.
3. **TROCHILUS cupreiventris**, Fraser, 1840. (*vestita faem.*
Longuem. - *Ornismya maniculata*, *Less.*) *Rev. Zool.*
1838. p. 314. *ex S.t.a Fe de Bogota.*
4. **TROCHILUS luciani**, Bourc. *Ann. Sc. Lyon* 1847. p. 624.
5. **TROCHILUS mosquera**, Bourc. *Rev. Zool.* 1846. p. 306.
ex N. Granada.
6. **TROCHILUS aline**, Bourc. *Rev. Zool.* 1842. p. 373. - *Ann.*
Sc. Lyon, 1842. p. 344. t. 19. *ex Columbia.*
7. **TROCHILUS derbyi**, Bourc. *Rev. Zool.* 1846. p. 306. *ex*
N. Granada. Popayan.
8? **TROCHILUS aureliae**, Bourc. *Ann. Sc. Lyon*, 1846.
p. 315. cum fig. ex Bogota.
9? **ORNISMYA isaacseni**, Parduzaki, *Rev. Zool.* 1845. p. 95.
ex S.t.a Fe de Bogota.
Quid Throchilus d'Orbignyi, Bourc. Ann. Sc. Lyon, 1846. p. 320?

187. **Cynanthus**, Sw. p. (Lesbia, Less. - Mellisuga, p. Boie, Gr.) America m. 6.

1. **TROCHILUS *forficatus***, L. (bipartitus, Lath. - cyanurus, Steph. - Ornismya kingi, Less.) Edw. B. t. 33 - Vieill. Ois. dor. t. 60. - Less. Troch. t. 38. ex Chili, nec Jamaica.
2. **Cynanthus *bifurcatus***, Sw. (Ornismya nuna, Less.) Ois.-Mouch. Suppl. t. 35. ex Peru.
3. **TROCHILUS *mocoia***, Bourcier. (smaragdicaudus, Gould) Pr. Zool. Soc. 1846. ex Bolivia.
4. **TROCHILUS *gouldii***, Loddiges 1832. nec Less. (Ornismya sylphia, Less.) Rev. Zool. 1840. ex S. de Bogota.
5. **TROCHILUS *gracilis***, Gould, Proc. Zool. Soc. 1846. p. 36. ex Peru.
6. **TROCHILUS *victoriae***, Bourc. Rev. Zool. 1846. p. 315. t. 4. ex N. Granada.

188. **Cometes**, Gould. nec Hodges. (Mellisuga, p. Gr.) America m. 2.

1. **TROCHILUS *sparganurus***, Shaw. (chrysurus, Cuv. radiosus, Temm. - Ornismya sapho, Less.) Gen. Zool. t. 39.* - Less. Ois.-Mouch. t. 27. 28. - Trochil. t. 49. Nat. Libr. xv. t. 23. ex Bolivia.
2. **Cometes *phaeon***, Gould, Proc. 1847. ex Peru.

189. **Trochilus**, L. p. (Cynanthus, p. Sw. - Mellivora, p. Gr.) Am. etiam bor. 2.

1. **Trochilus *columbris***, L. - Edw. B. t. 38. - Vieill. Ois. dor. t. 31. 32. 33. - Wils. Am. Orn. t. 20. 3. 4. Aud. Am. t. 47. - Less. Ois.-Mouch. t. 48. 48.* Trochil. t. 1. - Nat. Libr. xiv. t. 15. - Sagra, Voy. Cuba, t. 21. 1. ex Amer. bor. a Florida ad Canad. 2. **Trochilus *ricordi***, Gerv. (parzudaki alter, Less. Ortorhynchus ricordi, Sagra) Mag. Zool. 1835. - Ois. t. 41. 42. - Voy. Cuba, t. 21. 2. ex Insula Cubae.

190. **Ornismya**, Less. p. (Hylocharis, p. Gr.) Amer. trop. 1.

1. **TROCHILUS *niger***, L. (vieilloti, Shaw. - humilis, Gosse. Ornismya minima, Less.) Briss. Orn. iii. t. 36. 8. Vieill. Ois. dor. t. 53. - Less. Ois.-Mouch. t. 79. ex Ins. S. t. Dominic.

191. **Mellisuga**, Br. p. Antill. 1.

- TROCHILUS *minimus*, Sw. ex L. (Least Humming Bird, Sloane, Jamaica, t. 264, l.) Pl. ent. 276. i? - Edw. B. t. 105? Briss. Orn. iii. t. 36. 1. ex Antill.

192. **Selosphorus**, Sw. (Calliphlox, Boie. - Les Rubis, Less.)

Mellisuga, p. Gr.)

Am. occ. etiam b. 4.

1. **TROCHILUS rufus**, L. (rufus, Gm. - collaris, Lath. - sitkensis, Rathke. - Ornismya sasin, Less.) Edie. B. t. 32. Lath. Syn. t. 35. - Vieill. Ois. dor. t. 61. 62. - Less. Ois.-Mouch. t. 66. 67. - Suppl. t. 11. 12. 13. - Trochil. t. 43. - Nat. Libr. xiv. t. 11. - Aud. Am. t. 379. Brandt, Icon. Av. Ross. tab. 1. 2. ex California et Amer. occ. etiam max. hor. Rossica!
2. **TROCHILUS anna**, Less. (icterocephalus, Natt.) Ois.-Mouch. t. 74. - Aud. Am. t. 425. - Nat. Libr. xiv. t. 6. ex California.
3. **TROCHILUS platycercus**, Sw. (Ornismya tricolor et montana, Less.) Ois.-Mouch. Suppl. t. 14. - Trochil. t. 60. 53. et 54. "cauda cuneata ob pennarum mutationem!" Nat. Libr. xv. t. 13. ex Mexico. Brasil.
4. **TROCHILUS costae**, Bourc. Rev. Zool. 1839. - Ann. Sc. Phys. Lyon, 1840. t. 2. - Voy. Fenus, t. 2. ex Calif.

193. **Stephanoides**, Less. (Mellisuga, p. Gr.)

America m. 3.

1. **TROCHILUS galerita**, Molina. (flammeifrons, Lyell. - Orthonychus kingi, Vig. - sephanooides, Less.) Voy. Cog. Ois. t. 31. 2. - Ois.-Mouch. t. 14. - Suppl. t. 5. - Nat. Libr. xiv. t. 12. ex Chili.
2. **TROCHILUS stokesi**, King, Pr. Zool. Soc. 1831. - Less. Troch. t. 50. - Nat. Libr. xv. t. 5. ex Ins. Juan Fernandez.
3. **TROCHILUS fernandensis**, King. (Ornismya cinnamomea, Gerv. - robinson, Less.) Pr. Zool. Soc. 1831. Mag. Zool. 1835. Ois. t. 43. ex Ins. Juan Fernandez.

194. **Chrysolampis**, Boie. (Les Topazes, p. Less. - Mellisuga, p. Gr.)

America m. 1.

- TROCHILUS moschatus**, pegasus et elatus, L. (guianensis et carbunculus, Gm.) Pl. enl. 237. 2. et 640. 1. - Briss. Orn. t. 37. 1. - Vieill. Ois. dor. t. 29. 30. 54. 55. 56. Sw. B. Bras. t. 30. - Less. Ois.-Mouch. t. 52. 53. Nat. Libr. xv. t. 11. ex Guiana? Antillia?

195. **Orthorhynchus**, Cuv. p. (Les Huppés, Less. - Mellisuga, p. Gr.) Amer. m. or. 3.

1. **TROCHILUS cristatus**, L. (puniceus? Gm. - pileatus, Lath. - Ornismya cristata major, Less.) *Pl. enl.* 227. 1. *Educ. B.* t. 37. - *Briss. Orn. III. t. 37.* 2. - *Vieill. Ois. dor.* t. 47. 48. 63? artefact. - *Sic. Bras.* t. 21. - *Less. Trochil. t. 4 ex Ins. Martinica et S. Trinitat.* Major: crista aureo-viridi, apice cyanea.
2. **Orthorhynchus chlorolophus**, Bp. (Ornismya cristata minor, Less.) *Ois.-Mouch. t. 31.* 32. *ex An-tillia minor. Martinica. Minor: crista ex toto viridi-aura.*
Quid Trochilus exilis, Gm. (cristatellus? Lath.) ex Guiana, Crista viridi, apice auræ?
3. **TROCHILUS melanolophus**, Vieill. *Enc. Meth.* p. 574.

196. **Cephalopepis**, Loddiges. (Orthorhynchus, p. Cuv. - Mel-lisuga, p. Gr.) America m. 2.

1. **TROCHILUS talandii** et versicolor, Vieillot (Mellisuga delalandei, Steph.) *Pl. col.* 18. 1. 2. - *Less. Ois.-Mouch. t. 23.* 24. - *Sic. B. Bras.* t. 22. - *Nat. Libr.* xiv. t. 10. mas. xv. t. 7. faem. *ex Brasilia. Rio grande.*
2. **TROCHILUS loddigesii**, Gould. (opisthoecomus, Licht.) *Proc. Zool. Soc.* 1830. - *Less. Trochil. t. 51.* - *Erman, Verz. v. Thier. t. 2.* 3. - *Nat. Libr.* xv. t. 6. *ex Bras.*

197. **Lophornis**, Less. (Bellatrix, Boie. - Selosphorus, p. Sic. Colibri, p. Spix. - Mellisuga, p. Gr.) America m. 9.

1. **TROCHILUS auratus**, Gm. (ornatus, Bodda.) *Pl. col.* 640. 3. *Vieill. Ois. dor.* t. 49. 50. 51. - *Less. Ois.-Mouch. t. 41.* - *Trochil. t. 24.* - *Nat. Libr.* xiv. t. 15. mas. 16. faem. *ex Guiana. Cayenne. Brasil.*
2. **TROCHILUS magnificus**, Vieill. (decorus, Licht. - Ornismya strumaria, Less. - Colibri helias, Spix.) *Av. Br. t. 82.* 2. - *Pl. col.* 299. 2. - *Ois.-Mouch. t. 42.* 43. *Nat. Libr.* xiv. t. 19. mas. juv. 20. faem. *ex Brasil.*
3. **Lophornis delattrii**, Less. *Rev. Zool.* 1839 p. 19. *ex Columbia.*
4. **ORNISMYA helenae**, Delattre, *Rev. Zool.* 1843. p. 133. *ex Guatemala. Vera pax.*
5. **Lophornis gouldi**, Less. *Troch. t. 36.* - *Nat. Libr.* xiv. t. 12. *Patria ignota.*

6. **Lophornis audeni**, Less. (Colibri mystax, Spix.)
*Ois.-Mouch. Suppl. t. 2. - Av. Bras. t. 82. 3. - Nat.
 Libr. xiv. t. 17. ex Peru.*
7. **Lophornis regulus**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1846.
*p. 89. ex Bras. occ. Quamquam minimo maxima omnium
 corona caput premit!*
8. **Lophornis reginae**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1847.
p. 95. Cristas plumis latoribus! quam in praecedenti.
9. **Trochilus chalybeus**, Vieill. (festivus, Licht. - Ornisa-
 mya vicilloti, Less.) *Ois.-Mouch. t. 64. - Trochil. t. 8.
 9. 10. 11. - Nat. Libr. xiv. t. 18. ex Brasil.*
- * 198. **Discosura**, Bp. (Platurus, p. Less. - Mellisuga, p. Gr.) America m. 2.
 1. **Trochilus longicaudus**, Gm. (platurus, Lath.) Vieill.
Ois. dor. t. 60. - Less. Ois.-Mouch. t. 40. ex Guiana.
2. **Trochilus ligonicaudus**, Gould, (Ocreatus! ligoni-
 caudus, Gould.) Proc. Zool. Soc. 1846. ex Brasil.
199. **Tryphaena**, Gould. (Mellisuga, p. Gr.) America m. 3.
 1. **Ornismya duponti**, zemes et caelestis, Less. Colibr.
*Suppl. t. 1. - Nat. Libr. xiv. t. 26. - Gould, Mon. Tr. t. 14.
 ex Mexico. Guatemala.*
2. **Trochilus amethystinus**, Gm. - Pl. enl. 672. 1.
*Less. Ois.-Mouch. t. 47. - Suppl. t. 20. 21. 22. - Tro-
 chil. t. 52. - Nat. Libr. xv. t. 9. ex Guiana Bra-
 sil. sept.*
3. **Ornismya amethystoides**, Less. Troch. t. 25. 26.
*27. 30. ex Brasil. An var. praecedentis?
 Quid Ornismya orthura, Less. Troch. t. 28. 29. - Nat. Libr. xv.
 t. 8. ex Cayenne?*
200. **Augastes**, Gould. (Hylocharis, p. Gr.) America m. 2.
 1. **Trochilus superbus**, Vieill. nec Temm. (scutatus, Temm.
*Ornismya nattereri, Less. - Augastes scutatus, Gould.
 Augastes superbus, Bp.) Pl. col. 299. 3. - Ois.-Mouch.
 t. 16. - Nat. Libr. xiv. t. 14. - Gould, Mon. Tr. t. 15.
 ex Brasil.*
2. **Trochilus lumachellus**, Less. (Augastes lumachel-
 lis, Gould, 1849.) Rev. Zool. 1838 et 1846. ex Brasil.
Bahia.

201. **Calothorax**, Gr. (Les Lucifer, Less.) America m. 7.

1. **TROCHILUS lucifer**, Sw. (Ornismya cyanopogon, Less.)
Ois.-Mouch. t. 5. - Colibr. Suppl. t. 9. 10. - Nat.

Libr. xv. t. 14. ex Mexico.

2. **TROCHILUS calliope**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1847.
p. 11. ex Mexico.

3. **TROCHILUS herrani**, Delattre, Rev. Zool. 1846. p. 309.
ex Nova Granada.

4. **TROCHILUS mulsanti**, Bourc. Ann. Sc. Lyon, 1842. t. 20.
ex S.ta Fe de Bogota.

5. **TROCHILUS heliodori**, Bourc. Ann. Sc. Lyon, 1842.
t. 15. 16. ex S.ta Fe de Bogota.

6. **TROCHILUS jourdani**, et rosae, Bourc. Ann. Sc. Lyon,
 1840. t. 5. 6. et 1846. *ex Caracas.*

7. **TROCHILUS enicurus**, Vieill. (Ornismya heteropygia mas.
 et swainsoni, Less. faem.) Pl. col. 66. 3. - *Ois.-Mouch.*
t. 15. - Trochil. t. 66. faem. - Nat. Libr. xiv. t. 27. ex
Insula. S. Trinit? Brasil. Abnormis ob caudam
singularem! an hujus generis? forsitan Gouldii, minime Thry-
phaenis adjungenda.

Quid Ornismya elisa, Lesson, 1839?

Quid Trochilus yarelli et Tr. evelinae, Bourc. 1847?

202. **Mellactin**, Boie. (Les Queue étroites, Less. - Cynanthus,
 p. Sic.) America m. 1.

TROCHILUS cornutus, Wied. (dilophus, Vieill. - bilo-
 phus, Temm. - Ornismya chrysolopha, Less.) Pl. col.
 18. 3. - *Less. Ois.-Mouch. t. 7. 8. - Suppl. t. 32. - Nat.*
Libr. xiv. t. 21. mas. 22. faem. ex Brasil.

*203. **Thaumastura**; Bp. (Calothorax et Mellisuga, p. Gr.) Amer. trop. 3.

1. **TROCHILUS cora**, Less. et Garn. Voy. Coq. Ois. t. 13. 4.
Ois.-Mouch. t. 6. - Trochil. t. 39. 40. - Nat. Libr. xiv.
t. 25. ex Peru. Cauda speciosa!

2. **ORNISMYA vesper**, Less. Ois.-Mouch. t. 19. - *Trochil.*
t. 9. 48. - Nat. Libr. xiv. t. 24. ex Chilli.

3. **ORNISMYA fanny**, Less. (Trochilus labrador, Bourc.)
Ann. Sc. Lyon. 1838. cum fig. ex N. Granada. Peru.
Species 2. et 3. typicae, quamvis cauda simplici!

*204. **Gouldia**, Bp. (Mellisuga, p. Gr.) America m. 3.

1. **TROCHILUS tangsdorffii**, Vieill. (Colubri hirundinaceus, Spix.) Av. Bras. t. 8. 2. - Pl. col. 66. 1. - Less. Ois.-Mouch. t. 26. adult. - Suppl. t. 16. juv. - Trochil. t. 35. 60. - Nat. Libr. xv. t. 10. ex Brasil.
2. **TROCHILUS popelairi**, Dubus, Esq. Orn. t. 6. ex Columb.
3. **TROCHILUS conversi**, Bourc. Rev. Zool. 1840. t. 3. ex S.ta Fe de Bogota.

FAMILIA 12. PHYTOTOMIDAE.

SUBFAM. 29. PHYTOTOMINAE.

205. **Phytotoma**, Molina. America m. 3.

1. **Phytotoma rara**, Molina (silens, Kittl. - bloxami, Childr. - molina, Less.) Hist. Nat. Chili, t. 1. - Griff. Anim. Kingd. fig. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 4. - Mag. Zool. 1844. Ois. t. 5. ex Chili.
- 2? **Phytotoma angustirostris**, Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 29. 2. ex Amer. mer.
- 3? **Phytotoma rutila**, Vieill. - Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 29. 1. ex Amer. mer.

FAMILIA 13. COLIIDAE.

SUBFAM. 30. COLIINAE.

206. **Colius**, Briss. Africa. 6.

1. **LOXIA COLIUS**, L. (**Colius capensis** erythropus, Gm. leuconotus, Lath. - erythropygius, Vieill.) Pl. enl. 282. 1. Syn. t. 41. - Levaill. Afr. t. 257. ex Africa mer.
2. **Colius senegalensis**, Gm. (macrourus! Gr. ex L') Vieill. Gal. t. 51. ex Africa occid.
3. **Colius indicus**, Lath. (erythromelon, Vieill. - carunculatus, Steph. - quiriva, Less. - coromandeliensis, Licht.) Levaill. Afr. t. 258.
4. **Colius striatus** et panayensis! Gm. (Tanagra macroura, Scopoli) Sonn. Voy. t. 74. - Lev. Afr. t. 256. ex Africa mer.
5. **Colius nigricollis**, Vieill. (gularis, Cuv. - atrigularis, Steph.) Lev. Afr. t. 259.
6. **Colius leucotis**, Rüpp. Mus. Senckenb. ill. t. 2. 1. ex Abyssinia.

FAMILIA 14. MUSOPHAGIDAE.

SUBFAM. 31. MUSOPHAGINAE.

207. **Musophaga**, Isert. (*Phimus, Wagl.*) Africa. 1.
Musophaga violacea, Isert. (*Cuculus regius, Shaw.*
Phimus violaceus, Wagl.) Lever. *Mus. t. p. 167.*
Levaill. Touracos, t. 18. - *Sv. B. west Afr. t. 19.*
ex Africa occ.
208. **Turacæ**, Cuv. (*Corythaix, Ill.* - *Opaethus, Vieill.* - *Spelectis, Wagl.* - *Gallirex, Less.*) Africa. 7.
1. **CUCULUS persa**, L. (*Corythaix purpureus? Cuv.* - *C. buffoni, Jard.* - *Opaethus africanus, Shaw.* - *O. buffoni, Vieill.* - *senegalensis, Sw.* - *Spelectos persa, Wagl.*) *Edw. B. t. 7.* - *Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 122.* - *B. of west Afr. t. 21.* *ex Africa occid.* *Crista tota viridi, semicirculari, parce compressa.*
2. **OPAETHUS PERSA**, Vieill. (*Corythaix persa, Less.* - *Spelectos corythaix, Wagl.* - **TURACUS albocristatus**, Strickl.) *Pl. enl. 601.* *ex Africa mer.* *Crista compressissima, albo terminata.*
3. **CORYTHAIX macrorhyncha**, Fraser, *Proc. Zool. Soc. 1839. p. 34.* *Similis praeed. sed minor: rostro robustiore haud serrato, rubro flavoque: crista fasciola subterminali alba, apice ipso nigro-purpurea.*
4. **CORYTHAIX leucotis**, Rüpp. *Zool. Atl. t. 3.* *ex Abyssinia.* *Macula anteculari alba.*
5. **OPAETHUS erythrolophos**, Vieill. (*Musophaga pauina, Temm.* - *Spelectos erythrolophos, Wagl.* - *Corythaix igniceps, Less.*) *Gal. Ois. t. 49.* - *Pl. col. 23.* *ex Africa mer.* *Crista compressa, rubra.*
6. **MUSOPHAGA gigantea** et **cristata**, Vieill. (*Corythaix gigas, Steph.* - *Chizaerhis! gigantea, Wagl.* - *Crax cyaneus, Griff.*) *An. Kingd. Birds. III. cum figura.* *Levaill. Tourac. t. 19.* *ex Africa occ. nec mer.* *Maximus: crista plicatili, nigra, caeruleo terminata.*
7. **MUSOPHAGA porphyreolopha**, Vig. (*Corythaix burcellii, Smith.* - *Gallirex anais, Less.*) *Zool. Ill. S. Afr. t. 35.* - *Jard. et Selb. Ill. Orn. n. s. t. 46.* *ex Afr. occ. et merid.* *Minor: crista caerulea.*

209. **Schizchoris**, Wagl. (Chizaerhis, Wagl. 1827. - Corythaixoides hinc Coliphimus, Smith). Africa. 5.
1. **PHASIANUS africanus**, Lath. (Musophaga variegata, Vieill. - senegalensis, Licht. - Chizaerhis variegata, Wagl.) Lev. Tourac. t. 20. - Gal. Ois. t. 48. - Sw. B. west. Afr. t. 20. ex Africa occ. Crista fusca albo striolata, e plumis longis, strictis, acutis.
 2. **CHIZAERHIS zonurus**, Rüpp. Faun. Abyss. t. 4. ex Afr. orient. Electricibus lateralibus utrinque quatuor fascia lata alba.
 3. **CHIZAERHIS personata**, Rüpp. Pr. Zool. Soc. 1842. 8. Tr. Zool. II, p. 233. t. 16. ex Abyssinia. Fascia, guaque denudatis cristae cinereo-murina.
 4. **CHIZAERHIS leucogastra**, Rüpp. Pr. Zool. Soc. 1842. 9. Tr. Zool. II, p. 234. t. 17. ex Abyssinia. Crista brunnea e plumis truncatis!
 5. **CORYTHAIXOIDES concolor**, Smith. (Chizaerhis feliciae, Less.) Report of S. Afr. Exp. Append.

FAMILIA 15. UPUPIDAE.

SUBFAM. 32. UPUPINAE.

210. **Upupa**, L. Eur. As. Afr. 3.
1. **Upupa epops**, L. (vulgaris, Pall. - senegalensis? Sw. macrorhyncha, Sand.) Pl. enl. 52. - Edw. B. t. 345. Levail. Promer. t. 22. - Gould, Eur. t. 238. ex Eur. Asia, Africa, orient. Crista disticha, fascia apicali nigra albo-marginata: alis caudaque fasciatis.
 2. **Upupa minor**, Gm. (africana, Bechst. - capensis, Sw. nec Auct. - cristatella, Vieill.) Gal. Ois. t. 184. Jard. Ill. Orn. t. 142. ex Africa merid. et occ. Crista disticha, fascia apicali nigra albo substituta: coda fasciata.
 3. **Upupa monolophos**, Wagl. - Levaill. Promer. t. 9. ex Africa mer. Crista simplici: alis caudaque absque fasciis.
211. **Fregillupus**, Less. (Upupa, p. Gr.) Africa. 1.
- Upupa capensis**, Gm. (madagascariensis, Shaw. - varia, Bodd. - Pastor! capensis, Temm. - P. upupa, Wagl. Coracia cristata, Vieill.) Pl. enl. 697. - Lev. Promer. t. 18. - Vieill, Ois. dor. t. 3. ex Afr. mer. et orient.

FAMILIA 16. BUCEROTIDAE.

SUBFAM. 33. BUCEROTINAE.

212. **Bucorvus**, Bp. ex Less. (*Bucorvus et Buceros, p. Gr.*) Africa. 6.
 1. **BUCEROS abyssinicus**, Gm. (*carunculatus, Wagl. brac, Dumont. - leadbeateri, Vig.*) Pl. enl. 779. - Lev. Afr. t. 230. 231. 232. ex Africa orient.
 2. **BUCEROS elatus**, Temm. Pl. col. 521. 1. ex Afr. occ.
 3. **BUCEROS atratus**, Temm. (*ruficristatus, Temm. Mus. Lugd. faem.*) Pl. col. 558. ex Afr. occ.
 4. **BUCEROS cristatus**, Rüpp. Faun. Abyssin. t. 1. ex Africa orient.
 5. **BUCEROS buccinator**, Temm. Pl. col. 284. ex Afr. m.
 6. **BUCEROS cylindricus**, Temm. Pl. col. 521. ex Afr. occ.
- * 213. **Buceroturus**, Bp. (*Buceros, p. Gr.*) Malaiasia. 1.
 BUCEROS *galeatus*, Gm. (*scutatus, Gr. ex Bodd.*) Pl. enl. 933. Edw. B. t. 281. c. - Linn. Trans. xiv. t. 23. - Mag. Zool. 1835. Ois. t. 38. ex Sumatra, Borneo, Malacca.
214. **Buceros**, L. (*Caryocatactes et Tragopan, Moehr. - Hydrocorax, Briss.*) Asia m. Oc. 6.
 1. **Buceros hydrocorax**, L. (*planicornis, Merr. - platyrhynchus, Pears.*) Pl. col. 283. - Lev. Ois. Am. et Ind. t. 6. - Id. Afr. t. 240. ex Philippinis Insulis. *Cornu lato, plano!*
 2. **Buceros bicornis**, L. (*cristatus, Vieill. - cavatus?* Shaw. - homrai, Hodg.) As. Res. 1833. fig. p. 169. Gould, Cent. Himal. B. fig. optima. ex Asia contin. Sumatra. *Cornu profunde excavato!*
 3. **Buceros rhinoceros**, L. (*africanus! Gm. jun. - diadematus, Dumont - rhinoceros var. sumatrana, Müll. et Schleg.*) Pl. enl. 934. - Lev. Ois. Am. et Ind. t. 2. Marsd. Hist. Sumatr. t. 21. ex Sumatra. Major: *cornu valde recurvo: fascia caudali latitudinis mediae.*
 4. **Buceros rhinoceroides**, Temm. Mus. Lugd. (*rhinoceros var. bornensis, Müll. et Schleg.*) Fig. nulla. ex Borneo. Similis praecedenti, sed minor.

5. *Buceros subtilis*, Temm. Mus. Lugd. (thinceros var. indica, Müll. et Schleg.) *Figura nulla*. ex India merid. Minor (statura praecedentis): cornu minus recurvum; fascia caudali angusta.

6. *Buceros lunatus*, Temm. (sylvestris, Less. an Vieill.) rhinoceros var. javana, Müll. et Schleg. Pl. col. 546. ex Java. Major: cornu recto; fascia caudali latissima.

*215. *Hydrocissa*, Bp. (Buceros, p. Gr.) As. m. Oe. 6.

1. *BUCEROS monoceros*, Shaw (coronatus, Bodda.) Pl. enl. 873. - Lev. Ois. Amer. et Ind. t. 9. 10. 11. 12. ex Sumatra, Malacca, Deccan.

2. *BUCEROS pica*, Scopoli (malabaricus, Gm. - albirostris, Shaw - leucogaster, Blyth. - bicolor, Eyton - convexus, Temm.) Sonn. Voy. Ind. t. 121. - Edic. B. t. 281. d. Lev. Ois. Afr. et Ind. t. 14. - Pl. col. 501. ex Asia merid. Malaisia.

3. *BUCEROS galeritus*, Temm. Pl. col. 520. mas. juv. ex Sumatra, Borneo.

4. *BUCEROS violaceus*, Shaw, Lev. Am. t. 19. ex Ins. Ceylon. Unica species Familiae in Mus. Lugd. desiderata!

5. *BUCEROS malayanus* et pusaran? Raffles (anthracinus, Temm.) Pl. col. 520. ex Sumatra.

6. *BUCEROS exaratus*, Reinw. - Temm. Pl. col. 211. ex Celebes.

*216. *Calao*, Bp. (Aceros? Hodgs. - Buceros, p. Gr.) As. m. Ocean. 5.

1. CASSIDIX.

1. *BUCEROS cassidix*, Temm. Pl. col. 210. mas. - Verh. Natuurk. Gesch. t. 4. bis. faem. ex Celebes, Manado.

2. *BUCEROS corrugatus* et gracilis, Temm. (rugosus, Begbie) Pl. col. 531. 535. ex Sumatra, Borneo, Malacca.

2. CALAO.

3. *BUCEROS plicatus*, Lath. (undulatus, Shaw. - niger et javanus, Vieill. - javanicus, Shaw.) Lev. Afr. t. 239. Id. Ois. Am. et Ind. t. 20. 21. faem. 22. jun. ex Java.

4. *BUCEROS ruficollis*, Vieill. (plicatus! p. Gr. - annulatus? Dum. - subruficollis? Bl.) Pl. col. 557. Labillard. Voy. à la Rech. de la Peyr. t. 11. ex Ins. Molucc.

3. ACEROS.

5. *ACEROS nepalensis*, Hodgs. (Buceros nepalensis, Gr.) As. Res. 183. t. 1. 2. - Gr. Gen. B. t. 99. faem. ex Asia centra.

* 217. **Berenicornis**, Bp. (Buceros, p. Gr.) Afr. Malaisia. 2.

1. BUCEROS **comatus**, Rafles. (lugubris, Begbie.) Verh. Naturk. Gesch. t. 4. ex Sumatra. Major.

- * 2. BUCEROS **macrourus**, Temm. 1842. (leucostigma, a rostro, Mus. Lugd. - albocristatus? Cassini, Journ. Acad. Phil. 1847? - Berenicornis albicristatus, Bp. in litt.) Mus. Lugd. ex Afr. o.c. Ashantoe. Minor: niger: rostro breve, incurvo, valde compresso, supra appendiculato, nigro, macula elongata alba utrinque ad mandibulae basim: capite plumis albis, rachide et extremo apice nigris, cristato: cauda longissima, cuneata; rectricibus opice albis.

218. **Tockus**, Less. (Buceros, p. Gr.) Afric. Ac. Oc. 12.

1. ASIATICI.

1. BUCEROS **sulcatus**, Reinw. (encocephalus, Vieill.) Temm. Pl. col. 60. ex Insulis Philippinis.
2. BUCEROS **ginginianus**, Lath. (oxyurus, Wagl. - bicornis, Scopoli. - bengalensis, Gr.) Sonn. Voy. t. 120. Lev. Ois. Am. et Ind. t. 15 ex Ind. cont.
3. BUCEROS **griseus**, Lath. (cineraceus, Temm. in Pl. col. descriptio tantum) Mus. Paris. et Lugd. ex Nepal.
4. BUCEROS **gingalensis**, Shaw. (gingala, Vieill. - pyrrhopygus, Wagl.) Levall. Ois. Am. et Ind. t. 23. ex Asia mer.
5. BUCEROS **sulcirostris**, Wagl. (panayensis? Scopoli. manillensis? Gm. - manilla, Bodd. - insculptus, Dumont. - panini, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 280. 281, 891. Sonn. Voy. t. 82. 83. - Lev. Afr. et Ind. t. 18. ex Philippinis Insulis.
Quid Buceros intermedius, B. nigrirostris et B. carinatus, Blyth, 1847. ex Asia mer?

2. AFRICANI.

6. BUCEROS **fasciatus**, Shaw. (melanoleucus, Vieill.) Lev. Afr. t. 233.
7. BUCEROS **melanoleucus**, Licht. (coronatus, Shaw.) Lev. Afr. t. 234. 235. - Sw. Zool. Ill. t. 178. - Enc. Meth. Ois. t. 240. 4.
8. BUCEROS **nasutus**, L. (nasica et hastatus, Cuv.) Pl. enl. 890. - Lev. Afr. t. 236. 237.
9. BUCEROS **paeccilarhynchus**, Laf. Rev. Zool. 1839. p. 257.

10. BUCEROS *erythrorhynchus*, Temm. (nasutus, Cuv. nee L. - Tockus erythrorhynchus, Less. 1831.) *Pl. enl.* 260. - *Pl. col.* 283. - *Lev. Afr.* t. 238.
11. BUCEROS *limbatus*, Rüpp. *Faun. Abyss.* t. 2. 1. ex *Africa orient.*
12. BUCEROS *flavirostris*, Rüpp. *Faun. Abyss.* t. 2. 2. ex *Africa orient.*
Quid Buceros leucomelas, Licht. 1832?
Quid Buceros jubatus, Vieill. Suppl. Dict?

SUBFAM. 34. EURICEROTINAE.

219. *Euriceros*, Less. Madagascar. 1.
Euryceros prevosti, Less. *Cent. Zool.* t. 74. - *Ill. Zool.* t. 13. ex *Madagascar.*

FAMILIA 17. RAMPHASTIDAE.

SUBFAM. 35. RAMPHASTINAE.

220. *Ramphastos*, L. (Bucco, Moehr. - Tucana, Briss.) Amer. trop. 14.
a. Tectrices caudae superiores flavae.
1. *R. erythrorhynchus*, Gm. (levaillanti, Wagl.) *Pl. enl.* 262. - *Edw. B.* t. 238. - *Lev. Ois. Parad.* t. 3. 4. - *Gould, Monogr. Ramph.* t. 3. ex *Cayenna, Guyana, Brasil. sept.* *Rostro rubro pectore albo.*
Bolivia. *Pectore albo-flavido; fascia crissaque sanguinis: rostro nigro flavo rubroque picto.*
Quid Ramphastos tucanus, L. nec Wagler? Pl. enl. 307?
 2. *R. inca*, Gould, *Proc. Zool. Soc.* 1840. p. 147. ex *Bolivia.* *Pectore albo-flavido; fascia crissaque sanguinis: rostro nigro flavo rubroque picto.*
 3. *R. Cuvieri*, Wagl. - *Gould, Monogr. t. 2.* ex *Bras. s. Pectore albo: rostro nigro, lateribus convexis.*
 4. *R. culminatus*, Gould, 1833. - *Monogr. Ramph.* t. 1. ex *Mexico.* *Pectore albo: rostro nigro lateribus planis.*
 5. *R. citreopygus*, Gould, 1835. (*sulphuratus, Less.*) *Monogr. t. 4. ex Brasil. occ.* *Cauda brevis! Pectore flavo-stramineo: rostro nigro minor! subunicolori, vix marginato.*
 6. *R. osculans*, Gould, 1835. *Monogr. t. 5. ex Brasil. Pectore flavo-aurantiaco: rostro nigro, flavo marginato.*
 7. *R. citrealimus*, Gould, *Pr. Zool. Soc.* 1843. p. 147. - *Gray et Mitch. Gen. B.* t. 100. ex *S. t. Fe de Bogota.* *Pectore flavo, fascia crissaque rubris: genis gulaque albis: rostro nigro viridi-marginato.*

b. Tectrices caudae superiores albae.

8. **R. tocard**, Vieill. (ambiguus, Sw. - swainsoni, Gould. eugnathos, Wagl.) Levaill. Parad. t. 9. - Zool. Ill. t. 168. - Monogr. t. 8. ex Mexico mer. Columbia. Pectore flavo: rostro oblique dimidiato flavo.
9. **R. piscivorus**, L. (tacanus, Shaw. - carinatus, Sw. callorhynchus, Wagl.) Edw. B. t. 64. 329. - Zool. Ill. t. 45. - Gould, Monogr. t. 7. ex Mexico. Pectore flavo: rostro viridi, rubro, et atro-caeruleo picto.
10. **R. toco**, Gm. (magnoirostris, Sw.) Pl. enl. 82. - Lev. Ois. Par. t. 2. - Lath. Syn. t. 9. - Gould, Monogr. t. 6. ex Guiana, Brasil. Maximus: cauda breviori: pectore albo: rostro rubro; maxilla utrinque macula apicali nigra. Quid R. niveus, Less. Compl. Buff. p. 184?

c. Tectrices caudae superiores rubrae.

11. **R. vitellinus**, Illig. - Sw. Zool. Ill. t. 56. - Levaill. Ois. Parad. t. 17. - Gould, Monogr. t. 9. ex Guiana, Cayenna, Brasil. Rostro nigro: genis albis.
12. **R. forsterorum**, Wagl. - Lev. Ois. Parad. t. 5. ex Peru. Rostro longissimo nigro: genis sicut et pectore aurantiacis.
13. **R. maximus**, Cuv. (ariel, Vig. - erythrosoma et temineki, Wagl.) Levaill. Parad. t. 6. - Vaill. Gal. Ois. t. Suppl. - Gould, Monogr. t. 10. ex Brasil. Rostro nigro: genis flavo-aurantiis. Quid R. picatus, L. (aldrovandi, Shaw.) Albin. Av. t. 25. uropygio nigro, rectricibus apice rubris?
14. **R. dicolorus**, Gm. (tuca, Licht. - chlororhynchus, Temm.) Pl. enl. 269. - Lev. Parad. t. 8. - Sw. Zool. Ill. t. 108. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 29. - Gould, Monogr. t. 11. ex Brasilia, etiam m. Rio Janeiro Paraguay. Minimus: rostro virescente, marginibus rufo-serratis!

221. **Pteroglossus**, Ill. (Aracari, Less. 1828.) America m. 18.

1. **RAMPHASTOS aracari**, L. - Pl. enl. 166. - Lev. Parad. t. 10. Gould, Monogr. t. 12. ex Brasil. Subitus flavus, fascia lata abdominali rubra: maxilla lateribus luride albitante.
2. **P. castanotis**, Gould, Proc. Z. S. 1833. p. 119. - Monogr. t. 13. ex Brasilia. Subitus flavus, fascia lata abdominali rubra: maxilla oblique dimidiato nigra.

3. **P. regalis**, Licht. (ambiguus, Less. - torquatus, Wagl. a Gu?) Gould, Monogr. t. 14. ex Mexico. Subtus flavus: pectoris macula nigra; fascia abdominali nigra rubraque.
4. **P. pluvicinctus**, Gould, 1835. - Lev. Parad. t. 11. Monogr. t. 15. ex Brasilia. Subtus flavus: pectoris collaris nigro; fascia abdominali nigra rubraque.
5. **P. bitorquatus**, Vig. - Gould, Monogr. t. 16. ex Guiana. Pectore rubro: collaris flavo, angusto, saepe inconspicuo.
6. **RAMPHASTOS azarae**, Vieill. (Pteroglossus azarae, Wagl.) Lev. Parad. Suppl. t. A. ex Brasil. s. Guiana. Pectore coccineo: collare latissimo nigro: vitta abdominalis rubra, angusta, obsoleta: maxilla vitta lata fuscata.
7. **P. flavirostris**, Fraser, 1840. (azarae, Gould, nec Auct.) Gould, Monogr. t. 17. ex Brasil. mer. Pectore coccineo: collaris nigro: vitta abdominali rubra, latissima, rostro flavo unicolori.
8. **RAMPHASTOS viridis**, L. (Pteroglossus viridis, Ill.) Pl. enl. 727. 728. - Levaill. Parad. t. 16. 17. - Sic. Zool. Ill. t. 160. - Gould, Monogr. t. 21. ex Guiana angelica. Subtus unicolor flavus: gula nigricante: maxilla dimidiatim flavo-aurantiaca.
9. **P. hypoglaucus**, Gould 1831. Monogr. t. 19. ex Colubia. Subtus unicolor, caerulescens!
10. **P. nigrirostris**, Waterhouse 1839. (melanorhynchus, Sturm). ex Panama. Subtus caeruleus; gula genique albis: uropygio flavo: crasso rubro.
11. **RAMPHASTOS bailloni**, Vieill. (Pteroglossus bailloni, Wagl. - croceus, Jard.) Lev. Parad. t. 18. - Selby, Ill. Orn. t. 6. - Gould, Monogr. t. 20. ex Brasilia. Subtus unicolor, flavus: gula concolori: uropygio coccineo.
12. **P. humboldti**, Wagl. - Gould, Monogr. t. 22. ex Brasilia. Subtus unicolor, flavus: maxilla flava nigro inscripta: mandibula nigra.
13. **P. inscriptus**, Sv. (scriptus, Temm.) Zool. Ill. t. 90. Gould, Monogr. t. 23. ex Guiana. Subtus unicolor flavus: mandibula utraque flava nigro inscripta.
14. **P. paecilosternus**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1843. p. 147. ex Sta Fe de Bogota. Subtus flavus, vitta pectorali nigra et sanguinea: uropygio rubro: rostro nigro, apice albido, basi et lateribus aurantiacis.
15. **P. erythropygius**, Gould, 1843. - Voy. Sulph. B. t. 28. ex Amer. centr. Rialejo. Subtus flavus, vitta pectorali nigra rubraque: uropygio late sanguinco: rostro flavo.

16. **P. beauharnaisii**, Wagl. 1832. (*ulocomus*, Gould 1833. - *Beauharnaisius ulocomus*, *Bp. in lit.*) Monogr.
t. 18. ex Brasil. *Subtus flaves rubro mixtus: rostro albo-serrato: plumis capitis crispis.*
17. **P. poeppigi**, Wagl. (*leptocephalus*, Nitzsch.) ex Br.
18. **P. cucullatus**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1846, p. 69. ex Bras. *Subtus cum lunula occipitali cyaneo-cinerereus: genis gulaque brunnescens: crasso coccineo: rostro viridi-flavo, apice, maculaque utrinque ad basim nigris.*
Quid R. glaber. - R. indicus (*Mill. t. 57.*), Shaw?
Quid Pteroglossus brevirostris, Less. Tr. Orn. p. 178?
Quid *Ramphastos albus*. - R. luteus - R. caeruleus. - R. dubius, Gm.?
Vix hujus familiae!
222. **Selenidera**, Gould, 1837. (*Pteroglossus*, p. Gr.) America m. 6.
1. **PTEROGLOSSUS gouldi**, Natterer, 1837. (*Selenidera gouldi*, Gould) Icon. Av. i. t. 7. ex Brasil. Minor: lateribus intense aurantiacis: mandibula alba: maxilla macula nigra, magna, utrinque unica.
2. **PTEROGLOSSUS maculirostris**, Licht. (*Ramphastos maculatus*, Vieill.) Levail. Parad. t. 15. - Suppl. t. A. A. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 26. - Gould, Monogr. t. 24. ex Brasil. Major: lateribus flavidis: maxilla albicans, nigro-fasciata maculis utrinque plurimis ovatis.
3. **PTEROGLOSSUS nattereri**, Gould, 1835. - Monogr. t. 25. ex Brasil. Maxilla rubra apice concolor.
4. **PTEROGLOSSUS reinwardtii**, Wagl. - Gould, Monogr. t. 26. ex Brasil. Maxilla rubra apice nigricanti.
5. **PTEROGLOSSUS longidorffi**, Wagl. - Gould, Monogr. t. 28. ex Brasil. Rostro immaculato, subcinerascenti.
6. **RAMPHASTOS piperitorus**, L. (*Pteroglossus culik*, Wagl.) Pl. enl. 577. 729. - Edw. B. t. 330. - Levail. Parad. t. 13. 14. - Gould, Monogr. t. 27. ex Guiana. Rostro immaculato, basi rubro.
223. **Aulacoramus**, Gr. 1841. (*Aulacorhynchus*, Gould, 1824. - *Pteroglossus*, p. Gr.) America m. 8.
1. **PTEROGLOSSUS sulcatus**, Sw. Zool. Ill. t. 44. - Pl. col. 356. - Gould, Monogr. Ramph. t. 31. ex Guiana. Omnia viridis, uropygio et crasso concoloribus: cauda unicolori.
2. **RAMPHASTOS pavoninus**, Gm. (*Pteroglossus pavoninus*, Wagl.) Gould, Monogr. t. 30. ex Mexico. Omnia viridis, uropygio concolore: criso rectricibusque apice ferrugineis: maxilla basi nigra, vitta marginali aurantiaca.

3. PTEROGLOSSUS *albivitta*, Boiss. Rev. Zool. 1840. p. 70.
Similia praecedenti, sed rostro breviori (avis sexta tantum parte), vitta marginali basis alba.
4. *P. prasinus*, Licht. - Gould, Monogr. t. 29. ex Mexico. *Omnino viridis, uropygio concolor: crisso et rectricibus opice ferrugineis: maxilla a basi flavoante.*
5. PTEROGLOSSUS *derbyanus*, Gould, 1835. Monogr. t. 32.
ex Cordilleris. Omnino viridis, uropygio crissoque concoloribus: rectricibus mediis opice castaneis.
6. PTEROGLOSSUS *haematoptygus*, Gould, 1834. Monogr. t. 33. ex Brasil. *Uropygio coccineo!*
7. PTEROGLOSSUS *atrigularis*, Sturm, edit. Gould, Monogr. cum figura. ex Brasil. *Gula nigra!*
8. PTEROGLOSSUS *caeruleicinctus*, Orb. (Lichtensteini, Gould) Voy. Am. m. Ois. t. 66. 2. - Monogr. Sturm's ed. t. 31. ex Columbia. *Viridis: gula alba; fascia petoralis caerulea: uropygio rectricumque medianarum apicibus castaneis.*

FAMILIA 18. LEPTOSOMIDAE.

SUBFAM. 36. LEPTOSOMINAE.

224. *Leptosoma*, Vieill. Madagascar. 1.
CUCULUS afer, Gm. (cafer, Lath. - discolor, Herm. - Buccaficanus, Steph. - Leptosomus viridis, Vieill. - L. viridis et crambus, Less.) Pl. enl. 587. 588. - Lev. Afr. t. 226. 227. ex Madagascar.

FAMILIA 19 CUCULIDAE.

SUBFAM. 37. SAUROTHERINAE.

225. *Saurothera*, Vieill. Amer. trop. 4.
1. *CUCULUS vetula*, Gm. (Cuculus jamaicensis major, Klein. Saurothera jamaicensis, Laf. - S. vetula, Gr.) Sloane, Jam. t. 258. 2. - Gosse, Ill. B. of Jam. t. 74. ex Jamaica, nec S. t Dominic. Rostro recto: capite fuscō: genis gulaque albīs: pectora rufa.
2. *S. dominicensis*, Laf. 1847. (Cuculus jamaicensis longiroster, Br.) Orn. iv. t. 17. 2. - Pl. enl. 772. ex S. t Dominic, nec Jamaica. Rostro recto: capite dorso concolor: genis gulaque fulvis: pectora cinereis.

3. *S. VETULA*, Laf. ex Vieill. nec Gm. (*vieilloti*, Bp.) Gal.
Ois. t. 38. - Rev. Zool. 1847. p. 357. ex Antillis.
Minor: rostro subincurvo; mucha et remigibus concoloribus;
gula pectoreaque griseis; abdomine rufo.
4. *S. merlini*, Orb. Voy. La Sagra, Cuba, Ois. t. 25.
ex Ins. Cuba, Martinica? Maxima: rostro curvo;
remigibus partim rufis.

226. **Geococcyx**, Wagl. (Leptostoma, Sw.) California. Mex. 4.

1. *CUCULUS viaticus*, Licht. (Diplopterus viaticus, Boie,
Geococcyx variegatus, Wagl. - Saurothera marginata,
Kaup, Isis, 1832. p. 991. t. 26. - S. bottae, Blainv. - S.
californiana, Less. - Leptostoma longicauda, Sw.) Ann.
Mus. 1835. t. 9 ex California.
2. *G. affinis*, Hartl. Rev. Zool. 1844. p. 215. Gr. et Mitch.
Gen. B. t. 114. ex California.
3. *G. velox*, Karwinski, Münch. Gel. Anz. III. 1836. p. 95.
ex Mexico.
4. *CUCULUS mexicanus*, Gm. (Geococcyx mexicanus,
Strickland). ex Mexico.

SUBFAM. 38. PHAENICOPHAEINAE.

227. **Seythrops**, Lath. Oceania. 1.

- 1. Seythrops novae-hollandiae*, Lath. (australasiae,
Shaw. - australis, Sw. - Cuculus praeagrus, Reinw.)
White's Journ. t. 142. - Mag. Zool. 1835. Ois. t. 37.
Pl. col. 290. - Gould, Austr. t. 90. ex N. Holl.
Celeb. nec Timor.

Optime descripsit Aevum ex Ins. Celebes anno 1821 venerandus Reinwardt in aureis Observ. Orn. quas mihi benigne 1850 manuscripto
communicavit.

228. **Carpococcyx**, Gr. (Calobates, Temm. nec Kaup.) Borneo. 1.

- CALOBATES *radiatus*, Temm. (err. typ. radiceus) Pl. col. 538.
ex Sumatra, Borneo occid.

229. **Rhinortha**, Vig. (Bubutus, Less. - Anadaenus, Sw. - Idiococcyx, Boie). Oceania. 1.

- CUCULUS *chlorophaeus*, Raffles, (sumatranaus, Cuv.
Coccyzus badius, Gr. - Phaenicophaeus caniceps, Vig.
viridirostris, Eyton. - Bubutus isidori et davanceli, Less.
Anadaenus rufescens, Sw.) Voy. Belang. t. 2 - J. Gr.
Zool. M. t. 9, ex Sum. Borneo. Rufus: rectricibus apice
albis. Mas. capite pectoreaque griseis. Faem. cauda nigra.
Quid Coccyzus ferrugineus, Gould. (Playa ferruginea, Gr.) Voy.
Sulphur. t. 29. ex Ins. Cocos Oe. Pacif. Ferrugi-
neus, capite cinerascenti: subtus ochraceus: cauda gradata,
rectricibus lateraliibus apice albis?

230. **Dasylophus**, Sw. (Melias, p. Less.) Ins. Philipp. 2.
 1. **Phaenicophaeus superciliosus**, Cuv. (Melias superciliosus, Less. - Dasylophus superciliosus, Sw.) *Icon. Règn. Anim. t. 33. l. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 116.*
ex Ins. Phil. Ater: rectricibus apice albis: plumis superciliaribus elongatis, rubris.
2. **D. cumingi**, Fraser, (Phaenicophaeus barroti, Eyd. et Souley.) *Voy. Bonit. Ois. t. 6. - Zool. Typic. fig. bona. ex Ins. Philipp. Aeneo-viridis, subtus rufus; capitis lateribus, rectricibusque apice albis: plumis candidis cristae gulaeque rachidibus nigris apice dilatato-petinulatis!*
Specimen eximium in Musaco Wratislaviensi descripsi.
231. **Phaenicophaeus**, Vieill. (Malcoha, C. - Melias, Glog.) *Asia m. Oc.* 4.
 1. **P. callirhynchus**, Reinw. (calyorrhynchus! Temm.)
Pl. col. 349. ex Ins. Celebes. Purpurascens-castaneus, pecto abdomineque fuscocineraceus: aliis caudaque atro-eyaneis: rostro pulchre tricolori.
2. **P. erythrogathus**, Temm. (P. corallirhynchus? Less.) *M. Lugd. ex Sumatra. Viridi-aeneus; subtus, cum rectricibus a medio ad apicem, castaneus: rostro flaviante, mandibula rubra.*
3. **P. viridi-rufus**, Vieill. (tricolor, Steph. - Cuculus curvirostris, Shaw. - melanognathus, H. - Melias viridis, Less.) *Natural. Misc. t. 905. - Lev. Afr. t. 225. ex Java. Viridi-aeneus, subtus rufus: rectricibus a medio ad apicem castaneis: rostro flaviante, mandibula nigra.*
4. **CUCULUS pyrrhocephalus**, Forst. (Phaenicophaeus leucogaster, Dum. - Phaenicophaeus pyrrhocephalus, Gr.) *Vieill. Gal. t. 37. - Lev. Afr. t. 224. ex Asia mer. Viridi-aeneus; abdomine caudaeque apice albis: capite alto punctato: facie denudata, coccinea!*
232. **Zanclostomus**, Sw. (Taccocua et Melias, p. Less.) Africa. As. m.O. 6.
 a. ASIATICI.
 1. **Z. flavirostris**, Sw. (aereus? Vieill.) *Birds of west. Afr. t. 19. - Lev. Afr. t. 215? ex Africa occid. Ex violaceo-cyanus, subtus cinerascens: rectricibus unicoloribus: rostro flavo.*
2. **CECULUS sirkee**, J. Gr. (Taccocua leschenaulti, Less. Centropus ceculoides, C. W. Smith.) *Jerd. Ill. Ind. Orn. fig. ex Asia merid. Cinereo-brunneus; abdomine rufescens: rectricibus lateralibus apice albis: resto rubro.*

3. *Z. viridirostris*, Jerd. (*Phaenicophaeus jerdoni*,
Blyth.) *Ill. Ind. Orn.* 1. t. 3. *ex Asia merid.* *Simili-*
lis sequenti; sed minor, et rostro graciliori magisque viridi.
Quid Z. affinis, et Z. infuscatus, Blyth. ex Asia d' centr?

b. OCEANIC.

4. *CUCULUS sumatranus*, Raffles. (*Melias diardi*, Less.
Phaenicophaeus crawfurdii, J. Gr. - *Zanclostomus craw-*
furdii hinc sumatranus, et Z. diardi, Gr.) *Zool. Misc.*
t. 2. - *O. des Murs*, *Pl. p. 19. ex Sumatra, Borneo.*
Cupreo-viridis, capite pectoreque ardestiacis: abdomine et
crisso castaneis: cauda corpore paullo longiori: rectribus
apice albis. Jun. crisso concolori: superciliis albis.
5. *MELIAS tristis*, Less. (*Phaenicophaeus longicaudatus*,
Blyth. - *elongatus*, Müll. - *Zanclostomus tristis et elonga-*
tus, Gr.) *Tijdschr. van Nat. Gesch.* 1825. t. 8. 5. *ex*
Sumatra. Aeneo-viridis, capite pectoreque cinereis: cau-
da corpore duplo longiori: rectricibus apice albis. Jun. subtus
albovans: superciliis albis.
6. *CUCULUS jaranicus*, Horsf. (*Coccyzus rubrirostris*,
Drapiez. - *chrysogaster*, Temm. - *Phaenicophaeus cal-*
lorhynchus? Blyth, *neq; Temm.* - *Piaya erythrorhyncha*,
Less. - *Piaya chrysogastra*, Müll. an, *exclusa patria, Less?*).
Zool. Res. Java, fig. mala. *ex Malaisia. Viridi-*
aeneus, pileo, abdomineque cinereis: gula rufa: crisso casta-
neo: rectricibus cyaneo-chalybeis, apice albis: rostro rubro.

SUBFAM. 39. CROTOPHAGINAE.

233. *Crotophaga*, L. (*Crotophagus*, Briss.) Amer. trop. 6.
1. *C. ani*, L. - Azara, 263. - *Pl. enl.* 102. 2. *ex Guiana,*
Brasil. sept.
 2. *C. major*, L. - Azara, 264. - *Pl. enl.* 102. 1. *ex Bras.*
 3. *C. laevirostris*, Sw. *Two Cent. and a Quarter*, p. 321.
f. 65. a. ex Bras.
 4. *C. rugirostris*, Sw. *Two Cent. and a Quarter*, p. 321.
*f. 65. b. - Jard. et Selb. *Ill. Orn.* n. s. t. 41. ex Bras.*
 5. *C. sulcirostris*, Sw. 1827. (*casasii*, Less. 1829.) *Two*
Cent. p. 322. f. 65. c. - Cent. Zool. t. 9. ex Am. centr.
Realejo.
 6. *C. semisulcata*, Sw. *Two Cent.* p. 346. *ex Am. centr.*

SUBFAM. 40. INDICATORINAE.

234. **Indicator**, Vieill. (Prodotes, Nitzsch). Afric. As. Oc. 8.
1. **CUCULUS INDICATOR**, Gm. (Indicator *sparmanni*, Steph.
minor, Cuv.) Mill. *Cimel. Phys.* t. 24. a. - *Lev. Afr.* t. 242.
ex Afr. mer. Minor: pectora cinereo-olivaceo.
 2. **I. major**, Steph. (*flavicollis*, Sw. - *levaillanti*, Leadb.)
Gen. Zool. ix. t. 27. - *Vieill. Gal.* t. 46. *ex Africa*
occid. Major: gula pectoraque flavis.
 3. **I. levaillanti**, Temm. *Pl. col.* *descriptio tantum.* - *Lev.*
Afr. t. 241. *ex Africa mer.* Major: pectora maculato.
 4. **I. minor**, Steph. (minimus, Temm. - *diadematus*, Rüpp.
buphagoideus, Leadb.) *Pl. col.* 542. 2. *ex Africa mer.*
orient. et *occid.* Minimus!
 5. **I. maculatus**, Gr. (sparmanni, Leadb. nec Steph.
variegatus? Less.) Guérin, *Icon. Règn. Anim.* t. 32. 2.
Mitch. *Gen. B. t.* 113. *ex Africa*. Olivaceus; subtus
fuscus; maculis crebris albidis variegatus.
 6. **I. albirostris**, Temm. (*albicollis*, Leadb. - *leucotis*
neu flavicollis, Sw. - *flaviscapulatus*, Rüpp.) *Pl. col.* 367.
ex Africa merid. et *occid.* Major: gula nigra: rostro
flavo(neu albo!); macula auriculari nivea; humerali flava.
concoloribus.
 7. **I. archipelagicus**, Temm. *Pl. col.* 522. 1. *ex Bor-*
n. o. Minor: rostro fuso: macula humerali flava: auriculis
concoloribus.
 8. **I. xanthonotus**, Blyth, *Journ. As. Soc. Beng.*
1841, 1842, 1843 cum fig. *ex Asia mer.* Dorsoflavus!

SUBFAM. 41. CUCULINAE.

235. **Eudynamis**, Vig. (Gymnopus! Blyth, 1843.) Asia m. Oc. 9.

a. ASIATICI.

1. **CUCULUS orientalis** et scolopaceus? L. (indicus niger,
Br. - maculatus, Gm. - indicus, Lath. - crassirostris,
Vieill. - Centropus fasciatus, C. W. Smith. - Eudyna-
mis indicus et maculatus, Gr.) *Pl. enl.* 274. 1. mas. 764.
jun. 586. faem. - *Edw. B. t.* 59. - *Lev. Afr.* t. 214. mas.
216. jun. *ex Asia centr. or. et mer.* Major (Long.
14-pols.); rostro flavofusco. Mas. nigro-nitens. Jun. albo-ma-
culatus. Faem. rufo-varia.

2. **CUCULUS niger** et honoratus? *L.* (*bengalensis niger*, *Br.*

Eudynamis honoratus, *Gr.* - *Gymnopus niger*, *Blyth.*

Eudynamis niger, *Hartl.*) *Edu. B. t.* 58, mas. - *Pl.*

enl. 294? faem. *ex Bengal. Malabar.* *Minor*

(*Long. 10-poll.*): *rostro flavo-aurantiaco.* *Mas. nigro-nitens.*

Faem. et juv. nigricantes, albo, rufo, cinereoque varii.

*b. OCEANICL.*3. **CUCULUS ORIENTALIS**, *Reinw.* (*mindanensis?* *L.* - *cyanoccephalus?* *Lath.* - *Eudynamis australis*, *Sic.*) *Pl. enl.*

277? faem. *ex Java, Sumatra.* *Rostro flavissimo.*

Mas. nigro-nitens. Faem. rufo-varia.

Quid Cuculus cyanoccephalus, Gr. ex Lamb. Icon. ined. n. 60?

4. **E. flindersii**, *Lath.* (*orientalis*, *mas*, *et flindersii*, *faem.*

Vig. *et Horsf.* - *Griff. An. Kingd. III. cum. fig.* - *Gr.*

et Mitchill. Gen. B. t. 91. - *Gould, Austr. IV. t.* 91.

Unica species ex Austr. Similis Eudyn. orientali et

Eudyn. australi; sed minor, et rostro tenuiore. Mas. niger.

Faem. fusca, rufa varia.

5. **E. picatus**, *Müll. Verh. Nat. Gesch.* p. 167. *ex*

Amboina. *Similis E. orientali et australi, sed minor: E.*

flindersii nimirum affinis! rostro late, flavo.

6. **E. melanorhynchus**, *Müll. Verh. Nat. Gesch.*

ex Celebes. *Major, magis chalybaeus: rostrum nigerrimo.*

*7 **E. ransomi**, *Bp.* (*Cuculus punctatus* var. *ceramensis*,

Forston) *Mus. Lugd.* *ex Ceram.* *Maximus (Longitud.*

fere sesquipedal.): rostro brevi robusto. Mas. et Faem. pa-

ram dissimiles: ex auro virecenti-fusci, rufo punctato-ma-

culati: subtus rufi nigro-undulati: rectricibus rufi nigroque

fasciatis. Jun. rufus albo-maculatus; subtus albus, fusco-

fasciatus.

Sociabilis amico ex Societate amicorum,

Ipswichi tamquam animae! Cuculidarum

pulcherrimum dico.

8. **CUCULUS punctatus**, *L.* (*rufiventer*, *Less.* - *Eudynamis*

punctatus, *Müll.*) *Pl. enl.* 771. - *Sonnerat, Voy. N.*

Guin. t. 78. *ex Amboina, N. Guinea.* *Similis praec-*

cedenti sed minor (Long. 14-poll.) et coloribus minus viridis.

9. **CUCULUS taitensis**, *Sparrm.* (*taitius*, *Gm.* - *fasciatus*,

Forst.) *Mus. Carls. t.* 32. *ex Insulis O-taiti-*

Bora-Bora. *Minor: fuscus, albo-ocellatus; subtus rufus,*

fusco-striatus: superciliis albis: cauda rufa nigroque fasciata:

rostro rubenti.

236. **Oxylophus**, Sw. (Edolius, Less. - Coccystes, Gloger.) Eur. m. As. Afr. 4.

1. **Ceculus glandarius**, L. (andalusiae, Br. - pisanus, Gm. - macrurus, Brehm) Pl. col. 314. - Edw. B.t.57.

Exped. Egypt. Ois. t. 4. 2. ex Afr. sept. Asia occ. Europ. mer. Cinereus, albo-maculatus; subtus albus, pectore rufescens; remigibus fuscis: rectricibus nigricantibus, apice albis.

Vix specie differt Cuculus phaiopterus, Rüpp. Mus. Lugd. ex Egypt. Crista minor; maculis albis paucis, parvis: remigibus ex parte rufis!

2. **Ceculus coromandus**, L. (collaris, Vieill. - Oxylophus coromandus, Gr.) Pl. enl. 274. 2. - Lev. Afr. t. 213. ex Asia mer. Java, Sumatra. Niger; subtus, cum torque cervicali, albus: gula flavida: alis rufis.

3. **Cuculus serratulus**, Sparrm. (ater et melanoleucus, Gm. jacobinus, Bodd. - edolius, Cur. - Leptosomus afer, Franklin. - Oxylophus serratulus, Gr.) Mus. Carls. t. 3. Pl. enl. 872. - Lev. Afr. t. 207. m. 208. f. ex Afr. As. occ. Persia. Minor, omnino niger: speculo alari albo. Faem. Nigra; subtus alba: speculo alari et rectricibus apice albis.

4. **Ceculus ater**, Steph. (levaillanti, Less. - Oxylophus afer! Gr.) Gen. Zool. ix. t. 24. - Lev. Afr. t. 209. - Leach, Zool. Misc. t. 31. - Sw. Zool. Ill. t. 18. ex Africa or. et occ. Major: niger: subtus albus; gula striis densis nigris: speculo alari, rectricibusque apice albis.

237. **Cuculus**, L.

Eur. As. Afr. Oc. 10.

a. EUROPAEUS.

1. **C. canorus**, L. (hepaticus, Sparrm. - borealis, Pall.)

Pl. enl. 811. - Mus. Carls. t. 55. - Lev. Afr. t. 202. m. ad 203. jun. - Gould, Eur. t. 240. ex Eur. As. occ. Afr. sept. Rectrice extima nigra, apice tantum, maculisque parvis, albis: tarsis fere omnino plumatis.

b. AFRICAN.

2. **C. gularis**, Stephens. (lineatus, Sw.) Lev. Afr. t.

200. m. 201. f. ex Afr. occ. Cinerus, subtus albus nigro transversim anguste lineatus: orbitis rostrique basi aurantiaci: rectrice extima alba, fasciolis nigris subsenis: tarsi semi-plumatis.

3. **C. capensis**, Gm. (solitarius, Vieill.) Pl. enl. 390.

Lev. Afr. t. 206. ex Africa mer. Fusco-virens; subtus albus, nigro fasciatus: jugulo rufo; rectricibus apice albis.

4. *C. clamosus*, Lath. - Lev. Afr. t. 204. m. 205. f. ex
Africa mer. Simillimus praecedenti, sed totus niger!

c. OCEANIC.

5. *C. optatus*, Gould, 1845. B. of Austr. iv. t. 84. ex
Australia. Major: C. canoroidi nimium affinis.
6. *C. canoroides*, Müll. Verh. Nat. Gesch. p. 235. ex
Java, Borneo, Timor, Sumatra. Major: subtus
fasciatus.
7. *C. tenuirostris*, Temm. (canorus, Horsf.) ex *Java,*
Sumatra. Minor: subtus fasciatus: rostrum gracilior.
8. *C. concretus*, Müll. Verh. Nat. Gesch. p. 230. ex *Born.*
Valde minor: canda breviori.
9. *C. lepidus*, Müll. Verh. Nat. Gesch. p. 236. ex *Timor.*
Minimus: subtus fasciatus.
10. *C. polioaster*, Müll. Verh. Nat. Gesch. p. 236. ex
Ternate. Major: subtus albo-griseus, subnigricolor.
Medius quasi inter Cuculus veros et Cacomantes.

238. **Cacomantis**, Müll. 1842. (*Surniculus*, p. Less. - *Cucus*,
 p. Gr.) Oceania. 9.

1. **CUCULUS INORNATUS** et albistrigatus, Vig. et Horsf.
 (*Columba pallida*? Lath. - *Cucus inornatus*, Gould)
Austr. iv. t. 85. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 85. ex
Austr. Major: subtus cinereus: rectricibus margine albo-
serratis.
2. **C. insperatus**, Gould, 1845. (viridi-rufus, Temm.)
B. of Austr. iv. t. 87. ex N. Holland. Major: sub-
tus cinereo-rufus: rectricibus omnibus margine albo-serratis,
subtus conspicuus fasciatus.
3. **C. dumetorum**, Gould, 1845. *B. of Aust. Intr. fig.*
nulla. Similis praeced. sed valde minor, et colore obscuriore.
4. **CUCULUS FLAVUS**, radiatus et panayanus? Gm. (merulinus,
flaviventris et variegatus? Scopoli. - sonnerati, Lath.
rufovittatus et pyrogaster? Drapiez. - pravatus, Horsf.
 jun.) *Pl. enl. 814. - Sonn. Voy. Nouv. Guin. t. 81.*
ex Java, Sumatra Minimus: fuscus; capite pectore-
que griseis; abdome rufo-cinnamomeo: rectricibus interne
et subtus albo-fasciatis.
- Quid Cucus niger, (Lath.) Gr. nec L. - tenuirostris, J. Gr. nec*
Temm. flavus Jerd. - lathami, J. Gr. - ejulans, Sund. - varius,
Vahl. nivicolor, Hodgs. Ill. Ind. Orn. t. 34. 2, et t. 35. 1. ex
Asia continentali?

5. *Cuculus sepulcralis*, Müll. (hypooides; p. *Boie*) Verh.

Nat. Gesch. p. 177. ex *Java et Sumatra*. Minor;
subtus rufo-castaneus: rectricibus margine albo-serratis; me-
diis subuncicoloribus.

6. *Cuculus tymbononus*, Müll. Verh. *Nat. Gesch.* p. 177.
ex *Timor*. Minor; subtus cinereus: cauda subuncicolori.7. *Cuculus flabelliformis*, Lath. (cineraceus, incertus
et variolosus, Vig. et H. - cineraceus, Gould) Gen.
Syn. t. 126. - *Sonn. Vog. N. Guin.* t. 79? - *Jard. Ill.*
O. t. 67. - *Gould*, *Austr. iv.* t. 86. ex *Austr. r.* Fusco-
cinereus: subtus rufescens; abdomine albicans: cauda albo ni-
groque fasciata.8. *Cuculus fasciolatus*, Müll. (hypooides, p. *Boie*) Verh.
Nat. Gesch. p. 177. ex *Java et Sumatra*. Rufus
nigro-undulatus; subtus albus, fusco-fasciolatus: rectricibus
rufis, albo nigroque variegatis.9. *Cuculus lanceolatus*, Müll. Verh. *Nat. Gesch.* p. 178.
ex *Java*. Stramineo-rufus nigro-maculatus; subtus cine-
reus, taeniis fuscis: cauda rufa, nigro-fasciata.239. *Hierococcyx*, Müll. 1842. (Simotes? *Blyth* 1846. - Cucu-
lus, p. *Gr.*)

Asia. Ocean. 5.

a. ASIATICI.

1. *Cuculus sparveroides*, Vig. 1831. - *Gould, Cent. Him.*
B. t. 53. ex *Asia mer.* Maximus.2. *Cuculus poliocephalus*; Lath. (himalayanus, Vig.
1831. - *micropterus*, Gould.) *Cent. Him. B. t. 52.* ex
Asia centr. Medius.

b. OCEANICI.

3. *Cuculus fugax*, Horsf. (*Hierococcyx fugax*, Müll.) Verh.
Nat. Gesch. p. 233. ex *Sumatra*, *Java*, *Borneo*.
Fuscus, subtus cinereo-rufus: cauda breviori, nigra, vix fas-
ciata, apice tantum alba.4. *Cuculus vagans*, Müll. Verh. *Nat. Gesch.* p. 233. ex
Java. Similis praecedenti, sed minor.5. *Cuculus leucolophus*, Müll. Verh. *Nat. Gesch.* p. 233.
ex *Nova Guinea*. Niger; macula elongata verticis, et
extremo apice rectricum tectricumque caudae inferiorem, aliis.
Quid Simotes albivertex, *Blyth, Journ. As. Soc. Beng.* 1846?
Quid *Cuculus perlatus*, C. incertus, C. rufalus, C. pyrrhocenes,
C. variegatus, C. caerulescens, *Vieill. Nouv. Dict. H. Nat.* viii.
p. 223-235?

240. **Surniculus**, Less. 1831. (Pseudornis, Hodgs. 1839. - Cuculus, p. Gr.)

Afr. As. Ocean. 4.

1. **CUCULUS lugubris**, Horsf. Zool. Res. Java, cum fig. ex Java, Sumatra, Borneo. Nigerrimus, viridimicans; criso, tibiis, remigibus interne, rectricibusque externis albo-notatis. Jun. punctis allis sparsis margaritatus.
2. **CUCULUS nigriceps**, Sw. Zool. Ill. n.s. fig. ex Afr. occ. Atro-niger, remigibus intus albo-fasciatis: rectricibus lateraliibus, et tectricibus caudae inferioribus, apice albis.
3. **CUCULUS rubiculus**, Sw. B. west. Afr. II. p. 181. ex Africa occ. Niger; subtus albidofulvescens, pectorerufo fasciis latis nigris: rectricibus nigris, lateraliibus maculis tribus apiceque albis.
- 4? **PSEUDORNIS dicruroides**, Hodgs. (Cuculus dicruroides, Gr.) Journ. As. Soc. Beng. 1839. p. 136. cum fig.

241. **Chrysococcyx**, Boie. (Chalcites, Less. - Lampromorpha, Vig. - Cuculus, p. Gr.)

Africa. As. Oc. 9.

a. AFRICANI.

1. **CUCULUS cupreus**, Lath. (cupreus, Shaw, nec Gr. ex Bodd. qui auratus, Gm. - splendidus, Gr. - Chrysococcyx cupreus, Boie.) Mus. Lev. t. 159. - Vieill. Gal. Ois. t. 42. ex Africa mer. Splendide cupro-viridis, pectore quoque aureo, plumis rotundis metallicis tamquam squamatus: abdome stramineo: criso albo, viridi-maculato: cauda longiuscula, rectricibus lateraliibus aureo-viridibus albo-maculatis.
2. **CUCULUS klaasi**, Cuv. (Chalcites klasii, Less.) Lev. Ois. Afr. t. 212. - Sv. B. west. Afr. t. 21. ex Afr. mer. et occ. Æneo-viridis, subtus cum pectore albus: lateribus, alisque immaculatis: stria postoculari alba: rectricibus lateraliibus albis.
3. **CUCULUS auratus**, Gm. (cupreus, Gr. ex Bodd. nec Auct. Lampromorpha chalopepla, Vig. 1831.) Lev. Afr. t. 210. faem. 211. mas. - Nat. Misc. t. 1029. ex Afr. mer. et occ. Aureo-viridis, subtus cum pectore albus: lateribus viridi-fasciatis: capite, aliis, caudaque albo-viridis.
4. **CUCULUS smaragdineus**, Sic. Birds of west. Afr. p. 191. ex Africa occ. Splendidissime aureo-viridis, pectore quoque aureo, plumis rotundis, metallicis, tamquam squamatus: abdome crisoque flavis, immaculatis: cauda brevicaula, rectricibus extimis apice albis.
Quid Chrysococcyx smaragdinus, Blyth, J. As. S. Beng. 1846. p. 53. ex As. meridionali?

B. ASIATICI et OCEANIC.

5. CUCULUS *lucidus*, Gm. (nitens, Forst. - Sylvial versicolora? Lath.) Gen. Syn. t. 23. - Pl. col. 102. 1. - Gould, Austr. iv. t. 88. ex Australia, Amboina, N. Guinea. Ex cinereo cupreo-viridis; subtus cum pectore albus, aeneo-viridi late fasciatus: cauda brevi, fascia terminali nigricante; rectricibus lateralibus rufis: rostro a basi nigricante.
6. CUCULUS *plagosus*, Lath. (malayanus? Raffles. nec Gr. metallicus? Vig.) ex Asia mer. Aureo-viridis: subtus cum pectore albus, aureo-viridi cerebro fasciatus: copite, etiam adulti, rufescenti, aliquo immaculatis: rectricibus lateribus rufis: rostro basi flavo, apice nigrō.
7. CUCULUS *xanthorhynchus*, Horsf. (malayanus, Gr. Lampromorpha amethystina, Vig.) Zool. Res. Java. fig. pessima. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 117. immaturus! ex Java, Sumatra, Borneo. Intense violaceus, pectore quoque auro-violaceo; abdome albo: rectricibus omnibus violaceis, extima tantum albo-maculata: rostro a basi flavissimo. Juv. cupreo-viridis.
8. CUCULUS *chalcites*, Ill. (basalis, Horsf. - Chrysococcyx chalcites, Gr.) Temm. Pl. col. 102. 2. ex Java, Borneo. Auro-cinereus: subtus albido cinereo-fasciatus, abdomine medio immaculato: rectricibus lateribus albo-maculatis, basi externe rufis.
9. CHALCITES *osculans*, Gould, (Cuculus palliolatus? Lath.) Austr. t. 89. Cinereus, subtus albo-rufescens; macula auriculari nigra: cauda fusca apice alba, inferne albo-fasciata. Minime splendens! vix hujus generis!

SUBFAM. 42. CENTROPODINAE.

242. **Centropus**, Ill. (Polophilus, Leach - Corydonix, Vieill.) Afr. As. Oc. 22.

a. AFRICANI.

1. CUCULUS *senegalensis*, L. (aegyptius, Gm. - Corydonix senegalensis vel pyrrholeucus, Vieill.) Pl. enl. 322. Lev. Afr. t. 219. - Gal. Ois. t. 46. - Siv. B. of west. Afr. t. 20. - Exped. Egypt. t. 4. 1. ex Africa mer. orient. et occ. Medius (Long. 15-poli), Niger; alis rufis: subtus albus.
2. C. *rufinus*, Cuv. (burchelli? Sic. - Polophilus rufus, Steph.) Lev. Afr. t. 221. ex Africa mer. Minor: ex toto rufo-cinnamomeus, plus minus variegatus: alis brevissimis; cauda valde elongata.

3. CUCULES **nigrorufus**, Cuv. (Corydonix bicolor, Vieill.)

Lev. Afr. t. 220, ex Africa mer. Major (Long. ultra sesquiped.): atro-violaceus; speculo alari rufo.

4. **C. superciliosus**, Rüpp. Faun. Abyss. t. 21. 1. ex

*Africa orient. Medius (Long. 14-poll.): fusco-cine-
reus; subtus ochraceus; alis sensim rufescens; plumarum
rachidiibus et superciliis albidis.*

5. **C. monachus**, Rüpp. Faun. Abyssin. t. 21. 2. ex

*Africa orient. Major (Long. fore sesquipedal.): pur-
pureo-niger; subtus albus; alis, dorsoque abrupte rufis.*

6. CUCULES **tolu**, Gm. (Centropus melanorhynchus, Gr. ex

*Bodd. - affinis? Less. nec Horsf.) Pl. enl. 295. 1. - Lev.
Afr. t. 219. ex Madag. Fusco-rufescens, rachidiibus al-
bis; alis rufis; abdomen saepè nigrum.*

7. **C. aethiops**, Cuv. (Corydonix nigerrimus, Vieill.)

*Polophilus maurus, Steph.) Lev. Afr. t. 222. ex Afr.
mer. Minimus (Mogn. Turdi viscivori): ex toto niger opacus.*

*8. **C. epomoides**, Temm. Mus. Lugd. ex Africa occ.

*Guinea. Minor (Longit. paucilla ultra pedal.): viridi-ni-
ger; alis abdomine rufis: rostro brevissimo, subaduncu.*

Jun. genis pectoraque albido-rufis; alis nigro-undulatis.

*9. **C. francisci**, Bp. Mus. Lugd. ex Guinea. Major

*(Longit. ultra sesquipedal.): chalybeo-virens; abdomine late al-
bidio; alis interscapilioque abrupte purpurascens-rufis: cauda
aeneo-nigra; tectricibus superioribus elongatis, griseo-vermi-
culatis: rostro longiusculo, valde compresso.*

Francisco Schlegelo, nominis digno, Medico cor-
dis cordato, cui multa auxilia debeo,
dicatus!

*b. ASIATICUS.*10. CUCULES **viridis**, Scopoli (bengalensis, Gm. - Centropus

dimidiatus et chlororhynchus? Blyth. - philippensis
var. bengalensis? Less. - Corydonix maculatus, Vieill.)

*Delic. Flor. et Faun. Insubr. ex Asia. Medius (Lon-
gitud. 16½-poll.): niger, cyaneo-micans; alis et interscapilio
rubro-castaneis: rostro elongato, gracili.*

*c. OCEANIC.*11. CUCULES **philippensis**, Cuv. (babutus, Horsf. - Cu-

culus aegyptius var. β . Lath. - Corydonix pyrrhopterus,
Vieill. - Polophilus sinensis, Steph. - Centropus eury-
cercus? Hay.) Pl. enl. 824. Zool. Res. Java, fig. ex
Ins. Phil. Borneo. Major (Long. 21-poll.): niger, cya-
neo-micans; alis interscapilioque abrupte aureo-rufis.

- * 12. *C. medius*, Müll. Mus. Lugd. (melanops? Less. jun.)
Sonn. Voy. t. 80. ex Amboina, Java. Medius (Long. 15-poll.): niger, viridi-micans; alis et interscapilio sensim cinnamomeo-rufes: rostro levè, curvo, robusto.
- * 13. *C. molkenboeri*, Bp. (Centropus philippensis var. sumatrana? Less.) Mus. Lugd. ex Philippinis. *Minor (Longitud. 13-poll.): niger, viridi-micans, rachidibus lucidis: alis interscapilioque gradatim purpurascens-cupreis: rostro robusto, rectiusculo, elongato.*
Salutifero genio H. J. Molkenboeri, Viri illibati, Botanici indefessi, dicatus!
14. *C. affinis* et lepidus, Horsf. (pumilus, Less.) *Minimus (Longitud. vix pedal.): atro-niger; alis rufes, tectricum rachidibus saepius albis: rostro brevissimo, aduncus.*
15. *C. violaceus*, Quoy et Gaim. *Voy. de l'Astrol. Ois. t. 19. ex N. Guinea. Magnus (Long. 21-poll.): omnino caeruleo-ater: rostro nigro.*
16. *C. celebensis*, Quoy et Gaim. (bicolor? Less. nec Vieill.) *Voy. de l'Astrol. Ois. t. 20. faem. ex Celeb o s. Magnus (Long. bipedal.): griseo-rufus, subtus dilutior: rostro fuso-corneo.*
17. *C. menebiki*, Less. et Garn. (venatorius, Müll. Mus. Lugd.) *Voy. Coq. t. 34. ex Nova Guinea. Magnus (Long. bipedal.): ex toto viridi-ater: rostro albidente.*
18. *C. ateralbus*, Less. et Garn. *Voy. Coq. t. 33. ex Nova Hibernia. Magnus (Long. ultra semipedal.) purpureo-niger: capite, collo, pectore, speculoque alari magno, albis: fronte atro: rostro nigricanti.*
- * 19. *C. goliath*, Forsten. Mus. Lugd. ex Gilolo. *Maximus (Long. 28-pollic.): atro-niger: speculo alari magno albo: rostro robusto, nigro.*
- d. AUSTRALASIANI.
20. *Coccyzus phasianus*, Lath. (Polophilus phasianus, variiegatus, leucogaster et lathami, Leach. - Centropus gigas, Cuv. - phasianus, Gr. - Corydonix giganteus, Vieill.) Leach, Zool. Misc. t. 46. 51. 52 et 56. - Vaill. Afr. t. 223. - Gould, Austr. iv. t. 92. mas et faem. ex Austr. occ. m. *Magnus (Long. subbipetal.): niger, plumarum rachidibus micantibus: alis et interscapilio rufes, ochraceo-lineolatis: canda ochraceo plus minus undulata: rostro brevissimo, robusto, valde incurvo.*
21. *C. macrourus*, Gould, Austr. Intr. p. 68. fig. nulla. ex Austr. sept. occ. *Major praecedentis: rostro longiore, minus incurvo: canda variegata.*
22. *C. melanurus*, Gould, Austr. Intr. p. 68. fig. nulla. ex Austr. sept. occ. *Minor praecedentium: rostro gracilliori: canda fore unicolori.*

SUBFAM. 43. COCCYZINAE.

243. **Coua**, Cuv. (*Serisomus, Sw.*) Madag. Afr. or. 6.
1. **CUCULUS madagascariensis**, Gm. (*gigas, Bodd.*
Coccyzus virescens, Vieill. - *Coua gigas, Gr.*) *Pl. enl. 815.*
ex Madag. Major (Longit. 21½ poll.) viridi-aeneus: pectore olivaceo; gula albicante: abdomine castaneo; crasso nigricante: rectricibus apice albis.
 2. **CUCULUS caeruleus**, L. (*Coua caerulea, Gr.*) *Pl. enl. 295. 2. - Levail. Ois. Afr. t. 218. - Vieill. Gal. Ois. t. 41. ex Madagascar. Omnisca caeruleus; cauda chalybaea: rostro brevissimo: pedibus brevibus.*
 3. **CUCULUS cristatus**, L. (*Coua cristata, Gr.*) *Pl. enl. 589.*
Levail. Ois. Afr. t. 217. ex Madag. Glaueus; cristatus; subtus albus, jugulo rufo: rectricibus cyaneo-chalybaeis, apice albis.
 4. **COCZZUS delalandii**, Temm. (*Coua delalandi, Gr.*) *Pl. col. 440. ex Madagascar. Azureus; subtus albus, ventre crisoque rufo-cinnamomeis: rectricibus atro-chalybaeis, apice albis.*
 5. **C. serriana**, Pucheran, Mag. Zool. 1845. t. 55. *ex Madagascar. Olivaceus; píleo concolori: pectore rubro-castaneo; gula, abdomine, caudaque nigris.*
 6. **C. reynaudi**, Pucheran. (*ruficeps, Gr.*) Mag. Zool. 1845. t. 56. - Mitch. Gen. B. t. 115. *ex Madagascar. Glauces: loris nigris; píeo rufo: subtus cinereus; alis caudaque cyaneis. Philosopho insigni omnes doctrinas eadem laude complectenti, Gallicae Scientiarum Academiae decori futuro sacra!*
244. **Cultrides**, Pucheran. America mer. 1.
- COCZZUS geoffroyi**, Temm. (*Cultrides geoffroyi, Pucher.*)
Pl. col. 7. ex Brasilia. Viridi-aeneus, capite cristato juguloque cinnamomeis, fusco undulatis: fascia pectorali nigra.
245. **Diplopterus**, Boie (*Macropus, Spix - Dromococeyx, Wied. - Guira, Less. - Octopteryx, Kaup - Ptiloleptis, Sw.*) America mer. 5.
1. **CUCULUS naevius**, L. (*Diplopterus naevius, Boie*) *Pl. enl. 812. ex Brasil. Cristatus: minor: rufo-cinereus, plumis medio longitudinaliter nigris.*
 - *2. **Diplopterus lessoni**, Bp. Mus. Paris. *ex Brasil. Cristatus, uti praecedens, cui similis; sed duplo major!*

3. **COCCEUS guira**, Gm. (Crotaphaga piririgua, Vieill. ex Azara 262. - Ptiloleptis cristatus, Sw.) Gal. Ois. t. 44. Icon. Règn. An. Ois. t. 31. - Voy. Uran. Ois. t. 26. ex Brasilia. Albidus; cristatus: remigibus, rectricumque fascia lata, nigris: rostro rubent: oculis ciliatis!
4. **MACROPS phasianellus**, Spix. (Piaya macroura, Verri. - Diplopterus phasianellus, Gr. - Caculus punctulatus? Gm. jun.) Av. Bros. t. 42. ex Bras. Fusco-aeneus, plumis singulis apice albis; subtus albus: rectricibus caudae superioribus preelongis, laxis, recumbentibus.
5. **COCCEUS galeritus**, Ill. (Coccyzus chochi et chiriri, Vieill. ex Azara 266. 269. - Piaya chiriri, Aliq. - Diplopterus galeritus, Hartl.) ex Brasil. Crista fulva nigroviraria: genis rufis, superciliis albis: alis trifasciatis, caudaque fuscovenusta.
6. **PIAYA brasiliiana**, Less. (Diplopterus brasilianus, Gr.) Rev. Zool. 1839. p. 41. ex Brasil. Crista rufa nigroviraria: genis aliisque griseis: speculo alari violaceo.

246. **PIAYA**, Less. (Coccyzua, Less.)

Amer. calidior. 9.

- *1. **P. circe**, Bp. (Tingazu? Azara, 265) Mus. Lugd. ex Columbia. Maxima (Longit. 19-poll.-Caud. 12½): cupreorufa, pileo concolore: abdomine ardesiaco, crasso nigricante: cauda elongata; rectricibus subtus nigricantibus, omnibus apice albis, mediis proximas valde excentribus.
2. **COCCEUS cayanus**, L. (cayensis, Brisson. - Coccyzus macrocerus, Vieill. ex Azara, 265. - C. cayensis, Sw.) Pl. enl. 211. - Briss. Orn. iv. t. 8. 2. ex Bras. Cayenn. Mexico. Major (Long. 16½-poll. - Caud. 10). Rufo-cinnamomeus, pileo concolore: abdomine dilute ardesiaco, crasso vix fuscente: cauda elongata; rectricibus undique laete rufis, omnibus apice albo macula subterminali nigra, mediis proximas excentribus: rostro fuscocorneo.
- *3. **P. mehleri**, Bp. Mus. Lugd. ex S. t. a Fe de Bogota. Similis praeced. sed minor (Long. 15-poll. - Caud. 9½): rostro robustiori: rectricibus omnibus macula nigra obsoleta, mediis, subtus et ipso apice rufis, proximas vix excentribus. Ab exiguo doctrinac eximio litterarum Cultori, Eugenio Mehlero dicata!
4. **COCCYZUS rutilus**, ex Avi, et minutus, ex Br. Vieill. (Coccyzus cayanus var. β. Gm. - Cue. cayensis minor, Br. monachus, Cuv. - Coccycena rutila, Less. - Piaya rutila et minuta, Gr.) Briss. Orn. iv. t. 16. 2. ex Cayenna. Minima (Long. 10-poll. - Caud. 5½): rubro-ferruginea, pileo concolori; subtus vix dilatior; ventre crisseque ardesiaceis: rectricibus omnibus apice albis: rostro flavicante.

5. **P. brachyptera**, Less. (Cuculus cayanus var. γ. Gm.

Macropus caixana, Spix) Av. Bras. t. 43. ex Brasil.
Media (Long. 15-poll. - Caud. 8): *purpurascens-cinnamomea*,
pileo cinereo; abdomine nigricante: alis brevissimis: rectri-
cibus fascia subterminali nigra, apice albis: rostro rubenti.

6. **P. erythropygia**, Less. Rev. Zool. 1842. p. 209. ex

Amer. centr. S. Carlos. Brunneo-olivacea: uropygio
et corpore subtus rufis: alis caudaque virescentibus: rostro
flavo, superne nigricante: pedibus rubris.

7. **CUCULUS pluvialis**, Gm. (Coccyzus jamaicensis, Hartl.

Piaya cinnamomeiventris, Laf. - pluvialis, Gr.) Sloan.
Jam. 258. 1. ex Jam. Major: viridi-aenea, capite fusc-
escens: subtus cum rectricibus alarum inferioribus castanea;
gula late alba; pectore cinerascente: rectricibus atro-chaly-
baeis apice albis.

8. **CUCULUS ridibundus**, Gm. (mexicanus, Briss. - Coc-

cyzus ridibundus, Vieill. - Piaya ridibunda, Gr.) ex
Mexico. Major (Long. 16-poll.): fulvo-rufa: subtus cine-
rea; abdomine nigro: rectricibus fulvo-nigricantibus.

9? **CUCULUS cornutus**, L. (Piaya cornuta, Gr.) Willughby,

Orn. t. 38. ex Brasil. Tota fuliginosa: cauda apice alba:
capite crista bifida, cornu aemulante!

247. **Coccyzus**, Vieill. (Coccyzon, Glöger - Cureus, Boie.

Erythrophrys, Siev. - Coccyzus, Nitsch.) Am. s. et centr. 6.

1. **CUCULUS americanus**, L. (carolinensis, Brisson,

Wilson. - cinerosus, Temm. - Coccyzus pyrrhocer-
rus, Vieill. - Erythrophrys americanus, Siev.) Pl. enl.
 816. - Vieill. Am. s. fig. - Wils. Am. Orn. t. 28. 1.
 Aud. Am. t. 2. - Gould, Eur. t. 242. ex Amer. sept.
 Eur. acc. *Cinereus, subtus albus: remigibus interne rufis:*
rostro subtus flavo: annulo oculare luteo.

2. **CUCULUS erythrophthalmus**, Wils. (Coccyzus ery-

throphthalmus, Bp. - Piaya erythrophthalma, Less.)
Am. Orn. t. 28. 2. - Aud. Am. t. 28. 2. ex Amer. sept.
Cinereus, subtus albus: remigibus unicoloribus: rectricibus
omnibus dorso concoloribus, sine nigredine, apice albis: rostro
ex toto nigro: annulo oculare rubro.

3. **CUCULUS minor**! Gm. (*seniculus*, Lath. - Coccyzus me-

lanocoryphus? Vieill. ex Azara 267. - Piaya minor, Less.)
 Pl. enl. 813. - Aud. Am. t. 169. ex Antill. et Amer.
 sept. meridionalibus tantum. *Major: griseus;*
subtus rufo-ochraceus: remigibus unicoloribus: rectricibus la-
terobilis nigris, omnibus apice albis: maxilla nigra, man-
dibula flava.

4. *Cuculus dominicus*, L. (dominicensis, Br. - Piaya dominica, Gr.) Briss. Orn. iv. t. 9. 2. ex Ins. S. ti

Dominici. Minor; ex virescenti-cinereus, capite griseo; subtus albo-rufescens; gula etiam rufescens; rectricibus mediis exceptis, atro-cyanis albo terminatis: rostro nigerrimo.

5. *Coccyzus cinereus*, Vieill. (melanorhynchus, Cuv.

Piaya melanorhyncha, Less. - cinerea, Gr.) Azara 268. ex Brasil. mer. *Cinereus*, alis concoloribus; capite griseo; subtus flavo-rufescens; gula alba; rostro nigro.

*6. *Coccyzus lansbergi*, Bp. Mus. Lugd. ex S. t. Fe de Bogaota. *Rufus*, capite plumbeo; subtus flavo-ferrugineus: remigibus ex toto rufis; rectricibus omnibus atro-caeruleis, mediis exceptis, apice albis: rostro nigerrimo.

Museo Lugdunensi missus a R. VAN LANSERGE legato Neerlandiae apud Republicas Columbianas, Cultore et Fautore Scientiarum Naturalium.

FAMILIA 20. PICIDAE.

SUBFAM. 44. YUNGINAE.

248. *Yunx*, L. Eur. As. Afr. 5.

1. *Yunx torquilla*, L.-Plen. 698. - Gould, Eur. t. 233.

ex Eur. As. occ. Afr. sept. Gula, pectore, criso que albida.

*2. *Yunx japonica*, Bp. (Y. torquilla ex Japonia, Schleg.)

Mus. Lugd. ex Japonia. Similis praecedenti, sed valde minor, et coloribus dilutioribus.

3. *Yunx indica*, Gould, 1849. (phalaena, Bp. in litt.)

B. of As. 1. t. 15. ex India occid. Major: jugulo castaneo; abdomine albido, striis fuscis parum conspicuis: criso albo-cinnamomeo.

4. *Yunx pectoralis*, Vig. 1831. (ruficollis, Licht.)

Mag. Zool. 1835. Ois. t. 33. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 112. ex Africa mer. Minor: jugulo castaneo: abdo mine fuscens, striis nigris conspicuis: criso rufa.

5. *Yunx aequatorialis*, Rüpp. 1845. Orn. Faun.

Nord-Ost. Afr. t. 37. ex Africa or. Abyssinia. Jugulo, pectoris, abdominalisque parte, castaneis: criso ferrugineo.

SUBFAM. 45. COLAPTINAE.

249. *Meiglyptes*, Sw. (Micropternus, Blyth - Phaiopicus, Malm.) Asia mer. Oc. 3.

a. MEIGLYPTES.

1. *Picus tristis*, Horsf. (poicilophous, Temm.) Pl. col. 197. 1.

x Java, Sumatra, Borneo.

2. **Hemicercus brunneus**, Eyton 1839. (*Picus marginatus*,
Reinw. *Ms.* 1821. - *tukki*, Less., 1839. - *luridus*, Nitzzsch.

Meiglyptes brunneus, Gr.) ex *Malacca*, Eyton. *Sumatra*, Müller. *Vix cristatus*: nigro-olivaceus flavido undulatus, capite pectore abdomineque medio immaculatis, gula minute striata; cervico utrinque vitta flava marginata. *Mas. fasciola mystacali rubra*.

b. Phaiopicus. Gula squamulata nec striata.

3. **Picus rufinotus**, Math. 1844. (rufus? J. Gr. nec Lath.
Meiglyptes badius, Hodgs. - *Micropternus phaioceps*,
Blyth - *Phaiopicus blythii*, Math. 1849.) *Ill. Ind. Zool.* 1.
t. 29. 2. - *Mus. Britann.* ex *Asia centr.* Fusco-testaceus, nigro-lineatus: major: crista occipitali crassa, laza, capite concolori.

4. **Meiglyptes gularis**, Jerd. (*M. pyrrhotis*, Hodgs.
Micropternus gularis, Blyth - *Picus phaiopus*, 1845. hinc
Phaiopicus jerdoni! Math. 1849!!) *Mus. Brit.* ex *As.*
m e r. Medius: crista occipitali breviori, minus conspicua.

5. **Picus brachyrurus**, Vieill. (*badius*, Raffles. - *Meiglyptes brachyrurus*, Gr.) ex *Sumatra*. Minor: *vix cristatus*; colore obscuriore: gula tamquam squamata, plumulis nigris, margine albis.

* 6. **Picus badiosus**, Temm. *Mus. Lugd.* ex *Borneo*.
Similis praecedentis; sed minor, et gula concolori, vix punctulata.
Genus vix hujus Subfam. potius ad *Hemicercos* approximandum!

250. **Geocolaptes**, Burch. (*Colaptes*, p. Gr.) Africa m. 1.

Picus arator, Cuv. (olivaceus? Lath. - *Geocolaptes terestrис*, Burch. - *Colaptes olivaceus*, Steph.) *Levaill.*
Afr. t. 254. ex *Capite Bonae Spei*. Fuscus, albo punctatus, capite cinereo; subtus albidus rubro induitus: uropygio coccineo: remigibus rectricibusque subtus auratis.

251. **Colaptes**, Sw. (*Geopicus*, Malherbe.) America. 9.

1. **Picus auratus**, L. - *Pl. enl.* 693. - *Wils. Am. Orn.*
t. 3. 1. - *Aud. Am.* t. 37. ex Amer. sept. orient.
Pileo et cervico griseo-vinoceis: dorso fasciato: abdomine maculato: remigum rectricumque rachidibus auratis.
Mas. maxilla mystacalis nigra.

2. **Colaptes ayrest**, Audub. *B. of Am.* 2.^{da} ed. t. 494.
ex Amer. sept. occ.

3. *Picus rubricatus*, Licht. (rubicatus mas. Wagl. - rubricotis, Mus. Lugd. - Colaptes mexicanus, Sw. - rubricatus, Bp. Gr.) *Aud. Am. t. 416. 1. ex Am. s. occ. Mex.*
Pileo et cervice griseo-cinereis: dorso fasciato: juguli fascia nigra latissima: abdomine maculis rotundis sparsis: remigium rectricumque rachidibus rubris. Mas. macula mystacali rubra. Faem. macula mystacali evanida.
4. *Colaptes collaris*, Vig. 1830. (mexicanoides, Lafr. 1844. - C. rubricatus, p. et mexicanoides, Gr. - *Picus rubricatus* faem! Wagl.) *Beech. Voy. Zool. t. 19. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 111. mas. ex Mexico mer.* *Similiterus praeceps. (an spec. distinctus?)*: rostro breviori: pileo et cervice rufis: fasciis dorsibus angustioribus, crebrioribus: maculis abdominalibus minus rotundatis: remigium rectricumque rachidibus supra nigris, subtus auratis. Mas. macula mystacali rubra. Faem. macula mystacali obsolete cinnamomea.
5. *Colaptes fernandinae*, Vig. - *La Sagra, Voy. Cuba, Ois. t. 24. ex Insula Cuba.* Ex toto aureo-rufescens, nigro fasciatus: pileo genisque rufis: remigium rectricumque rachidibus supra nigris, subtus auratis.
6. *Colaptes brasiliensis*, Sw. ex Amer. mer.
7. *Picus pitius*, Molina. (chilensis, Lesson - eculinus, Licht. - *Colaptes pitius*, Gr.) *Voy. Coq. t. 32. ex Amer. mer. o c i d.* Fusca albito-lineata; subtus albus nigro ecclatibus: pileo cinereo; gula uropygioque albis: remigium rachidibus auratis.
8. *Colaptes rupestris*, Orb. *Voy. Am. m. Ois. t. 62. 1. ex Amer. mer.* Flavidus, subtus maculis rotundis nigris: dorso aliquo rufescenti nigreque fasciatis: pileo nigro.
9. *Picus elegans*, Fraser, nec Sw. (rivoli, Boissonn. - *Colaptes elegans*, Bp.) ex S. Fe de Bogota, Mexico. Loris, genis et abdome luteis; occipite dorsaque rubris; pectore uropygioque undis squamiformibus vario-coloratis: remigium rachidibus auratis. Mas. pileo mystacibusque rubris. Faem. pileo mystacibusque nigris.
 Species valde abnormis: media quasi inter *Colaptes*, *Melanerpes*, et *Centurus*!

SUBFAM. 46. PICINAE.

252. *Leuconerpes*, Sw.

Amer. trop. 3.

PICUS dominicanus, Vieill. ex Azara 254. (candidus, Otto. - melanopterus, Wied. - bicolor, Sw.) *Spix. Av. Br. t. 50. - Zool. Ill. n. s. t. 38. ex Brasil. Albus, ventre sulphureo; striola postoculari, dorso, alis, caudaque nigris.* Mas. jugulo nuchaque, sicut et abdome, sulphureo indutis.

253. **Melanerpes**, Sw. (*Melampicus*, *Malh.*) America. 11.
1. **Picus erythrocephalus**, L. (*tricolor*, Vieill. nec *Gm.*
obscurus, *Lath.* jun.) *Pl. col.* 117. - *Ois. Am. s. t. 112.*
mas. ad. 113. jun. Wils. Am. Orn. t. 9. i. ad. - Bp. Am.
Orn. t. 14. 3. jun. - Aud. Am. t. 27. ex Amer. sept.
Niger, capite colloque rubris: abdomine, speculoque alari mag-
no, albis. Jun. capite colloque fuscis.
 2. **Picus torquatus**, Wils. (*lewis*, Drapiez.) *Am. Orn.*
t. 20. 3. - Aud. Am. t. 416. 7. 8. ex Amer. sept.
occid. Splendido nigro-viridis; facie abdomineque rubris;
pectore et torque lato cervicali griseo-pruinosis.
 3. **Picus ruber**, Gm. (*flaviventris*, Vieill. nec *Sw.*) *Aud.*
Am. t. 421. ex Amer. sept. occ. Niger; capite, collo,
pectoreque coccineis: alis albo-maculatis: abdomine flavescenti.
 4. **Picus rubidicollis**, Vieill. (*portoricensis*, Daud.) *Ois.*
Am. s. t. 117. - Shaw, Nat. Misc. t. 22. - Mus. II.
Nat. n. t. 51. ex Antill. S. Doming. Coracino-
niger; alis caudaque nigris opacis: fronte, loris, orbitis, uro-
pygoque albis: subtus ruder, lateribus fuscenscentibus; criso
griseo, unicolor.
 5. **Melanerpes formicivorus**, Bp. ex Swains. (*Picus*
flavigula, Natterer, *Mus. Vienn.* nec *Gr.* - *Melampicus*
flavigula, *Malh.* 1849.) *Pr. Zool. Soc.* 1837. p. 109. *ex*
Mexico, Columbia. Ex chalybeo niger; fronte late,
uropygio, remigumque fascia basali, albis: gula flava: men-
to et capistro nigris: pectore nigro striis undique albis: ab-
domine albo, lateribus crissaque nigro-striatis.
Mas. fronte alba, vortice nigro, occipite anguste coccineo.
Faem. sincipiote albo, occipito chalybeo-nigro, dorso concolori.
 6. **Picus melanopogon**, Licht. (*formicivorus*, p. *Aliq.*
Melampicos melanopogon, *Malh.* 1849.) *Pl. col.* 451.
faem. nec mas! ex Brasil. Chalybeo-niger; fronte late,
uropygio, remigumque fascia basali, albis: gula alba; mento et
capistro nigris: pectore nigro, striis postice tantum albis.
Mas. fronte alba, vortice et occipite late coccineis.
Faem. fronte alba, vertice nigro-chalybeo; occipite late rubro:
(mari praecedentis similis!)
 7. **Picus meropirostris**, Wagl. (*Melanerpes meropi-*
rostris, Bp.) *Syst. Av.* sp. 65. *ex Amer. mer. Niger;*
fronte rubra: vitta superciliaris alba, postice aurea; uropygio
candido; abdomine medio coccineo; lateribus, crissaque, remigi-
busque albo nigroque fuscatis. Rostrum subincircum, ca-
rinis acutis.
 8. **Picus herminieri**, Less. (*Melanerpes l'herminieri*,
Gr.) *Tr. Orn.* p. 228. - *O. des Murs. Pl. p. 38. ex An-*
tillis. Nigerinus, pectore abdominali sanguinice.

9. *Picus flavifrons*, Spix (rubriventris, Vieill? nec Sw. Azara 255. - coronatus, Licht. - erythrogaster, Beckl. Tripurus flavifrons? Sw. - Centurus!flavifrons, Gr.) Av. Br. t. 52. mas. et faem. ex Brasilia. *Nigerrimus*, dorso albo; fronte gulaque auratis; pectore griseo-olivaceus; abdomine coccineo; lateribus et crasso nigroflavoque undulatis.
10. *Picus hirundinaceus*, Gm. (flavipes et ischnorhynchus, Wagl. - Centurus! eruentatus, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 694. 2. - Vieill. Am. s. t. 115. ex Cayenna. *Nigerrimus*; superciliis, nucha, uropygioque latissime, albis; abdomine medio rubro; lateribus, crasso, tectricibusque alarum inferioribus, albo nigroque fasciatis.
11. *Picus rubrifrons*, Spix. - Av. Br. t. 55. ex Brasil. sept. *Nigerrimus*; vertice et abdomine medio coccineis; hypochondris et crasso albido nigro-fasciatis; uropygio latissime candido: remigibus rectricibusque maculis albis quadratis: alis elongatis!
254. **Chloronerus**, Sw. (Mesopicus! et Chloropicus! p. Malh.) Amer. trop. 17.
1. *Picus aurulentus*, Licht. (chrysochlorus et auratus, Vieill. ex Azara 256, 257. - macrocephalus, Spix. - brasiliensis, Sw. - xanthotaenia, Wagl. - Chloronerus aurulentus, Gr.) Pl. col. 59. 1. - Av. Bras. t. 53. 2. - Zool. Ill. t. 20. mas. ex Antill. Amer. mer. Olivaceus, subtus flavido-rufescens nigricanti-fasciatus: capitis et collis lateribus flavo-rufescenti et olivaceo vittatis: gula flava; remigibus, rectricibusque nigris, immaculatis. Mas. pilos subcoristato, mystaculus rubris.
 2. *Picus maculipennis*, Licht. (Chloronerus maculipennis, Gr.) ex Brasil. Olivaceo-viridis, subtus albus viridige fasciatus: pileo, mystacibusque rubris: gula, loris et superciliis auro-flavis: remigibus nigris rufo-maculatis.
 3. *Picus chlorocephalus*, Gm. (icterocephalus, Lath. Chloronerus flavigula, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 784. - Spix, Av. Bras. t. 54. 2. ex Brasil. Olivaceus; subtus albus olivaceo fasciatus: genis totis, gulaque luteis: Mas. pileo mystacibusque rubris. Faem. occipite tantum late coccineo.
 4. *Picus erythrops*, Vieill. nec Gm. (icterocephalus var. Lath. - icterocephalus mas. Spix. - Chloronerus erythrops, Gr.) Av. Bras. t. 54. 1. ex Brasilia. Olivaceo-auratus: subtus albido, olivaceo-fasciatus: genis et collis lateribus flavis: gula rubra. Mas. pileo et nucha rubris. Faem. siapite flavo vix aurantiae; occipite et gula tantum rubris.

5. *Picus flavicollis* et maculatus? ex Azara 259, Vieill. (Chloronerus flavigollis et maculatus, Gr.) *N. Dict. H. Nat. xxvi. p. 74.* ex Brasil. mer. Nigricans, albido fasciatus; subtus maculis longitudinalibus, anticis albis et nigricantibus, posticis nigricantibus et pallideflavis; capitis plumis flavidis nigro-marginatis: pileo coccineo: alis pulchro albo-maculatis; tectricibus inferioribus stramineis.
6. *Picus squamosus*, Vieill. nec Less. (Chloronerus squamosus, Gr.) *N. Dict. H. Nat. xxvi. p. 74.* ex Guiana. Ex rufa virens, capite griseo; subtus cinereus, plumis albis nigrisque tamquam squamatus.
7. *Picus spilogaster*, Wagl. (Chloronerus spilogaster, Gr.) Azara, 258. ex Bras. mer. Ex fuscocento flavidio-olivaceus; subtus olivaceo-rufescens, plumis singulis maculis guttiformibus quatuor albis: pilei plumis strictis, coccineis, subsericeis: remigibus intus albo-maculatis: restrictibus fasciatis.
8. *Picus polyzonus*, Temm. (Chloronerus polyzonus, Gr.) ex Brasil. Rufofuscus; capite rufo, linea infraoculari flava; subtus nigro rufoque fasciatus.
9. *CHLOROPICUS rufoviridis*, Malherb. (Chloronerus rufoviridis, Gr.) *Rev. Zool. 1845. p. 401.* ex Am. mer. Fusco-olivaceus; sincipito nigro, punctulis rufis: occipite, guaque fuscis, punctulis nigris: pectore et abdомino nigro, rufescenti et olivaceo fasciatis.
10. *CHLOROPICUS kirki*, Malherb. 1845. (Mesopicos kirki, Math. 1840. - Chloronerus kirkii, Gr.) *Rev. Zool. 1845. Jard. Contr. Orn. 1848. t. 2.* ex Insula Tabago. Ex flavicante olivaceus; subtus viridi-fuscus albo-rufescens: fasciatus: pileo uropygio cinnabarinis: nucha utrinque flavo-marginata.
11. *MESOPICUS cecilius*, Math. *Rev. Zool. 1840. p. 538. sp. 11.* ex Columbia. Valde praecedenti affinis; sed minor: gula magis alba; striis abdominalibus duplo crebrioribus. Mas. capite non cristato, et uropygio coccineis. Fem. capite fusco-virente, albido punctulato.
12. *Picus affinis*, Sic. (maculifrons et ruficeps, Spix - adspersus? Natter. - passerinus ex Bras. Mus. Lugd. - Chloronerus affinis, Gr.) *Zool. Ill. t. 78. - Av. Bras. t. 56. 1. 2. 3.* ex Brasil. Olivaceus; subtus fusco-olivaceo et sordide albidio lineato-fasciatus: pileo cum fronte coccineo, plumis brevibus, acutis, basi nigrit; nuchae longioribus, aureo-flavis: cauda nigra, fasciolis olivaceis continuis.
13. *Picus passerinus*, L. (Dendrobates passerinus, Gr.) Vieill. *Ois. Am. s. t. 115.* mas. ex Antill. Minor; olivaceo-flavicans; subtus fusco albidoque lineato-fasciatus: pileo coccineo; fronte, et capitis lateribus griseo-rufescentiibus: cauda nigra, fasciolis olivaceis, interrupta.

14. *Picus rubiginosus*, Sw. (aeruginosus? *Licht.*-plumbiceps, Temm. *Mus.* Lugg. faem. - Chloronerves rubiginosus et aeruginosus, Gr.) *Zool. Ill. t. 14.* - *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 110.* ex *Venezuela. Antill.* *Aurantio-olivaceus; subtus flavidus, fuscovirenti lineato-undulatus; sincipite nigricante; genis albis, occipite rubro.*
Mas mystacibus superciliisque rubris.
Faem. superciliis mystacibusque nigris.
15. *Picus percussus*, Vig. (rüppelli, Wagl. - *Dendrobates percussus*, Gr.) *Pl. col. 390.* 424. faem. ex *Ins. Cuba.* *Cinereo-ciridus, tergo flavidore; subtus flavidus, pectoro striis, lateribus crissaque fasciatis, nigris: abdomine medio pure sulphureo: fronte genisque candidis; gula media et vitta utrinque pone oculos, nigris: pileo et macula magna jugulari sanguineis.*
16. *Picus fumigatus*, Orb. et Laf. (Dendrobates fumigatus, Gr.) *Voy. Am. m. Ois. t. 63.* i. ex Amer. mer. *Ex rufescens-fuliginosus, unicolor; alis caudaque obscurioribus: pileo rubro.*
Quid P. nigriceps, Orb. rufo-fuliginosus, maculis obsoletis rubentibus; subtus griseo-olivaceo nigroque fasciatus; pileo nigerrimo?
18. *Mesopicus desmursii*, Malh. *Rev. Zool.* 1849. p. 537. *sp. 10. ex America mer. Olivaceus; subtus albidus, nigro striatus; fronte rufescens; pileo, uropygione coccineis; genis bivittatis; alis nigricantibus, maculis albidis; canda fasciolata; remigum rectricumque scopis subtus flavis.*
Continuatori Buffoni et Temmincki Iconibus pulcherrimis dicatus.
255. *Centurus*, Sw. (*Tripsurus*, Sw. ob quinam monomaniam!
Zebraicus! Malh.) America. 9.
1. *Picus superciliaris*, Temm. (superciliosus, Vig. - Colaptes superciliaris, Gr.) *Pl. col. 433.* - *La Sagra, Voy. Cuba, Ois. t. 23.* var. alb. ex *Ins. Cuba.* *Maximus; albo-nigroque lineatus; subtus pallide olivaceus, abdomine medio rubro; fronte alba; pileo coccineo, cristato; superciliis nigris; remigum scopis nigricantibus.*
 2. *Picus radiolatus*, Wagl. (*lavaratus*, Temm. - *albifrons*, Kuhl, an Sw?) - *Centurus radiolatus*, Gr.) *Pl. ent. 597. Edw. B. t. 244.* ex *Jamaica.* *Major; niger, striolis albidis angustissimis; fronte, superciliis, genis, gulaque albidis; vertice, occipite nuchaque coccineis; pectoro, abdomeque medio aurantiaco; crasso nigro albo-lineato; rectribus nigris.*

3. **Picus carolinus**, L. (griseus, Vieill. - zebra, Bodd.
erythrauchen, Wagl.) Pl. col. 692. - Vieill. Ois. Am.
s. t. 116. - Aud. Am. t. 415. 3. ex Amer. sept.
Albo nigroque striatus, fronte albo-rubella; subtus ruber, la-
teribus capitis et corporis, gulaque griseis: criso maculis
longitudinalibus cordiformibus; rectricibus omnibus albo-
fasciatis. Mas. pileo late aureo-ruberrimo. Faem. capite ci-
nereo; occipe tantum rubro.
4. **Picus striatus**, Lath. nec Gm. (Centurus striatus, Gr.)
Pl. enl. 281. 614. - Vieill. Ois. Am. s. t. 114. mas. ex
Ins. Si. Dominic. Flavo-olivaceus nigro-fasciatus:
fronte, genis, gulaque griseis: occipite tectricibusque caudae
superioribus rubris; abdomine crissaque olivaceis, immacula-
tis: remigibus rufo-maculatis: rectricibus omnibus immacu-
latis, dualbus utrinque extimus griseo-marginatis.
Quid P. striatus, Gm. nec Lath. (fasciatus, Lath. - Chlorenerpes
fasciatus, Gr.) [?]Nigricans; subtus cum genis albo-nigroque
striatus; orbitis albis: pileo, loris, ac vitta malari albo-mar-
ginata coccineis?
5. **Centurus elegans**, Sw. Phil. Mag. 1827. nec Fraser.
(Picus hypoleucus? Wagl. 1829.) ex Mexico. Albo ni-
groque striatus; gula pectoraque ex olivaceo rufescens-griseis;
capite abdominisque medio aureo-flavis; pileo rubro; macula
oculari nigra!
6. **Centurus subelegans**, Bp. (tricolor! Gr. 1849. ex
Wagl. 1829.) Pr. Zool. Soc. 1837. p. 109. ex Venezuela.
Minor, albo-nigroque fasciatus; subtus, cum capite, dilute cine-
rascens: vertice abdominisque medio rubris; fronte et cervice
subauratis: macula oculare nigra nulla.
Quid P. tricolor, Gm. ex Sebae Thesaur. t. 64. 6. ex Mexico?
7. **Picus aurifrons**, Licht. (ornatus, Less. 1839. - chryso-
genys, Vig.) ex Mexico. Similis praecedenti; sed etiam
minor.
Quid P. aurifrons, Less. 1839. Mus. D. Follet, ex Sumatra?
Quid C. rubriventris, Sw. nec Vieill. (C. swainsoni, Gr. ex Malm.)?
8. **Centurus santa-cruzi**, Bp. (flaviventris! Gr. ex Sw?
nec Vieill.) Pr. Zool. Soc. 1837. p. 18. ex Mexico.
Albo nigroque striatus; capite et corpore subtus griseo-oliva-
ceus; vertice cerviceque rubris; fronte et abdomine auratis:
uropygio albo: remigibus rectricibusque nigris. Rostrum
subincureum.

9. *Zelaphicus pucherani*, Malh. Rev. Zool. p. 542. sp. 15.

ex Amer. m. r. Albo nigroque varius; uropyglio candido: subtus olivaceus; abdomine medio sanguineo: rostro longiusculo, acute, valde ad apicem compresso: remigibus tertia et quarta omnium longissimis! Mas. sincipite nuchaque coccineis. Facie fronte aurea; occipite coccineo.

256. *Tiga*, Kau p. (Chrysonotus, Sw. - Brachypternopus! Malh.) Asia. Oceania. 5.1. *Picus tigia*, Horsf. (javanensis, Lyngb. - *Tiga tridactyla*, Gr. ex Sw.) Ill. Ind. Zool. t. 30. 2. ex Java.

Olivaceo-aurantiacus, cervice nigerrimo; subtus albidas vix rufescens plumis nigro-marginatis; gula, genisque nigro fasciatis, albis: pileo, crista occipitali, uropygiale late coccineis.

2. *Picus rafflesii*, Vig. (amicetus, Müll. - *Tiga labarum*, Less. - *T. rafflesii*, Gr.) App. Mem. Raffles. ex Sumatra, Borneo. Aureo-olivaceus, subtus olivaceo-uscus:

fronte gulaque sordido aurantiis; genis cerviceque albis nigro vittatis; aliis caudaque nigris, minime fasciatis: remigibus instantus maculis retundis albis. Mas. crista elongata cinnabarinæ.

3. *Picus grantia*, M. Clell. (*Tiga grantia*, Gr.) Proc. Zool.

1839. p. 165. ex Asia continent. Fronte, aliis, caudaque flavido-rufoscentibus: cervice et colli lateribus olivaceis: subtus fuscus: remigibus rectricibusque flore fasciatis.

4. *Picus shorii*, Vig. 1831. (*Tiga shorei*, Gr.) Gould, Cent.

Himal. B. t. 49. ex Asia continent. Viridi-aurantius: pileo postice cristato: torso, uropygiale ruberrimus: subtus albus, nigro tamquam squamatus: vitta utrinque pone oculos, altera ad collis latera, nucha, remigibus, rectricibusque nigris.

5. *Picus rubropygialis*, Malh. (*Tiga rubropygialis*, Gr.)

Rev. Zool. 1845. ex Asia mer. Niger, pileo albo-rufescenti, striolato; pectore abdomineque maculato: dorso aliisque olivaceis, tergo plus minus rubricato: uropyglio coccineo. Quid *Tiga intermedia*, Blyth, ex Asia continentali?

257. *Brachypterus*, Strickl. (Brachylophus? Sw. - Brachypternopus, Malh.)

Asia. Oceania. 3.

1. *Picus aurantius*, L. (bengalensis, Gm. - *nuchalis*, Wagl. - *hemipodus*, Sw. - *psarodes*, saem. Licht. - *Brachypterus aurantius*, Gr.) Pl. enl. 995. - Edw. B.

t. 182. ex Asia centrali. Aurantio-flavus auratus; subtus albus, plumis nigro-marginatis squamatus: cervico nigerrima: gula lutea nigra, plumis albo-notatis: pileo, crista occipitali, coccineo.

2. *Picus chrysomotus*, Less. (puncticollis, Malherbe, adult.) *Rev. Zoolog.* 1845. p. 404. Fig. nulla. *ex Asia centr. et mer.* *Flavo-aurantiacus, rubro-striatus: gula, pectore, uropygio, caudaque nigris; striis pectoralibus albis.*
Mas. pileo, cum crista, ex toto coccineo.

3. *Picus erythronotus*, Vieill. (neglectus, Wagl.-ceylonus, Forst. - Kerella, Valenc. - psarodes mas? Licht. Brachypterus erythronotus, Gr. - mutilatus, Temm. *Mus. Lugd.* faem.) *Nouv. Dict. II. Nat.* xxvii. p. 73. *ex Ceylon.* *Sanguineo-coccineus, plumis sincipiatis basi nigris, occipitis elongatis: gula nigra, albo-undulata; pectore et abdomine albido, plumis nigro marginato-squamulatis; cauda nigra.* Faem. crista occipitali coccinea; sincipito albo-punctato.

Quid Brachypt. micropus et Br. dilutus, Blyth, ex As. centr?

258. **Chrysocolaptes**, Blyth.

Asia. Oceania. 7.

1. *Picus haematribon*, Wagl. (spilophorus, Vig. faem. Chrysocolaptes haematribon, Gr.) *Syst. Av. sp. 95. ex Ins. Philipp.* *Sanguineus; subtus albido fusco-undulatus: capite cristato, collo, pectoreque nigro-oliveaceis, guttis numerosis albis, nigro-marginatis: remigibus, interne albo-maculatis, rectricibusque fuscis.*
2. *Picus palatacea*, Wagl. (philippinarum? Lath. - Chr. aurantius, Gr. ex Bodd.) *Pl. enl. 691.* faem. - Sonn. Voy. t. 37. *ex Ins. Phil.* *Fusco-ruber; alis miniatis: subtus rufo nigroque varius, pectore albo ocellato: capite cristato.* Mas crista coccinea. Faem. crista nigra, albo-notata.
3. *PICUS strictus*, Horsf. (peralaimus, ex Java, Wagl. Chrysocolaptes strictus, Gr.) *Linn. Tr. XIII. ex Java, Sumatra, Borneo.* *Aurivo-oliveaceus, dorso concolore (sine albo et nigro); subtus albus, nigro tamquam squamatus: uropygio latissimo rubro.*
4. *Picus sultaneus*, Hodgs. (strenuus, Gould, 1839. - strictus, Jerd. - Chrysocolaptes sultaneus, Gr.) *Journ. As. Soc. Beng.* 1837. p. 105. *ex Asia mer. Nepal.* *Similis praecedenti; sed valde major: dorso ex tota fulvo-oliveaceo aurato: uropygio latissimo rubro.*
5. *Picus goensis*, Gm. (melanotus, Blyth. - guttocristatus, Tick. - Dendr. ellioti, Jerd. - Chr. goensis hinc festivus, ex Bodd. Gr.) *Pl. enl. 696. ex As. Nepal.* *Aurantio-flavus; subtus albus, plumis singulis nigro-marginatis tamquam squamatus: capite albo, nigro vario cervice et interscapilio candidis; dorso, scapularibus, caudaque cum tectricibus superioribus, nigerrimis. Mas pileo, cum crista occipitali, uropygioque coccinisco. Faem. pileo flavo-aurantiaco.*

6. *Picus menstruus*, Scop. (manillensis, Gm. - obscurus, Wagl. nec Lath. - Chrysocolaptes menstruus, Gr.) *Sonn.*

Voy. t. 36. ex Ins. Philipp. Cinereo-virens; pileo griseo-vario; uropygio coccineo; alis caudaque nigricantibus.

7. *P. cardinalis*, Gm. nec Less. (Picus guineensis, Gr. ex Scopoli - strigicollis? Vieill.) *Sonn. Voy. t. 35. ex N. Guinea. Niger, marginibus plurarum dorsalium, alarum maculis, et vitta postoculari utrinque, albis; subtus albus, nigro-maculatus: remigum, rectricumque rachidibus flavis. Mas pileo rubro.*

259. **Chrysoptilus**, Sw. (Geocolaptes, p. Malh.) America trop. 7.

1. *Picus cayennensis*, Gm. (guttatus, Spix. - guttulatus, vel punctulatus, Wagl. - Chrysotilus punctigula, Gr. ex Bodd. - Chr. guttatus, Sie. - Chr. cayennensis, Bp. Colaptes! cayannensis, Blyth.) *Pl. enl. 613. faem. - Av. Bras. t. 53. 1. mas. ex Bras. Guiana, Mus. Ingd. ex S. Fe de Bogota. Minor (Long. 8-poll.): flavo-olivaceus, uropygio sub-aurantiaco, nigro-fasciatus: subtus flavo-virescens, pectore rufescens, plumis singulis macula nigra unica rotunda: sincipite nigro; genis albis; occipite rubro; gula albo nigroque varia: remigum rectricumque lateraliuna scapis auratis. Mas. mystacibus rubris.*

2. *Picus teretomelas*, Vieillot. (nattereri? Malherb.) *ex Amer. mer. Medius (Long. 10-poll.): albo-viridis, uropygio flavo, nigro-fasciatus: subtus undique flavo-vires, plumis singulis nigro tristigattis: occipite suberistato, mystacibus coccineis: sincipite nigerrimo: genis, gulaque albo-stramineis: remigum, rectricumque scapis auratis. Mas mystacibus coccineis.*

3. *Picus melanochloros*, Gm. (cristatus? Vieill. ex Azara 252.) *ex Buenos ayres. Modius (Long. 10 $\frac{1}{2}$ -poll.): niger, rufo-varius; subtus rufus, nigro-ocellatus: fronte nigra: genis albo-stramineis; occipite, mystacibusque rubris: remigum scapis nigris.*

4. *Picus buffoni*, Kuhl. (chlorozostus, Wagl. 1829. - Chrysotilus chlorozosteus, Gr.) *Pl. enl. 719. ex Bras. Major (Long. 12-poll.): albo-viridis, uropygio flavo, nigro-fasciatus: subtus sulphureo-viridis, plumis nigro trimaculatis, macula apicali magno cordiformi: sincipite nigro; occipite laci, coccineo: remigum scapis olivaceo-flavis: rectricibus nigris; lateraliibus flavo-fasciatis; extimae rachi apice aurato. Mas. mystacibus atro-coccineis.*

5. *Picus canipileus*, Orb. (Chrysotilus canipileus, Gr.) *Voy. Am. m. t. 63. 3. mas. ex Am. mer. Fusco-olivaceus: subtus flavidus; pectore plumis nigro-marginatis tamquam synamat: capite griseo; sincipite nigro; occipite rubro.*

6. **Picus campestris**, Licht. (Chrysotilus campestris,
Sw.) Spix, Av. Br. t. 46. ex Bras. mer. Parag.
Brunneus, fasciolis numerosis ochraceis; uropygio albo: sub-
tus albo-flavidus, fasciolis numerosis, nigricantibus, lunu-
latus: pileo gulaque nigris: collo undique, genisque auratis.
7. **GEOPICUS campestroides**, Malm. (P. campestris, faem.
Mus. Paris. - *Picus* sp. nov. campestri affinis, Mus. Lugd.)
ex Amer. mer. Simillimus praeced. at gula semper alba.
Mas. vitta malari nigra, coccineo intermixta.
260. **Dendrobates**, Sw. (Campethera, Gr. - Dendromus, Sw.)
Chrysotiliopicus! et Dendropicus, Malm.) Africa. 25.
- a. MACULATI.
1. **Picus nubicus**! Gm. (**notatus**, Licht. - Campethera nu-
bica, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 687. - Lev. Afr. t. 250.
ex Cap. B. Sp. i. Minor: viridi-olivaceus, maculis par-
vis albidis; subtus albus, maculis magis nigris cordiformi-
bus: remigum scapis supra nigris; cauda viridi, apice flavo.
Mas occipite, mystacibusque rubris.
 2. **Picus nubicus**, Licht. nec Auct. (punctatus, Cuv. nec Vieill.
punctuligerus, Wagl.-Dendromus punctatus, Sw.)
ex Afr. occ. et or. Major: olivaceo-viridis, albidio-vermicu-
latus, maculis aureis: subtus flavidus, pectore et collumque
punctulis nigris crebre conspersus: cauda omnino remigumque
scapis auratis. Mas pileo ex toto, mystacibusque coccineis.
 3. **Picus punctatus**, Vieill. (guttatus? Licht.) ex Afr.
Cinereo-virens albo-maculatus: subtus albus, fusco-varius:
supercilii albis: genis albo castaneoaque variis: pilo nigro
albo-punctato.
 4. **DENDROMUS brachyrhynchus**, Sie. (Campethera bra-
chyrhyncha, Gr.) B. of west. Afr. II. p. 160. ex Afr.
occ. Olivaceus, subtus albo nigroque fasciatus: sincipite ru-
bro: rostro brevissimo!
 5. **Picus variolosus**, Licht. (maculosus? Valenc. - ben-
nettii, A. Smith - Campethera variolosa, Gr.) ex Afr. m.
 6. **DENDROMUS chrysurus**, Sw. (Campethera chrysura, Gr.)
B. of w. Afr. II. p. 158. ex Afr. occ. Olivaceus, albo-
varius: subtus albo-rufus; gula maculis, abdomine fasciis, ni-
gris: rectricum scapis aureis.
Mas pileo et vittae mystacali rubris.
 7. **DENDROMUS aethiopicus**, Rüpp. (Campethera aethio-
pica, Gr.) Syst. Uebers. Ost-Afr. t. 36. ex Afr. or.
Nubia, Brunneo-virens, albo-fasciato-maculato: subtus fla-
vicans, maculis rotundis nigris; gula candida; genis nigro-
striolatis: remigum rectricumque scapis auratis.
Mas pileo mystacibusque coccineis.
Faem. fronte, vertice, mystacibusque nigris, albo-punctatis.

8. *Picus abyssinicus*, Hempr. et Ehrenb. (fuscescens,
Rüpp. nec Vieill. - *D. abyssinicus*, Gr. - Chrysopicus
cailliauti? Malh.) ex Afr. or. *Abyssinia*. Similis
praecedenti, sed minor; rostro breviori, tenuiori; fuscus, mi-
nime olivaceus, albido, nec flavo, varius, dorso maculis albi-
dis rix fasciato; subtus fuscescens, maculis longitudinalibus
nigricantibus; genis haud striatis; gula nigro-nuculata; re-
migum rectricumque scopis fuso-flavida.

Quid Picus abyssinus, Stanley in Salt's Journ. App. ex Afr. or?

9. *Picus abingonti*, Smith, 1836. (smithi, Malherb. 1845.)
*Report. S. Afr. Exped. ex Afr. mer. Olivaceus, di-
lutiiori variegatus; gula pectore quo nigris, plumis margini-
bus maculaque centrali flava; pilo mystacibusque coccineis;
fronte punctulis coraciis; occipite cristato.*

10. *Picus namaquus*, Licht. (mystaceus, Vieill. - bia-
nicus, Cuv. faem. - diophrys, Steph. - Dendrobates
namaquus, Gr.) *Lev. Ois. Afr. t. 251. 252. ex Cap.
B. Spé i.* Cinereo-olivaceus, allo subcellatus; fronte fuso,
allo-punctata; vertice rubro; occipite, vittisque ad latera colli
disjunctis, nigris; genis allis, stria mediana nigricante.

11. *Dendrobates schoensis*, Rüpp. *Orn. N. Ost.
Afr. t. 33. ex Africa orient.* Similis praecedenti;
sed major, et rostro longiori; fuscus, supra albido-undulatus,
subtus rix canescens variegatus; capite colloque undique
nigris; lateribus vittis duabus albis, confluentibus; fronte
allo-punctata; vertice coccineo.

b. FASCIATI.

12. *Picus fulvicapillus*, Ill. (fuscescens, Vieill. - chrysop-
terus, Cuv. - capensis, Forst. - Colaptes capensis, Smith.
Dendrobates fulvicapillus, Sw.) *Lev. Afr. t. 253. 1. 2. ex
Africa a. m. Long. 6-poll.; fuscus allo-flavante undulatus;
subtus cinereo-albus, fuso striatus et undulatus; fronte, ge-
nusque castaneo-cinereis; remigum rectricumque scopis au-
ratis. Mas vertice rubro; occipite nigro.*

13. *Picus hemprichii*, Ehrenb. (flaviscapus, Temm.-Dend-
hemprichii, Rupp.) *Faun. Nord-Ost. Afr. t. 35. ex
Nubia, Abyss. Minor (Long. 5½ poll.); fusco-olivaceus, fla-
vido-variegatus; subtus albicans, nigricante striato-fasciatus;
fronte rufo-grisea; remigum rectricumque scopis auratis.
Mas mucha subristata, cum occipite et vertice, coccinea.*

14. *Dendropicus hartlaubi*, Malh. *Rev. Zool. 1849. p. 532.
sp. 5. ex Afr. or. Zanzibar. Long. 6-poll.; fuso-
olivaceus, flavidо-undulatus; subtus albido-flavicans, striis
tantum longitudinalibus nigris; fronte rufa cinerea; genis
albis; remigum, rectricumque scopis splendide aureis.
Mas vertice et occipite cristato coccineis..*

15. **DENDROPICUS lafresnayi**, *Math. Rev. Zool.* 1849. p. 532.
sp. 6. ex Afr. or. Similis praecedenti, sed minor (*Long. vix 5-poll.*), et minus fasciatus. *Mas occipite tantum rubro.*
16. **PICUS minutus**, *Temm.* (*Dendrobates minutus*, *Bp.*)
Pl. col. 197. 2. ex Senegal. (*Long. vix 4½-poll.*): *albo-rufescens; subtus cinereus, fusco variegatus; capite griseo; occipite, tectricibusque caudis superioribus rubris; remigibus rectricumque scopis auratis.* *Omnium Picinarum hue usque cognitarum Minima!*
Quid P. africanus et Picus olivaceus, J. Gr. nec L. Zool. Misc. p. 18?

c. UNICOLORES.

17. **PICUS capensis**, *Gm.* (*poliocephalus*, *Cuv.* nec *Sw.* - *caniceps*, *Wagl.* - *Dendrobates griseicephalus*, *Gr.* ex *Bodd.*) *Pl. enl. 786. 2. - Lev. Afr. t. 249.* *ex Africa mer.* *Olivaceus; cervice pectoreque flavis: fronte, genis, gulaque canis; occipite rubro: remigibus secundariis, scapularibusque immaculatis.*
18. **Picus poliocephalus**, *Sic. B. of west. Afr.* II. p. 154.
nec Cuv. ex Afr. occ. *Ex fulvescenti olivaceus; uropygio coccineo; capite colloque ex toto griseis; remigibus omnibus fasciatis. Mas pileo nuchaque rubris!*
19. **Dendrobates immaculatus**, *Sw. B. of West.*
Afr. II. p. 152. - Rüpp. Mus. Senck. III. p. 119. ex Afr. occ. Olivaceus, immaculatus; cervico concolor: subtus cinereo-vires, pectore olivaceo: genis, gulaque griseis; pileo, uropygioque coccineis: remigibus intus basi tantum maculis albis.
- * 20. **Dendrobates spodocephalus**, *Bp.* (*poliocephalus*, *Rüpp.* nec *Sw.*) *Mus. Francf. - Orn. Faun. N. Ost.*
Afr. t. 34. ex Afr. occ. *Ex olivaceo flavo-vires; capite, collo, corporeque subtus canis; pileo (maris), uropygioque latissime, et ab domine medio longo, coccineis: remigibus, rectricibusque flavo-variiis.*
21. **Picus senegalensis**, *Gm.* (*tephrodops*, *Wagl.* - *striolatus*, *Less.* - *Dendrobates senegalensis*, *Gr.*) *Pl. enl. 345. 2.*
ex Seneg. Minor: ex flavicantí aureo-viridis, alarum tectricibus flavo-punctatis, uropygio olivaceo: subtus griseo-olivaceus, albido-undulatus, capite cinereo-olivaceo: rectricibus nigris, flavo maculato-fasciatis. *Mas pileo coccineo.*
22. **Picus goertan**, *Gm.* (*Dendrobates goertan*, *Gr.*) *Pl. enl. 320. ex Senegal.* *Flavo-viridis, alis tantum maculatis; subtus, cum capite, canus unicolor, crasso obsoleta fasciolata: vertice laevi, uropygioque coccineis: ab domine medio rubro-aurantio.*

23. **CHLOROPICUS pyrrhogaster**, *Math. Rev. Zool.* 1845.

*p. 399. ex Afr. occ. Sierra Leone, Ashantea.
Fusco-olivaceus: pileo corriceque nigris; pectore, uropygio,
abdominis medio, sanguineis: lateribus, crissaque fusco-
olivaceis, albido-striatis.*

Mas vertice rubro. Faem. pileo ex toto nigro.

24. **HEMICERCUS rubiginosus**, *Sv. B. of w. Afr.* II. p. 150.

*ex Afr. occ. Rubro-castaneus, capite brunneus; subtus
brunneo-nigricans: macula utrinque ad rostri latera rubra:
alii rotundatis: cauda brevissima: rostro flavido.*

25. **DENDROMUS microuros**, *Sic.* (*Picus pardinus*, *Temm. Mus.*

Lugd. - Campephera nivosa, Gr.) B. of w. Afr. II. p. 162.
*ex Ashantea. Minor (Long. 6-poll.): olivaceus; subtus,
cum genis, maculis parvis rotundis pardatus.*

Mas occipitis cristula rubra. Species aliquantulum abnormis!

261. **Gecinus**, Boie (*Brachylophus*, *Sic.* - *Chloropicus*, *p. Math.*) *Eur. As. Afr. Oc. 10.*

a. EUROPAEI.

1. **PICUS viridis**, *L. - Pl. enl.* 879. mas. 371. faem. - *Gould*,

*Eur. t. 226. ex Europ. Viridis, subtus griseo-olivaceus:
pileo rubro: genis nigris: rectricibus omnibus fasciolatis.
Mas mystacibus rubris. Faem. mystacibus nullis.*

2. **PICUS canus**, *Gm.* (*chloris*, *Pall.* - *norvegicus*, *Lath.*
viridi-canus, *Meyer* - *caniceps*, *Nilss.* - *Gecinus canus*,
Boie) *Edu. B. t. 65. - Wern. Atl. Man. Temm. fig.*
*bona. ex Eur. praeceps orient. Viridis, subtus cine-
reo-olivaceus; capite canescente; genis albo nigroque striatis:
rectricibus mediis tantum fasciolatis. Mas mystacibus ni-
gris angustis; fronte et vertice tantum rubris.*
Faem. vertice vix rubro.

b. AFRICANUS.

3. **CHLOROPICUS vaillantii**, *Malherb.* (*algirus*, *Vaill. jun.*

*Gecinus algirus, Gr. - G. vaillanti, Bp.) Mem. Soc. H.
Nat. Metz, 1846. p. 5. ex Afr. sept. Affinis praeced: *viridis*,
subtus flavo-olivaceus; mystacibus latissimis nigerrimis.
Mas fronte nigro cinereoque varia: pileo nuchaque late coccineis.
Faem. sincipite nigro cinereoque vario: occipite coccineo.*

c. ASIATICI.

4. **PICUS karelini**, *Brandt* (*persicus?* *Vieill.* - *Gecinus*

karelini, *Gr.*) *Bull. Petersb. x. p. 2. ex Persia bo-
real. Flavo-viridis, rectricibus alarum fuscocantibus, albo-
fasciatis: capite cano: fronte alba; pileo rubro: subtus, cum
genis, albidius, pectore et abdome nigricante/fasciolatis.*

5. *CHLOROPICUS guerini*, *Math. Rev. Zool.* 1840, p. 539. sp. 12.
ex Asia or. China. *Simillimus Gecino cano, sed vitta occipitali nigra perinsignis.*
Mas fronte et vertice partim coccineis. Faem. fronte et vertice cano-olivaceis, plumarum rachidibus nigricantibus.
6. *Picus awakera*, *Temm.* (*Gecinus awakera*, *Gr.*) *Pl. col.* 585. *mas.* - *Schlegel*, *Faun. Jap.* t. 36. *m. et f.*
ex Japonia. *Similis G. viridi, magisque G. cano; sed minor, mystacibus rubris, et abdomine maculis transversis nigris.*
Mas pileo late rubro. Faem. occipite rubro.
7. *PICUS occipitalis*, *Vig.* (*barbatus*, *J. Gr.* faem. - *Gecinus occipitalis*, *Gr.*) *Gould*, *Cent. Him. B.* t. 47. - *Ill. Ind. Zool.* t. 31. 2. *faem.* *ex Asia centr.* *Viridis, subtus albido-virens, unicolor: genis gulaque canis; sincipite coccineo; macule magna elongata occipito-cervicali nigririma.*
Faem. pileo toto nigro.
8. *PICUS squamatus*, *Vig.* (*dimidiatus*, *J. Gr.*) *Gould*, *Cent. Him. B.* t. 48. - *Ill. Ind. Zool.* t. 29. 1. - *Jard. et Selb. Ill. Orn.* t. 108. *ex Asia centr.* *Viridis, uropygio flavido, nigricante-fasciatus: pileo et nucha coccineis; superciliis nigris: jugulo late griseo-niridi: abdomine albo-virescenti, plumis nigro-marginatis tamquam squamato: rostro flavicante.*
*Quid P. striolatus, *Blyth.* (*squamatus*, *Jerd.* - *Gecinus striolatus*, *Gr.*) *Journ. As. Soc. Beng.* 1843, p. 1000. *ex Asia centr?**
- d. OCEANIC.
9. *PICUS dimidiatus*, *Temm.* (*vittatus*, *Vieill.* - *affinis*, *Raffles*-*bengalensis*, *Horsf.* - *viridanus*, *Bl.* - *squamatus*, *Jerd.*-*G. dimidiatus*, *Boie*) *ex Java.* *Viridis, nucha uropygioque flavicantibus; subtus flavo-cinereus; pectore unicore; abdomine plumis viridi-marginatis: caudae nigricante. Mas pileo latissime rubro. Faem. pileo, mystacibusque nigris.*
- 10? *PICUS xanthopygus*, *Hodgs.* (*lepidotus*, *Natterer.* *dimidiatus*, *jun. Mus. Lugd.*) *ex Java.* *Minor: olivaceo-cinereus: occipite nigro: uropygio flavissimo: subtus albidus, pectoris obdominisque plumis nigricante-marginatis.*
262. *Chrysophlegma*, *Gould*, 1849. (*Dryotomus*, *Hodgs.* - *Geninus*, *p. Gr.*) Asia. Oceania. 3.
1. *PICUS flavinucha*, *Gould*, 1833. (*Dryotomus flavigula*, *Hodgs.* 1837.) *Gould*, *B. of Asia.* t. 6. adult. - *Gr. et Mitch. Gen. B.* t. 109. juv. *ex Nepal.* *Viridis, subtus cinereo-olivaceus: fronte rufescens; crista occipitali e pennis sericeis flavissimis: juguli plumis nigerrimis, basi candidis: remigibus rufis, nigro-fasciatis et late terminatis: rectricibus nigris. Mas gula flava. Faem. gula rufa nigro-raria.*

2. *Picus nepalensis*, J. Gr. (mentalis, Jerd. - Gecinus nepalensis, Gr.) Ind. Zool. t. 31. 1. fig. mala. ex Asia cent. Flavo-viridis, tecriculus alarum rubro-indutus: crista elongata, rubro-aurata; pectore viridi: cauda nigra.
3. *Picus chlorolophus*, Vieill. (chlorigaster et mentalis, Jerd. - Chloropicus xanthoderus? Malherb. - Gecinus chlorophaeus? Gr. - G. chlorolophus, Blyth.) ex Asia cont. Fusco-virens, plumis griseo-limbatis; uropygio olivaceo: subtus ex virescenti-brunneus.
Mas pileo et vitta malari coccineis.
Faem. sincipite nigro, occipite tantum coccineo.

* 263. *Venilia*, Bp. (Brachylophus, Strickl. nec Sw. - Gecinus, p. Gr.) Asia. Oceania. 6.

a. BRACHYLOPHI, Strickl. Cristati: erythrochlori.

1. *Picus puniceus*, Horsf. (Gecinus puniceus, Gr.) Pl. col. 423. ex Java, Sumatra. Cristatus; viridis, tergo concolor: subtus olivaceus, lateribus undulatus: pileo aliquis puniceus.
2. *Picus mentalis* et gularis, Temm. (Gecinus mentalis, Gr.) Pl. col. 384. ex Java. Viridis: occipitis crista, lateribus cinnamomeo, postico flava; gula nigra, allo-varia: pectore cinnamomeo, aliis sanguineis: cauda nigra.
3. *Picus miniatus*, Forst. (malaccensis, Lath. - rubescens, Vieill. - Gecinus miniatus, Gr. - G. malaccensis? Blyth.) Ind. Zool. t. 4. - Shaw, Natur. Misc. t. 413. Ill. Ind. Zool. t. 30. 1. ex Java, Sumatra, Borneo. Longe cristatus: miniato-sanguineus, uropygio flavante; subtus olivaceofuscus, arctissime nigricante-vermiculato: gula fusco-rufa.
Quid Gecinus pyrrhotis, Blyth. (Picus pyrrhotis, Hodgson, nec Meiglyptes sive potius Microterus aut Phaiopicus) ex Himal?
- b. VENILIAE, Bp. Sanguinei; capite laevi.
4. *Hemicercus rubiginosus*, Eyton, nec Sw. (porphyromelas, Boie. - melanogaster, Hay). Rev. Zool. 1844. ex Sum. Born. Major (Long. 8½-poll.); sanguineo-rubiginosus; subtus bruno-fuliginosus: capite flavo-brunneo: remigibus rectricibusque flavo-cinereo fasciatiss: rostro albido. Mas occipitis lateribus, mystacibusque coccineis.

* 5. *Venilia albertuli*, Bp. Mus. Societ. Zool. Amstelod. ex Ins. Celebes. *Minimus* (*Longit. 5-poll.*): *miniatococcineus*, *plumis basi fuscis*; *subtus nigricans*, *plumis bilunatis albido-undulatus*; *capite laevi*: *remigibus intus albo-maculatis*, *rectricibusque fusco-nigris*.
Faem. minor; rostro breviori; colore rubro, obscuriore.

Proxenulo ornithologico parisiensi, Alberto Geoffroy de St. Hilaire, *Fringillarum discri-minatori*, *Majorum gloriae per tertiam aetatem haud dubio propagatori*, dicata! in qua rubrum calorem contemplatus, quum Tui, generose puer, essem memor, subito nigrum intuitu tristis animum subiit istius, quem utinam fovere possem, mei Al-berti, recordatio!

6. *Picus callonotus*, Waterh. 1840. (*cardinalis*, Less. 1845.
nec Gm. - *Dendrobates callonotus*, Gr.) *O. des Murs*, Pl. p. 59. ex Ins. Ocean. Pacif. *Minor* (*Long. 5½-poll.* - Rostr. 8-lin.); *sanguineus*, *plumis basi fuscis*; *subtus allidus*; *capite laevifusco*, *pileo nigricante*, *lateribus dilutioribus*; *gula, alis-que subtus, albis*; *cauda fusca*; *rostro albido-corneo*.
Mas pilei plumis elongatis, acutis, apice rubris.

Quid *Picus sanguineus*, Lich. Wagl. Syst. Av. sp. 97. Mus. Monac. ex America merid. Cayenna. *Longitud. 6½-poll?*

264. *Hemicereus*, Sw. Africa. As. Oc. 3.

1. *Picus concretus*, Reinw. (*Dendrocopus sordidus*?
Eyton - *Hemicereus concretus*, Gr.) *Pl. col. t. 90. 1. 2.*
ex Java, Sumatra, Borneo. *Albo nigroque va-riis*, *subtus fuliginosus*; *copitis crista elongata*.
Mas crista rubra. Faem. crista fuliginosa.

2. *Picus canens* err. canente, Less. (*Hemicercus canente*!
Gr.) *Cent. Zool. t. 73.* ex Pegu. *Longit. vix 6-poll.*
coracino-niger, *subtus nigricans*; *fronte albo-punctata*; *inter-secapilio, uropygio, vitta humerali lata*, *gula, juguloque albo-cineris*.

3? *Picus cordatus*, Jerd. (*Hemicercus cordatus*, Gr.) *Ill.*
Ind. Orn. t. 40. ex Asia mer. Pegu. *Minor praeced.*
sed vix specie distinctus.

265. *Celeus*, Boie. (*Malacolophus*, Sw. - *Celeopicus*, Malb.) America trop. II.

1. *Picus undatus*, L. (*Celeus undatus*, Gr.) *Edu. B. t. 332.*
ex Amer. mer. *Major*: *ex olivaceo aurantio-rufus*, *om-nia nigro-undulatus*; *rectricibus claram inferioribus immu-culatis*. Mas *vitta infra-oculari*, *genisque coccineis*.

2. *Picus flavescens*, Gm. (*Celeus flavescens*, Boie. - *Azara*, 251.) *Sp. Av. Br.* t. 49. 1. mas. 2. faem. ex Bras. m. *Parag.*
Albo-nigro quo fasciatus; subitus nigerrimus capite cristato elongata genis gulaque flavidis; copistro, mystacibusque rubris.
3. *Picus tinnunculus*, Wagl. (*Celeus tinnunculus*, Gr.)
Isis, 1829. *Rufo nigro quo fasciatus: capite subcristato, colloque supra ochraceis; subitus flavidio nigro quo lineatus; jugulo nigro unicolori; rectricibus nigris, a basi ultra medium rufo fasciatis. Rostrum elongatum.*
4. *Picus cinnamomeus*, Gm. (*flavicans?* *Spix*, jun. - *Celeus cinnamomeus*, Boie). *Pl. enl.* 524. - *Vieill. Am. s. t. 111. mas. - Av. Br. t. 51. 2. jun. ex Guiana. Rufo-cinnamomeus, maculis dorsalibus luteis; pileo cristato, et corporis lateribus, lateis. Mas vitta mystacalis rubra.*
5. *Picus excalidus*, Gm. (*flavicans*, Lath. - *Celeus citrinus*, Gr. ex Bodd.) *Pl. enl.* 509. ex Cayenna. Ex rufescens luride flavidus: genis inferne rubris.
6. *Celeopicus smaragdicolli*s, Malh. *Rev. Zool.* 1849. p. 534. sp. 7. Mus. Nannetons. ex Cayenna. Similis praeced. sed macula jugulari triquetra smaragdinus! Mas cristatus: ochraceus: vitta postoculari late coccinea.
7. *Picus rufus*, Gm. (*Celeus rufus*, Gr.) *Pl. enl.* 694. 1. ex Guiana. Ex toto rufus nigro-undulatus: cauda fasciata, apice nigricante: rostrum pallido. Mas vitta malari coccinea.
8. *Picus jumana*, Spix. (*Celeus tumana*, Gr.) *Av. Bras. t. 47.* m. et f. ex Bras. sept. Ex toto saturate rufo-cinnamomeus, unicolor; uropygio et hypochondris ochraceis: femoribus, alarum flexura, tectricibusque inferioribus, flavidis. Mas vitta malari coccinea.
9. *Picus badiooides*, Less. (*castaneus*, Wagl. ex Licht. *Celeus badiooides*, Gr.) *Cent. Zool.* t. 14. ex Mexico. Castaneus, undique nigro-variegatus; uropygio dilutiori, immaculato: capite cristato ex toto flavo-rubo: cauda apice nigra.
10. *Picus multicolor*, Gm. (*scutatus*, Wagl. - *thoracinus*, Less. - *Celeus torquatus*, Gr. ex Bodd.) *Pl. enl.* 863. ex Amer. mer. Capite cristato ex toto fulvo-rubo: alis rufis: pectore nigerrimo; abdomine flavicente. Mas vitta malari sanguinea.
11. *Picus ochraceus*, Spix. (*Celeus ochraceus*, Gr.) *Av. Bras. t. 51.* 1. ex Brasil. sept. Rufescens-ochraceus, nigro-maculatus; capite, crista magna elongata, gula, cereice, uropygio, alarum tectricibus inferioribus, femoribusque ochraceis dilutioribus immaculatis: subitus ex toto nigricans, plumis subtilissime rufescens-marginatis. Mas vitta malari coccinea.

266. **Hemilophus**, Sw.

1. **Picus mackloti**, Wagl. (pulverulentus, Temm. - gutturalis, Valenc. - javensis faem. Horsf. - Hemilophus mackloti, Gr.) *Pl. ent. 389. ex Java.* Similis sequenti; sed major (Longit. 18-poll.). rostro apice nigro.

*2. **Hemilophus mülleri**, Bp. (Picus pulverulentus, junctus Mus. Lugd.) *ex Borneo.* Minor (Long. 14-poll.): rostro apice albo: nigricans (ut Hem. mackloti), sincipitis plumis perbrevis, adpresso, punctulo apicali albo (ramquam praecep.) pulverulentus: gula albito-rufescens: rectricibus nigris. Mas mystacibus rubris.

Dicatus S. Mullero, qui propter innumera pretiosissima Animalia hanc quoque Avem ex Malaisia secum apportavit. Quem magno peregaudeo, quod vivum cum Mackloto amico, peregrinatore et ipso, sed mortuo, hic potuerim conjungere, sicuti postea in excellentium peregrinatorum historia consociati manebunt.

3. **Picus fulvus**, Quoy et Gaim. (Hemilophus fulvus, Gr.) *Voy. Astrol. Ois. t. 17. ex Oceania, Celebes.* Niger; subtus flavidus: occipite, genis, colloque undique, albo-punctatis: facie rubra: cauda fusco-rufescens.

4. **Picus javensis**, Horsf. (horsfieldi, Wagl. - leucogaster, Wagl. ex Reinwardt. - crawfurdii, J. Gr. - Hemilophus javensis et leucogaster, Gr.) *Griff. An. Kingd. II. p. 513. - Pl. col. 501. ex Java, Sumatra, Borneo.* Niger: capite cristato, et taenia colli utrinque laterali, coccineis: abdomine albo-testaceo.

5. **Picus hodgsoni**, Jerd. (Hemilophus hodgsoni, Gr.) *Madr. Journ. x. p. 215. cum fig. - Ill. Ind. Orn. t. 5. ex Asia mer. Malabar.*

6. **Picus lichtensteini**, Wagl. (funereus, Valenc. - modestus, Vig. - punctatus, Less. - Hemil. lichtensteini, Gr.) *ex Manilla.* Nigro-coracinus: capite subristato, gula, colloque, punctis minutis albis apicibus conspersis. Mass sincipite genisque atro-coccineis. Faem. sincipite nigro. Jun. nigro-ardesiacus, pectore etiam albo-punctulatus.

7. **Picus validus**, Reino. (Campephilus validus, Gr.) *Pl. col. 378. mas. 402. faem. ex Java, Sumatr. Born.* Crista occipitali brevissima: alis caudaque nigris; remigibus rufo-fasciatis. Mas pileo, collo, pectore, abdomine que coccineis; genis, mento, cervice que curatis: uropygio, crisoque ex auro flavo-coccineis. Faem. ex toto sordide grisea; genis et cervice flavescensibus.

267. **Dryocopus**, Boie. (Dryotomus, *Sic.* - *Campephilus*, *Gr.*) Eur. America. 17.

a. EUROPAEUS.

1. **Picus martius**, L. - *Pl. enl.* 596. - *Gould, Eur.* t. 225.

ex Eur. As. occ. Nigerrimus: capite laevi: rostro depresso, supra tricarinato, subtus albido, apice nigro: tarsis semiplummosis. Mas pileo rubro. Faem. macula tantum occipitali rubra.

b. AMERICANI SEPTENTRIONALES.

2. **Picus pileatus**, L. (Dryocopus pileatus, Boie) *Pl. enl.* 718.

Wils. Am. Orn. t. 29. 2. - Audub. Am. t. 13. ex Amer. sept. Nigriceps cristatus; stria superciliaris, vitta genarum utrinque per latera ducta, gula, flexura et speculo alarum, albis; fascia oculare nigra. Mas capitis crista et mystacibus coccineis. Faem. pileo et mystacibus fuscis, crista tantum coccinea.

3. **Picus principalis**, L. (Campephilus principalis, Gr. Dendrocopos principalis, Bp.) *Pl. enl.* 690. mas. - Vieill.

Ois. Am. s. t. 109. - Wils. Am. Orn. t. 29. 1. - Aud. Am. t. 66. ex Am. s. or. Coracino-niger, vitta lata infraoculari per latera colli ad dorsum, remigibusque secundariis albis; crista elongata; narium plumulis albis; rostro eburneo. Mas crista coccinea, superius nigra. Faem. crista tota nigra.

4. **Picus imperialis**, Gould, 1832. (Campephilus imperialis, Gr. - Dryocopus imperialis, Bp.) *Aud. Orn. Biogr.* v. p. 313. Fig nulla. *ex Amer. sept. occ. Longit. 2-pedal. - Al. 1-ped. - Rostr. 4-polt. - Nigro-virens, vitta laterali nulla: dorsi macula triangulari, remigibusque secundariis interne, albis; crista occipitali, laxa, sericea, longissima; narium plumulis nigris; rostro eburneo. Mas crista coccinea. Faem. crista concolore. Picidarum maximal*

c. AMERICANI MERIDIONALES.

5. **Picus albirostris**, Vieill. (comatus, Ill. - melanoleucus, var. *Lath.* - Dryocopus albirostris, Gr.) *Spix. Av. Bras. t. 45. ex Brasil. Mexico?* *Niger; abdomen*

albo-rufescens, nigro fasciato; pileo genisque coccineis; vitta laterali et tectricibus clarum inferioribus albis; rostro albido. Faem. crista coccinea superne nigra; genis albis, nigro-marginatis. Quid Picus melanus, Wagl. Mus. Paris. ex Cayenne, minor, subtusque ex toto niger?

6. **Picus lineatus**, L. (Dryocopus lineatus, Boie.) *Pl. enl.* 717. - *Spix. Av. Bras. t. 48. ex Brasil.* *Niger; subtus albidius, nigricante-fasciatus; gula alba; genis plumbeis; pileo, crista, et vitta malari coccineis; scopularibus et rectricibus partim, tectricibusque atarum inferioribus, albis. Faem. crista coccinea; sincipte nigro; vitta malari cinerea.*

7. *Picus galeatus*, Natter. (*Dryocopus galeatus*, Gr.) *Pl. col. 171.* ex *B r a s i l.* *Niger*; *subtus ex toto albo-rufescens*, *nigro-fasciolatus*: *crista magna laxissima*, et *vitta malari coccineis*: *genis albo nigroque variegatis*: *remigibus intus pulchro rufis*: *rostro caeruleo*, *apice albo*. *Mas pileo ex toto rubro*, *cristato*. *Faem. occipite tantum suberistato, rubro*.
8. *Picus erythrops*, Cuv. nec Vieill. (*semitorquatus*, *Licht.* *Dryocopus erythrops*, Gr.) *O. des Murs. Pl. p. 27.* ex *Buenos ayres*. *Nigerrimus*, *cristatus*, *abdomine albido-undulato*: *loris aurio*: *vitta suboculari per latera collis ducta*, *gulaque nigro-striolata*, *albis*: *tectricibus alarum inferioribus albo-sulphureis*: *rostro fusco-corneo*. *Mas pileo ex toto, mystacibusque coccineis*. *Faem. occipite tantum coccineo*.
9. *Picus scapularis*, Vig. (*Dryocopus scapularis*, Gr.) *Zool. Journ. iv. p. 364.* ex *Amer. mer.* *Niger*, *vitta utrinque ad collis latera, abdomineque fulvo-albus*: *pileo cristato*, *mystacibusque coccineis*: *alarum tectricibus inferioribus albis*: *rostro eburneo*.
10. *Picus magellanicus*, King, 1827. (*jubatus*, *Lafr. faem.* *Campephilus magellanicus*, Gr.) *Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 105.* mas. - *Mag. Zool. 1843. t. 31.* faem. ex *Patag. mer.* *Nigerrimus*; *capite cristato toto ac collo coccineis*, *plumis basi nigris*: *tectricibus alarum inferioribus*, *remigibusque secundariis partim albis*. *Faem. capite crista longissima colloque nigris*, *capistro tantum coccineo*.
11. *Picus pollens*, Bp. (*Campephilus malherbii*, Gr.) *Act. Ital. Mediol. 1845.* jun. - *Mitch. Gen. of B. t. 108.* mas. ex *S. Fe de Bogota*. *Niger*: *pileo rubro*, *cristato*: *dorsu*, *et alarum tectricibus inferioribus*, *albis*: *abdomine, uropugio, crissque cinnamomeis*, *nigro-undulatis*: *remigibus intus maculis albis (minime rufis)*, *aestate evanescentibus*. *Mas adult. genis rubris*; *crista elongata ex toto coccinea*. *Faem. genis rubris*; *crista elongata superius nigra*. *Junior genis nigris*; *fascia suboculari alba*; *crista brevi, rubra*.
12. *Picus guatemalensis*, Hartlaub. (*Campethaga guatemalensis*, Gr.) *Rev. Zool. 1844. p. 214.* ex *Am. centr.* *Niger*, *verticis plumis elongatis*, *occipite, genis, et capistro coccineis*; *subtus flavidus nigricante subundulatus*: *collis fascia utrinque*, *dorso medio, alarum flexura et tectricibus inferioribus*, *flavis*: *rostro eburneo*.
13. *Picus robustus*, Licht. (*Campephilus robustus*, Gr.) *Spix, Av. Bras. t. 44.* ex *Amer. mer. Brasil.* *Cinnamomeus*, *subtus nigro-fasciatus*: *capite cristato collaque coccineis*; *fronte, mento, alis, caudaque nigris*: *maculis internis rectricum*, *tectricibus alarum inferioribus*, *lorisque cinnamomeis*.

- * 14. *Dryocopus percoccineus*, Bp. Mus. Lugd. ex
Buen Ayres. Simillimus praeced. sed major, crista
magis explicata, et, cum capite et collo, vividiore coccineo.
Mai. adult. fronte loris mento percoccineis, macula tantum
subauriculari alba nigraque.
15. *Picus rubricollis*, Bodda. (Campephilus rubricollis,
Gr.) Pl. enl. 612. ex Guiana. Niger; subtus fulvo-
fuscens, pectore rubro induit; capite subcristato colloque
ex toto coccineis: remigibus intus rufis, immaculatis.
16. *Picus haematoxaster*, Tschudi. (Dryocopus haema-
togastrus, Gr.) Faun. Per. t. 25. ex Amer. mer. occ.
Coccineus; genis flavis; fronte, regione parotica, fascia
oculari, vitta utrinque ad collis latero, interscapillio, alis, cau-
daque nigris.
17. *Picus boiei*, Wagl. nec Temm. (Leucopogon, Valenc., atrio-
ventris et caniventer, Orb. - Campephilus boiei, Gr.)
Syst. Av. sp. 3. ex Brasil. Nigerrimus; cristatus;
vitta utrinque a rostro ad aures alla: occipite ad latera,
crista, et fascia mentali lata in nucha confluenta, coccineis:
rostro albo.
Luculentu Avis sumptuoso artefactae exemplo Pici
boiei, Temminck, Pl. col. 473. (P. sumptuosus! etrayer!!)
Less. - *Campephilus sumptuosus*, Gr.) manifestum fit, Virum
illum, qui tam diligenter acriter versatus est in fisticulis Avi-
bus indagandis, quique tot jam impostores redarguit, et ipsum
interdum sibi imponi passum esse.

268. *Picus*, L. (Dryobates, Boie - Picus et Leuconotopicus! Malh.) Cosmopol. 40.

a. EUROPAE.

1. *P. major*, L. (cissa, Pall. - pipra, M. c. Gill.) Pl. enl. 196.
595. - Gould, Eur. t. 229. ex Eur. As. sept. Albo
nigroque varius: fronte, genisque albis; vertice, dorsaque ni-
gris: occipite et crissu rubris; abdomine griseo, lateribus
immaculatis.
2. *P. meqius*, L. (cynaedus, Pall.) Pl. enl. 611. - Gould,
Eur. t. 280. ex Europa. Albo nigroque varius: fronto
cinerea; pileo crissuque rubris; collaris albo: lateribus rubel-
lis, nigro-striatis.
3. *P. minor*, L. (pipra, Pall. - striolatus, Meyer.) Pl.
enl. 598. - Gould, Eur. t. 231. ex Europa. Albo
nigroque varius: fronte fusca; pileo rubro: subtus ex toto ru-
fescens: macula utrinque ad collis latera fusca: gula alba; la-
teribus maculatis.

4. **P. leuconotus**, Bechst. (cirris, Pall.) Wern. Atl.

Temm. Man. fig. med. Gould, Eur. t. 228. ex Europa.

*Albo nigroque varius: fronte, genis, dorso, jugo que albis;
pileo criso que rubris; mystacibus nigris: lateribus rubel-
lis, nigro-striatis.*

b. AFRICAN.

5. **P. numidicus**, Malh. 1842. (jabala, *Mus. Paris.*) Faun.

Orn. Sicil. et Rev. Zool. 1845. ex Algeria. Similis

*P. majori Europee; sed rostro longiore, et pectoris torque
nigro et coccineo.*

*Quid P. syriacus, Hempr. et Ehrenb. (*Campthera syriaca*, Gr.)*

*Symbol. Phys. 1829. ex Asia oce. mer. Statuta P.
medii; albo-nigroque varius; subtus albo-flavicans: taenia
colli laterali nigro-fusca; pectoris fascia transversa inter-
rupta coccineo-rosea?*

Quid P. obsoletus, Wagl. Isis, 1829. p. 510. ex Senegambia.

*Fuliginosus fere unicolor, capitidis lateribus striatus: subtus
sericeo-albidus, immaculatus: remigibus, rectricibusque albo
et fuliginoso maculato-fasciatis?*

c. ASIATICI.

6. **P. kizuki**, Temm. Pl. col. descr. tant. - Schleg. Faun.

*Japon. t. 37. m. et f. ex Japon. Parvulus: rostro fusco
flavidoque vario: alis caudae longiusculis: dorso aliquo late
albo-fasciatis: rectricibus quatuor mediis omnino nigris, ex-
timis duabus albo nigroque fasciatis.*

8. **P. pygmaeus** et nanus? Vig. (trisulensis, Licht.)

Proc. Zool. Soc. 1831. p. 172. et 44. ex Asia centr.

*Minimus (Long. 4½-poll.): nigricans, dorso fasciis, alis cau-
daque maculis, albis: subtus albidus nigrante-striatus: su-
perciliis et vitta suboculari albis: sincipite fusco; occipite
nigro, striola auriculari utrinque coccinea.*

9. **P. macei**, Temm. on Vieill? (medius, ex India? Lath.)

*Pl. col. 59. 2. - J. Gr. Ill. Ind. Zool. l. t. 32. 1. mas
jun. 2. faem. ex Bengal. Niger, albo-varius; subtus ru-
fescens: pileo rubro: cauda nigra, albo-fasciata; rectricibus
mediis omnino nigris.*

10. **P. mahrattensis**, Lath. (haemasoma, Wagl. - au-

rericristatus, Tickell) Gould, Cent. Him. B. t. 51. - Ill.

*Ind. Zool. t. 33. 2. ex Asia. Niger, albo-margaritatus;
pileo aureo-griseo: subtus albidus, collari lato interrupto gri-
seo-fusco: abdomine medio rubro; lateribus fusco-striatis.*

Mas crista occipitali rubra. Faem. crista occipitali flavicante.

11. **P. brunneifrons** vel aurifrons, Vig. Pr. Zool. Soc.

1831. - Gould, Cent. Him. B. t. 52. ex Asia centr.

*Albo nigroque varius: subtus albus nigrante-guttulatus:
fronte fusca; vertice brunnea-aurato; occipite (maris) criso-
que coccine*

12. **P. hyperythrus**, Vig. 1831. - Gould, Cent. Hym.

B. t. 50. ex Asia centr. Albo nigroque varius; subtus cum colli lateribus fulvo-castaneus: crisso coccineo: capistro et vitta oculari albis: maxilla nigra, mandibula alba.
Mas pileo coccineo. Faem. pileo nigro, albo-striato.

13. **P. dargellensis**, Blyth, 1845. (majoroides, Hodgs.)

Mus. Lugd. mas. - himalayensis, Mus. Lugd. faem. - hodgsoni? Malherb.) ex Asia centr. Nigerrimus, macula scapulari magna, remigum rectricumque lateralium minoribus, albis; subtus albo-rufescens, maculis nigris magnis crebris longitudinalibus; fronte, genis, mento, abdibus: jugulo, et colli lateribus flavo-rufis; crisso rubro.

Mas occipite coccineo.

14? **P. himalayanus**, Jard. (assimilis, Natt.-himalaya-

nus, Blyth.) Ill. Orn. t. 116. ex As. centr. Nigerrimus, macula scapulari magna, remigum maculis parvis, albis; subtus flavido-griseus immaculatus; crisso rubrocalvis brevibus! Mas pileo coccineo plumbis basi late nigris.

15. **P. hardwickii**, Jerd. (variegatus, Wagl. nec Lath.

moluccensis! J. Gr. an Lath. var. b? nec Gm.) Ill. Ind. Zool. t. 33. l. mas. et faem. ex Asia mer. Minimus: fuscognicans, maculis albidis striatus; pileo immaculato: subtus albidus, maculatis paucis fuscis, obsoletis: rostro brevissimo: cauda alas vix excedenti.

16. **P. cinereitigula**, Math. Mus. Brit. 1845. Rev. Zool.

1849. p. 531. sp. 4. ex Asia mer. Nigricans, maculis candidis fasciato-lunulatus; uropygio candido, fuscō-striato: subtus albo-flavidus; gula cinerea albo-striata; crisso albo striolitis nigris: genis fuliginosae, vitta duplice alba.
Mas. vertice stria utrinque coccinea.

17. **P. mitchelli**, Math. Rev. et Mag. Zool. 1849. p. 553.

sp. 3. Mus. Britann. ex Asia centr. Nepal. Similis P. moluccensi; sed rostro breviore: subtus albo-rufescens, guttulis numerosis rufo-nigricantibus: rectricibus mediis nigris, immaculatis.

Illustratori eximio Generum Avium; urbanissimo David. S. Mitchello in rebus quae ad Zoologiam sustentandam pertinent versatissimo!

Quid P. scintilla, Natter, affinis praecedenti: rostro longiori: corpore supra minus albo-variegato: cauda nigricante?

Quid P. pectoralis, P. canicapillus, P. rubricatus, P. gymnophthalmus et P. validirostris, Blyth, Journ. As. Soc. Bengal. xiv. p. 197?

Quid P. cathpharius, Hodgs. Journ. As. Soc. Beng. 1843. p. 1006.
ex Asia centr?

d. OCEANIC.

18. **P. moluccensis** et bicolor? Gm. (*Tripsurus auritus*,
Eyton) Pl. enl. 748. 2. ex Sum. Borneo. Minimus: fuscus, albo-striatus; píleo immaculato: subtus cinerascens, guttulis latis, nigris, crebris: rostro longiculo: rectricibus alas valde caudam excedentibus, omnibus albo nigroque fasciatis. Mas striola utrinque occipitali coccinea inconspicua.
19. **P. minor**, Horsf. (*analis*, Temm. - macci, Wagl. nec Temm. - wagleri? Hartl.) ex Java. Similis P. macei, sed minor: niger, albo-striatus; subtus albus, pictore nigro-maculato: genis colloque ab his, vitta laterali utrinque nigra: crissu rubro: píleo (maris) coccineo: rectricibus omnibus albo nigroque fasciatis.
20. **P. temminckii**, Malh. Rev. et Mag. Zool. 1840. p. 530. sp. 2. Mus. Lugd. ex Celebes. Similis P. Kisuki, sed minor: rostro longiori unicolori: tectricibus alarum remigibus tantum albidò-punctatis: rectricibus omnibus fasciis albo-rufescens.
- Oppositionis studio obscurissima Avis splendissimo Mus. Lugd. Moderatori dicata!*

e. AMERICANI SEPTENTRIONALES.

21. **P. stricklandi**, Malherb. Rev. Zool. 1845. p. 373. ex Mexico. Nigricans, dorso albo-striato: regione parotica, superciliis, et semicollarri albis: subtus albus, gula pectoraque maculis, abdomine fuscis, nigris: alis elongatis!
22. **P. jardiniti**, Malherb. Rev. Zool. 1845. p. 374. ex Mexico. Nigerrimus, tergo cinereo-striato; subtus, cum genis et collateribus, ex cinereo-rufescens.
23. **P. querulus**, Wils. (leucotis, Ill. - borealis, Vieillot. viellotii, Wagl.) Am. Orn. t. 15. 1. - Oiz. Am. t. 122. Aud. Am. t. 389. Albo nigroque fasciatus; tectricibus eaudae aterrimitis, alarum maculis cordiformibus albis: subtus albus, lateribus nigro-guttulatis: píleo toto lucide nigro: narium plumulis albis: striola utrinque ad occipitis latera coccinea.
24. **P. villosus**, L. - Pl. enl. 754. - Wils. Am. Orn. t. 9. 1. Vieill. Oiz. Am. s. t. 120 - Aud. Am. t. 416. 1. 2. Albo nigroque varius, dorsi plumbi medii longioribus albis subvillosus; fronde alba; píleo genisque nigris; plumulis narium, superciliis, vitta utrinque lata infraoculari, corpore subtus, rectricibusque lateralibus albis. Mas occipite rubro.
25. **P. canadensis**, Gm. (leucomelas, Bodd. - leucomelanus, Wagl.) Pl. enl. 345. - Aud. Am. t. 417. 7. ex Canada. Albo nigroque varius; subtus albus, immaculatus: colli lateribus albis, vitta duplice nigra: rectricum extima tota alba; secunda basin versus et opice nigra. Mas vertice coccineo. Faem. píleo toto nigro.

26. *P. philipsi*, Audubon, *B. of America*, t. 417. 5. 6.
27. *P. martinæ*, Audubon, *B. of Amer.* t. 417. 1. 2.
28. *P. harrisi*, Audub. (*inornatus?* *Licht.*) *Amt.* 417. 8. 9.
29. *P. auduboni*, Trudeau - Audubon, *Amer.* t. 417. 4.
30. *P. wilsoni*, Malh. *Rev. Zool.* 1849. p. 529. sp. 1. ex *Californica*. *Albo-nigroque varius; subtus albus, lateribus nigro-maculatis; sincipite nigro albo-striolato; occipite coccineo; capitis collique lateribus albis, vittis nigris duabus: uropygia, rectricibusque mediis nigris; tribus utrinque extiniis albis, nigro-fasciatis.*
- Wilsoni WILSONI nomine digne, Avium rario-rum odoratori, investigatori, perscrutatori indefesso, liberalissimo, jam ab alio dicatum ex animi sententia iterum dico!
31. *P. pubescens*, L. - Wils. *Am. Orn.* t. 9. 4. - Vieill. *Ois. Ams.* t. 121. - Aud. *Amer.* t. 112. ex *Amer. sept.* *Minor;* *albo nigroque varius; subtus albidus; pilo nigro, fascia occipitali rubra angusta; genis vitta duplice alba; rectricibus lateralibus albis nigro-maculatis; remigum septima secundam valde superante.*
32. *P. medianus*, Sw. *Faun. Bor. Amer.* p. 308. ex *Amer. sept.* *media;* *Albo-nigroque varius; subtus albidus; vertice nigro; occipite rubro, maculis albis; remigum secunda septimum valde superante.*
33. *P. meridionalis*, Sw. (*P. gardneri?* *Audub.*) *Faun. Bor. Am.* p. 308. - *Orn. Biogr.* v. p. 317. - *Am. 2.a ed.* cum fig. ex *Georgia.* *Minor;* *albo nigroque varius; subtus cinereus; vertice nigro; fascia occipitali lata rubra; remigum secundo et octava subaequalibus.*
34. *P. varius*, L. - Pl. enl. 755. - Wils. *Am. Orn.* t. 8. 1. 2. et t. 9. 2. - Bp. *Am. Orn.* t. 8. 1. 2. juv. - Vieill. *Ois. Am. s.* t. 118. - Audub. *Am.* t. 190. ex *Amer. sept.* *Albo nigroque varius; capite pectoreque rufescentibus; genis albis, stria nigra; gula rubra, nigro-marginata.*
35. *P. cancellatus*, Wagl. *Isis*, 1829. p. 510. ex *Mexico.* *Albo fuliginosoque fasciatus, tectricibus alarum albo-guttatis; subtus albidus longitudinaliter nigro-striatus; pilo, plumis apice coccineis, cerviceque fuliginosis.*
36. *P. scalaris*, Wagl. 1829. (*gracilis*, Less. 1839. - *nuttalli*, *Gambel*, 1848.) *Journ. Ac. Phil.* 1. t. 18. 2. 3. ex *Mexico.* *Albo nigroque fasciatus; subtus sordido albus, maculis parvis atterimis, cordiformibus; canda tectricibus superioribus atterimis; rectricibus mediis nigris, immaculatis.*
- Quid P. parvus, P. yucatensis et P. dubius, Cabat. 1845. ex Mex?*

†† AMERICANI MERIDIONALES.

37. **P. cactorum**, Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 62. 2. ex

Bras. o.c. Albo nigroque varius: cereice abdomineque cinereis: fronte late alba: gula pectoroque auratis.

38. **P. bicolor**, Gm. (variegatus, Lath. sec Wagl. - mixtus

Gr. ex Bodd. - maculatus, Vieill.) Pl. enl. 748. 1. ex Amer. m.e.r. Minor: albofuscusque varius, supra lineatus, subtus longitudinaliter maculatus: capitis lateribus albis, macula postoculari fusca: pileo subcristato, variegato. Mas pileo rubro. Faem. pileo fusco.

39. **P. lignarius**, Molina (melanocephalus, King - puncticeps, Orb. - kingi, Gr. - albostriatus, Natter.) ex Amer.

m.e.r. Long. 7-poll. Albo nigroque varius; subtus albidus dense nigro cancellatus: superciliis protractis, vittaque utriusque a basi rostri late, albis; pileo cum nucha unicolo nigro. Quid Picus Mus. Lugd. ex Brasilia? (ad africanos Dendro-

bates accedens) a Lichtensteino 1840 missus; cuius faemina est simillima P. lignario, sed minor, genis haud vittatis, rachidibus remigum rectricumque auratis! Mas genis albo-sericeis; fronte latissime rufo-cinerea; occipite cum verticis parte coccinea.

Quid P. anais, P. grataloupensis, P. guayaquilensis, Less. Echo, 1846?

270. **Apternus**, Sw. (Picoides, Laoep. - Tridactyla, Shaw) Eur. As. Am. bor. 3.

1. **Picus tridactylus**, L. (Picoides europaeus, Less. - criso-

soleucus, Brandt. - Picoides tridactylus, Gr.) Werner, Atl. Temm. Man. fig. - Gould, Eur. t. 332. ex Eur. As. sept. Long. 9-poll. albo nigroque varius; dorso longitudinaliter albo: subtus albo nigroque variegatus; pectore candido: fronte maculata; vertice flavo-aurato: rostro parum depresso. Faem. pileo nigro, argenteo striato.

2. **PICUS TRIDACTYLUS**, Sw. (hirsutus et undulatus, Vieill.

Apternus americanus, Sw. - Picoides hirsutus, Gr.) Edie. B. t. 114. - Ois. Am. s. t. 124. - Faun. Bor. Am. t. 56. ex Am. sept. Minor: albo nigroque varius; dorso albo, fasciis nigricantibus; fronte maculata; vertice flavo-aurato: rostro depresso. Faem. pileo nigro, albo-striato.

3. **PICUS TRIDACTYLUS**, Bp. (**arcticus**, Richards. et Sw.

Picoides arcticus, Gr.) Am. Orn. t. 14. 2. - Faun. Bor. Am. Av. t. 57. ex Amer. max. bor. Major: niger-rimus, dorso unicolori nitente, remigibus tantum maculatis; subtus albus; fronte pura; vertice flavo-aurantiaco; rostro robustiore, depresso. Faem. pileo nigro.

SUBFAM. 47. PICUMNINAE.

271. **Sasia**, Hodgs. (*Microcolaptes*, Gr. - *Comeris*, Hodgs.) Asia m. Ocean. 2.

1. **PICUMNUS abnormis**, Temm. (*Sasia abnormis*, Gr.) *Pl.*

col. 371. 3. ex Java, Sumatra, Borneo. Olivaceus, subtus cum genis castaneis; cauda nigra.
Mas frons flavus. Faem. frons rufa.

2. **Sasia ochracea**, Hodgs. *Journ. As. Soc. Bengal.*

1836. p. 778. *ex Asia mer.*

272. **Vivia**, Hodgs. (*Piculus hinc Vivia*, Hodgs. - *Picumnus*, p. Gr.) Asia central. 1.

PICUMNUS immominatus, Burton. (*Vivia nepalensis*,
Hodgs. - *Piculus nepalensis et rufifrons*, Hodgs., *List.*)

*Proc. Zool. Soc. 1825. p. 154. Brit. Mus. ex Asia
centrali. Flavo-viridis; subtus albidus, maculis nigris
conuentibus; frons nigra et aurantio-fasciata; collis lateribus
fuscis; superciliis vittaque suboculari albis.*

273. **Picumnus**, Temm. (*Asthenurus*, Sw. - *Piculus*, Gœffr.) America m. 11.

a. *Immaculati*; *subtus fasciati*.

1. **PIPER minutissima**, L. (*Yunx minutissimus*, Gm. Vieill.

Picus minutissimus, Pall. - *Picus minutus*, Lath. - *cayen-*
nensis minor, Br. - *Picumnus cirratus*, Temm. - *cayen-*
nensis, Lafr.) *Pl. col. 371. 1. mas 2. faem. ex Guiana,*
principiave Batava. Major! (Long. 4-poll.): cincereus, nucha
rufescens; occipite nigro, albo-punctulato: subtus albo nigro-
que fasciatus. Mas sincipite rubro nigro-striolato.
Faem. pileo ex toto nigricante, albo-punctulato.

2. **P. exilis**, Temm. nec Licht. (*temminckii*, Lafr. - *Yunx*
minutus, Vieill. ex Azara 260.) *Pl. col. 371. 2. ex Bahia.*

Fuscus; subtus albus, plumis fasciis mediana nigra.

3. **P. exilis**, Gr. ex Licht. (*lichtensteinii*, Lafr.) *Cat. Du-*
blet. Berl. sp. 80. ex Brasil. San Paulo. Long.
3½-pollie. Fuscus; subtus albus, plumis nigro-marginatis.

b. *Maculatus; subtus fasciatus.*

4? **P. buffonii**, Lafr. (*minutus?* Wagl. 1829.) *Pl. enl. 786. 1.*
ex Cayenna. Viridi-oliveaceus, dorso aliquo albo-punc-
tatis; subtus viridis, albo nigroque undulatus: rostro breviori.

c. *Maculatus infra supraque.*

5. **Picus pygmaeus**, Lichtenst. (*ocellatus*, Wagl. 1829.
Picumnus pygmaeus, Lafr.) *Cat. Dubl. Mus. Ber. p. 12.*
ex Bras. Fuscus, dorso et abdomen ex totis albo-guttatis.

d. *Immaculati; subtus haud fasciati.*

6. **P. albiscquamatus**, Orb. *Voy. Am. m. Ois. t. 64. 2.*
Fusco-brunneus; alarum tectricibus rufo-marginatis; pectore
plumis nigro-marginatis tamquam squamato.

7. **P. olivaceus**, Lafr. Rev. Zool. 1845. p. 7. ex Columb.
Fusco-olivaceus; subtus cinerascens; gula albida; ventre flammulæ nigricantibus.
8. **P. granadensis**, Lafr. Rev. Zool. 1847. ex Nova Granada. *Majusculus; olivaceo-griseus, uropygio sulphurascens; subtus albo-griseus striis fuscis subobsoletis; pileo cerviceque nigris albo-punctulatis.*
9. **P. orbignyanus**, Lafr. Rev. Zool. 1845. p. 7. Valde minor P. minuto, cui coloribus similis: magnitudine P. exilis: *cinereo-rufescens; subtus, cum lateribus collis, albus, plumis nigro-marginatis tamquam squamatus.*
10. **Asthenurus rufiventris**, Bp. (Picumnus rufiventer, Gr.) Pr. Zool. 1837. *Fuscus; subtus cum genis rufus: pileo nigro, rubro-maculato.*
11. **P. cinnamomeus**, Wagler, Is. 1829. p. 646. - Lafr. Rev. Zool. 1845. p. 7. *Rufo-cinnamomeus; fronte albida, plumulis piliformibus, rigidis, obtecta; pileo nigro, verticis striolis flavis, nucha maculis albis.*

FAMILIA 21. BUCCONIDAE.

SUBFAM. 48. BUCCONINAE.

- *274. **Gymnobucco**, Bp. (Bucco, p. Temm.) Africa occid. 1.
 **Bucco calvus*, Mus. Lugd. an Lafresn? (Megalaima calva? Gr.) ex Ashantea. *Long. 6-poll; fuliginoso-cinerous; capite cum genis implumus; penicillitis setarum rigidarum duobus rufescientium ad rostri latera, duobus hinc inde mandibulæ, altero subtus antrorsum verso. Rostrum albidum.*
275. **Psilopogon**, Müll. 1835. nec Boie (Megalorhynchus, Eyton.) Malaisia. 1.
Psilopogon pyrolophus, Müll. (Bucco pyrolophus, Temm.) Pl. col. 597. - Tijdschrift voor Nat. Gesch. 1835. t. 2. ex sylvis montosis Ins. Sumatr.
- *276. **Psilopus**, Temm. (Bucco, p. Auct. - Caloramphus, Less.) Asia m. Malaisia. 1.
M. hayii, Gr. (spinosis, Eyton. - Micropogon fuliginosus, Temm. - Caloramphus sanguinolentus, Less. - Bucco lathami, Raffles.) ex Asia m. Sumatra, Borneo. Quid Bucco lathami, Gm. (Meg. lathami, Gr.) Lath. Syn. II. t. 22. Avis jun. Patriae incertae?
- *277. **Xylobucco**, Bp. (Bucco, p. Temm.) Africa occ. 1.
 **Bucco scolopaceus*, Temm. Mus. Lugd. ex Ashantea; *Long. 4-poll: nigricans, plumis singulis opice flavo-virescenti subundulatus; subtus cinerascens flavo-indutus, striolis fuscis evanescentibus. Rostrum nigrum, rectissimum, apice valde compressum.*

278. **Trachyphonus**, Ranzani, 1823. (*Cucupicus*, Less. - *Po-*
lysticte, Smith. - *Promepicus*, Lafr.) Africa. 3.
 1. **Picus! cafer**, Gm. (*Trachyphonus vaillanti*, Ranz. - Tr.
cafer, Gr. - *Micropogon sulphuratus*, Lafr. - *occipitalis*,
Rüpp. - *Polysticta quapapa*, Smith. - *Picus lathami*, Gm?
nec Wagl.) *Levaill. Prom. t. 32.* - *Mag. Zool. 1836. t. 60.*
ex Afr. mer.
2. **Bucco subsulphureus**, Fraser. (*Capito subsulphu-*
reus, Gr.) *Proc. Zool. 1843. p. 3.* *ex Ins. Fernando Po.*
3. **Bucco margaritatus**, Cretzschm. (*Micropogon margar-*
itus, Temm. - *Tamatia erythropygus*, Ehrenb. - *Ca-*
pito margariticus, Gr.) *Atl. t. 20.* - *Pl. col. 490.* *ex*
Africa orient. Abyssinia.
Quid Gerini, Lath. ex Gerin. Orn. t. 181. Patriae incertae?
279. **Micropogon**, Temm. (*Psilopogon*, Boie, Ms. 1825. *nec Müll.*
Capito, Vieill. Gr. *nec Auct.* - *Nyctactes*, Gloger). America mer. 3.
 1. **Bucco cayennensis**, et naevius, Br. (*erythrocephalus*,
Bodd. - *Micropogon cayennensis* et naevius, Temm.
Capito naevius, Vieill. jun. - *Capito erythrocephalus*, Gr.
ex Bodd.) *Pl. enl. 206. t. mas. 2. faem.* - *Edw. B. t. 333. jun.*
Lev. Barb. t. 23. mas. 24. faem. 25. jun. 26. sen. ex Guiana.
Quid Capito erythrocephalus, Tschudi, Faun. Per. p. 260?
2. **Bucco peruvianus**, aurantius et punctatus? Cuv. - *Mi-*
cropogon aureus, Temm. - *flavicollis*, Bp. - *Capito punc-*
tatus, Less. - *C. peruvianus*, Gr.) *Lev. Barb. t. 27.* adult.
O. des Murs. Pl. p. 20. juv. ex Peru.
3. **CAPITO glaucoangularis**, Tschudi. (*Micropogon glau-*
angularis, Bp.) *Faun. Peruviana*, t. 24. 2. *ex Am. mer. occ.*
- *280. **Eubucco**, Bp. (*Capito*, p. Gr.) America m. 6.
 1. **CAPITO richardsoni**, Gray et Mitch. *Gen. B. t. 106.*
ex Columbia.
2. **MICROPOGON hartlaubi**, Lafr. 1845. (*Capito hartlaubi*,
Gr.) *Rev. et Mag. Zool. 1849. t. 6.* - *Mus. Lugd. Maser*
faem. ex Columbia, S. Fe de Bogota.
3. **MICROPOGON boursieri**, Lafr. 1845. (*Capito boursieri*,
Gr.) *Rev. et Mag. Zool. 1849. t. 4.* - *Mus. Lugd. ex Columb.*
4. **Bucco elegans**, Gm. (*mayanensis*, Biss. - *pictus*,
Bodd. - *Capito maynanensis*, Gr.) *Pl. enl. 330.* - *Lev.*
Barb. t. 34. *ex Brasil.*
5. **Bucco aurivirens**, Cuv. (*Capito aurovirens*, Gr. ex Bp.)
Lev. Barb. t. Suppl. E. ex Brasil.
6. **CAPITO aurifrons**, Vig. (*Capito aurifrons*, Gr.) *Proc.*
Zool. Soc. 1832. p. 3. *ex Chili.*

- * 281. **Bucco**, L. p. (Megalaima, Gr. part.) Asia. mer. 1.
B. grandis, Gr. (virens, Bodda. - Megalaima virens, Gr.) Pl. enl. 871. - Lev. Barb. t. 20. - Gould, Cent. Him. B. t. 46. ex Asia orient. mer.
282. **Megalaima**, Gr. (Bucco, p. Auct.) Asia m. Oc. 24.
1. **B. chrysopogon**, Temm. (Megalaima chrysopogon, Gr.) Pl. col. 285. mas. ad. ex Sumatr. Born. Malacc.
2. **B. versicolor**, Raffles (rafflesi, Less. nec Bois - Megalaima versicolor, Gr.) Pl. col. 300. ex Sumatra, Borneo, Malacca.
3. **B. mystacophanous**, Temm. (Megalaima mystacophanous, Gr.) Pl. col. 315. ex Sumatra.
4. **B. oorti**, Müll. (Megalaima oortii, Gr.) Tijdschrift voor Natuurl. Gesch. 1835. t. 8. 4. ex Sumatra. Fronto occipiteque medio rubris; gula flava.
5. **B. henrici**, Temm. Pl. col. 524. ex Sumatra. Major: rostro valde robustiore; fronte flava; gula occipiteque ex toto caeruleis. Temere a Mullero cum praeced. confusus!
6. **B. australis**, Horsf. nec Raffles. (gularis, Reinw. - Megalaima australis, Gr.) Pl. col. 89. 2. ex Java.
7. **B. javensis**, Horsf. (kotorea, Temm. - Megalaima javensis, Gr.) Temm. Pl. col. sine fig. - Lev. Barb. Suppl. t. C. ex Java.
8. **TROGON asiaticus**, Lath. (Bucco cyanops, Cuv. - caeruleus, Dum. - Capito cyanocollis, Vieill. - Pogonias cyanogenius, Merr. - Megalaima asiatica, Gr.) Lath. Gen. Hist. III. t. 51. - Gal. Ois. t. 35. - Lev. Barb. t. 21. 22. ex Sumatra? Himal. et Bengal.
9. **B. flavifrons**, Cuv. (aurifrons, Temm. - Megalaima flavifrons, Gr.) Levaill. Barb. t. 55. ex Ins. Ceylon.
10. **B. armillaris**, Temm. (Megalaima armillaris, Gr.) Pl. col. 89. 1. ex Java.
11. **B. trimaculatus**, J. Gr. (frontalis, Temm. - duvau-celi, Less. - australis? Raffles, nec Horsf. - Megalaima trimaculata, Gr.) Zool. Misc. t. 3. - Pl. col. 536. 1. - Guérin, Icon. R. Anim. t. 34. 1. ex Borneo, Sumatra, Malacca, Siam.
Quid B. cyanotis, Blyth, Megalaima cyanotis, Gr. J. As. Soc. Beng?
12. **B. roseus** et barbiculus, Cuv. (roseicollis, Vig. - Capito rosaceicollis, Vieill. - Pogonias pullarius, Merr. - Megalaima rosea, Gr.) Lev. Barb. t. 33. et t. 56? ex Java.

13. **B. philippensis**, Briss nec Gm. (flavigula, Bodd.
parvus? Gm. nec Cuv. - indicus? Lath. - flaviocollis, Vieill.
rubricollis, Cuv. - rubrifrons, Merr.) Pl. enl. 331, Ocean.
B. luteus, Less. (Megalaima lutea, Gr.) O. des Murs, Pl.
p. 121. var. canaria! quam Semetipsi dicavit qui gallicum
nomen dedit Serini!
Micropogon cinctetus, Temm. (torquatus, Cuv. - Cap. cinctus,
Gr.) Levaill. Barb. t. 37. est Avis fictitia.
14. **B. rafflesius**, Boie, nec Less. ex Sumatra. Prae-
denti valde affinis, sed distinctus.
15. **B. rubricapillus**, Gm. (Megalaima rubricapilla,
Gm.) Brown, Ill. t. 14. ex Ceylon.
- 16? **B. maculatus**, Gmelin. (Megalaima maculata, Gr.)
Brown, Ill. t. 13. ex Ceylon.
17. **B. corvinus**, Temm. (lineatus? Vieill. - Megalaima
corvina, Gr.) Pl. col. 522. ex Java.
18. **B. phaesticus**, Temm. (Megalaima faiostricta, Gr.)
Pl. col. 527. ex Cochinchina.
- * 19. **Megalaimus hogdsoni**, Bp. Mus. Lugd. ex
Nepal. Similis sequenti, at valde major.
20. **B. viridis**, L. (zeylanicus? Gm. - Megalaima viridis,
Gr.) Pl. enl. 870. - Brown, Ill. t. 15. - Jerd. Ill. t. 26.
ex Asia mer. Java.
21. **B. caniceps**, Franklin. (lineatus, Tickell, nec Vieill.
Megalaima caniceps, Gr.) Lev. Barb. t. 28. ex Asia mer.
22. **B. malaccensis**, Hartl. (Megalaima malaccensis,
Gr.) Rev. Zool. 1842. p. 336. ex Asia mer.
23. **B. quadricolor**, Eyton, Proc. Zool. Soc. 1839. p. 105.
ex Malacca.
24. **B. franklini**, Blyth. (ignitus, Hodgs. - igniceps,
Temm. - Megalaima franklini, Gr.) Journ. As. Soc.
Beng. 1842. p. 167. ex Nepal.
283. **Barbatula**, Less. (Pogoniulus, Laf. - Megalaima p. Gr.) Africa. 4.
1. **Bucco barbatula**, Temm. (Bucco parvus, Cuv. nec Gm.
pusillus, Dum. - B. chrysopterus, Sw. - B. chryso-
zonicus, Rupp. - nanus, Vig. nec Bodd. - Capito rubri-
frons, Vieill. - Barbatula nana, Gr. err. Bodd.) Pl. enl.
746. 2. ex Afr. mer. et or.
2. **Bucco minutus**, Temm. (Pogonias passerinus? Merr.)
Mus. Lugd.-Lev. Barb. t. 32. ex Sennar. Caffer.

3. **Bucco atroflavus**, Blumenb. (erythronotus, Cuv. - Megalaima atroflava, Gr.) *Sparrm. Act. Suec.* xviii. t. 9.
ex Afr. occ. Guinea.
4. **Bucco chrysocomus**, Temm. (err. chrysomus!) et chrysocomus!! (Megalaima chrysocoma, Gr.) *Pl. col.* 536. 2.
ex Afr. occ. Senegal. Galam.
- 284. Pogonias**, Ill. (Laimodon, Gr. - Pogonia, Vieill. - Pogonius, Leach.) Africa. 10.
1. **Bucco dubius**, Gm. (Pogonius sulcirostris, Leach. - Pogonia erythromelas, Vieill. - Pog. major, Cuv. - Laimodon'dubius, Gr.) *Pl. enl.* 602. - *Lev. Barb.* t. 19. - *Zoolog. Misc.* t. 76. - *Gal. Ois.* t. 32. *ex Senegal.*
 - Sparactes superbus, Auct. est, Nitzsch o docente, Avis composita hujus speciei cute, cum crista Edolii.
 2. **Bucco bidentatus**, Shaw (leuconotus, Vieill. - Pogonias laevirostris et levaillanti, Leach. - pyrrhogaster? Rüpp. - Laimodon bidentatus, Gr.) *Nat. Misc.* t. 393. *Leach. Zool. Misc.* t. 77 et 117. - *Levaill. Barbus*, t. A. jun. et Guép. *Suppl. t. K.* adult, *ex Senegal.*
 3. **Pogonias nigrithorax**, Cuv. (personatus, Temm. Laimodon nigrithorax, Gr.) *Pl. col.* 201. - *Lev. Barb.* t. 28. *ex Africa.*
 4. **Bucco salti**, Stanley. (Pogonias rubrifrons, Sw. - haematoxys, et personatus? jun. Wagl. - brucei, Rüpp. - Loxia! abyssinica? Gm. - Hyreus! abyssinus? Steph. - Phyrotoma! tridactyla, Daud. - Laimodon salti, Gr.) *Salt's Trav. Append.* xliv. liv. - *Lath. Hist. of B.* iii. t. 53. *Zool. Ill.* t. 68. - *Faun. Abyss.* t. 20, 1. *ex Afr. or.*
 5. **Pogonias vieilloti**, Leach. (senegalensis, Licht. Bucco rubescens et fuscescens, Vieill. - Laimodon vieilloti, Gr.) *Zool. Misc.* t. 97. - *Levaill. Barb. Suppl. t. D.* *ex Africa occ. Senegal.*
 6. **Bucco niger**, Gm. (rufifrons, Steph. - Trogon! luzonensis, Scopoli - Pogonius stephensi, Leach. - Laimodon leucomelos, Gr. ex Bodda.) *Pl. enl.* 688. 1. - *Zool. Misc.* t. 116. - *Sonn. Voy.* t. 34. - *Lev. Barb.* t. 29. 30. 31. *Vieill. Gal. Ois.* t. 33. *ex Afr. mer.*
 7. **Pogonias hirsutus**, Sw. (Laimodon hirsutus, Gr.) *Zool. Ill.* t. 72. *ex Africa occ. Ashantea.*
 8. **Pogonias bifrenatus**, Ehrenb. (melanocephalus, Rüpp. - Laimodon bifrenatus, Gr.) *Symb. Phys.* t. 8. 2. *Cretzschm. Atlas.* t. 28. A. *ex Afr. or. Abyssinia.*

9. **Pogonias unidentatus**, Licht. (Laimodon unidentatus, Gr.) Verz. Sudafrik. Th. p. 17. sp. 179. ex Afr. m.
 10. **Laimodon undatus**, Rüpp. (Pogonias undatus, Temm. Mus. Lugd.) Faun. Abyss. t. 20. 2. ex Afr. orient.

FAMILIA 22 CAPITONIDAE.

SUBFAM. 49. CAPITONINAE.

285. **Capito**, Temm. nec Vicill. (Chaunornis, Gr. 1841. - Bucco Gr. ex L' 1843.) America trop. 10.
 1. **Bucco capensis**! *L. (collaris*, Lath. - Tamatia collaris, Cuv. - Capito collaris, Temm.) Pl. enl. 395. - Lev. Barb. t. 42. ex Amer. mer.
 2. **Bucco macrorhynchus**, Gm. (Tamatia macrorhynchus, Cuv. - Capito macrorhynchus, Temm. - Cyphos macrorhynchus, Spix) Pl. enl. 689. - Lev. Barb. t. 39. ex Mexico mer. et Septentrionalibus Amer. mer.
 3. **TAMATIA MACRORHYNCHUS**, Sw. nec Gm. (Bucco swainsoni, Gr. - Capito swainsoni, Bp.) Zool. Ill. t. 99. ex Bras.
 4. **Bucco pectoralis**, Gr. et Mitch. Gen. of B. t. 26. ex Amer. mer.
 5. **Bucco melanoleucus**, Gm. (Tamatia melanoleucus, Cuv. - Capito melanoleucus, Wagl. - tectus, Gr. ex Bodd. Pl. enl. 688. 2. - Levaill. Barb. t. 40. ex Am. mer.
 6. **Cyphos macrodactylus**, Spix (Capito cyphos, Wagl. Bucco macrodactylus, Gr.) Av. Bras. t. 39. 2. ex Am. mer.
 7. **TAMATIA bicincta**, Gould. (bitorquata, Sw. - Bucco bicinctus, Gr.) Pr. Zool. Soc. 1836. p. 80. ex Columbia, Venezuela.
 8. **TAMATIA gularis**, Orb. et Laf. (Bucco gularis, Gr.) Rev. Zool. 1838. p. 166. ex Amer. mer. Carthagena.
 9. **Bucco ruficollis**, Licht. (Capito ruficollis, Wagl.) Isis, 1829. p. 658. ex Mexico.
 10. **MALACOPTILA panamensis**, Laf. Rev. Zool. 1847. p. 70. ex Columbia.

 286. **Tamatia**, Cuv. (Cyphos, Spix. - Nyctactes, Strickland. Amer. mer. 4.
 Bucco, p. Gr.)
 1. **Bucco tamatia**, Gm. (Tamatia maculata, Cuv. - Chaunornis tamatia, Gr. 1841. - Capito tamatia, Steph. - Nyctactes tamatia, Strickland.) Pl. enl. 746. 1. - Levaill. Barb. t. 41. - B. of Bras. t. 11. ex Amer. mer.
 2. **Bucco chacuru**, Vieill. ex Azara 281. (Bucco strigilatus, Licht. - Capito melanotis, Temm.) Pl. col. 94. Bras. m.

3. CAPITO *leucotis*, Sw. (Bucco leucoonis, Gr.) *B. of Braz.*
t. 10. ex *Brasil. sept.*

4. ALCEDO! *maculatus*, Gm. (Bucco maculatus, Gr. - somnolentus, Licht. - Capito somnolentus, Temm. - Tamatia tamajac, Less. - T. maculata, Bp.) *Lev. Guép. Suppl. t. F.* - *Sw. B. of Braz. t. 9. ex Brasil.*

287. **Monasa**, Vieill. (Barbacous, Cuv. - Lypornix, Wagl. Scotocharis, Glog. - Monastes, Nitzsch. - Malacoptila, Gr.) America trop. 9.

1. **CUCULUS *tranquillus***, Bucco cinereus, et Corvus australis, Gm. (Cuculus ater, Bodd. - B. calcaratus, Lath. Corvus affinis, Shaw. - Capito calcaratus, Temm. - Monasa tranquilla, Vieill. - M. atra, Gr. ex Bodd. - Lypornix tranquilla, Wagl.) *Pl. enl. 512. - Levaill. Barbus, t. 44. adult. 45. jun. ex Guiana.*

2. **Bucco *nigrifrons***, Spix (Lypornix unicolor, Wagl. Monasa nigrifrons, Gr.) *Av. Bras. t. 43. 2. ex Bras.*

3. **Bucco *leucops***, Licht. (Bucco albifrons, Spix - Monasa personata, Vieill. - Capito leucops, Temm. - Lypornix leucops, Wagl. - M. leucops, Gr.) *Av. Bras. t. 41. 1. Sw. B. of Braz. t. 12. - Gal. Ois. t. 36. ex Am. mer.*

4. **Bucco *fusca***, Gm. (torquatus, Hahn - striatus, Spix, jun. Malacoptila fusca, Gr. 1841. - Tamatia fusca, Less. Monastes fuscus, Nitzsch. - Monasa fusca, Bp. 1827. Lypornix torquata, Hahn.) *Ausl. Vög. XIII. t. 5. - Lev. Barbus, t. 43. - Av. Bras. t. 40. 2. jun. - Sw. B. of Braz. t. 34. ex Brasil.*

5? **Monasa unitorques**, Dubus, *Bull. Acad. Brux.* 1848. - *Rev. Zool. 1848. p. 248. ex Peru.*

6? **Monasa inornata**, Dubus, *Bull. Acad. Brux. 1848. Rev. Zool. 1848. p. 249. ex Guatemala.*

7. **Bucco *rufa***, Spix (Lypornix rufa, Wagl. - Monasa rufa, Gr.) *Av. Bras. t. 40. 1. ex Brasil.*

8. **Bucco *rubeocula***, Spix (Monasa phaioleuca, Temm. Lypornix rubecula, Wagl. - M. rubecula, Less.) *Av. Bras. t. 39. 1. - Pl. col. 323. 2. - Sw. B. of Bras. t. 35. ex Brasil.*

9. **Bucco *ruficapilla***, Tschudi (Monasa ruficapilla, Gr.) *Faun. Peruan. p. 40. ex Peru.*

288. **Chelidoptera**, Gould. (Brachypetes, Sw.) America mer. 1.

CUCULUS tenebrosus, Pall. (Capito tenebrosus, Temm.

Monasa tenebrosa, Vieill. - Lypornis tenebrosa, Wagl.

Brachypetes tenebrosa, Sw. - Chelidoptera tenebrosa,

Gould.) Pl. enl. 505. - Pl. col. 323. 1. - Lev. Barbus, t. 46. - Sw. Bras. t. 36. ex Brasil.

FAMILIA 23. TROGONIDAE.

SUBFAM. 50. TROGONINAE.

289. **Trogon**, L. America mer. 24.

1. **T. curucui**, L. (melanurus, Sw. - nigricaudata, errore,

Gould.) Pl. enl. 452. 737. - Lev. H. N. Courouc. t. 1. m. 2. f.

Gould, Monogr. Trogon. t. 18, mas et faem. ex Cayenn.

Rectricibus extimis utrinque tribus nigris: abdome coccineo.

Mas aureo-viridis. Faem. dilute cinerea.

2. **T. surucui**, Vieill. ex Azara 270. - Hist. Nat. Quadr.

Parag. t. 24. - Gould, Monogr. Trogon. t. 15. ex

Bras. mer. Paraguay, Patagonia. Rectricibus

extimis utrinque tribus pure albis: abdome coccineo.

Mas viridis. Faem. nigricans.

3. **T. viridis**, L. (violaceus et strigilatus, Gm. - leverianus,

Shaw - albiventer, Cuv. - melanopterus, Sw.) Pl. enl.

765. 766. - Lev. H. N. Courouc. t. 3, mas. 4. faemina.

5. specim. decol. - Lev. Mus. t. p. 175. - Gould, Mon. Trog.

t. 10. mas jun. 11. m. ad. et faem. ex Guiana, Brasil,

Antill. Capite pectore que atro-violaceis: abdomine

flavo et aurantiaco: alis nigris: rectrice utrinque extima bi-

colora immaculata.

4. **T. atricollis**, Vieill. (rufus, Gm. - lepturus, Sw.

scalaris, Licht.) Pl. enl. 195. mas. 736. faem. - Lath.

Gen. Syn. t. 21. - Lev. Hist. Nat. Courouc. t. 7 mas.

8. faem. 9. mas decol. 15. faem. - Gal. Ois. t. 31. - Monogr.

Trogon. t. 8 ex Amer. mer. Abdomine flavo-auran-

tiaco: speculo alari albo. Mas aureo-viridis. Faem. rufa.

5. **T. sulphureus**, Spix. (meridionalis, Sw.) Av. Bras.

t. 38. - Gould, Monogr. Trogon. t. 9. ex Antill.

Cayenna, Bras. sept. Minimus: abdomine aurantio:

rectrice utrinque extima fasciis latis nigris.

Mas aureo-viridis. Faem. nigricans.

6. **T. aurantius**, Spix, Av. Bras. t. 36. - Gould, Mon.

Trogon. t. 14. ex Bras. Rectricibus extimis utrin-

que tribus albis, immaculatis: abdomine aurantio.

Mas viridis, capite pectore que violaceis. Faemina nigricans.

7. **T. collaris**, Vieill. (Curucui? Merr. - rosalba, Cuv. - auratus, Sw. mas. - castaneus, Spix, faem.) *Av. rar. Icon. t.9.*
Lev. H.N.Courouc. t.6. mas. - Spix, Av. Bras. t.37. faem.
Gould, Mon. Trog. t. 5. ex Mexico, Columbia. Rectricibus extimis utrinque tribus albis, fasciis nigris distinctis.
8. **T. puella**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1845. ex Am. m.
E s c u i n t l a. Aureo-viridis; macula oculari, gula, alis-que nigris; rectricibus albo-punctatis; fascia pectorali alba; abdomine coccineo; rectricibus extimis utrinque tribus nigris albo-lineatis.
9. **T. variegatus**, Gould, (nec Spix, Av. Bras. t. 37. qui Tr. caligatus?) Monogr. Trog. t. 6. ex Brasil. mer.
Parag. Capite pectore que atro-violaceis; abdomine coccineo.
10. **T. roseigaster**, Vieill. (domicellus, Cuv. - rhodogaster, Temm. - Temnurus? roseigaster, Gould) *Lev. H. N. Courouc. t. 13. - Monogr. Trog. t. 20. Abdomine roseo: remigibus albo-fasciatis.*
11. **T. ambiguus**, Gould, 1835. Monogr. Tropgon, t. 4.
ex Bogota, Guatimala. Rostris extimis utrinque tribus basi nigris, apice albis, medio albo nigroque vermiculatis.
12. **T. citreolus**, Gould. (chrysogaster, Sw. 1835.) Monogr. Tropgon. t. 13. mas jun. et faem. ex Mexico. Ci-nerascens; abdomine flavo-citrino; rectricibus extimis utrinque tribus apice late albis.
Mas aureo-viridis. Faem. cinerea.
13. **T. elegans**, Gould, 1835. Monogr. Tropgon. t. 3. ex Mexico, Guatimala. Capite antice, rectricibusque mediis apice, nigris; extimus utrinque tribus, a basi, nigro alboque fasciatis. Nimiis affinis Trog. collaris!
14. **T. purpuratus**, Sw. B. of Braz. t. 63. 64. ex Br. s.
15. **T. leucurus**, Sw. Two Cent. and a Quarter p. 331.
Azara 270? ex Brasil. m.
16. **T. melanocephalus**, Gould, Monogr. Tropgon. t. 12. ex Mexico, Honduras. Capite, pectore, alis caudae nigris; rectricibus extimis utrinque tribus macula apicali alba quadra.
17. **T. caligatus**, Gould, (variegatus? Spix) *Av. Br. t. 37?*
*Monogr. Tropgon. t. 7. ex Mexico, Columbia. Ca-
 pite caeruleo-violaceo; abdomine laete aurantiaco: rectri-
 bus extimis utrinque tribus albis, nigro-fasciatis.*
18. **T. massena**, Gould, Monogr. Tropgon. t. 16. ex Mexico, Honduras. Magnus: abdomine, lunula jugu-
 laris nulla, coccineo; rectricibus extimis utrinque tribus nigris.
Mas aureo-viridis; gula nigra. Faem. cinereo-fusca.

19. **T. macrurus**, Gould, Monogr. Trog. t. 17. mas.
ex Mexico. Viridi-aureus; fascia pectorali albo; abdomine
coccineo; cauda valde explicata; rectricibus extimis utrinque
tribus nigris.
20. **T. xalapensis**, Dubus, (auratus, Lafr. an Sic?) Esq.
Orn. t. 2. ex Mexico.
21. **T. assimilis**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1846. p. 67. ex
Peru. Aureo-viridis; abdomine coccineo; alis nigris albidio-
vermiculatis; rectricibus maxima ex parte nigris.
22. **T. personatus**, Gould, Ann. N. H. ix. p. 237. ex
Brazil. Similis praecedenti; sed magis variegatus, nec
cauda sere omnino nigra.
23. **T. heliothrix**, Tschudi, Faun. Peruan. Cons. p. 40.
Capite colloque nigricantibus; abdomine flavo-aurantiaco,
lateralibus fuscis; alis caudaque nigerrimis; rectricibus mediis,
apice excepto, viridibus; lateralibus margine niveis.
Faem. ex toto fuliginosa; abdomine luteo.
24. **T. mexicanus** et morganii, Sw. 1827. (glocitans,
Licht. - T. capistratus? Less. 1842. mas adult.) Zool. Ill.
t. 82. 83. - Gould, Monogr. Trog. t. 1. mas ad. 2. mas
jun. et faem. ex Mexico. Viridi-aureus; fronte gulaque
nigris; abdomine ruberrimo; alis fuscis, vermiculatis; rectri-
cibus nigris, apice albis, truncatis; lateralibus albis, nigro-
lineatis. Mas aureo-viridis, subtus coccineus; collaris albo.
Faem. fuliginosa; pectora rufescens; abdomine rubro.
Jun. rectricibus extimis nigro alboque fasciatis. Cauda ad
Priotelum accedit.
290. **Priotelus**, Gr. (Temnurus, Sw. nec Auct.) Ins. Cubae. 1.
TROGON **temnurus**, Temm. (Temnurus albicollis, Sw.
Priotelus temnurus, Gr.) Pl. col. 326. - Gould, Mon.
Trog. t. 19. - La Sagra, Voy. Cuba, t. 26. ex
Ins. Cuba. Pectore albido.
291. **Apaloderma**, Sw. Africa mer. 1.
TROGON **narina**, Vieill. (Apaloderma narina, Sic.) - Lev.
Afr. t. 228. 229. - H. Nat. Courouc. t. 10. mas. 11. faem.
Gould, Monogr. Trog. t. 26. ex Afr. mer. Pectore
viridi; abdomine coccineo.
292. **Harpactes**, Sw. As. m. Malaias. 11.
1. TROGON **rutilus**, Vieill. (cinnamomeus et duvauceli,
Temm. - Harpactes duvauceli, Gould. - H. rutilus,
Blyth, Cat. sp. 400.) Pl. col. 291. - Lev. Cour. t. 14. mas.
Gould, Monogr. Trog. t. 32. ex Sumatr. Borneo-
Minor: uropygio coccineo; rectricibus extimis albis.
Mas capite toto nigro.

2. TROGON *flagrans*, Müll. 1834. (erythrocephalus? Gould,
1834.-Harpactes erythrocephalus, hinc temmincki p. Gr.)
Tijdsch. Nat. Gesch. 1835. t. 8. 2. - *Gould, Mon. Trog.*
t. 33. mas. et faem. ex *Sumatra*. *Ruberimus*, capite ex
toto juguloque obscurioribus: dorso fulvo-castaneo: alis cauda-
que nigris: tectricibus alarum albo-vermiculatis; remigibus
albo-marginatis: rectricibus mediis castaneis, fasciulis api-
cali nigrae; extimis utrinque tribus apice albis.
Faem. capite pectore quo dorso concoloribus.
3. TROGON *hodgsoni*, Gould. (fasciatus? var. a. Lath.-Har-
pactes erythrocephalus? Sw. - H. hodgsoni, Gould.)
Monogr. Trog. t. 34. mas. ex *Asia centrali*,
Nepal. *Similis* praecedenti; sed major: capite lurido ru-
bro; pectore cinerascente.
4. TROGON *temmincki*, Gould. (fasciatus, Temm. nec Auct.
kasumba, Raffles. - Harpactes temmincki, Sw.) *Pl. col.*
321. - *Monogr. Trog.* t. 29. ex *Malaya s.* Capite
juguloque nigri: servico coccinea.
Faem. capite colloque canescensibus.
5. TROGON *diardi*, Boie (Harpactes diardi, Sw.) *Pl. col. 541.*
Gould, Monogr. Trog. t. 30. ex *Borneo*. *Rufus*: rec-
tricibus extimis utrinque tribus nigris, a medio ad epicem
albo-marmoratis. Mas cervice rubra; jugulo nigro.
6. TROGON *malabaricus*, Gould, 1834. (fasciatus? Penn.
Harpactes malabaricus, Sw.) *Monogr. Trog.* t. 31. ex
Asia merid. Capite juguloque nigricantibus.
7. TROGON *ardens*, Temm. (Harpactes ardens, Gould). *Pl.*
col. 404. - *Monogr. Trog.* t. 35. ex *Ins. Philipp.*
Pectore intense roseo.
8. TROGON *oreskios*; Temm. (gouldi, Sw. - Harpactes
oreskios, Gould.) *Pl. col. 181.* - *Monogr. Trog.* t. 36.
ex *Java*. Capite pectore flavescentibus.
9. TROGON *reinwardti*, Temm. (sulphureus, Begbie.
Apaloderma reinwardti, Sw. - Harpactes reinwardti, Gr.)
Pl. col. 124. - *Gould, Monogr. Trog.* t. 27. ex *Java*.
Viridis: pectore fusco; jugulo flavissimo.
10. TROGON *mackloti*, Müll. (Harpactes mackloti, Gr.)
Tijdsch. Natuur. Gesch. 1835. t. 8. 1. ex *Sumatra*.
Valde praecedenti affinis; sed bene distinctus macula magna
urepygialis castanea.
11. TROGON *gigas*, Vieill. (temmincki, Cuv. nec Gould. - Apa-
loderma cuvieri, Sw. - Harpactes gigas, Gr.) *Lev.*
Courouc. t. 12. - *Monogr. Trog.* t. 28. *Patria*
ignota, certe non *Java*! *Maximus*: pectore, abdo-
mine, caudaque subtus, albis.
Quid T. indicus, Lath. (Harpactes? indicus, Gr.) ex *Asia merid.*

293. **Calurus**, Sw. 1830. (Pharomachrus! *De la Llave*, 1801!) America calid. 6.
1. **Pharomachrus mocinno**, *De la Llave*, 1801! (Trogon pavoninus, Temm. nec Spix. - paradiseus, Bp. 1826. resplendens, Gould, 1835.) *Pl. col. 372.* - *Monogr. Trog. t. 21.* ex Am. centr. Costa Rica. Capite tote cristata; rostro rubro: tectricibus caudae superioribus mirifice perlóngis.
 2. **Trogon pavoninus**, Spix, nec Temm. (*Calurus pavoninus*, Sw.) *Av. Bras. t. 35.* - *Monogr. Trog. t. 23.* ex Brasil. Capite laevi: rostro corallino: remigibus, rectricibusque basque omnibus ex toto nigris.
 3. **Calurus auriceps**, Gould, *Ann. N. H. IX.* p 238. Gr. et Mitch. *Gen. of B. t. 25.* ex S. ta Fe de Bogota. Capite laevi: rostro flavo-aurantio: remigibus rectricibusque omnibus ex toto nigris.
 4. **Calurus fulgidus**, Gould, *Monogr. Trog. t. 24.* ex Amer. mer. Venezuela. Capite laevi: rostro olivaceo: rectricibus nigris, extimis utrinque tribus apice albos.
 5. **Calurus neoxenus**, Gould, *Monogr. Trog. t. 25.* ex Mexico. Capite laevi: rectricibus cyaneo-chalybeis, extimis utrinque tribus allo-terminatis.
 6. **Calurus pulchellus**, Gould. (*Trogon peruvianus*, Gould, 1837. nec Sw! - *antisianus*, Orb. 1837.) *Monogr. Trog. t. 22.* - *Mag. Zool. 1837.* - *Ois. t. 85.* - *Voy. Am. m. t. 66.* l. ex S. ta Fe de Bogota. Fronte cristata: naribus a crista testis.

FAMILIA 24. GALBULIDAE.

SUBFAM. 51. GALBULINAE.

294. **Galbula**, L. America trop. 8.
1. **ALCEDO GALBULA**, L. (*Galbula viridis*, Lath. - viridis-cauda, Sw. - ruficollis? Shaw) *Pl. enl. 238 - Edw. B. t. 334.* - *Lev. Jacam. t. 47.* mas 48. faem. 49. jun. Vieill. *Ois. Dor. Hist. N. Jacam. t. 1.2?* ex Guiana.
 2. **G. leptura**, Sw. (*G. viridis*, var. *Lath.*) *Gen. Syn. t. 26.* *Lev. Hist. Nat. Jacam. t. 52.* ex Brasil.
 3. **G. leucogaster**, Vieill. (*albiventris*, Cuv. - *aenea*, Temm. *Mus. Lugd.*) *Lev. H. Nat. Guèp. Suppl. t. H.* Gr. et Mitch. *Gen. B. t. 29.* ex Amer. mer. Minor.
 4. **G. albirostris**, Lath. (*flavirostris*, Vieill.) *Lev. Jacam. t. 51.* - *Ois. dor. t. 4.5.* ex Guiana. Minor.
 5. **G. albicularis**, Spix. (*lugubris*, Sw.) *Av. Bras. t. 57.1.* ex Guiana, Brasil. Rostro albo.
 6. **G. tombacea**, Spix, *Av. Bras. t. 58.* ex Brasil.

7. **G. ruficauda**, Cuv. (macrura, Vieill.) Gal. Ois. t. 29.
Lev. Hist. Nat. Jacam. t. 50. ex Columbia, Bras. s.
8. **ALCEDO paradisea**, L. (Galbula longicauda, Br. - G. paradisea, Gr.) Pl. enl. 271. - Edu. B. t. 10. - *Lev. H. Nat. Jacam. t. 52. - Vieill. Ois. Dor. t. 3. ex Cayenna. Major: longicaudata!*
295. **Jacamaralecyon**, Cuv. 1829. *ex Lev.* (Galbula, p. Gr.) America trop. 1.
Galbula tridactyla, Vieill. (ceycoides, Such. - armata, Sw. - Jac. brasiliensis, Less.) N. Dict. H. Nat. xvi. p. 444. t. E. 32. 2. - *Lev. Guépier. Suppl. t. L. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 22. - Spix, Av. Bras. t. 52. 2. ex Brasil. Rostro nigro.*
296. **Jacamerops**, Cuv. *ex Levaill.* (Lamprotila, Sw.) America trop. 2.
1. **ALCEDO grandis**, Gm. (Galbula jacamarici et grandis, Shaw - Lamprotila platyrhyncha, Sw.) Nat. Misc. t. 833.
Lev. Jacam. t. 54. - Vieill. Ois. dor. t. 6. ex Amer. mer.
2. **Galbula boersii**, Ranzani. (Jacamerops boersii, Gr.)
Lev. H. Nat. Jacam. t. 53. ex Amer. mer.
297. **Galbacyrhynchus**, O. des Murs, 1845. (Jacamaralecyonides! O. des Murs, 1849.) America m. 1.
Galbacyrhynchus leucotis, O. des Murs. 1845.
Pl. p. 17. ex S. Fe de Bog. Fusco-castaneus: plumis auricularibus albis: pileo, tergo, alis, caudaque viridi-nigris.
- FAMILIA 25. ALCEDINIDAE.
- SUBFAM. 52. DACELOINAE.
298. **Melidora**, Less. (Dacelo, p. Gr.) Nova Guinea. 1.
Melidora euphrosiae, Less. Tr. 1831. (Dacelo macrorhyncha, Less.) Voy. Coq. t. 31. bis. 2. *ex N. Guinea.*
299. **Syma**, Less. 1828. (Halcyon p. Gr.) Nova Guinea. 1.
HALCYON torotoro, Less. (Syma lessonia, Sw. - Dacelo syma, Müll.) Voy. Coq. Ois. t. 31. bis. 1. *ex N. Guin.*
300. **Dacelo**, Leach (Paralecyon, Glögler. - Choucaleyon, Less.) Oceania. 5.
a. **DACELO**. Maximae.
1. **ALCEDO gigantea**, Lath. (fusca, Gm. - undulata, Scopoli. - Choucaleyon australe, Less. - Dacelo gigantea; Leach. - gigas, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 663. - *Leach, Zool. Misc. t. 104. - Sonn. Voy. t. 106. - Gould, Austr. II. t. 18. ex Australia.*

2. *Dacelo cervina*, Gould, Austr. n. t. 20. - *Voy. au-*

Pole Sud, t. 23, 1. ex *Austr.*

3. *Dacelo leachi*, Lath. - Gould, Austr. n. t. 19. ex

Austr. mer.

b. *CHOU CALCYON.*

4. *Dacelo gaudichaudii*, Quoy et Gaim. *Voy. Ura-*
nie, Ois. t. 25. ex *Oceania.*

5. *Dacelo cyanalis*, Temm. *Pl. col. 262.* ex *Celeb.*

301. **Haleyon**, Sw. (Entomothera, Horsf.-Entomophila, Leach.) As.m.Af.Oc. 26.

a. *PARALCYON.*

1. *Dacelo concreta*, Temm. (lindsayi, Gallorum, nec

Angl. - lessoni, Vig. jun.) *Pl. col. 346.* adult. - *Voy.*

Bonite, Ois. t. 7. jun. ex *Sumatra.*

2. *Dacelo lindsayi*, Vig. (Haleyon lindsayi, Gr. - ru-
fula? *Lafr.*) *Mitch. Gen. B. t. 27.* *Similis juveni-*
Dacel. concretae, sed cauda elongata.

3. *Dacelo monachus* juven. cyanocephalus, jun. et princeps
adult. *Forsten.* (Haleyon monacha, Gr.) *Mus. Lugd.*
ex Celebes. Fuscoceruleo, subtus cum torquerostru; capite
cyaneo; gula alba; rostro ruddo. Faem. fronte genisque rufis.

4. *ALCEDO pulchella*, Horsf. (Dacelo buccoides, Temm.
faem. - Haleyon pulchella, Gr.) *Zool. Res. Java*, fig. mala.
Pl. col. 277. mas. 586. faem. ex *Java, Sumatra.*

* 5. *Dacelo melanops*, Temm. *Mus. Lugd.* ex *Borneo.*
Similis D. pulchella, sed genis nigris, nec rufis!

b. *HALCYON.*

6. *Dacelo pygmaea*, Cretzschm. (Alcedo chelicutii?
Stanley.) *Rüpp. Atl. Zool. t. 28. b. ex Afr. or. Abyss.*
Simillima sequenti, at valde minor. Long. 5½-pollie.

7. *Alcedo striolata*, Licht. 1821. (variegata? *Vieill.*
Haleyon striolata, Gr. *List. Brit. Mus.*) *Cat. Dupl. Berl.*
Mus. p. 11. ex Afr. occ. Senegal. Long. 6½-pollie.

8. *Alcedo fuscicapilla*, Lafr. (Dacelo vaillanti, Temm.
Mus. Lugd.-Haleyon fuscicapilla, Hartl.) *Mag. Zool.* 1833.
Ois. t. 18. ex Africa m. Major.

9. *Alcedo capensis!* L. - *Pl. enl. 590.* ex *Sumatra,*
Java, Malacca. Maxima.

10. *Alcedo leucocephala*, Gm. (javanica, Shaw. - Hal-
eyon javana, Gr. ex Bodda.) *Pl. enl. 757.* - *Nat. Misc.*
t. 793. ex Java, Sumatra, Borneo. Maxima.

11. ALCEDO *gurial*, Pears. (brunniceps, Jerd. - leucocephala, Horsf. nec Gm.) ex Asia mer. Simillima praecedentia, an specie distincta?
12. *Halcyon amauroptera*, Pears. Journ. As. Soc. Beng. 1841. p. 635. ex Asia mer. Bengal, Aracan, Tenasserim.
13. ALCEDO *melanorhyncha*, Temm. Pl. col. 391. ex Celebes. Restro nigerrimo!
- c. CANCROPHAGA.
14. ALCEDO *cineraceifrons*, Vieill. (Haleyon torquata, Sw.) Major Hale, senegalensi, et pectoris caeruleo distinctissima; maxilla pedibusque rubris; mandibula nigra.
15. ALCEDO *senegalensis*, L. (Ispida senegalensis major, Br. - Dacelo senegalensis, Less. - Haleyon senegalensis, Sw.) Pl. enl. 594. Zool. Ill. t. 27. ex Africa occ. Minor: maxilla rubra; mandibula pedibusque nigra.
16. ALCEDO *semicaerulea*, Gm. ex Forskh. (cancrophaga, Forst.-Dacelo acteon? Less.-Haleyon swainsoni? Smith. II. semicaerulea, Kaup. Gr.) Rüpp. Wirbelth. Abt. 24. ex Afr. or. et mer.
17. *Halcyon senegaloides*, Smith, Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 63. ex Africa mer.
18. ALCEDO *rufiventer*, Sw. (senegalensis var. ♂. Gmel. erythrogaster, Temm. - II. erythrorhyncha! Gould.) Pl. enl. 356, fig. major. ex Afr. occid. Senegal. Ins. Cap-Verd. Abdomine tantum intense rufa.
19. ALCEDO *cancrophaga*, Lath. (Haleyon cancerophaga, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 334. ex Afr. occ. Senegal. Subtus ex toto rufescens.
20. ALCEDO *atricapilla*, Gm. (albiventris, Scopoli. - brama, Less. - Haleyon pileata, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 673. Sonn. Voy. Ind. t. 31. - Less. Cent. Zool. t. 8. ex Malacea, Sumatra.
21. ALCEDO *gularis*, Kuhl. (melanoptera, Temm. nec Horsf. Haleyon ruficollis, Sw. - II. gularis, Gr.) Pl. enl. 232. ex Asia mer. Malaisia.
22. ALCEDO *omnicolor*, Reinw. (melanoptera, Horsf. nec Temm. - cyaniventris, Vieill.) Pl. col. 135. ex Java.
23. *Halcyon fusca*, Gr. ex Bodd. (albicularis, Blyth. Alcedo smyrnensis var. γ. Lath. - rufirostris, Licht. - macroura? Merr.) Albin, Av. III. t. 28. - Pl. enl. 894. - Kittl. Küpf. Vog. t. 14. 2. ex Asia or. Ins. Philipp.
24. ALCEDO *smyrnensis*, L. (Haleyon smyrnensis, Strickland.) Albin, Av. III. t. 27. ex Asia occ.

C. CALIALCYON.

* 25. *H. lilacina*, Bp. ex Sw. (Dacelo coromanda, Less.

Halcyon coromanda minor, Schleg.) ex Sun. Borneo.
Minor: (Long. alar. 4 $\frac{1}{2}$ -poll.): purpureo-violacea: capitibus late-
ribus, pectore, abdomineque violaceo; purpurascitibus: uro-
pygio caeruleo-argenteo: rostro basi latissimo: alis breviori-
bus, rotundatis; remigis prima decima ipsa valde breviore;
secunda longitudine inter quintam et sextam medias; tertia
quartam omnium longissimam subaequante.

* 26. *H. schlegeli*, Bp. (Halcyon coromanda major, Schleg.)

Faun. Jap. t. 39. adult. et jun. ex Japan. Major:
(Long. alar. 4 $\frac{1}{2}$ -poll.): ex toto rufa, dorso aliquo tantum vio-
laceo-purpuscentibus: uropygio cyaneo: rostro minus dilata-
to: alis longioribus, subacute; remigum prima sextam
aequante; secunda quarta longiore tertiam omnium longissi-
mam subaequante.

Quid Alcedo coromanda, Lath. (coromandeliana, Scop. - H. coro-
mander? Blyth, Cat. 200. - H. coromandeliana, Gr.) Sonn.
Voy. Ind. t. 118. ex Asia mer? Calcutt. et Brit. Mus.
ex Tenasserim!

302. *Todiramphus*, Less. (Halcyon p. Gr.)

Ocean. 18.

1. *HALCYON platyrostris*, Gould, (Todiramphus recur-
virostris, Lafr. 1842.) Proc. Zool. Soc. 1842. p. 135.
ex Ins. Navigator.

2. *ALCEDO sacra* et tuta, Gm. (collaris, Forst. - Todiram-
phus sacer et divinus, Less.) Mem. Soc. H. N. III. t. 11
et 12. - Lath. Syn. t. 27. ex Ins. Societas. Po-
lynesia.

3. *HALCYON sancta*, Vig. et Horsf. (sancta, Steph. - Al-
cedo australasiae, Vietill. - Dacelo chlorocephala var. β .
Less.) Philip. Voy. t. p. 158. - Jard. et Selb. Ill.
Orn. t. 96. 97. - Gould, Syn. B. of Austr. t. f.
Austr. t. 21. ex Australia.

4. *ALCEDO venerata*, Gm. (Halcyon venerata, Gr.) ex
Oceania.

5. *HALCYON collaris*, Sw. Zool. Ill. t. 27. nec Lath. - Gould,
Syn. B. of Austr. ex Malaia et specimina valde
minora ex Timor. Late diffusa!

6. *ALCEDO chlorocephala*, Gm. (collaris, Scop. nec Sw.
sacer et sancta ex Malais. Auct. - Halcyon chloris,
Gr. ex Bodda. - occipitalis Blyth.) Pl. ent. 783. 2. - Sonn.
Voy. t. 33. - Kittl. Küpf. t. 14. I. ex Asia mer.
Java, Sumatra.

7. *HALCYON varia*, Eyton, 1839. (chlorocephala? Raffles.
Todiramphus varius, Blyth, Cat. 205.) Pr. Zool. Soc.
1839. p^o 101. ex Pen. Malacc. Sumatra; nec Java.

8. HALCYON *sordida*, Gould, 1842. - *Austr.* II. t. 23. ex
Austr. sept.
9. ALCEDO *vagans*, Less. (sacra var. γ . et δ . Lath. - Daeclo
 sacra, var. γ . Less. - cyanea, Forst. - Halcyon vagans, Gr.)
Voy. Ereb. et Terr. B. t. 1. ex *Ocean. N. Zelandia.*
10. HALCYON *cinnamomina*, Sw. *Zool. Ill. t. 67.* - Gould,
Syn. B. of Austr. t. f. ex *N. Guinea, N. Zeland. Ins.*
Philipp. Ab H. vagantii, Gr. sane distincta.
11. HALCYON *coronata*, Müll. *Verh. Nat. Gesch. Ned. p.*
175. ex *Timor.* Similis praeced. sed valde minor.
12. HALCYON *pyrrhopygia*, Gould, 1840. *Austr.* II. t. 22.
 ex *Austr.* centr.
13. HALCYON *mackleayi*, Jard. (incinctus, Gould, 1837.
 faem.) *Selb. Ill. Orn. t. 101.* - *Austr.* II. t. 24. ex *Austr.* or.
14. ALCEDO *diops*, Temm. (Halcyon diops, Gr.) *Pl. col. 272.*
 ex *Ternate.*
15. ALCEDO *lazuli*, Temm. (Halcyon lazuli, Gr.) *Pl. col.*
500. ex *Amboina.* Nimum Hale. mackleayi affinis!
- *16. *H. funebris*, Forst. *Mus. Lugd.* ex *Celebes.* Ni-
 gro-viridis, corona occipitali, collaris, corporeque subtus albis.
- *17. *H. forsteni*, Temm. *Mus. Lugd.* ex *Celeb.* Caerulea,
 subtus alba: corona occipitali nigra.
18. HALCYON *saurophaga*, Gould, 1843. (Alcedo cyano-
 leuca, Temm.) *Voy. Sulph. Av.* t. 19. ex *Oceania,*
N. Guinea. Major; alba; striola postoculari, dorso, alis,
 caudaque caeruleis.
Quid Dac. albicilla, Less. 1831. var. α . *occipite viridi; collare albo.*
 var. β . *fronte et superciliis latissime albis.* (Hale. albicilla et
H. superciliosa, Gr. *Mus. Brit.* ex *Ins. Tangatabo?*)
303. **Aetenoides**, Hombr. et Jacq. (Halcyon p. Gr.) Ocean. 1.
HALCYON ACTENOIDES, Gr. (*Actenoides hombroni*,
Bp.) *Voy. Pole Sud, Ois.* t. 23. 2. ex *Oceania.*
304. **Tanysiptera**, Vig. Ocean. 2.
 1. ALCEDO *dea*, L. (*Tanysiptera dea*, Vig.) *Pl. enl.* 116.
 ex *Insul. Molucc. et Nova Guinea.*
 2. **Tanysiptera nymphæ**, Gr. *Ann. et Mag. N. H.*
1841. ex *Ins. Philipp.*
305. **Ceyx**, Lacèp. As. mer. Oc. 5.
 1. ALCEDO *tridactyla*, L. (*Ceix tridactyla*, Cur. - luso-
 niensis, Steph.) *Sonn. Voy. Ind.* t. 32. - *Pall. Spicil.*
vi. t. 2. 1? ex *Ins. Philipp.*

2. **ALCEDO TRIDACTYLA**, Lath. (*purpurea*, Gm. - *Ceyx rubra*, Gr. ex Bodd. - *microsoma*, Burt. - *erythaca*, Bl. - *purpurea*, Less.) Pl. enl. 778. 2. - Jard. Ill. Ind. Ord. t. 25. ex Asia cont. m.
3. **Ceyx TRIDACTYLA**, Jard. et Selby (*rufidorsa*, Strickland. - Alcedo madagascariensis, Lath. nec L. - A. purea var. Shaw) Orn. Ill. t. 55. 2. ex Malaisia.
4. **Ceyx melanurus**, Kaup, Verh. Nat. Ver. Darmst. 1848. p. 74. ex Ocean.
5. **Ceyx lepidus**, Temm. Pl. col. 595. 1. ex N. Guinea.

SUBFAM. 53. ALCEDININAE.

306. **Aleyone**, Sw. (Halecyone, Agass. - Therosa, Müll. Ms.) Oceania. 4.
 1. **Ceyx solitaria**, Temm. (Therosa solitaria, Müll.) Mus. Lugd. Pl. col. 595. 2. ex Nova Guinea.
2. **Ceyx pusilla**, Temm. (Aleyone pusilla, Gould, nec Shaw) Pl. col. 595. 3. - Gould, B. Austr. t. 26. ex Austral. s.
3. **Ceyx cyanipectus**, Laf. Rev. Zool. 1849. p. 33. ex Ocean.
4. **ALCEDO aurea**, Lath. (tribrachys, Shaw. - Aleyone australis, Sw. - Ceix cyanæa, Less. - A. pulchra et diegensis, Gould). Nat. Misc. t. 681. - Sw. Zool. Ill. t. 26. - Lewin, B. of N. Holl. t. 1. - Jard. et Selby, Ill. Orn. t. 55. 1. - Gould, Austr. t. 25. ex Austral.
307. **Alcedo**, L. (ispida, L. p. - Corythornis et Ispidina, Kaup.) Eur. As. Afr. Oc. 18.
- a. **ALCEDO**, Kaup.
- * 1. **A. quadribrachys**, Temm. Mus. Lugd. ex Afr. occ. Guinea. Simillima Alcyon. aurea sive tribrach!
2. **A. ispida**, L. (subispida et advena, Brehm. - Gracula atthis, Gm.) Pl. enl. 77. - Kittl. Küpf. Vog. t. 20. 1. Gould, Eur. t. 61. ex Eur. Asia occid.
3. **A. bengalensis**, Gm. (ispidoides, Less.) Edw. B. t. 11. Kittl. Küpf. z. Nat. Vog. t. 29. 2. - Faun. Jap. t. 38. adult. et jun. ex Asia mer. or. Minor: rastro longiore. Specimina ex Japonia alis paulo longioribus.
4. **A. moluccensis**, Blyth, Journ. As. Soc. Bengal. 1847. ex Ins. Celebes, Mollucc. et Papuens. Coloribus vividioribus; caeruleo purissimo, vix virescenti.
5. **A. meninting**, Horsf. (asiatica, Sw. - bengalensis minor, Briss.) Pl. col. 239. 2. - Sw. Zool. Ill. t. 50. ex Java, Sumatra, Born o.
6. **A. birni**, Horsf. Zool. Rev. Java, fig. mala. - Pl. col. 239. 1. ex Java.

7. *A. euryzona*, Temm. (nigricans? Blyth, 1847.) *Pl. col.*
descript. tantum. ex As. m. Malacc.
8. *A. semitorquata*, Sw. Zool. Ill. t. 151. - Rüpp.
Syst. Uebers. N. Ost. Afr. t. 7. ex Africa or. et mer.
9. *A. leucogastra*, Fraser. (Halcyon leucogaster! Gr.)
Proc. Zool. Soc. 1843. p. 4. - Zool. typ. fig. bona. ex
Ins. Fernando Po.
- b. *ISPIDINA*, Kaup.
- 10? *A. MADAGASCARIENSIS*? L. (*Ispida madagascariensis*, Br.)
Pl. enl. 778. 1. ex Malacca, Sumatra, Java, Borneo.
11. *A. CAERULEA*, nec *Todus caeruleus*, Gm. (grandis? Blyth.
Ispida indica torquata, Br.) *Br. Orn. IV. t. 37. 2. A. - Journ.*
As. Soc. Bengal. XIV. p. 190. ex Asia mer. Major.
12. *TODUS CAERULEUS*, nec *Alcedo caerulea*, Gm. (*ultramarina*,
Daud. - *todina*, *Merr.* - *pusilla*, *Shaw*, nec *Temm.* - *Todus*
pietus, *Bodd.* - *Haleyon cyanotis*, Sw. nec *Temm.*
Aleyon coronata, *Smith.* - *Ispidina picta*, *Kaup*, 1848.)
Pl. enl. 783. 1. - Shaw, Nat. Misc. t. 101. - Gr. et
Mitch. Gen. B. t. 28. ex Afr. or. et mer. Minor:
rostro rubente.
13. *A. nitida*, Kaup, 1848. ex As. m. *Minima: rostro nigro.*
c. *CORYTHORNIS*, Kaup.
14. *A. caeruleocephala*, Gm. (*cyanococephala*, *Shaw*)
Pl. enl. 356. 1. ex Africa or.
15. *A. cyanostigma*, Rüpp. *Faun. Abyssin. t. 24. 2.*
ex Africa or.
16. *A. cristata*, L. - *Pl. enl. 756. 1. - Br. Orn. IV. t. 37. 3.*
Kittl. Kupf. Vög. t. 29. 3. ex Afr. mer.
17. *A. vintsioides*, Eyd. et Gerr. *Mag. Zool. 1836.*
Ois. t. 74. - Edw. B. t. 336? ex Madagascar.
18. *A. nais*, Kaup. (*Corythornis nais*, Kaup, 1848.) ex
Africa.
Quid A. indica, L. Edw. t. 335. et A. erythaca, L. Albin. Av. III.
t. 29. ex As. m?
Quid A. flavicans et A. orientalis, Gm. (Briss. *Orn. IV. t. 37. f. 1. A.*)?
Quid A. beryllina, cyanoleuca, tricolor, et caerulescens, Vivill?

308. *Ceryle*, Boie. (*Ispida*, Sw.)

Eur. As. Afr. Am. 10.

a. *Orbis Antiquis.*

1. *ALCEDO rudis*, L. (*Ispida bicincta* et *bitorquata*, Sw.
Ceryle rudis, Boie. - *Ceryle varia*, Strickl.) *Edw. B. t. 9.*
Pl. enl. 716. m. adult. 62. jan. - Gould, Eur. t. 62. ex
Europa or. As. occid. Africa.
2. *ALCEDO guttata*, Vig. nec *Bodd.* (*Ceryle guttata*, Gr.)
Gould, Cent. Himal. B. t. 5. ex As. contr.

3. ALCEDO *lugubris*, Temm. (Ceryle lugubris, Schleg.)
Pl. col. 548. fig. medioer. reduct. - *Faun. Japon.* t.38. B.
 faem. adult. fig. optima magnitudin. nat. ex *Japon.* Si-
 milis precedentis; sed major, et rostro magis compresso.
4. ALCEDO *maxima*, Pall. (guttata, Bodd. nec Vig. - alfa,
Shaw. - Ispida gigantea, Sw. - Ceryle maxima, Gr.)
Pl. enl. 679. - *B. of west Afr.* t.11. ex *Afr. occ. Congo.*
 b. AMERICANAe.
4. ALCEDO *alcyon*, L. (guacu? Vieill. - Ceryle alcyon, Boie.
 Ispida alcyon, Sw.) *Catesb. Carol.* t.96. - *Pl. enl.* 715. mas.
Wils. Am. Orn. t. 23. l. - *Aud. Am.* t. 77. ex Amer. s.
5. ALCEDO *torquata*, L. (cinerea, Bonn. - cyanea, Vieill.
 ex Azara, 417. 418. - stellata, Meyen.) *Pl. enl.* 284. - *Nov.*
Act. Nat. Curios. Bonn. XVI. Suppl. t.14. ex *Parag. Per.*
6. ALCEDO *bicolor*, Gm. (Ceryle viridirufa, Gr. ex Bodd.
 Ceryle bicolor, Boie. - C. viridirufa, Gr.) *Pl. enl.* 592. 1. 2.
 ex Amer. mer.
7. ALCEDO *amazona*, Gm. (rubescens, Vieill. ex Azara 419.
 420. - Ceryle amazona, Boie.) ex Amer. mer.
8. ALCEDO *AMERICANA*, hinc *cabanisi*, Tschudi, Faun.
 Peruan. *Consp. sp.* 216 ex Amer. mer. occ.
9. ALCEDO *americana*, Gm. (viridis, Vieill. ex Azara 421.
 Ceryle americana, Boie.) *Pl. enl.* 591. ex Amer. m.
 Brasil. Mexico. Minor.
10. ALCEDO *superciliosa*, L. (Ceryle superciliosa, Gr.)
Edw. B. t. 245. - *Pl. enl.* 756. 3. ex *Gujana. Minima!*
Quid Alcedo leucorhyncha. - A. surinamensis. - A. brasiliensis.
A. cayanensis (taparara, Bonn.) Gm. ex Amer. mer id?

FAMILIA 26. MEROPIDAE.

SUBFAM. 54. MEROPINAE.

309. *Merops*, L. (Apiaster, Briss.) Alae longae, acutae; remiges
 valde scapulares excedentes, prima brevissima, secunda
 omnium longissima: cauda aequalis, rectricibus mediis
 elongatis. Eur. As. Afr. Oc. 15.

a. EUROPAEI.

1. *M. apiaster*, L. (chrysocephalus? Gm. - galilaeus, Has-
 selq. - schaeaghagi, Forskh. - hungariae, Brehm.) *Pl.*
enl. 938. - *Lev. Guèp.* t. 1. 2. - *Expéd. Egypt. Ois.*
t. 4. 3. - *Gould*, *Eur. t.* 59. ex *Eur. As. occ. Afr.*
Ex flavo viridis; dorso, alarumque tectricibus majoribus ru-
fi; *uropygio fulvo; gula flava, nigro-marginata; jugulo rufo,*
torque nullo; taenia oculari nigra, coeruleo marginata.

2. *M. aegyptius*, Forskh. (persica, Pall. - viridis var. γ .
et superciliosus var. β . Gm. - savignyi, Cuv. nec Sw.
schaeghagha, chaddaejr et ruficollis, jua. Vieill. - super-
ciliosus, Licht. Cat. sp. 96.) Dscr. Egypt. t. 4. 3.
Kittl. Küpf. Vög. t. 7. I. - Bp. Faun. Ital. t. 25. I. - Lev.
Guèp. t. 6. adult. 16. jun. ex Afr. or. As. occ. Eur.
or. mer. Dilute viridis, pílo concolor; copitis lateribus
scapularibusque caeruleis; fronte alba, fascia oculari nigra;
gula flava; jugulo, torque nullo, sensim castaneo: alis subtus,
hypochondriisque cinnamomeis.
Quid Merops congener, L. ex Aldrov. Orn. t. 878. ex Europa
austr. remigibus opice rubris?

b. AFRICANI.

- * 3. *M. savignyi*, Sw. ex Lev. p. nec Cuv. - Levaill. Guèp.
t. 6. bis adult. - Sw. B. of west. Afr. t. 7. nec Ill. ex Afr. occ.
Seneg. Similissimus praeced. at flavidior: alis valde breviori-
bus; rectricibus mediis longissimis: rostro gracili, rectiusculo.
* 4. *M. vaillantii*, Bp. 1830. (Merops savignyi ex Madagascar,
Lev.) Faun. It. Fig. nulla. ex Madag. Similis praeced-
entibus; sed minor et colore viridi, rufescens, minime cae-
ruleo mixto: alis quam in M. aegyptio valde brevioribus.
5. *M. superciliosus*, L. (bonelli) Lev. - patrich vel ru-
fipennis, Vieill. - Apiaster madagascariensis, Br.) Orn.
iv. t. 42. I. - Pl. enl. 259. - Lev. Guèp. t. 19. ex Afr.
or. Madagascar. Major: viridis, capite colloque ferrugi-
neis; macula oculari nigra allo-cincta; linais utrinque du-
bus a fronte supra infraque oculum: gula flavicante.
6. *M. albicollis*, Vieill. (superciliosus var. c. Aliq. nec Lath.
cuvieri, Licht. - savignyi, Sw. Ill. nec Cuv.) Lev. Guèp.
t. 9 - Zool. Ill. t. 76. ex Afr. occ. Senegamb. Minor:
viridis; fronte, superciliis, gula, abdomine quoque albis: vertice,
fascia oculari, et torque pectorali late, nigris: uropygio, alis,
caudaque caeruleis.
7. *M. nubicus*, Gm. (caeruleocephalus et brasiliensis?
Lath. - superbus, Penn.) Pl. enl. 649. - Shaw, Nat.
Misc. t. 78. et 613. - Lev. Guèp. t. 3. - Sw. B. of west.
Afr. t. 9. ex Afr. occ. Seneg. a L. Rubro-sanguineus,
subtilis vividior; capite uropygio quoque cyaneis: remigibus secun-
dariis longioribus; rectricibus mediis parum elongatis: rostro
gracili.
8. *M. nubicoides*, O. des Murs, 1846. Pl. p. 35. ex Afr.
Fusco-ruber cinereo mixtus: capite cyaneo; gula rosco-minia-
ta: remigibus secundariis brevioribus; rectricibus mediis
valde elongatis: rostro crasso, robusto.

9. **M. bicolor**, Daud. nec Bodd. (malimbicus, Shaw) Ann.*Mus. II. t. 62. l. - N. Misc. t. 71. - Lev. Guép. t. 5. - Vieill.**Gal. Ois. t. 186. ex Africa or. Cinereo-fuscus; subtus coccineus: taenia oculari nigra: vitta mandibulari alba.*

10. **M. viridissimus**, Sw. (viridis, L. p. - viridis, a. Gm. Apiaster madagascariensis, Briss.) *Orn. t. 42. 2. - Pl. entl. 740. ex Africa, Madagascar. Minor: dilute viridis subauratus unicolor, capitis et collis plumis basi, remigibus, rectricibusque rufescens: macula postoculari rix caeruleo-maryinata, et lunula angusta jugulari nigra.*

c. ASIATICI et OCEANICI.

11. **M. viridis**, L. p. (viridis var. β . et flavicans, Gm. - luteus, Scopol. - orientalis, adult. torquatus, jun. et coronatus, var. Lath. - lamareki, Cuv. - citrinella, Vieill. ferruginiceps et torquatus, Hodgs. - indicus, Jord. Apiaster bengalensis torquatus, adult. et Apiaster philippensis minor, juva. (Briss.) *Edw. B. t. 183. - Sönn. Voy. Ind. t. 119. var. alb. - Lev. Guép. t. 10. et. t. 11. var. alb. ex Asia centr. et mer. Nept. Viridis, cervico sulferruginea: gula, lateribus, crisseque caeruleas: torque jugulari nigro angusto: remigibus ferrugineis, apice nigris.*

12. **M. ornatus**, Lath. (melanurus, Lewin. - thouini, Kuhl. - lewini, Aliq. - Philemon ornatus, Vieill.) *Lev. II. Nat. Guép. t. 4. - Lewin, B. of New Holl. t. 2. Gould, Austr. II. t. 16. ex Australia; Timor, Müller. Viridis: vitta oculari nigra, hinc caerulea: cervice ferruginea: gula flavicante: uropygio caeruleo: cauda nigra; rectricibus mediis elongatis.*

13. **M. badius**, Gm. (castaneus, Lath. - bicolor, Bodd. nec Daud. - sumatranus, Raffles. - latreillii, Vieill. - cyano-pygialis, Less.) *Pl. entl. 252. - Leraill. Guép. t. 12. ex Sumatra, Borneo. Viridis; pilo, cerevice, dorso-que castaneis: gula, uropygiisque caeruleis. Quid Merops adansonii, Leraill. (senegalensis, Shaw - longicauda, Vieill.) Pl. entl. 314. - Guép. t. 13. ex Afr. or. rectricibus mediis longissimis?*

Quid M. erythrocephalus, Gm. - Briss. Orn. IV. t. 44. 3. A. - Nat. Misc. t. 37. ex Asia cont. capite cervicique ruberrimiis?

14. **M. javanicus**, Horsf. (cyanorrhinos nec savignyi, Temm.) *ex Java. Similis M. aegyptio et savignyi; sed pectore flavo-rufescens: cauda, criso, uropygioque cyanescens: rostro robustiore, magis curvo.*

Quid M. philippinus, L. (audini, Cuv. - Apiaster philippensis major Briss.) Pl. entl. 57. - Lev. Guép. t. 14. ex Oceanica?

15. **M. quinticolor** et leschenaulti, Vieill. (urica, Horsf.
erythrocephalus, Blyth. nec Auct. - Lev. Guèp. t. 15.
adult. t. 18. juv. - Sw. Zool. Ill. t. 8. ex As. mer.
Java. Castaneus; alis viridibus; gula flava; abdomine vi-
rescenti; torque jugulari, macula per oculos, remigibus in-
tus rufescens, ad apicem nigro-cyanis: uropygio, criso,
caudaque caeruleis. Cauda emarginata, minime vero alis, ad
Melittophagos accedit!

310. **Melittophagus**, Boie. Alae breves, rotundatae; remiges
breves, scapulares non excedentes, prima bene explicata,
tertia omnium longissima: cauda plus minus luteata. Africa.

6.

1. MEROPS **erythropterus**, Gm. (minutus, Vieill. - mi-
nulus, Cuv. - pusillus! Sw. 1837.) Pl. Lenl. 318. - Levail.
Guèp. t. 17. - Lath. Syn. t. 31. - Gen. Hist. IV. t. 70.
ex Afr. occ. Gambie. Minimus (vix long. 6-poll.): viridi-
cinerous: gula flava; torque jugulari, maculaque per oculos
nigris: abdomine ex rufescens-viridi: remigibus rectri-
busque lateralibus rufescens apico nigris.

2. MEROPS **sonnini** aut variegatus et collaris? Vieill. (ango-
lensis? Gm.) Briss. Orn. t. 44. I. - Lev. Guèp. t. 7. - Kittl.
Küpf. Vög. t. 7. 3. ex Afr. or. Abyssinia, Malimbo.
Minimus: viridis; vitta nigra, maculaque cyanea supracoculari-
bus: gula flavo-aurantia, lateribus albis, torque latissimo
jugulari cyaneo: pectore castaneo: abdomine carunculente:
remigibus, rectricibusque lateralibus, basi latissime, fulvis.

3. **M. lafreshnayi**, Guér. 1843. (lefeburei! O. des Murs,
1848.) Pl. p. 34. ex Abyssinia. Long. 7-poll. viridis:
loris et vitta auriculari nigris: subtus cinnamomeus; gula
flava, fascia jugulari atro-cyanæ: remigibus secundariis,
rectricibusque lateralibus basi rufis, fascia nigra subapicali
latissima, apice ipso albicante.
Adult. fronte et superciliis pulchre cyaneis: abdomine aureo-
ferrugineo.

4. MEROPS **hirundinaceus**, Vieill. (tawa, Cuv. - chryso-
laemus, Jardine. - furcatus, Stanley. - azuror, Less.
1831.) Lev. Guèp. t. 8. - Sw. B. of west Afr. t. 10. - Orn.
Ill. t. 99. ex Afr. m. Viridis; gula flavo-aurantia; lunula
jugulari, uropygio, crisoque caeruleis: remigibus cinnamo-
meis, apice nigris; cauda valde forcipata, fascia terminali am-
pla nigra; rectricibus apice albidis.

5. MEROPS **bullocki**, Vieill. (cyanogaster, Sie.) Lev. Guèp.
t. 20. - Donov. Nat. Rep. t. 45. - Sw. B. of west Afr.
t. 8. ex Afr. occ. Senegal. Viridis; fronte, gula, uro-
pygioque concoloribus: cervice sulferruginea: gula sanguinea,
torque nullo; pectore rufo-flavante; criso anguste azureo.

6. MEROPS **bullockoides**, Smith, 1834. Ill. S. Afr. Zool.

B. t. 9. ex Afr. m. Viridis; fronte gulaque albis; cervice subferruginea; jugulo sanguineo, torque nullo; pectore rufo-flavicante: uropygio crissoque late azureis.

311. **Nyctiornis**, Sw. (Alcemerops, Geoffr. - Bucia hinc Napo-

phila, Hodgs.) Alae breves, rotundatae; remigum tertia omnium longissima: cauda rectricibus subaequilongis emarginata: rostrum longum, curvum, robustum.

Asia. Oceania. 3.

1. MEROPS **gularis**, Lath. (Melittophagus gularis, Gr.)

Shaw, Nat. Misc. t. 337. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 30. ex Afr. occ. Niger; fronte, supercilis, uropygio, crissaque viridi-cyanescens: gula rubra; pectore nigro cyanoque varios remigibus partim castaneis.

2. MEROPS **amictus**, Temm. (Nyctiornis amicta, Sw. - Al-

cemerops amicta, Bl. Cat. 229.) Pl. col. 310. - Sic. Zool. Ill. t. 56. ex Malaccā et Malaisia. Major: viridis; fronte rosso-lilacea; gula, jugulique plumis pendulis longitudinaliter rubris; rectricibus subtus flavis, apice late nigris; cauda subfuscata.

3. MEROPS **athertoni**, Jardine. (cyanogularis, Jerd. - as-

samensis, M^r. Clell. - Nyctiornis caerulea, Sw. - N. amherstiana, Royle. - Bucia nepalensis, 1836. hinc Napophilā meropina, Hodgs. - Alcemerops paleazareus, Less. - Al- cem. athertoni, Blyth, Cat. 228.) Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 58. ex Asia mer. et contr. Medius: viridis; juguli plumis pendulis glauco-caeruleis; abdomine, crissō, rectri- cibusque subtus, flavidis: cauda truncata.

* 312. MEROPOGON, Bp. (Merops, p. Temm.) Alae Melitto-

phagi: cauda Meropis: rostrum et plumae juguli penduli Nyctiorithis!

Oceania. 1.

* MEROPS **forsteni**, Temm. Mus. Lugd. ex Celebes.

Viridis; sincipite, supercilis, gula, et plumis juguli pendulis, intense azureis: cervice, abdomine, rectricibusque lateralibus castaneis; mediis elongatis, aequilatis, extimisque margino externo viridibus.

FAMILIA 27. PRIONITIDAE.

SUBFAM. 55. PRIONITINAE.

313. HYLOMANES, Licht. (Momotus, p. Gr.) America centr. 1.

Hylomanes momotula, Licht. (Momotus momotula,

Gr.) Abh. Akad. Berl. 1838. t. 4. - Gr. et Mitch. Gen. of B. t. 24. ex Mexico.

314. **Crypticus**, Sw. (Momotus, p. Gr.) America trop. 3.
1. **C. superciliaris**, Sandb. (superciliatus, Sw.-apiaster, Less. - Momotus superciliaris, Gr.) Jard. et Selb. Ill. Orn. n. s. t. 18. ex Mexico, Honduras.
 2. **MOMOTUS martii**, Spix. nec Jard. (platyrhynchus, Leadb. Crypticus platyrhynchus, Gr. - Cr. martii, Bp.) Av. Bras. t. 60.-Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 106. ex Bras. Columbia.
 3. **PRIONITES carinatus**, Dub. (Crypticus carinatus, Laf.) Bull. Academ. Brux. 1848. - Rev. Zool. 1848. p. 249. ex Guatemala.
315. **PRIONITES**, Ill. (Momotus, Briss. - Baryphonus, Vieill.) Amer. trop. 9.
1. **RAMPFIAS momota**, L. (Momotus brasiliensis, Lath. Baryphonus cyanoccephalus, Vieill.) Pl. enl. 370.-Edw. B. t. 370. - Lev. Promer. t. 37. 38. ex Amer. mer. Cayenna.
 2. **P. bahamensis**, Sw. (Momotus bahamensis, Gr.) Jard. et Selb. Ill. Orn. n. s. t. 45. ex Antillis, Ins. S. tao Trinitatis.
 3. **P. caeruleiceps**, Gould, 1836. (caeruleocephalus, Jard. - Momotus caeruleiceps, Gr.) Selb. Ill. Orn. n. s. t. 42. ex Mexico.
 4. **P. ruficapillus**, Ill. (dombeyanus, Ranz. - Momotus rubricapillus, Steph. - cyanogaster, Vieill. ex Azara 52. dombeyi, Less. - M. ruficapillus, Gr.) Lev. H. Nat. Roll. t. 39. ex Bras. mer.
 5. **MOMOTUS terallantii**, Less. (Baryphonus ruficapillus, Vieill. nec Ill.) Gal. Ois. t. 190.-Lev. Hist. Nat. Promer. Suppl. t. 6. ex Amer. mer.
 6. **MOMOTUS mexicanus**, Sw. (Mom. martii, Jard. nec Spix.) Zool. Ill. n. s. t. 81. - Selb. Orn. Ill. t. 23. ex Mexico.
 7. **MOMOTUS yucatanensis**, Cabot, Proc. Boston Nat. Hist. Soc. 1843. p. 156. 1844. p. 466. ex Am. centr. or.
 8. **P. gularis**, Laf. Rev. Zool. 1840. p. 130. ex Guatemala. Minor: rostro exili; jugulo cyaneo.
 9. **MOMOTUS lessoni**, Less. Rev. Zool. 1842. p. 174.-O. des Murs, Pl. p. 62. ex Amer. centr. occ. Realejo, Viridis: pileo nigro, glauco-cincto; juguli plumis elongatis nigris; abdomine rufescenti; remigibus rectricibusque cyanis, subtus nigris; mediis opice dilatato disciforme caeruleo nigro-marginato.
- Quid Momotus sp. 3. Gr. Cat. Br. Mus. ex Mexico?*

FAMILIA 28. CORACIIDAE.

SUBFAM. 56. CORACHINAE.

316. **Kitta**, Temm. p. nec *Less.* (*Ptilonorhynchus*, *Less.* nec *Kuhl.*, *Cissa*, *Gr. ex Boie!!!* nec *Gould* - *Corapica*, *Less.* - *Chlorosoma*, *Sw.*) Asia mer. Oc. 4.

1. **Corvus speciosus**, Shaw. (*Galgulus sinensis*, *Briss.* *Coracias sinensis*, *Gm. Lath.* - *Pica speciosa*, *Wagl.* *Ptilonorhynchus sinensis*, *Less.* - *Cissa sinensis!* *Gr.* *Corvus sinensis*, *Bodd. nec Lath.*) *Pl. entl.* 620. - *Br. Orn.* II. t. 6. 2. *ex Ins. Philipp?* *China.*
2. **Corvus ornatus**, *Licht. Mus. Berolin.* (*Pica ornata*, *Wagl.* - *Cissa ornata*, *Gr. ex Hott.* - *C. puerula* *Blyth.*) *Figura nulla.* *ex Asia merid. Insul. Ceylon.* *Cyanæ; subtus pulchre caerulea, pectore cyaneo: capite subcristato, collo remigibusque externe cinnamomeis, rectricibus pallido cyaneis a medio, nigro notato, ad apicem albis; rostro rubro-aurantio.*

3. **Kitta venatoria**, J. Gr. (*Corapica bengalensis*, *Less.*) *Ind. Zool.* I. t. 24. *ex As. centr. et mer. Himal. Assam. Aracan. Tenasserim.* *Glauco-viridis; crista elongata, gula genisque flavido-viridisbus fasciis oculariis nucham cingentibus nigro holosericeis: rostro pedibusque aurantiaci.*

4. **Kitta thalassina**, Temm. (*Ptilorhynchus thalassinus*, *Less.*) *Pl. col.* 401. adult. *ex Java, Sumatra.* *Similis praecedenti sed major: glauco-viridis nitens, crista nitidissima; corona occipitali nigra holoserica: alia aureorufa: cauda fuso-virens: rostro, pedibusque ruberrimis.*

317. **Brachypterasias**, Lafr. 1834. (*Chloropygia*, *Sw.* 1837. *Atelornis*, *Lafr.* 1846.) Madagascar. 3.

1. **COLARIS leptosomus**, *Less.* (*Chloropygia leptosoma*, *Sw.* *Brachyp. leptosomus*, *Lafr.* - *collaris*, *Pucher.*) *Ill. Zool.* t. 20. - *Lafr. Mag. Zool.* 1844. *Ois.* t. 31. *ex Madag.*
2. **Brachypterasias pittoides**, *Lafr.* (*Atelornis pittoides*, *Pucheran*, 1846.) *Mag. Zool.* 1834. *Ois.* t. 32. *ex Madagascar.* *Tarsis longioribus: pollice quam in praeced. breviore.*
3. **ATELORNIS squamigera**, *Pucheran.* (*Brachypterasias squamigera*, *Lafr.* 1838.) *O. des Murs*, *Pl. p.* 39. *ex Madagascar.* *Tarsis longioribus: rostro turgidiore praecedent. pilei fascia longitudinali mediana nigra.*

318. **Coracias**, L. (Galculus, Briss.)

Eur. As. Afr. Oc. 9.

1. **C. garrula**, L. (germanicus et planiceps, Brehm. - Galculus garrulus, Vieill.) Pl. enl. 486. - Lev. Parad. t. 32. 33.
Gould, Eur. t. 60. ex Eur. Afr. s.
2. **C. caudata**, L. (angolensis, Daud. - bengalensis, var!
Lath. - Galculus angolensis, Briss. - natalensis, Lich? Smith.) Pl. enl. 88. - Briss. Orn. II. t. 7. 1. - Shaw, Gen. Zool. t. 51. - O. des Murs, Pl. p. 28. ex Afr. or. Angoloa. Fulvo-olivacea; uropygio glauco-cyanus vario: subtus cyano-glauca; jugulo violaceo; remigibus apice cyanonigris: rectricibus lateralibus cyanis, extima longissima apice nigricante.

Exhibit (non mutuatum Pici boiei, Temm. ad instar) caput columque Cor. indicae supra corpus Cor. abyssiniae.

3. **C. abyssinica**, Gm. (abyssinus, Bodd. - caudata, p. Gr. - albifrons, p. Shaw. - Galculus caudatus, Vieill. nec L.) Pl. enl. 626. - Lev. Roll. t. 25. ex Afr. or.
- 4? **C. senegalensis**, Gm. (senegala, Lath.) Edw. B. t. 327. Pl. enl. 326. ex Afr. occ. Similis C. abyssinicae.
5. **C. indica** et bengalensis, L. (pilosa, Gm. - naevia, Daud. affinis, M. C. Clell. 1839. - Galculus naevius, Vieill.) Pl. enl. 285. - Edw. B. t. 326. - Lev. Ois. Parad. t. 27. Gr. et Mitch. Gen. B. t. 21. ex Asia centr. et m. Rostro magno, robusto.
6. **C. viridis**, Cuv. (Galculus viridis, Vieill.) Lev. Ois. Parad. t. 31. ex Asia m.
Quid Coracias caerulea, Gm. (vivida, Lath.) nisi, suadente Waglero Alcedinis species?
7. **C. pilosa**, Lath. (crinita, Shaw. - nuchalis, Sw. - levianti, Rüpp. - Galculus pilosus, Vieill.) Lev. Ois. Parad. t. 28. 29. ex Afr. occ. et S.
8. **GALCUS temmincki**, Vieill. (Coracias pileata, Reinw. Ms. 1821. - temminckii, Wagl. - papuensis vel potius d'urvillei, Quoy et Gaim.) Lev. Ois. Parad. t. 6. - Foy. Astrol. Ois. t. 16. ex Ins. Celebes; nec N. Gussia. Fusco-virens; subtus caeruleus: capite uropygioque cyanosapphirinus: pectore cinereo-violaceo: alis caudaque azureis.
9. **C. cyanogaster**, Cuv. (Galculus cyanogaster, Vieill.) Lev. Ois. Parad. t. 26. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 123. Sw. B. of western Afr. II. t. 13. ex Africa occ.

319. **Eurystomus**, Vieill. (Colaris, Cuv.) Asia Africa Oc. 7.
 1. **Coracias orientalis**, L. (Colaris orientalis, Cuv.) - Eu-
 rystomus fuscicapillus, Vieill. - calornyx, Hodgs. - Eu-
 rystomus species 2, da? Gr. List Br. Mus.) Pl. enl. 619.
 ex Asia mer. et or. China. Similis sequenti, sed
 colore valde pallidior.
2. **Eurystomus cyanocollis**, Vieill. (orientalis,
 Aliq. - Colaris cyanocollis, Wagl.) Gal. Ois. t. 111.
 Lev. Parad. t. 36. ex Java.
3. **Coracias pacifica**, Lath. (Galbulus pacificus, Vieill.
 Eurystomus orientalis, Vig. et Horsf. - australis, Sw.
 E. pacificus, Gr.) Gould, Austr. II. t. 17. ex Austr.
4. **Coracias madagascariensis**, Gm. (Eurystomus
 violaceus, Vieill. - madagascariensis, Gr. - Colaris viola-
 ceus, Wagl.) Pl. enl. 501. - Lev. Ois. Parad. t. 34.
 ex Madagascar.
5. **Coracias africana**, Lath. (Colaris afra, Cuv. - purpurascens,
 Wagl. - Eurystomus purpurascens, Dum. - E. rubes-
 cens, Vieill. - E. afer, Steph.) Lev. Parad. t. 35. - Shaw,
 Nat. Misc. t. 401. ex Afr. occ.
6. **Eurystomus gularis**, Vieill. (collaris, Vig. - Co-
 laris gularis, Wagl.) Lev. Parad. t. 56. - Jard. et Selb.
 Orn. Ill. t. 109. ex Nov. Guinea.
7. **Colaris viridis**, Wagl. (Eurystomus viridis, Gr. - pur-
 purascens jun. Vieill.) Syst. Av. sp. 5. ex Afr. occ.
 Senegambia.

FAMILIA 29. EURYLAIMIDAE.

SUBFAM. 55. EURYLAIMINAE.

320. **Eurylaimus**, Horsf. (Platyrhynchus, Vieill. nec Desmar.) Malasia. 2.
 1. **E. javanicus**, Horsf. (horsfieldi, Temm.) Pl. col.
 130. 131. - Zool. Res. Java t. 5. - Gal. Ois. t. 125.
 Nat. Libr. x. t. 30. ex Java, Sumatra, Borneo.
 2. **E. ochromalus**, Raffles. (encullatus, Temm. - raffle-
 sii, Less. - capistratus! Mus. Lugd.) Pl. col. 260. ex
 Sumatra, Borneo.
321. **Corydon**, Less. nec Wagl. (Eurylaimus p. Gr.) Malasia. 1.
 CORACIAS **sumatranaus**, Raffles. (Eurylaimus corydon,
 Temm. - Eur. sumatranaus, Vig. - Corydon temmincki,
 Less. - C. sumatranaus, Strickl.) Pl. col. 297. ex Su-
 matra, Borneo.

322. **Psarisomus**, Sw. (Crossodera, Gould. - Raja *hinc* Simus, Hodgs. - Eurylaimus, p. Gr.) Asia m. Malaias. 1.

EURYLAIMUS *dalhousiae*, Jameson. (psittacinus, Müll.

Simornis sericeigula et Raja nepalensis, Hodgs. - Psari-

somus dalhousiae, Sw. - Crossodera dalhousiae, Gould.)

Pl. col. 598. - Royle, Ill. Bot. t. 7. 2. - Gould, Icon.

Av. fig. optima. ex Asia centr. mor. et Ins. Sumatra.

323. **Serilophus**, Sw. (Raja et Simornis, Hodgs. - Eurylaimus p. Gr.) Asia merid. 2.

1. EURYLAIMUS *lunatus*, Gould. (Serilophus lunulatus, Sw.) *Trans. Zool. Soc. t. 25. ex Sumatra, Malacca.*

2. RAJA *rubropygia*, Hodgs. (Simornis *hinc* Serilophus rubropygius, Hodgs. - Eurylaimus rubropygius, Gr. Eur. lunatus, Horsf. 1839.) *Gr. et Mitch. Gen. t. 23. ex Asia centr. Nepal.*

324. **Cymbirhynchus**, Vig. (Erola, Less.) Asia m. Malaias. 1.

TODUS *macrorhynchus*, Gm. (nasutus, Lath. — Eury-

laimus lemniscatus, Raffles. - Eur. nasutus, Temm.

Platyrhynchus nasutus, Desm. - Erola nasica, Less.

Cymbirhynchus affinis? Blyth.) *Pl. col. 154. - Lath.*

Syn. t. 30. - Gen. Hist. t. 45. - Nat. Libr. x. t. 29.

ex Sumatra, Borneo.

325. **Peltops**, Wagl. (Platystomus, Sw. - Erola, p. Less.) N. Guinea. 1.

EURYLAIMUS *blainvillii*, Garnot. (Erola blainvillii, Less.

Platystomus blainvillii, Sw. - Peltops blainvillii, Wagl.)

Voy. Coq. Ois. t. 19. 2. - Nat. Libr. x. Flycatch. t. 31.

ex N. Guinea.

SUBFAM. 56. CALYPTOMENINAE.

326. **Calyptomena**, Raffles. (Rupicola, p. Temm. - Pipra; p. Wagl.) Malaiasia. 1.

Calyptomena viridis, Raffles. (rafflesii et caudacuta,

jua, Sw. - Rupicola viridis, Temm. - Pipra viridis, Wagl.)

Horsf. Zool. Res. Java, fig. mala. - *Pl. col. 216. ex*

Sylviscupis Ins. Sumatra, Borneo, Malacca.

Viridis, cristata: fascia alarum triplici, remigibus, macula-

que auriculari nigricantibus.

22

FAMILIA 30. COTINGIDAE.

SUBFAM. 57. PIPRINAE.

327. **Rupicola**, Br. (Orinus, Nitssch. - Pipra, p. Wagl.) Alae longae, acutae: cauda mediocris, aequalis. America mer. 2.

1. **Pipra rupicola**, L. (Upupa *crocea*, L. - Rupicola aurantia, Vieill. - cayana, Sw. - elegans, Steph. - R. crocea, Gr.) Pl. enl. 39, mas. 747, faem. - Lev. Roll. t. 51, mas. 52, faem. 53, juv. ex Amer. mer. or. *Crista explicata*, *margine subterminali fuso: remigibus omnibus concoloribus*.

2. **Pipra peruviana**, Lath. (rupicola, var. β, Gm. - Rupicola peruviana, Gr.) Pl. enl. 745. - Lev. Roll. t. 54. ex Amer. mer. occ. *Crista brevi, immarginata, unicolor: remigibus ultimi cinereis*.

328. **Phaenicocercus**, Sw. 1831. (Carnifex, Sundev. 1840. Pipra, p. Wagl.) Alae brevissimae, obtusae, concavae: remigibus angustis, subfalcatis: cauda longa, aequalis: pedes syndactyli! digito externo cum intermedio phalangibus duabus coadunato. America mer. 2.

1. **Amphilis carnifex**, L. (coccinea et cuprea, Gm. - Lanius carnifex, L. - Cotinga rubra, Briss. - Pipra coccinea, p. Wagler. - Phaenicocercus carnifex, Sw.) Pl. enl. 378. Edw. B.t. 39. - Lev. Ois. Amer. t. 37, mas. 38, faem. - Merr. Beitr. t. 2. ex Guiana, Brasilia. *Rubro-sanguineus, collo, dorse, pectoreque vix obscurioribus: cauda unicolor*.

2. **Amphilis carnifex**, Spix, nec L. (merremi, Less. 1839. - Phaenicocercus atrococcineus, Lofr. 1838. - Ph. *nigricollis*, Sw.) Av. Bras. n. t. 5. ex Brasil. *Coccineus; collo, dorso, alis, caudaeque apice, nigris.*

329. **Metopia**, Sw. 1831. (Pipra, p. Gr.) Alae breves, obtusae, concavae; remigibus primariis angustis, subfalcatis: cauda longa, rotundata: digitii liberi. America mer. 1.

Pipra galeata, Licht. (wiedi, Less. - hilairii, Mus. Paris. et Lugd. - Metopia galeata, Sw.) B. of Brasil. t. 23. ex Brasil. *Nigerrima: pilo, crista frontali supra rostrum extensa, dorsaque antice, coccineis. Faem. olivacea, subtus grisea: capite laevi.*

330. **Xenopipo**, Caban. 1847. (Pipra, p. Gr.) Rostrum curvum, basi depresso-dilatatum, apice compressum! America m. 1.
Pipra atroritens, Caban. Orn. Notiz. p. 235, ex Guiana.

331. **Jodopleura**, Less. 1839. (*Jodopleurus, O. des Murs.*)

Alae longae, acutae; cauda subemarginata: rostrum breve,
robustum.

America mer. 3.

1. **J. pipra**, Less. (*Euphona aurora, Sunder.*) *Pl. p. 68.*(71.) 2. *ex Br. Minor; superciliis, uropygio que concoloribus.*2. **J. isabellae**, Parzudaki, (*emiliae, O. des Murs.*)*Rev. Zool.* 1847. *p. 188.* - *Pl. p. 68.* (71.) 1. *ex Venec-*
zuela. Superciliis, uropygio que albis; fasciculo plumarum
*hypochondriai violaceo.*3. **PIPRA laplacii**, Eyd. et Gerv. 1836. (*Ampelis fusca?**Vieill.* - *Euphona laplacii, Gr.* - *Jodopleura fusca,*
Hartl.) Zool. Favorite. Fig. nulla. *ex Brasil. Nigra:*
tectricibus caudae supra infraque albis; fasciculo hypochon-
*driai violaceo.*332. **Manacus**, Briss. p. (*Chiromachaeris, Cab.* - *Pipra, p. Gr.*)

Alae breves, obtusae, concavae; remigibus primariis an-

gustis, subfalcatis; cauda brevis aequalis.

America trop. 3.

1. **PIPRA MANACUS**, var. β . *L. (gutturosa, Desm.* - *Mana-**cus, Br.* - *Chiromachaeris manacus, Cabanis.* - *Manacus*
gutturosus, Bp.) Pl. enl. 303. t. fig. mala. - *Desm. Tang.*
et Manak. t. 58. - *Sw. B. Braz. t. 26. ex Brasil.*
Niger; uropygio, abdome, tibialis, canis; genis, collo, pec-
tore, tectricibus alarum humeralibus, inferioribusque candi-
dis; plumis gulae laxis, elongatis! Faem. olivacea.2. **PIPRA MANACUS**, *L. (Manacus edwardzi, Bp.) Pl.**enl. 302. t. - Edw. B. t. 260. t. ex Brasil. Niger;*
uropygio concolore; tectricibus alarum minoribus albis: sub-
*tus ex toto albus.*3. **P. candezi**, Parzud. 1841. *Mag. Zool.* 1843. *t. 45. ex**Amer. centr. Honduras. Viridis; subtus flavus: pi-*
leo, alis, caudaque nigricantibus; cervice, gula, tectricibus
*que alarum albis.*333. **Chiroxiphia**, Caban. (*Pipra, p. Gr.*) Alae longae, acutae:

cauda rectricibus duabus intermediis elongatis.

America m. 6.

1. **PIPRA caudata**, Shaw, *Nat. Misc. t. 153.* - *Thunb.*

Mem. Acad. Petersb. 1822. *t. 7. t. - Spix, Av. Bras. II.*
t. 6. 1. m. ad. 2. juv. - *Sw. B. of Br. t. 45. ex Brasil.*
Caeruleo; fronte verticeque subristato coccineis; genis, gula,
cervice, alis, rectricibusque lateratibus nigris; mediis acutis
cacteris parum longioribus: pedibus rubris. Faem. viridis.

2. **PIPRA longicauda**, Vieill. *ex Azara 112.* - *Kittl. Käpf.*

t. 18. 2. ex Parag. Niger: pileo cristato ex toto fulvo-
coccineo; dorso scapularibusque caeruleis; rectricibus duabus
mediis angustis, acutissime lanceolatis, apice dilatatis, cac-
teris duplo longioribus. Faem. olivaceo-virens.

3. **Pipra linearis**, Bp. 1837. (fastuosa, Less. 1842. - oxyura?)
v. Olf. - Chiroxiphia oxyura? Caban. - Ch. linearis, Bp.)

Voy. Sulph. B. t. 20. ex Peru. Nigra: vertice cristato coccineo: dorso caeruleo; rectricibus duabus mediis linearum acuminatis, nigris, caeteris triplo longioribus.

Faem. olivacea.

4. **Pipra melanocephala**, Vieill. (lanceolata, Wagl.)

N. Dict. Hist. Nat. xix. p. 163. ex Cayenna. Nigra; vertice cristato coccineo: dorso caeruleo; rectricibus duabus mediis caeteris sequi-longioribus, nigris, acuminatis.

5. **P. ignicapilla**, Wagl. Isis, 1830. p. 931. ex Bras.

Nigra: pilo ex toto aureo-flavo; dorso, pectore, abdomine, rectricumque medianarum apicibus angustatis, caeruleis: pedibus coccineis.

6. **Pipra militaris**, Shaw. (rubrifrons, Vieill.) Nat.

Misc. t. 849. - Gen. Zool. t. 3. ex Brasil. Nigra: fronte purpurea; genis gulaque canis: abdomine albo: uropygio coccineo; scapularibus virescentibus: rectricibus mediis elongatis, angustissime acuminatis.

Faem. olivacea, subtus grisea; capite laevi.

Quid P. pareolides, d'Orb. et Laf. Rev. Zool. 1838. p. 165.
ex Columbia, similis P. pareolae, sed rectricibus mediis elongatis, acuminatis?

334. **Cirrhipipra**, Bp. (Pipra, p. Gr.) Alae subelongatae, acutae; remigibus aequalitis: cauda rectricibus utrinque extimis cirrhosis.

America m. 1.

Pipra filicauda, Spix. (filifera, Less.) At. Bras. II. t. 8. I.
ex Bras. Aureo-flava: pilo, cervice, dorsoque antico, coccineis; tergo, alis, caudaque nigris: remigibus intus ad basin late albis: rhachidibus restrictum quatuor in filum subtilissimum, longissimum, introrsum arcuato-flexum, nudum, elasticum, desinentibus. Faem. olivacea, subtus flavo-virescentes: rectricibus tribus utrinque tantum in filum debilem productis.

335. **Pipra**, L. (Manacus, Briss.) Alae subelongatae, acutae; remigibus omnibus aequalitis: cauda brevis, aequalis; rectricibus conformibus.

America trop. 17.

1. **P. pareola**, L. (superba, Pall. - aegithaloides, Licht.)

Manacus cristatus niger, Br.) Pl. entl. 687. 2. mas. ad. 303. 2. jun. - Edw. B. t. 261. I. - Sw. B. of Bras. t. 44.

Desm. Tangur. et Manak. t. 50, 51, 52. ex Bras. Cayenna. Nigra holosericea; dorso scapularibusque caeruleis; verticis plumis strictis, elongatis, coccineis.

Faem. olivacea, subtus cineraceens.

2. **P. aurantia**, Wagl. 1830. (*Manacus aurantius*, Briss. aureola var. β . *Gm.*) *Edw. B. t. 83.* - *Desm. Tang. et Man. t. 57.* ex *Cayenna*. *Aurantiaca; dorso, crisso, alis, caudaque nigris; remigibus intus macula alba.*
3. **P. aureola**, L. (*Manacus ruber*, *Br.*) *Pl. enl. 34. 4. m. ad. Edw. B. t. 261. 2.* - *Shaw, Nat. Misc. t. 249.* - *Desmar. Tangar. et Manak. t. 54. 55. 56.* - *Hahn, Ausland. Vög. t. 5.* ex *Cayenna*. *Coccinea; fronte, gulaque aurantii; tergo, alis, abdomine, caudaque unicolo, nigris: tectricibus alarum inferioribus luteis.*
4. **P. fasciata**, Orb. et Lafr. *Syn. Av. p. 38.* - *Voy. Am. t. 30. 1.* ex *Chili*. *Coccinea, fronte, gula, abdomine, tectricibus alarum inferioribus, rostricibusque basi, flavis: tergo, alis, caudaque apice, nigris.*
5. **MANACUS rubricapillus**, Br. (*Pipra torquata?* *L.* erythrocephala var. β . *L.* - erythrocephala, *Licht.* - *P. rubricapilla*, *Temm.*) *Pl. col. 54. 3.* - *Desm. Tang. et Man. t. 53. faem. ex Brasil. Cayenne. Minor: cauda breviore: nigerrima, tibiis albo-variis; pileo, genti, suffragineoque coccineis.*
6. **P. erythrocephala** et cristata? *L.* (*auricapilla*, *Licht.* *Manacus auro-capillus*, *Briss.*) *Pl. enl. 34. 1. jun.* - *Edw. B. t. 21.* - *Desmar. Tang. et Manak. t. 60. 61.* - *Hahn, Ausl. Vög. t. 3. 1.* ex *Brazil. Cayenne. Nigra, tibiis albis; pileo, geni, suffragineoque aureo-subaurantiaco.* Quid *P. erythrocephala*, *Vieill. Enc. Moth. I. p. 390.* ex *Braz?*
7. **P. cornuta**, Spix, *Av. Bras. t. 7. 2.* ex *Brazil.* *Nigerrima, capite ex toto, suffragineoque coccineis; occipitis plumis, utrinque elongatis!*
8. **P. chloromeros**, Tschudi, *Faun. Per. p. 11.* ex *Porru. Nigra; facie, pileo nuchaque coccineis; tibiis citreis.*
9. **P. vitellina**, Gould, 1843. *Voy. Sulph. B. t. 21.* ex *Amer. contr. oec. Panama. Nigra; subfuscum cerevice flavo-vitellina; uropygio crisoque olivaceis.*
10. **P. serena**, L. (*Manacus alba-fronte*, Br. - *Euphona serena*, *Licht.*) *Pl. enl. 32. 2.* - *Desmar. Tangar. et Man. t. 62. 64.* ex *Bras. Cayenne. Atra; fronte candida, postice caeruleo-iridescenti; uropygio cyaneo; abdomine luteo.*
11. **P. leucocilla**, L. (*Manacus albo-capillus*, Br. - *Parus pipra*, L.) *Pl. enl. 34. 2.* - *Edw. B. t. 260.* - *Desmar. Tangar. et Manak. t. 59.* - *Hahn, Ausl. Vög. t. 2.* ex *Brazil. Guiana. Nigerrima, pileo candido; remigibus fuliginosis.*

12. *P. gutturalis*, L. (Manacus gutture albo, Br.) *Pl. enl.*
324. 1. - Desmar. *Tangar. et Man.* t. 63. *ex Brasil.*
Coracino-nigra; gula, jugulo acute, remigibusque intus, conditidis: mandibula nigra. Faem. olivacea, subtus albo-virescens.
13. *P. perspicillata*, Wagl. 1830. (*Pipra gutturalis* facm. Desm.) *Addit. Tang. et Manak.* t. 65. mas. *ex Brasil.*
Olivacea; stria oculari, remigibus, rectricibusque iatus, nigricantibus: subtus ex toto alba: mandibula albicans.
14. *P. cyanocapilla*, Wagl. 1830. (*coronata*, Spix).
Ae. Bras. t. 67. 1. - Hahn, Ausl. Vog. t. 3. 2. ex Bras.
Atterrima; pileo cyano; uropygio rufa caeruleo.
15. *P. caeruleiceps*, Tschudi, Faun. Per. p. 11.
ex Peru. Nigra; pileo, uropygioque caeruleis.
16. *P. strigilata*, Wied. (*lineata*, Thunb.) *Pl. col.*
54. 1. mas. 2. faem. - *Sv. B. of Brazil.* t. 25. - *Mem. Acad.*
Petersb. 1823. p. 284. t. 8. 1. ex Brasil. Olivacea; pileo subcristato coccineo: subtus albo-virescens, rufo-striatu.
17. *P. striolata*, Bp. 1837. (*strigilata*, Wagl. nec Wied.
regulus? Hahn.) *Ausl. Vog. As. et Am.* t. 4. 1. et 2. - *Gr.*
et Mitch. Gen. t. 67. 2. ex Peru. Olivacea; pileo crista-
tato coccineo: subtus rufa, albo-striata.

336. **Piprites**, Caban. 1847. (*Hemipipo*, Cab. 1847. - *Pipra*, p. Gr.)

Aiae modicæ, subacutæ remigibus latis: cauda longius-
cula: corpus crassum: colores obscuri: rostrum vali-
dum: digitæ liberi.

America mer. 3.

a. **PIPRITES.** Cauda divaricata.

1. *P. pileata*, Natt. (*Piprites pileata*, Cab.) *Pl. col.* 172, 1.
*ex Peru. Rubro-castanea; subtus rufo-flavida: pileo ni-
gro, superciliis genitibus rufis.*
Faem. olivacea, uropygis tantum rubro-castaneo.

b. **HEMIPICO.** Cauda truncato-rotundata.

2. *P. chloris*, Natter. (*Piprites hinc Hemipipo chloris*, Cab.) *Pl. col.* 172, 2. *ex Bras. Peru. Prusino-viridis;*
*subtus viridi-flavus: fasciola frontali cinnamomina; macula
aurium cinerea: alis, caudaque nigris, albo varisis.*

3. **HEMIPICO chlorion**, Caban. 1847. (*Pipra chlorion*, Bp.)
*Orn. Not. p. 234. sp. 3. Fig. nulla. ex Cayenna. Si-
milis praeed. sed rostro robustiore, latiore: cauda breviore:
gula crissosque tantum flavicantibus; subtus murina: alis mi-
nus albo variegatis, testricibus minoribus virescentibus.*

- *337. **Masius**, Bp. 1850. (Pipra, p. Gr.) Alae concavae, rotundatae; remigibus angustis, prima brevi, tertia omnium longissima: cauda elongata, rotundata: corpus gracile: rostrum minimum: digili externi conjuncti. America mer. 1.

Pipra **chrysopera**, Lafr. Mag. Zool. 1843. Ois. t. 44.

Gr. et Mitch. Gen. t. 67. 1. ex Columbia. Nigerrima: pileo, gula, alis subtus, remigibus, rectricibusque interne, aureis, occipitis plumis elongatis, apice appendiculato, rubro.

Genus dictum Aloysio Masio meo, Italicissimo, exuli etiam cariori, amplitudine ingenii, animi virtute, lacertorum vigore aequae praecelarol... Utinam multos tales filios Italia et vel Gallia progenuerint!....

338. **Calyptura**, Sw. 1831. Alae vix concavae; remige prima breviore! cauda brevis aequalis. Ad Tyranninas accedit! America m. 1.

PARDALOTUS **cristatus**, Vieill. (Regulus tyrrannulus, Licht.

Pipra tyrannulus, Wagl.) Sw. Orn. Draw. t. 26. ex Bras.

SUBFAM. 53. COTINGINAE.

339. **Phibalura**, Vieill. 1816. (Chelidis, Gloger, 1827. - Amphilobula, Caban. 1847.) Alae longae acutae: cauda furcata! An Subfamilia distincta? America trop. 1.

Phibalura flavirostris, Vieill. (Ph. cristata, Sw. flavifrons, Aliq. Pipra chrysopogon, Wagl. ex Licht. - forficata, Thunb.) Zool. Ill. t. 31. - Pl. col. 118. ex Bras.

340. **Cotinga**, Br. (Ampelis, p. L.) America mer. 5.

1. AMPELIS COTINGA, L. (**Cotinga cælestis**, Gr.) Pl. enl. 186. - Edw. B. t. 241. - Lev. Ois. Am. et Ind. t. 34.

35. 36. ex Guiana. Caerulea, pectore late violacea; alis caudaque nigris.

2. AMPELIS **caerulea**, Vieill. (cotinga, p. L. - superba, Shaw. - Cotinga cincta, Gr. ex Bodda. - C. caerulea, Bp.) Pl. enl. 188. - Edw. B. t. 340. - Lev. Ois. Am. t. 41. 42. Shaw, Nat. Misc. t. 817. et 821. ex Bras. Caerulea; subtus ex toto violacea, torque jugulari cyanea.

3. AMPELIS **nattereri**, Boissonn. (Cotinga nattereri, Gr.) Rev. Zool. 1840. p. 2. ex Columbia. Caerulea; subtus late et tante violacea; macula abdominali, et striis jugularibus, nigris.

4. AMPELIS **cayana**, L. (Cotinga cayana, Gr.) Pl. enl. 624. Lev. Ois. Am. t. 27. 28. 29. 30. ex Bras. Cayenn. Caerulea, jugulo violacea.

5. **AMPELIS maynana, L.** (*Cotinga mayanensis, Br.* - *maya-*
na, Gr.) *Pl. enl. 229. - Levaill. Ois. Am. t. 43. ex*
G u y a n a, M a y a n a. *Pulcherrime caerulea, gula pur-*
pureo-violacea.
*Quid Ampelis cineta (*Cotinga tschudi, Gr.*) et A. rufaxilla (*Cotinga*
rufaxilla, Gr.) Tschudi, *Fauna Per.* p. 10. *ex Am. m. o.c.**

341. **Xipholena, Gloger, 1842.** (*Cotinga, p. Gr.*) *Aiae remi-*
gibus acquisitatis; tectricibus corpori proximiioribus ensi-
formibus, elongatis, carinatis, rigidis: cauda longiuscula;
rectricibus lati. America mer. 3.

1. **AMPELIS pompadoura, L.** (*grisea, Bodd.* - *cinerea, Briss.*
Lath. - *macroura, Temm.* - *Lanius nengeta, p. L?* *Gm.*
faem. - *Turdus puniceus, Pall.* - *Cotinga purpurea, mas*
et cinereo-purpurea, faem. Briss. - *C. pompadoura, Gr.)*
Pl. enl. 279 mas, et 699. faem. - Edic. B. t. 341. - Lev.
Amer. t. 31, 32, 33. ex G u j a n a. *Purpurea; tectricibus*
valde elongatis.

2. **AMPELIS PURPUREA, Licht. nec Br. (*atropurpurea,***
- Wied.* - *Cotinga purpurea, Gr.)* *Cat. Dipl. Berl. Mus.*
sp. 583. ex Bras. s. *Similis praecedenti; sed obscurior, et*
tectricibus vix elongatis, nec rigidis, minime carinatis.
Adult. atropurpurea; remigibus albis, primariis opice nigris:
rectricibus lateraliibus externe roseis, margine interno albido.
Jun. cinerea, purpureo maculata; aliis nigricantibus, remigi-
bus secundariis albo-limbatis.

3. **AMPELIS lamellipecten, Lafr.** (*leucura, Temm.) Mag.*
Zool. 1839. Ois. t. 9. ex Columbia. *Major: nigro-pur-*
purea, plumbis squamosis; aliis caudaque albis: tectricibus valde
elongatis, rigidissimis.

Quid Ampelis aureola, Vieill. N. Dict. H. Nat. viii. p. 642.

342. **Carpornis, Gr. 1846.** (*Amphilion, Caban. 1845.*) America mer. 3.

1. **AMPELIS melanoccephala, Wied.** (*Cotinga speciosa,*
Thunb. - *Procnia melanocephala, Sie.*) *Zool. Ill.*
t. 25 - Griff. Anim. Kingd. I. t. p. 507. ex Brasil.
Viridis, subtus flavescentia nigricante undatus; capite nigro.

2. **PROCNIA cucullata, Sw.** (*Carpornis cucullata, Gr.)*
Zool. Ill. t. 37. - Pl. col. 363. ex Brasil. *Brunneus:*
alarum fasciæ duplice, et abdomine luteis: capite, collo
pectoreque nigris.

3. **AMPELIS rubrocristata, Lafr.** (*rufocristata, Boiss.*
Carpornis rubrocristata, Gr.) *Voy. Am. m. Ois. t. 31, I.*
ex S.ta Fe de Bogota.

Quid Cotinga cristata, Gr. ex Gm. - Mill. Ill. t. 15, G?

343. **Tijuea**, Less. (Chrysoteryx, Sw. - Carpornis, p. Gr.) America mer. 1.

Tijuea nigra, Less. (Chrysoteryx erythrorhynchus,
Sw. - Ampelis chrysoptera, Nordin. - Carpornis nigra,
Gr.) Cent. Zool. t. 6. - Erman, Zool. Atl. t. 10. 1. ex
Bras. centr. Nigra; remigibus medio auratis: rostro
aurantiaco.

344. **Ptilochloris**, Sw. (Laniisoma, Sw. - Collurampelis, Less.) America mer. 4.

1. **Lanius arcuatus**, Geoffr. (Muscicapa squamata, Wied.
Ptilochloris lunatus, Sw.) Mag. Zool. 1833. Ois. t. 12.
ex Brasil.
2. **P. remigialis**, Lafr. Rev. Zool. 1838. p. 237. ex Br.
3. **P. rufo-olivaceus**, Lafr. R. Zool. 1838. p. 238. ex Br.
4. **P. virescens**, Lafr. Rev. Zool. 1838. p. 239. ex Br.

345. **Pyrrhorhynchus**, Lafresn. (Ampelion? Cabanis, 1845.

Cotinga, p. Gr.)

Am. m. occ. Mex. 5.

a. Rostro pedibusque rubris.

1. **AMPELIS viridis**, Orb. (Cotinga viridis, Gr.) Voy. Am.
t. 30. 2. ex Bolivia. Gula flavata: cauda apice nigra.
2. **AMPELIS riefferi**, Boiss. (Cotinga viridis, p. Gr.) Rev.
Zool. 1840. p. 3. ex Columbia. Tarsis brevioribus:
cauda apice concurre.
3. **AMPELIS arcuata**, Lafr. (Carpornis arcuata, Gr.) Mag.
Zool. 1843. t. 40. ex Columbia. Major: capite nigro:
subtus nigro-undulatus.

b. Rostro rubro: pedibus fuscis.

4. **AMPELIS aureipectus**, Lafr. (elegans, Tschudi, 1843.)
Mag. Zool. 1843. t. 39. ex Santa Fe de Bogota, Peru.
Pectore aureo.
5. **AMPELIS formosa**, Hartl. Rev. et Mag. Zool. 1849.
p. 493. t. 14. 1. ex Venezuela. Fuscis nigra: subtus
aurea, pectore sanguineo.

Multum me dolet quod non possum debitas persolvere laudes Tau-
rinensi Professori Summi Rusconi Discipulo et Continuatori,
Philippe De Filippi amico et Schlegeliano, qui genera non-
nulla, fortasse primus, propositi, intersynonyma saltem hic ci-
tanda. Sed apud Batavos, utut sunt docti atque rerum peregrin-
narum amantes, libros italicos frustra quaeres, aequae ac rerum
italicarum nostri temporis non praejudicatam cognitionem!

SUBFAM. 60. CORACININAE.

346. **Chasmorhynchus**, Temm. 1820. (Proenias, Gr. an Hoff-
mansegg? nec Ill. - Arapunga et Averano, Less.) America trop. 3.
 1. **AMPELIS variegata**, L. (Chasmorhynchus variegatus,
Temm.) Pl. col. 51. - Cuv. Règn. Anim. t. 4. 4. ex Br.
 2. **AMPELIS alba**, Thunberg. (Proenias nudicollis, Wied.
Chasmorhynchus ecarunculatus, Spix.) Av. Bras. t. 4.
Pl. col. 368. mas, et 383. faem. ex Brasil.
 3. **AMPELIS carunculata**, Gm. (Proenias nivea, Gr. ex
Bodd.) Pl. enl. 793. - Lev. Am. Ind. t. 39. 40. ex Brasil.
347. **Coracina**, Vieill. (Gymnoderus, Geoffr.) America mer. 1.
GRACULA faecida, L. (Corvus nudus, Gm. - nudicollis,
Bodd. - gymnoderus, Vieill. - Gymnoderus cayanensis,
Geoffr. - G. faetidus, Strickl. Gr.) Pl. enl. 609. ex Brasil.
348. **Cephalopterus**, Geoffr. (Coracina, p. Vieill.) America mer. 1.
Cephalopterus ornatus, Geoffr. (Coracina cepha-
loptera, Vieill. - Ampelis umbellata, Steph.) Ann.
Mus. XIII. t. 15. - Pl. col. 255. ex Brasil.
349. **Gymnocephalus**, Geoffr. (Coracina, p. Vieill.) America mer. 1.
CORVUS calvus, Gm. (Gymnocephalus capucinus, Geoffr.
cayanensis, Steph.) Pl. enl. 521. - Lev. Ois. Am. t. 49.
ex Guiana.
350. **Pyroderus**, Gr. (Coronis, Gloger, 1827.) America mer. 3.
 1. **COTINGA scutata**, Shaw. (Ampelis sanguineicollis, Licht.
Coracina rubricollis, Vieill. ex Azara 56. - C. scutata,
Temm.) Pl. col. 40. ex Brasil. Parag. Major:
abdomine, tectricibusque alarum inferioribus rufa punctato-
maculatis.
 2. **CORACINA granadensis**, Laf. Rev. Zool. 1846. p. 227.
ex Columbia o.c. Major: subtus castaneus unicolor;
fascia angusta pectorali, crisoque nigra.
 3. **CORACINA orenocensis**, Laf. Rev. Zool. 1846. p. 227.
ex Columbia or. Minor: rostro breviori; abdomen,
tectricibusque alarum inferioribus maculis numerosioribus.

FAMILIA 31. TODIDAE.

SUBFAM. 61. QUAERULINAE.

351. **Querula**, Vieill. 1816. (Threnoedus, Gloger, 1842) America trop. 2.

1. **MUSCICAPA rubricollis**, Gm. (porphyrobrancha, Shaw.)

Querula cruenta, Gr. ex Bodd. - Querula rubricollis, Sw.)

Pl. enl. 381. - Lev. Ois. Am. et Ind. t. 47. 48. - Nat.

Misc. t. 60. - Gal. Ois. t. 115. - Nat. Libr. x. Flyc. t. 1.

ex Amer. mer.

2. **MUSCICAPA militaris**, Gm. (Querula rubra, Vieill.)

purplea, Less.) Lev. Ois. Am. et Ind. t. 25. 26. ex

Amer. merid.

352. **Lipaugs**, Boie, 1828. (Lathria, Sw. 1831. - Laniocera hinc

Turdampelis, Less.) America mer. 5.

1. **MUSCICAPA plumbea**, Licht. Dubl. Berl. p. 53. (Querula

cineræ, Vieill. - Lathria cinerea, Sw.) Lev. Ois. Am. et

Ind. t. 44. - Nat. Libr. Flyc. t. 2. ex Amer. mer.

2. **MUSCICAPA simplex**, Licht. (Lipaugs simplex, Gr.) Cat.

Dubl. Berl. Mus. p. 53. sp. 552. ex Bras. sept.

3. **QUERULA fuscocinerea**, Laf. (Lipaug. fuscochinereus,

Hartl.) Rev. Zool. 1843. p. 291. Major praecedentium.

4. **AMPELIS hypopyrrha**, Vieill. (sibilatrix, Wied. - Li-

paugs lateralis, J. Gr. - L. hypopyrrhus, Hartl.) Zool.

Misc. t. 60. ex Brasil.

5. **LANIOCERA sanguinaria**, Less. (Lipaugs sanguina-

tius, Hartl.) Rev. Zool. 1840. p. 353. ex Brasil.

6. **TURDAMPELIS lanioides**, Less. (Lipaugs lanioides, Hartl.)

Echo du Monde sav. 1844. p. 156. ex Brasil.

SUBFAM. 62. PSARINAE.

353. **Tityra**, Vieill. p. (Psaris, Cuv.-Pachyrhynchus, Spix.-Pa-

chyramphus, Gr.)

Am. m. Antill. 4.

1. **LANIUS cayanus**, L. (cayanensis cinereus, Br. - Psaris

cayanus, Cuv. - cayanensis et guianensis, Sw. - nae-

vius, Less. jun. - virgata, Ham. Smith. faem. - Tityra ci-

nereus et cayana, Vieill. - T. cayana et guianensis, Gr.)

Pl. enl. 304. mas. 377. faem. - Briss. Orn. II. t. 14. I. mas.

2. faem. - Gal. Ois. t. 134. ex Cayenna, Brasil. sept.

Rostro basi carnoe; loris nudis.

2. **PSARIS brasiliensis**, Sw. (Pachyrhynchus cayanus,

Spix, nec L. - Tityra brasiliensis, Gr.) At. Bras. II. 44. I.

ex Brasil.

3. **PACHYRHYNCHUS semifasciatus**, Spix (mexicanus et tityroides, Less. - Tityra personata, Jard. - T. personata et tityroides, Gr. - T. semifasciata, Caban.) Av. Bras. t. 44. 2. - Selb. Ill. Orn. t. 24. ex Bras. Mexico, Amer. centr. Peru.

4. **LANIUS inquisitor**, Olfers. (cayanus, var. γ. Lath. faem. Tityra erythrogenys, Jard. faem. - Psaris erythrogenys; Selb. faem. - Psaris selbyi, jardimii et nattereri mas, erythrogenys faem. Sw. - Psaris inquisitor, Orb. - Tityra inquisitor, nattereri, jardimii et selbyi, Gr. - Tityra inquisitrix, Caban.) Zool. Ill. n.s. t. 35. mas. penn. mut. - Nat. Libr. x. Flycatch. t. 3. faem. ex Brasil. s. Rostro toto nigro: loris plumatis.

354. **Pachyramphus**, Gr. p. (Pachyrhynchus, Sic. nec Auct.) Am.m.Antill. 6.

1. **LANIUS validus** olim leucoptilon, Licht. mas. (Tityra atricapilla ex Azara 209.m. et rufa ex Azara 209.t. Vieill. - cristata mas et pileata faem. Jard. - Pachyrh. cinerascens, Spix - P. pileatus, Selb. - megacephalus, Sw. mas jun. Psaris cristatus mas et strigatus jun. Sw. - atricapillus et roseicollis quad faem. et juv. Orb. - affinis Less. 1840. m. jun. - Tityra strigata, cristata, cinerascens, pileata, rufa, megacephala, affinis et leuconota, Gr. - Pachyramphus cristatus, Hartl. - P. validus, Caban.) Av. Bras. II. t. 46. 1. mas jun. - Zool. Ill. 2. ser. t. 41. mas. - Ill. Orn. t. 17. faem. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 63. m. et f. ex Bras.

2. **Pachyramphus nigrescens**, Caban. (Tityra sp. dist. statuta cristatae? Jard.) ex Column. Totus niger; genis plumatis: remige intermedia falciformi valde elongata!

3. **QUERULA minor**, Less. mas jun. (Psaris roseicollis, mas nec faem. Orb. - Pachyrhynchus pectoralis, Sw. mas jun. aglaiae, Lafr. 1829. mas jun. - Pachyramphus pectoralis, Hartl. - Tityra pectoralis et aglaiae, Gr. - Pachyramphus minor, Cab.) Jard. et Selb. Ill. Orn. iv. t. 18. mas. ex Mexico, Peru, Bolivia.

4. **PSARIS cuvieri**, Sic. (Muscicapa nigriiceps, Lichtenst. Muscipeta nigriiceps, Wied. - Platyrhynchus duponti et Tityra viridis, Vieill. - Tityra cuvieri, mas, et vieilloti faem. Jard. - Pachyrhynchus cuvieri, Spix. - vieilloti, Jard. faem. - T. cuvieri, viridis et vieilloti, Gr. - Pachyramphus nigriiceps mas, et vieilloti faem. Hartl. - Pachyramphus cuvieri, Caban.) Zool. Ill. t. 32. mas. - Av. Bras. t. 45. 2. mas. - Selb. Ill. Orn. t. 10. 1. faem. - Nat. Libr. x. Flycatch. t. 4. mas. ex Brasil.

5. PIPRA *atricapilla* mas et Muscicapa aurantia faem. *Gm.*

(*Lanius mitratus*, *Licht.* - *Pachyrhynchus leucogaster*,
Sw. mas jun. - *Pipracinerea* mas, *Tityra eques*, *leucogaster*
et mitrata, *Gr.* - *Pachyramphus mitratus* mas, *et au-*
rantius faem. *Hartl.* - *Pach. atricapillus*, *Caban.*) *Pl.*
enl. 687. 1. mas, 831. 1. faem. *ex Cayenna.*

6. VIREO *versicolor*, *Hartlaub*, mas jun. (*Pachyrhynchus*
squamatus, *Lafr.* mas ad. - *Tityra versicolor*, *Gr.* - *Pa-*
chyramphus versicolor, *Caban.*) *Rev. Zool.* 1843. p. 289
et 291. Fig. nulla. *ex Novo Granada.* *Minima* : *sub-*
tus flavo-viridis fusco-undulata.
Mas pileo, dorsoque nigris; alis albo variis.
** Faem. viridis; pileo cerviceque fusco-plumbeis; alis rufi variis.*355. PSARIS, *Cuv.* p. (*Bathmidurus*, *Caban.* - *Pachyrhynchus*,

p. *Spix.* - *Tityra*, p. *Gr.*)

America mer. 6.

1. PSARIS *niger*, *Sw.* (*Pachyrhynchus niger*, *Spix* - *Ti-*
tyra nigra, *Jard.* - *Bathmidurus niger*, *Caban.*) *Av.*
Bras. t. 45. 1. *ex Guyana*, *Brasil. sept.*2. MUSCICAPA *surinama*, *L.* (*Tityra surinama*, *Strickl.*)
Jard. Contr. Orn. 1848. t. 2. *ex Cayenna.*3. PACHYRHYNCHUS *variegatus*, *Spix* (*spixii*, *Sw.* - *Mus-*
cipeta splendens, *Wied.* mas. - *Muscicapa apicalis*, *Licht.*
Tityra splendens *et variegata*, *Gr.* - *Pachyramphus splen-*
dens, *Hartl.* - *Bathmidurus variegatus*, *Caban.* - *Psaris*
variegatus, *Bp.*) *Av. Bras.* II. t. 43. 2. *ex Brasil.*4. SALTATOR *melanoleucus*, *Vieill.* (*Muscicapa rufescens*,
Gm. - *Pachyrhynchus rufescens*, *Spix.* - *castaneus*, *Selb.*
ruficeps, *Sw.* faem. - *Muscipeta aurantia*, *Wied.*, *nec Gm.* faem.
Tityra castanea, *Jard.* - *T. ruficeps*, *castanea*, *rufescens*
sp. 19. *etrufescens* sp. 39. *Gr.* - *Bathmidurus melanoleucus*, *Cab.*) *Pl. enl.* 453. 1. faem. - *Av. Bras.* t. 46. 2. faem.
Selb. III. Orn. t. 16. 2. faem. *ex Brasil.*5. LANIUS *ATRICAPILLUS*, *Gm.* mas. (*Todus marginatus*,
Licht. faem. - *Muscipeta marginata*, *Wied.* - *Pachyrhyn-*
chus swainsoni, *Jard.* faem. - *marginatus*, *Orb.* - *albi-*
frons, *Sw.* - *Platyrhynchus marginatus*, faem. *et Tityra*
swainsoni, *albifrons*, *marginata*, *et species* 34. *Gr.* - *Pa-*
chyramphus marginatus, *Hartl.* faem. - *Bathmidurus*
marginatus, *Caban.* - *Psaris marginatus*, *Bp.*) *Voy. Am.*
*m. t. 31. 2. 3. 4. faem. ex Brasil.*6. BATHMIDURUS *major*, *Caban.* (*Psaris major*, *Bp.*) *Orn.*
Not. p. 246. sp. 5. ex Brasil.

SUBFAM. 63. TODINAE.

356. **Todus**, L. America calid. 4.
1. **Todus viridis**, L. - Sloane, *Nat. Hist. Jamaic.* t. 263. 1.
Sic. Zool. Ill. n. s. t. 66. ex Ins. Jamaica.
 2. **Todus mexicanus**, Less. *Ann. Sc. Nat.* 1838, p. 167.
ex Mexico et America mer.
 3. **Todus viridis**, Vig. (**multicolor**, Gould. - portoricensis, Less. 1833.) *Icon. Av. fig. bona. - La Sagra, Voy. Cuba, Ois. t. 22. ex Ins. Cubae.*
 4. **Todus viridis**, Vieill. (**subulatus**, Gould. - dominicensis, Laf. 1847.) *Pl. enl. 585. 1. 2. - Desmar. Tod. t. 67. - Vieill. Ois. Am. s. t. 56. - Gal. Ois. t. 124. ex Ins. S. ti Dominic. Martinic.*

SUBFAM. 64. TYRANNINAE.

357. **Todirostrum**, Less. 1831. (*Vermivora*, Less. nec *Auct.*) America m. 15.
- Triccus, Caban. 1845.)
 1. **Todus cinereus**, L. (*Muscicapa melanoxantha*, Sparrm. *Todirostrum cinereum*, Less.) *Pl. enl. 585. 3. - Edw. Br. t. 262. 2. - Mus. Carls. t. 97. - Desmar. Todiers. t. 68. ex Surinam.*
 2. **Todus maculatus**, Desm. (*Platyrhynchus maculatus*, Vieill. - *Todiramphum maculatum*, Less.) *Hist. Nat. Todiers. t. 4. ex Guiana.*
 3. **Todus melanocephalus**, Spix. (*Todirostrum melanocephalum*, Gr.) *Av. Bras. t. 9. 2. - Sw. Nat. Libr. x. Flycatch. t. 18. ex Cayenna, Bras. sept.*
 4. **Todus griseus**, Desm. (*Todirostrum griseum*, Gr.) *H. Nat. Tod. t. 69.*
*Quid T. plumbens, Gm. (*Todirostrum plumbeum*, Gr.) ex Surinam?*
 5. **Todus sylvia**, Desm. (*Todirostrum sylvia*, Gr.) *Hist. Nat. Tod. t. 71.*
 6. **Todus ecaudatus**, Laf. (*Todirostrum ecaudatum*, Gr.) *Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 33. 1. 2. ex Bolivia.*
 7. **Todus auricularis**, Vieill. (*megacephalus*, Sw. - *Ver-mivora melanotis*, Less. - *Todiramphum auriculare*, Laf. *Euscarthmus cinereicollis*, Wied. - *Todirostrum cine-reicolle*, Gr.) *Nat. Libr. x. Flycatch. t. 19. ex Bras.*
 8. **MUSCICAPA diops**, Temm. (*Todiramphum diops*, Laf. *T. granadense*, Hartl. 1843.) *Pl. col. 144. 1. ex N. Gran.*

9. **TODUS margaritaceiventer!**, Lafr. (Todirostrum margaritaceiventer, Gr.) *Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 33. 3. 4.*
Azara. 177. ex Bolivia, Parag.
10. **MUSCICAPA gularis**, Natter. (Todus plumbiceps, Lafr.
Todiramphus gulare, Gr.) *Azara 169. - Pl. col. 167. 1.*
ex Bras. Bolivia.
11. **T. flavifrons**, Lafr. *Rev. Zool. 1846. p. 361. sp. 3.*
ex Brasil.
12. **T. furcatum**, Lafr. *Rev. Zool. 1846. p. 362. sp. 10.*
ex Brasil.
13. **T. palpebrosum**, Lafr. *Rev. Zool. 1846. p. 362.*
sp. 11. ex Columbia.
14. **T. spiciferum**, Lafr. *Rev. Zool. 1846. p. 363. sp. 8.*
ex Brasil.
15. **T. squamicrista**, Lafr. *Rev. Zool. 1846. p. 363.*
sp. 9. ex Columbia.
Quid Euscathmus orbitatus, Wied. (Todirostrum orbitatum, Gr.)
Beitr. II. p. 958. ex Brasilia?

358. **Megalophus**, Sw. (Muscipeta, Cuv. - Onichorhynchus,
Fisch. - Terpsichore, Gloger. - Muscivora, Gr. ex Cuv.
Myiarchus hinc Muscivora, Cab. 1847.) America mer. 1.
Todus **regius**, Gm. (Megalophus regius, Sw. - Muscipeta
regia, Wied. - Muscivora regia, Gr.) *Pl. enl. 289. - Sw.*
Nat. Libr. Flyc. t. 15. - Id. Orn. Draw. Braz. B.
t. 51. 52. ex Cayenna, Bras.
Quid Muscivora cristata, Gr. nec Gm? (Shaw, Nat. Misc. t. 465)?

359. **Platyrhynchus**, Desm. 1805. America trop. 8.
1. **TODUS PLATYRHYNCHUS**, Pall. (*rostratus*, Lath. - Platyrhynchus fuscus, Desm.) *Hist. Nat. Tod. t. 72.*
Spic. Zool. vi. t. 3. c. - Gal. Ois. t. 126. ex Bras. s.
 2. **TODUS cancrroma**, Licht. (Platyrhynchus caneromus,
Temm. - mystaceus, Vieill. ex Azara 173.) *Pl. col. 12. 2.*
Sw. Zool. Ill. t. 115. - Nat. Libr. x. Flyc. t. 17. ex
Brasil. sept.
 3. **P. herminieri**, Less. *R. Zool. 1839. p. 104. ex Col.*
 4. **P. pusillus**, Sw. *Phil. Mag. 1827. p. 366. ex Bras.*
 5. **P. leucoryphus**, Wied. *Beitr. p. 974. ex Bras.*
 6. **MUSCICAPA prasinia**, Sparrm. (Platyrhynchus prasinus
Gr.) *Mus. Carls. t. 86. 87. ex Brasil.*

7. *P. striatus*, Less. Rev. Zool. 1839. p. 41. ex Bras.
8. *P. nuchalis*, Wied. Beitr. p. 971. ex Bras.
Quid Platyrhynchus ferrugineus, fuscus, gularis, obscurus et brachyurus, Gr. ex Gmelin?
360. **Orchilus**, Cabanis. (Euscarthmus, p. Gr.) America m. 2.
1. *EUSCARTHMUS pileatus*, Tsch. Faun. Per. t. 9. 1. ex Per.
2. *EUSCARTHMUS rufipes*, Tsch. Faun. Per. p. 13. ex Per.
361. **Coleopterus**, Caban. 1847. America m. 2.
1. *Coleopterus cristatus*, Caban. ex Schomb. Orn.
Not. 1. p. 253. sp. 1. in Wieg. Arch. 1847. t. 5. 2. 3.
ex Guiana.
2. *Todus pilaris*, Licht. (Coleopterus pilaris, Caban.) Orn.
Not. 1. p. 253. sp. 2. in Wieg. Arch. 1847. t. 5. 4. ex
Nova Granada.
362. **Euscarthmus**, Wied. 1831. (Musciphaga, Less. 1837.
Serpophaga, Gould) America m. 9.
1. *E. meloryphus*, Wied, Beitr. II. p. 947. ex Brasil.
2. *E. nidipendulus*, Wied, Beitr. II. p. 950. ex Bras.
3. *SYLVIA pectoralis*, Vieill. (Euscarthmus superciliaris,
Wied. - E. pectoralis, Gr.) Azara 165. ex Brasil.
4. *MUSCICAPA parulus*, Kittl. (Sylvia bixami, J. Gr. - Culicivora parulus, Lafr. - Serpophaga parulus, Gould.
Euscarthmus parulus, Gr.) Mem. Ac. Sc. de S. Petersb.
1831. t. 9. ex Chili.
5. *SERPOPHAGA albicoronata*, Gould. (Euscarthmus albo-coronatus, Gr.) Voy. Beagle, p. 49. ex La Plata.
6. *TYRANNUS albicristatus*, Vig. 1829. (Culicivora reguloides, Lafr. - Vermivora elegans? Less. - Euscarthmus albocristatus et reguloides, Gr.) Orb. Voy. Amer.
m. Ois. t. 36. 1. ex Brasil.
7. *SYLVIA nigricans*, Vieill. (Taichuris nigricans, Orb.
Serpophaga nigricans, Gould. - Euscarthmus nigricans,
Gr.) Azara 167. ex Parag. La Plata.
8. *E. cinereus*, Strickl. Ann. N. Hist. 1844. p. 414. ex
Brasil.
9. *MOTACILLA cristata*, Gu. (Vermivora cristata, Less.
Euscarthmus galeatus, Gr. ex Bodd.) Pl. encl. 391. 1. ex
Cayenna.

363. **Hapalura**, Caban.

America m. 2.

1. **MUSCICAPA stenura**, Temm. (*Hapalura stenura, Caban.*)

Pl. col. 167. 3. ex Brasil.

2. **PACHYRHYNCHUS minimus**, Gould. (*Pachyramphus minimus, Darwin.* - *Tityra minima, Gr.* - *Hapalura minima, Caban.*) *Voy. Beagle, t. 15. ex Monte Video.*

364. **Hapalocercus**, Caban. 1847. (*Lepturus, Sw.* 1847. - *Lep-*
tocercus, Caban. 1845.)

America m. 2.

1. **LEPTURUS ruficeps**, Sw. (*Hapalocercus ruficeps, Caban.*)

Nat. Libr. x. Flyc. t. 20. ex Brasil.

2. **ALECTERUS flaviventris**, Laf. *ex Azara* 171. (*Arundi-*
ncola flaviventris, Orb. - *Hapalocercus flaviventris, Cab.*)

*Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 37. 1. ex Bolivia, Parag.**Quid Lept. platycerus, Sw. Nat. Libr. x. p. 163. Mus. Paris. ex Br?**Quid Lepturus galeatus, Less. Rev. Zool. 1849. ex Mexico?*365. **Cyanotis**, Sw. (*Tachuris, Orb.*)

Amer. trop. 1.

- REGULUS omnicolor** et *Sylvia rubigastra, Vieill. ex Azara*

*161. (*Cyanotis azarae, Gr. ex Licht.* - *C. omnicolor, Sw.*

Regulus byronensis, Gr. - *Tachuris rubigaster, Orb.*)

Griff. Anim. Kingd. II. t. 42. ex Bras. m. Parag.

366. **Tyrannulus**, Vieill. 1816. (*Elaenia, p. Gr.*)

America mer. 1.

SILVIA elata, Lath. (*Tyrannulus elatus, Vieill.*) *Pl. enl.*

708. 2. - Gal. Ois. t. 71. - Spix, Av. Br. II. t. 8. 2. ex

Cayenna, Bras.

367. **Elaenia**, Sundev. (*Paroides, Less.* - *Muscicapara, Laf.*) America. 10.

1. **PLATYRHYNCHUS brevirostris**, Spix. (*Elaenia brevi-*

rostris, Sundev. - *Tityra brevirostris, Gr.*) *Av. Bras.*

t. 15. 2. ex Brasil.

2. **MUSCICAPA pagana**, Licht. (*Elania pagana, Sundev.*

Platyrhynchus paganus, Spix.) *Av. Bras. t. 16. 1. ex*

Bahia.

3. **MUSCIPETA modesta**, Wied. (*Elania modesta, Sundev.*

Tityra modesta, Gr.) *Beitr. III. p. 820. ex Bras.*

4. **MUSCICAPA aurifrons**, Wied. (*Elania aurifrons, Sund.*)

Beitr. III. p. 820. ex Bras.

5. **MUSCICAPA virescens**, Temm. (*Elania virescens, Gr.*)

Pl. col. 275. 3. ex Brasil.

Febr. 1850.

24*

6. *PACHYRHYNCHUS albescens*, Gould. (*Tityra albescens*,
Gr. - *Pachyramphus albescens*, *Darw.*) *Voy. Beagle*,
B. t. 14. ex Buenos Ayres.
7. *E. cottae*, Gosse, *Ann. N. H.* 1849. p. 257. - *Ill. B. of*
Jamaic. t. 45. ex Antill.
8. *E. helviventris*, Cab. (*Elania helviventris*, Gr.) *Orn.*
Notiz. II. p. 35. ex Bolivia.
9. *MUSCICAPA obsoleta*, Natter. (*Tyrannulus obsoletus*,
Temm. - *Elania obsoleta*, *Hartl.*) *Pl. col. 275. 1. ex Bras.*
10. *Elaenia leucophrys*, Caban. *Orn. Not. p. 250. sp. 1.*
ex Venezuela.
*Quid Muse. leucophrys, Orb. (*Elania leucophrys*, Gr.) *Syn. Av. p. 53?**

368. *Hirundinea*, Orb. (*Muscivora*, p. Gr.) America m. 1.

TODUS ferrugineus, Gm. (*Tyrannus hellicosus*, Vieill.
ex Azara 189. - Platyrhynchus hirundinaceus, Spix. - ru-
pestris, Wied. - *Hirundinea ferruginea*, Orb. et Lafr.
1838. - *Muscivora rupestris* et *Platyrhynchus ferrugi-
neus*, Gr. - *Myiarchus ferrugineus*, Caban. - *Hirundi-
nea hellicosa*, Orb.) *Av. Bras. t. 13. ex Br. m. Parag.*

369. *Leptopogon*, Caban. (*Elaenia*, p. Sunder.) America mer. 10.

1. *L. superciliaris*, Cab. - Tschudi, *Faun. Per. t. 10. 2.*
ex Amer. mer. occ.
2. *L. amaurocephalus*, Caban. - Tschudi, *Faun. Per.*
p. 162. ex Brasil.
3. *MUSCICAPA ventralis*, Natter. (*Elania ventralis*, Gr.)
Pl. col. 275. 2. ex Brasil.
4. *MUSCICAPARA bivittata*, Lafr. (*Elania bivittata*, Gr.)
Syn. Av. p. 324. sp. 235. ex Bolivia.
5. *MUSCICAPARA angustirostris*, Lafr. (*Elania angusti-
rostris*, Gr.) *Syn. Av. p. 325. sp. 237. ex Bolivia.*
6. *MUSCICAPARA gaimardi*, Orb. (*Muscicapa albicilla*?
Vieill. - *Elania albicilla*, Gr.) *Syn. Av. p. 326. sp. 238.*
ex Bolivia.
7. *MUSCICAPARA stramineiventris*, Orb. (*Elania strami-
neiventris*, Gr.) *Synops. Av. p. 327. sp. 241. ex Boliv.*
9. *MUSCICAPARA olivacea*, Lafr. (*Muscicapara boliviiana*,
Orb. - *Elania olivacea*, Gr.) *Syn. Av. p. 328. sp. 244.*
ex Bolivia.

9. **ELAENIA modesta**, Tschudi, Faun. Per. p. 24. nec Sund.
 10. **ELAENIA viridiflava**, Tschudi, Faun. Peruan. t. 9. 2.
Quid Musc. obscura, Vieill. (Elania obscura, Gr.) N. Dict. xxl. p. 451?
Quid Musc. punctata, Vicill. (Elania punctata, Gr.) Azara 1842?
370. **Mionectes**, Caban. (Elaenia, p. Sundev.) America mer. 6.
1. **MUSCICAPARA striaticollis**, Lafr. nec Caban. (Mionectes poliocephalus, Tschud. nec Orb. - Elania striaticollis et poliocephala, Gr.) Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 35. 2. Faun. Per. p. 148. t. 10. 1. ex Amer. mer. occ.
 2. **TYRANNUS rufiventris**, Lafr. (Myiarchus rufiventris, Tschudi. - Mionectes rufiventris, Caban.) Orb. Voy. Am. m. t. 32. 3. 4. ex Peru.
 3. **MUSCICAPA oleaginea**, Licht. (Muscipeta chloronota? Less. Mionectes oleaginus, Cab.) Dubl. Mus. Berl. sp. 565. ex Brazil.
 4. **MUSCICAPA luteocephala**, Less. (Elania luteocephala, Gr.) Lafr. Mag. Zool. 1833. Ois. t. 13. ex Bras.
 5. **ELANIA viridis**, Lafr. Mag. Zool. 1833. ex Bras.
 6. **ELANIA rufo-olivacea**, Lafr. Mag. Zool. 1833. ex Br.
371. **Cyclorrhynchus**, Sundev. (Platyrhynchus, p. Gr.) America mer. 4.
1. **Todus olivaceus**, Licht. (Platyrhynchus sulphurescens, Spix. - Pl. olivaceus, Temm.) Pl. col. 12. 1. - Av. Bras. II. t. 12. 2. faem. ex Brasil.
 2. **Cyclorrhynchus brevirostris**, Caban. (Elania brevirostris, Tschudi, nec Sund. - Platyrhynchus brevirostris, Gr.) Orn. Not. p. 249. sp. 2. ex Mexico.
 3. **PLATYRHYNCHUS sulphurescens** mas, Spix (Cychlorhynchus sulphurescens, Caban.) Av. Bras. II. t. 12. 1. ex Brasil.
 4. **PLATYRHYNCHUS flaviventer**, Spix. (Tyrannula modesta? Sw. - Myiobius flaviventer, Gr. - Cycl. flaviventer, Caban.) Av. Bras. II. t. 15. 1. - B. of Br. t. 48. ex Bras.
372. **Myiobius**, Gr. 1840. (Tyrannula, p. Sw.) America m. 5.
1. **MUSCICAPA barbata**, Gm. (Platyrhynchus xanthopygus, Spix) - Pl. enl. 830. 1. 2. - Av. Bras. t. 9. 2. - Sw. Zool. Ill. t. 116. ex Cayenna.
 2. **MUSCICAPA erythrura**, Licht. (Myiobius erythrurus, Caban.) Wieg. Arch. 1847. t. 5. 1. ex Guian. Cayenn.

3. **MUSCICAPA fuliginosa**, Gm. (fusca, Bodd. nec Auct.
Myiobius fuscus, Gr.) *Pl. enl.* 574. 1. *ex Cayenna.*
4. **MUSCIPETA fuscata**, Wied. (Myiobius fuscatus, Gr.)
Beitr. N. Bras. III. p. 902. sp. 4. *ex Brasil. sept.*
5. **MUSCICAPA agilis**, Gm. (oliva, Bodd. - Myiobius olivus,
Gr.) *Pl. enl.* 574. 2. *ex Cayenna.*

*373. **Myiarchus**, Bp. *ex Caban.* (Myiobius p. Gr.) Rostrum minimum, parce depresso: pedes graciles, debiles, digito postico caeteris longiore: alas breves; remigum prima decima ipsa breviora; secunda tertiam omnium longissimum subaequante; caeteris gradatim decrescentibus: cauda elongata, angusta, potius rotundata quam emarginata. America mer. 2.

1. **TYRANNULA sclerophagoidea**, Bp. *Act. Ital. Ann. sext.*
Mediol. p. 405. sp. 30. *ex S.t.a Fe de Bogota.* Fusco-olivaceo: subtus flavida, gula alba: alis caudaque fuscis; tectricibus alarum et remigibus tertiaris marginibus late spurco-albis fascias binas alares constituentibus.
2. **TYRANNULA divisoricata**, Bp. (*Pyrocephalus divisoricus*, Gr.) *Proc. Zool. Soc.* 1837. p. 112. *ex Mexico.* Cris-tata: alis acuminatis: cauda divisoricata! An hujus generis?

374. **Pyrocephalus**, Gould. 1840. (Myiarchus, p. *Caban.* 1844) America mer. 6.

1. **MUSCICAPA coronata**, Gm. (*Platyrhynchus coronatus*, Vieill. *ex Azara* 177. - *Tyrannula coronata*, Sw. - *Myiarchus coronatus*, Cab. - *Pyrocephalus rubineus*, Gr. *ex Bodd.* - *P. parvirostris*, Gould.) *Pl. enl.* 675. 1. - *Nat. Misc.* t. 569. - *Voy. Beagle*, t. 6. *ex Parag. Guiana.*
2. **P. nanus**, Gould, *Beagl.* t. 7. m. etf. *ex Ins. Galapag.*
3. **TYRANNULA circumcincta**, Sw. (*Pyrocephalus circumcinctus*, Gr.) *B. of Brasil.* t. 50. *ex Brasil.*
4. **P. validus**, Caban. *Orn. Not.* II. p. 351. *ex Brasil.*
5. **PYROCEPHALUS obscurus**, Gould. (*atropurpureus*, Lichet. *Myiobius atropurpureus*, Tschudi - *Myiarchus obscurus*, Caban.) *Voy. Beagle*, p. 45. *ex Peru.*
6. **MUSCICAPA virgata**, L. (*flammeiceps*, Temm. - *Myiarchus virgatus*, Caban.) *Pl. col.* 144. 3. *ex Brasil.*
Quid Musc. cinnamomea, Gm. (*Pyrocephalus cinnamomeus*, Gr.) *Lath. Syn.* II. I. p. 354. sp. 56. *ex Cayenna?*

375. **Tyrannula**, Sw. 1827. (Myiobius, p. Gr. 1840. - Myiarchus,
p. Caban. 1849.) America. 40.

a. Ultimi Tyrannorum sive Tyrannularum primae!

1. **MUSCICAPA crinita**, L. (ludoviciana, Gm.) Pl. enl. 569. l.

Ois. Am. s. t. 45. - Wils. Am. Orn. t. 13. 2. - Audub.
Amer. t. 129. ex Amer. sept.

2. **TYRANNUS irritabilis**, Vieill. ex Azara 195. (T. crinitus, Hartl.) ex Amer. mer. Parag.

*3. **TYRANNUS CRINITUS**, Gosse. (**Tyrannula gossii**, Bp.)
Jamaic. p. 186. ex Antill.

4. **MUSCICAPA cooperi**, Nuttal. (Tyrannus borealis, Sw.)
Faun. Bor. Am. II. t. 35. - Aud. Amer. t. 174. ex Am. s.

b. Tyrannulae verae Americanae septentrionales.

5. **T. nigricans**, Sw. (Myiobius nigricans, Gr.) Aud.
Am. t. 415. ex Mexico, Amer. sept. occ.

6. **MUSCICAPA say'a**, Bp. (Tyrannula pallida? Sw. - T. Myiobius, Gr. - Tyrannula say'a, Bp. - Ochthoeca!!! say'a, Cab.)
Am. Orn. t. 2. 3. - Faun. Bor. Am. t. 45. - Aud. Am.
t. 359. 4. 5. ex occ. Amer. sept. Mexico.

7. **MUSCICAPA nunciola**, Wils. (fusca? Gm. nec Bodd. cui
gratos esse dubemus! - Myiarchus fusca, Cab. - Myiobius
nunciola, Gr.) Catesb. Carol. t. 53. - Vieill. Am. s. t. 40.
Am. Orn. t. 13. 4. - Aud. Am. t. 120. ex Amer. sept.

8. **MUSCICAPA atra**, Gm. (phoebe? Lath. - Tyrannus atriceps,
Lafr. - Tyrannula richardsoni, Sw. - Myiobius ater, Gr.)
Faun. Bor. Am. t. 46. fig. infera. ex Amer. sept.

9. **MUSCICAPA treillii**, Aud. (virens?) Amer. t. 45. ex Am. s.

10. **MUSCICAPA virens**, L. (rapax, Wils. - querula, Vieill.
neq; Wils. - Tyrannula obscura? Sw. nec Gm. - Myiarchus
virens, Caban.) Ois. Am. s. t. 39. - Am. Orn. t. 13. 5.
Aud. Am. t. 115. ex Amer. sept.

11. **MUSCICAPA acadica**, Gm. (querula, Wils. nec Vieill.
Platyrhynchus virescens, Vieill. - Myiobius acadicus,
Gr. - Tyrannula acadica, Sw.) Am. Orn. t. 13. 3. - Aud.
Am. t. 144. ex Amer. s. Rostrolatissimo.

12. **T. pusilla**, Sw. (Myiobius pusillus, Gr.) Faun. Bor.
Am. t. 46. fig. supera. ex Amer. sept. Penns.

13. **MUSCICAPA minutula**, Wils. (Tyrannula flaviventris,
Baird, - Muscicapa flaviventris, Aud. nec Steph.) B. of
Am. 2da edit. t. 490. ex Amer. sept.

14. **T. minima**, Baird. (*Muscicapa minima*, Aud. - *Myio-*
bius minimus, Gr.) *B. of Amer.* 2^{da} edit. t. 491. ex
Amer. sept. Missouri Region. rara in *Pennsylvania*.
15. **PLATYRHYNCHUS cinereus**, Spix. (*Myiarchus cinereus*,
Caban.) *Av. Bras.* II. t. 13. 2. ex *Bras. Peru*.
16. **MUSCICAPA ferox**, Gm. (*flaviventris*, Steph. nec Aud. - *Ty-*
rannula ferox, Sw. - *Myiarchus ferox*, Caban.) *Pl. enl.*
 571. L. ex *Cayenna*. *Similis Tyr. nuncioles Amer. s.*
sed major, et pectore magis cineracente.
17. **MUSCICAPA cayennensis**, L. (*flava*, Vieill.) *Pl. enl.*
 569. 2. - *Ois. Am. s. t. 41.* ex *Amer. m. Antill.*
18. **TYRANNUS tuberculifer**, Lafr. (*Myiobius tuberculifer*,
Gr. - *Myiarchus tuberculifer*, Caban.) *Orb. Voy.*
Am. m. Ois. t. 32. 1. 2. ex *Amer. mer. centr.*
- *19. **T. bogotensis**, Bp. Pr. Zool. Soc. 1837. sp.
 ex *Colombia*. *Simillima Tyr. virenti: rostro longiori,*
subtus albido (nec nigro): cauda minus emarginata: remigi-
bus latioribus (minus angustis); prima et tertia inter se ae-
qualibus; prima quinta non excedente.
20. **MUSCICAPA chrysocopeps**, Spix. (*Tyrannula ferruginea*,
Sw. - *Myiobius chrysocopeps*, Gr.) *Av. Bras.* t. 11. 2.
 B. of *Bras. t. 53.* ex *Bras. sept.*
21. **MUSCICAPA sibilans**, Licht. (*Tyrannus sibilator*, Vieill.
 ex *Azara* 191. - *Tyrannula curtipes*, Sw. - *T. sibilans*,
Hartl.) *B. of Bras. t. 14.* ex *Brasil.*
22. **T. superciliosa**, Sw. (*Muscicapa similis?* Spix.
M. miles? Licht. - *M. trivirgata?* Wied. - *Myiobius sumi-*
lis, Gr.) *Av. Bras. t. 25.* - *B. of Bras. t. 46.* ex *Bras. s.*
23. **MUSCICAPA martinica**, L. (*albicapilla?* Vieill.) *Pl.*
enl. 568. 1. - *Ois. Am. s. t. 377.* ex *Antillies.*
24. **TYRANNUS fumigatus**, Lafr. (*Myiobius fumigatus*, Gr.)
Orb. Syn. Av. p. 207. sp. 207. ex *Bolivia.*
25. **MUSCIPETA albiceps**, Lafr. et Orb. (*Myiobius albi-*
ceps, Gr.) *Syn. Av. p. 47.* ex *Peru.* *Major.*
26. **MUSCIPETA platyrhyncha**, Wied. (*Myiobius platy-*
rhynchus, Gr.) *Beitr. N. Bras.* III. p. 932. sp. 14. ex *Br.*
27. **TYRANNUS albicollis**, Vieill. ex *Azara* 186. (*legatus*,
Licht. - *Tyrannula albicollis*, Hartl.) *Dubl. Mus.*
Berl. p. 56. ex *Parag. Bolivia.*
28. **MUSCICAPA uropygia**, Wied. (*Myiobius uropygia-*
tus, Gr.) *Beitr. N. Bras.* III. p. 868. sp. 24. ex *Bras.*

29. **T. affinis**, Sw. (Myiobius affinis, Gr.) *Phil. Mag.* 1827.
t. 367. ex Bras.
30. **T. barbirostris**, Sw. (Myiobius barbirostris, Gr.)
Phil. Mag. 1827. p. 367. ex Brasil.
31. **T. megacephala**, Sw. (Myiobius megacephalus,
Gr.) *B. of Bras.* t. 47. ex Brasil.
32. **T. caniceps**, Sw. (Myiobius caniceps, Gr.) *B. of
Bras.* t. 49. ex Brasil.
33. **T. fumigata**, Boisson. (*boissonneauti*, Bp. - Myio-
bius species 39, Gr.) *Rev. Zool.* 1840. p. 71. *Mus. Lugd.*
ex S.ta Fe de Bogota.
34. **T. lateventer**, Less. (Myiobius lateventer, Gr.)
Rev. Zool. 1840. p. 354. ex Brasil.
35. **MYIOBIUS diademus**, Hartl. (Muscicapa fuscocapilla,
Lafr. - Myiobius diademus, Gr.) *Rev. Zool.* 1843. p. 289.
ex Nova Granada.
36. **MUSCICAPA CINNAMOMEA?** *Vieill.* nec Gm. (Muscipetra cinna-
momea hinc *vieilloti*, Lafr. - M. cinnamomeus et
vieilloti, Gr.) *Orb. Syn. Av.* p. 49. ex Bolivia.
37. **MYIOBIUS pyrrhopterus**, Hartl. *Rev. Zool.* 1843.
p. 289. ex Nova Granada.
38. **T. tschudii**, Hartl. (Muscicapavaria? *Vieill.* ex Azara
187. - Myiobius varius, Gr.) *Rev. Zool.* 1844. p. 369.
ex Bras. Bahia.
39. **MYIOBIUS pallidus**, Gosse, Ill. B. *Jamaica*, p. 166.
t. 40. ex Antill.
40. **MYIOBIUS tristis**, Gosse, Ill. B. *Jamaica*, p. 167. t. 41.
ex Antill.
- Quid species Grayanae: Myiobius spalicens, minutus, superci-
liosus, ex Gmel? - M. ruficaudatus, auricularis, leucophaeus,
melanops, rivularis, ex Vieill? - M. turdinus, virescens, chry-
sochloris, brevipes, asilus, strigilatus, ex Wied?
376. **Milvulus**, Sw. 1827. (Muscipipra, Less. 1831.) America. 6.
1. **MUSCICAPA tyrannus**, L. (Tyrannus savana, Vieill.) *Pl.
enl.* 571. 1. - *Vieill. Am. s. t. 43.* - *Bp. Am. Orn.* t. 1. 1.
Audub. Am. t. 168. ex Amer. etiam sept.
2. **TYRANNUS violentus**, ex Azara 190, adult. et *Muscicapa
phaenoleuca* ex Azara 192. jun. *Vieill.* (Milvulus nuncio-
lus? Steph. - Milvulus violentus, Bp. 1827.) *Orb. Ois.*
p. 310. ex Brasil. mer. Parag.
3. **TYRANNUS bellulus**, Vieill. (Milvulus bellulus, Gr.)
N. Dict. H. Nat. xxxv. p. 75. ex Amer. m.

4. *Milvulus monachus*, Hartl. (Milvulus phaeonoleucus? Gr.) Rev. Zool. 1844. p. 214. ex *Guatimala*.
5. **MUSCICAPA forficata**, Gm. (Milvulus forficatus, Sw. Tyrannus forficatus, Vieill.) Pl. enl. 677. - *Bp. Am. Orn.* t. 2. 1. - *Aud. Amer.* t. 159. 3. ex *Mexico*, Amer. s.
6. **MUSCICAPA vetula**, Olfers. (pullata, Bp. 1827. - Tyrannus longipennis, Sw. - T. vetulus, Selb. - Milvulus vetulus, Hartl.) *Spix. Av. Bras.* t. 18. - *Jard. et Selb. Ill. Orn.* t. 42. ex *Brazil*.
377. **Tyrannus**, Lacèp. p. 1799. (Drymonax, Gloger. 1827.) America. 14.
1. **T. melancholicus**, Vieill. ex *Asara* 198. (eruditus, Sw. - Muscicapa despotes, Licht. - furcata, Spix.) *Av. Bras.* II. t. 19. ex *Brazil. Parag.*
1. **MUSCICAPA TYRANNUS**, Br. nec L. (**Tyrrannus interpidus** et pipiri, Vieill. - Muscicapa animosa, Licht.) Pl. enl. 676. - *Ois. Am. s. t. 44.* - *Wils. Am. Orn.* t. 13. 1. - *Aud. Am.* t. 79. ex *Amer. sept.*
2. **LANUS TYRANNUS**, L. (leucogaster? Steph. - **Tyrrannus matutinus**, Vieill.) Pl. enl. 537. - *La Sagra, Voy. Cuba, Ois. t. 14.* ex *Antill.*
3. **T. griseus**, Vieill. (dominicensis, Br.) *Ois. Am. s.t. 46.* *Aud. Am. t. 170.* ex *Antill.*
4. **T. dominicensis**, Gosse, Jamaic. p. 169. nec Briss. ex *Antill.*
4. **MUSCICAPA verticalis**, Say. (Tyrannus verticalis, Bp. vociferans, Sw.) *Am. Orn.* t. 2. 2. - *Aud. Am.* t. 359. 1. 2. ex *occid. Amer. s. Mexico*.
5. **T. cinereus**, Vig. Zool. Beach. *Voy. p. 17.* ex *Am. occ.*
6. **T. caudifasciatus**, Orb. *Voy. Cuba, t. 12.* - *Gosse, Ill. Jam. t. 44.* ex *Antill.*
7. **T. magnirostris**, Orb. *Voy. Cuba, t. 13.* ex *Antill.*
8. **T. crassirostris**, Sw. *Quart. Journ. Sc.* 1826. p. 273. ex *Brazil.*
11. **MUSCICAPA rustica**, Licht. (cinerascens, Spix. - Tyrannus calcaratus, Sic. - T. rusticus, Wied.) *Jard. et Selb. Ill. Orn.* t. 37. ex *Brazil.*
12. **T. vorax**, Vieill. *Nouv. Dict. H. Nat.* XXXV. p. 90. ex *Amer. mer.*
14. **T. aurantio-atro cristatus!** Orb. et Laf. *Syn. Av. p. 45.* ex *Amer. m.*
Quid *T. americanus*, Gr. (Lanius americanus, Lath.) Pl. enl. 307?

378. **Saurophagus**, Sw. 1831. (Pitangus, Sw. - Apolites, Sund.) Amer. trop. 3.

1. **Lanius sulphuratus**, Gm. (Tyrannus sulphuratus, Vieill. ex Azara 200. - Muscicapa pitangua, Wied.) Pl. enl. 296. - Ois. Am. s. t. 47. ex Amer. mer.
2. **Lanius flavus**, Gm. (Corvus leucogaster, Bodd. - Saurophagus flavus, Gr.) Pl. enl. 249. ex Bras. s. m.
3. **Lanius lictor**, Licht. (Saurophagus pusillus, Sw. - S. swainsonii, Gould. - S. lictor, Gr. & Gr. et Mitch. Gen. B. t. 62. ex Bras. s. Para. Similis Saur. sulphurato, sed valde minor (long. rix 7-poll.); et resto elongata, gracili.

379. **Scaphorhynchus**, Wied. (Megastoma, Sw. - Tyrannus, p. Vieill.) Amer. m. trop. 5.

1. **Lanius pitangua**, L. (Tyrannus brasiliensis, Briss. carnivorus, Vieill. ex Azara 197. - Scaphorhynchus sulphuratus! Wied. - Megastoma ruficeps, Sw.) Pl. col. 212. ex Brasil.
2. **Megastoma flavigeeps**, Sw. Tico Cent. p. 285. ex Bras.
3. **Megastoma atriceps**, Sw. Tico Cent. p. 285. ex Bras.
4. **Muscicapa audax**, Gm. (Tyrannus solitarius, Vieill. ex Azara 196. - Scaphorhynchus audax, Caban.) Pl. enl. 453. 2. ex Bolivia, Bras. mer. Parag.
5. **Scaphorhynchus chrysocephalus**, Tschudi, Faun. Peruan. p. 23. t. 8. 1. ex Amer. mer. occ.
Quid Tyrannus bairdi, Gambel, Journ. Acad. Phil. t. p. 40?

SUBFAM. 65. TAENIOPTERINAE.

380. **Machetornis**, Gr. 1841. (Chrysolophus, Sw. 1837.) America trop. 1.

TYRANNUS rixosus, Vieill. ex Azara 197. - ambulans, Sw.
Musc. joazeiro, Spix. - Pepoaza rixosa, Orb. - Machetornis rixosa, Gr.) Av. Bras. t. 23. ex Bras. m. Parag.

381. **Gubernetes**, Such.

TYRANNUS yetapa, Vieill. (Muscicapa yeperu, Licht. - longicauda, Spix. - Gubernetes cunninghami, Such. - formicatus, Sw.) Av. Bras. t. 27. - Zool. Journ. II. t. 4. Nat. Libr. x. Flycatch. t. 5. ex Brasil.

America m. 1.

382. *Copurus*, Strickl. 1841. America m. 2.

1. *MUSCICAPA filicauda*, Spix. (colonus, Vieill. ex Azara.
colon, Steph. - monacha, Licht. - Muscipeta leuconilla, Hahn. - Platyrhynchus platurus, Vieill. - Copurus monacha, Caban. - C. filicauda, Strikl.) Lath. Hist. v. t. 102. - Hahn, Vög. Am. figura. ex Bras. Parag.
2. *Copurus leuconotus*, Lafr. Rev. Zool. 1842. p. 335.
ex Bolivia.

383. *Alecturus*, Vieill. 1816. (Xenurus, Boie. - Yetapa! Less.) America mer. 2.

1. *Alecturus tricolor*, Vieill. ex Azara 225. (azarae,
Sw. - Muscipapa alector, Wied. - M. alectura et Gallita
tricolor, Vieill.) Gal. Ois. t. 132. - Pl. col. 155. 1. mas
2. faem. - Nat. Libr. Flyc. t. 6. - Hist. Parag. t. 23.
ex Parag.
2. *Alecturus guirayetapa*, Vieill. ex Azara 226.
(Muscicapa psalura, Temm. - risoria, Vieill. - Yetapa
psalura, Less.) Pl. col. 286. 296. - Gal. Ois. t. 131.
ex Bras. m. Parag.

384. *Arundinicola*, Lafr.

America m. 1.

MUSCICAPA leucocephala, Pall. (Muscicapa dominicana, Spix, nec Vieill. - Arundinicola leucocephala, Orb.)
Wied. Abh. Bras. fig. mala. - Lath. Syn. t. 29. - Azara
176. - Av. Bras. t. 29. 1. - Lev. Afr. t. 159. ex Bras.

385. *Lichenops*, Commers. (Ada, Less. 1831. - Perspicilla,
Siev. 1837.)

Chili. Patagon. 1.

MOTACILLA perspicillata, Gm. (Perspicilla leucoptera,
Sw. - Ada commersoni, Less. - Lichenops erythropterus,
Gould. - Muscipapa nigricans, Vieill. ex Azara
182. mas 228. faem. - Elania nigricans, Gr.) Nat. Libr.
Flyc. t. 9. - Voy. Beagle B. t. 9. faem. ex La Plata.

386. *Fluvicola*, Sw. 1827. (Entomophagus, Wied. 1831. - Suiriri, Orb.)

America mer. 7.

1. *MUSCICAPA climacura*, Vieill. (nengeta, Licht. - mystax, Spix. - mystaceus, Wied. - Platyrhynchus pseudogilla, Less. - Fluvicola cursoria, Sw.) Av. Bras. t. 31. 1. 2.
Zool. Ill. n. s. t. 47. ex Brasil.
2. *Fluvicola nigerrima*, Lafr. (Ada nigerrima, Orb.)
Syn. Av. p. 340. sp. 290. ex Bolivia.

3. **MUSCICAPA bicolor**, Gm. (albiventer, *Spix.* - *Fluvicola bicolor*, *Sw.* - Fl. pica, *Gr. ex Bodda.*) *Pl. enl. 675. 1.*
566. 3. - Edw. B. t. 348. 1. - Azara 175. - Av. Bras.
t. 30. 1. 2. ex Brasil.
4. **Fluvicola leucophrys**, Lafr. *Orb. Voy. Am. m.*
t. 38. 1. ex Bolivia.
5. **Fluvicola rufipectoralis**, Lafr. *Orb. Voy. Am.*
m. t. 37. 2. ex Bolivia.
6. **MUSCICAPA suiriri**, Vieill. (Suiriri suiriri, *Orb.* - *Elania suiriri*, *Gr.* - *Fluvicola suiriri*, *Hartl.*) *Azara 179. ex Parag. Bolivia.*
7. **MUSCICAPA icterophrys**, Vieill. (Suiriri icterophrys, *Orb.* 1837. - *Elania icterophrys*, *Gr.* - *Fluvicola icterophrys*, *Hartl.* - *Myiobius icterophrys*, *Gr.* - *Tyrannus cinchoneti*, *Tschudi*) *Fn. Per. t. 8. 2. - Ann. Hist. Nat. XIII. t. 12. ex Bogota, Peru.*
387. **Ochthaeeca**, Caban. 1847. p. (Fluvicola, p. *Gr.*) America occ. 1.
FLUVICOLA oenantheoides, Lafr. (*Ochthoeeca oenantheoides*, Caban.) *Orb. Voy. Am. m. t. 38. 2. ex Columbia.*
388. **Cnipolegus**, Boie, 1820. (*Hirundinea*, Lafr. - Blechro-
pus, p. *Sw.* - *Fluvicola*, p. *Gr.*) Americamer. 2.
1. **MUSCICAPA comata**, Licht. (*Muscicapa lophotes*, Temm.
galeata, *Spix. nee Licht.* - *nigerrima?* Vieill. - *rufogularis*, *Less.* - *Blechropus cristatus*, *Sw.* - *Fluvicola comata*, *Gr.*) *Av. Bras. t. 27. adult. et 28. 1. jun? - Nat. Libr. Flyc. t. 7. ex Brasil.*
2. **MUSCICAPA cyanirostris et ruficapilla**, Vieill. (*analis*, *Licht.* - *Ada cyanirostris*, *Orb.* - *Fluvicola cyanirostris*, *Hartl.* - *Cnipolegus cyanirostris*, *Boie.*) *Azara 181. mas. 178. faem. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 61. ex Parag.*
389. **Taenioptera**, Bp. 1826. (*Xolmis*, *Boie.* 1828. - *Nengetus*, *Sic.* 1827. - *Orsipus hinc* *Blechropus*, *Sic.* 1837.) America mer. 3.
1. **Lanius mengeata**, L. (*Tyrannus cinereus et pepoza ex Azara 201.* Vieill. - *Muscicapa polyglotta*, *Spix.* - *taenioptera*, *Bp.* 1824.) *Edw. B. t. 318? - Av. Bras. t. 24. Nat. Libr. x. Flyc. t. 8. ex Bras. Parag. Bolivia.*
2. **TYRANNUS coronatus**, Vieill. (*Muscicapa vittigera*, *Licht.* jun. - *Pepoza coronata*, *Orb.* - *Taenioptera coronata*, *Gr.*) *Azara 202. ex Parag.* *

3. **MUSCICAPA dominicana**, Vieill. (Pepoaza dominicana,
Orb. - Fluvicola azarae, Gould, ex Azara 203. - Flavic.
dominicana, Gr.) *Voy. Beagle, Birds*, p. 53. t. 10. ex
Bras. Parag.
4. **TYRANNUS irupero**, Vieill. ex Azara 204. (Muscicapa
moesta, Licht. - M. nivea, Spix. - Pepoaza irupero, Orb.
Taenioptera nivea et T. irupero, Gr.) *Av. Bras. t. 29. 1.*
Darwin Birds, p. 53. ex *Bras. m. Parag. Bolivia*.
5. **PEPOAZA variegata**, Laf. (Taenioptera variegata, Gr.)
Orb. *Voy. Am. m. Ois. t. 39. 2.* - *Voy. of Beagle, Birds*,
t. 11. ex *Patagon.*
6. **MUSCICAPA pyrope**, Kittl. (Pepoaza pyrope, Laf. - Taenioptera pyrope, Gr.) *Vög. von Chili. t. 10. ex Ch. Pat.*
7. **MUSCICAPA velata**, Licht. (Taenioptera velata, Gr.) *Spix, Av. Bras. t. 22. ex Brasil. Parag. Bolivia.*
8. **PEPOAZA murina**, Laf. (Taenioptera murina, Gr.) *Orb. Syn. Av. p. 348. sp. 273. ex Bolivia.*
9. **TYRANNUS atricapillus**, Vieill. ex Azara 206. (Taenioptera atricapilla, Gr.) *Enc. Meth. p. 856. ex Bras. mer. Parag.*

390. **Centrites**, Cab. n. 1847. (Centrophanes, Cab. 1845. - Lessonia, Sw. nec Auct. - Alauda, p. Gm.) America mer. 1.

ALAUDA rufa, Gm. sp. 7. (fulva, Lath. - nigra, Bodd. - Sylvia dorsalis, King. - Anthus fulvus, Orb. - sordidus, Less. erythronotus, Morr. ex Azara 149. - variegatus, Gerv. Lessonia nigra, Gr. - L. erythronota, Sw. - Muscisaxicola nigra, Gould. - Centrites rufus, Cab.) *Plenl. 738. 2. mas. Mag. Zool. 1836. Ois. t. 67. faem. ex Par. Chili, Pat.*

391. **Ochthites**, Cab. n. (Muscigralla, Laf.) America m. 1.
MUSCIGRALLA brevicauda, Orb. *Voy. Am. m. t. 39. 1.*
ex Peru.

392. **Ptyonura**, Gould. (Muscisaxicola? Laf.) America m. 7.
1. **P. albifrons**, Tschudi, *Faun. Peruan.* p. 25. ex Peru.
2. **MUSCISAXICOLA rufivertex**, Orb. (Ptyonura rufivertex, Tsch.) *Voy. Am. m. t. 40. 2. ex Bolivia.*
3. **MUSCISAXICOLA mentalis**, Laf. (Ptyonura mentalis, Cab. - Orb. *Voy. Am. m. t. 41. 1. ex Peru, Boliv. Patag.*
4. **MUSCISAXICOLA maculirostris**, Laf. - Orb. *Voy. Am. m. t. 41. 2. ex Bolivia.*

5. *MUSCISAXICOLA striaticeps*, Laf. - *Orb. Voy. Am.*
m. t. 41. 1. ex *Bolivia*.
 6. *SYLVIA macloviana*, Garn. (*Currucia macloviana*, Less.
Muscisaxicola macloviana, Gr.) *Voy. Coq. Zool.* 1. p. 663.
ex *Ins. Falkland*.
 7. *MUSCISAXICOLA brunneata*, Gould, *Voy. of Beagle*, B. p. 84.
ex *Patagonia*.
303. **Agrionis**, Gould. 1838. (*Thamnolanius*? p. *Less.* 1839.
Dasycephala? p. *Gr.*) America mer. 4.
 1. *THAMNOPHILUS lividus*, Kittl. (*Tyraurus gutturalis*, Gerv.
nec Laf. - *Agrionis livida*, Cab. - *A. gutturalis*, Gould.)
Mem. Acad. Petersb. 1835. p. 465. - *Mag. Zool.* 1836.
Ois. t. 63. ex *Chili*.
 2. *A. striatus*, Gould. (*Tyrannus gutturalis* var. *Gerv.*)
Voy. Beagle Zool. p. 56. ex *Patagon.*
 3. *A. micropterus*, Gould, *Beagle Zool.* p. 57. t. 12.
ex *Patagon.*
 4. *PEPOAZA maritima*, Laf. (*Agriornis leucurus*, Gould.
A. maritimus, Gr.) *Zool. Beagle t. 13.* ex *Chil. Bol.*

FAMILIA 32. MYIOTHERIDAE.

SUBFAM. 66. TAMNOPHILINAE.

304. **Cymbilaimus**, Gr. (*Tamnophilus*, p. *Gr.*) America mer. 1.
LANIUS lineatus, Leach. (*Tamnophilus lineatus*, *Gr.*)
Zool. Misc. t. 6.
305. **Thamnophilus**, Vieill. (*Batara*, *Less.*) America mer. 30.
 1. *LANIUS dollatus*, L. (*ferrugineus*, *Act. Paris.* - *rufi-*
nosus, *Lath.* - *Tamnophilus radiatus*, *Vieill.* ex *Azara* 212.
radiosus, *Spix.* *Pl. enl.* 297. 2. - *Edw. B.* t. 226. - *Av.*
Bras. t. 35. 2. et 38. 1. - *Levaill. Afr.* t. 77. 2. ex
Brasil. Parag. Bolivia.
 2. *LANIUS palliatus*, Licht. (*vestitus*, *Cuv.* - *Thamnophi-*
lus lineatus, *Spix.* - *badius*, *Sw.*) *Av. Bras. t. 33. 1. 2.*
B. of Brazil. t. 65. 66. ex *Bras.*
 3. *T. undulatus*, Mikan. (*striatus*, *Quoy et Gaim.* - *vi-*
gorsei, *Schuch.* - *cineraceus et rufus*, *Vieill.* - *gigas*, *Sw.*)
Delic. Flora et Faun. Brasil. fig. - *Voy. Uran. t. 18. 19.*
Zool. Journ. Suppl. pl. 7. ex *Bras.*
 4. *LANIUS meleagris*, Licht. (*Thamnophilus guttatus*,
Spix. - *maculatus*, *Schuch.*) *Av. Br. t. 35. 1.* - *Zool. Journ.*
Suppl. pl. 6. ex *Bras.*

5. **T. teachi**, Such. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 41. ex Bras.
6. **T. major**, Vieill. ex Azara 211. (albiventer, Spix. - Lanius stagurus, Licht.) Av. Bras. t. 32. 1. mas 2. faem. ex Brasil. Parag. Bolivia.
7. **Lanius luctuosus**, Licht. (Thamnophilus othello, Less. T. luctuosus, Gr.) Cent. Zool. t. 19. ex Brasil.
8. **Lanius naevius**, L. (punctatus, Shaw - Thamnophilus caeruleolens et auratus, Vieill. ex Azara 213. mas et 214. faem. - Lev. Afr. t. 77. - Leach, Zool. Misc. t. 17. - Sw. Orn. Draw. B. of Braz. t. 59. ex Bras. Parag. Bol.
9. **T. maculatus**, Laf. - Orb. Voy. Am. m. IV. p. 172. ex Rep. Argentina, Corrientes.
10. **T. aspersicenter**, Laf. - Orb. Voy. Am. m. t. 4. 1. mas 2. faem. (sub nomine T. schistacei) ex Bolivia.
11. **T. schistaceus**, Laf. (err. fuliginosus) Orb. Voy. Am. m. t. 5. 1. ex Bolivia, Peru.
- Quid Lanius canadensis, L. Pl. enl. 479. 2. - Quid Briss. Orn. n. t. 39. 4. et Vieill. Ois. Am. s. t. 49? spec. Thamn. 34. et 35 Grayi?
- Quid Lanius ruber, et L. niger, Gm. spec. Thamn. 47. et 50 Grayi?
- Quid Lanius pileatus, Lath. (Th. pileatus, Gr. sp. 15. nec Sw.), cristatus et aurantius, Lath. sp. 15. 32. 49. Grayi?
- Quid Th. fasciatus, cinnamomeus, bicolor, ambiguus, pileatus, ferrugineus, pectoralis, Swains. species 3. 4. 5. 13. 14. 18. 27. Gr?
- Quid Th. ruficeps, Such. Gr. 17. - T. obscurus, Leach, Zool. Misc. t. 21. Gr. 51. - Th. scapularis et nigricans, Wied. sp. 52. 53. Grayi?
- Quid Th. cristatellus, virescens, ruficapillus, cyanocephalus, rubicus, lineatus (non Gr.), guttatus, longicaudatus, chloropterus, viridis, Dict. viridis, Encycl. varius (ex Gm.), Vieill. species 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. et 48. Grayi?
- Quid Th. fuliginosus, Gould 1837. nec Orb. species Grayi 23?
- Quid Th. palliatus, Less. nec Gr? - capistratus, Less. sp. 25. 26. Grayi?
- Quid Th. atropileus, albicans, multistriatus, brevirostris, Lafresn. species 20. 28. 29. 30. Grayi?
- Quid Th. luctuosus, Tschudi, nec Licht. species 31. Grayi?
396. **Dasycephala**, Sw. 1831. vix Gr. (Taminolanius, p. Less.) Amer. trop. 5.
1. **MUSCICAPA cinerea**, Gm. (Tyrannus cinereus, Sw. - rufescens, Orb. faem. - Dasycephala cinerea, Sw.) Spix, Av. Bras. II. t. 26. 2. ex Bras.
 2. **Dasycephala uropygialis**, Caban. ex Schomb. Orn. Not. I. p. 222. ex Guyana.
 3. **MUSCICAPA thamnophiloides**, Spix. (Tyrannus rufescens, Sw. - rufus, Laf. - thamnophiloides, Orb. - Muscicapa rubra et Thamnophilus rutilus? Vieill. ex Azara 218. et 188. nec 217. - Dasycephala thamnophiloides, Gr.) Av. Bras. II. t. 26. 1. ex Brasil. Paraguay.

4. **MUSCICAPA THAMNOPHILOIDES**, Nordm. nec Spix. (**haematoches**, Licht. - *Dasycephala haematodes*, Cabanis) Amer. mer. 4.
5. **TYRANNUS rufiventris**, Vieill. ex Azara 205. nec Orb. (*Tamnolanius ferrugineus*, Less. - *Dasycephala ferruginea*, Harl.) Rev. Zool. 1839. p. 138. ex Bras. m. Parag.
397. **Dysithamus**, Caban. 1847. (*Tamnophilus*, p. Gr.) Amer. mer. 4.
1. **LANIUS guttulatus**, Licht. 1823. (*Myiothera striatothorax*, Temm. - *Tamnophilus striatothorax*, Wied.) Pl. col. 179. 2. mas 1. faem. ex Brasil.
 2. **MYIOTHERA mentalis**, Temm. (*poliocephala*, Wied. *Tamnophilus mentalis*, Orb.) Pl. col. 173. 3. mas. ex Peru, Bolivia.
 3. **THAMNOPHILUS olivaceus**, Tschudi, 1844. (*Dysithamus olivaceus*, Caban.) Faun. Peruan. p. 174. ex Amer. mer. occ.
 4. **THAMNOPHILUS stellaris**, Spix. (*Myiothera plumbea*, Wied. - *Dysithamus stellaris*, Caban.) Av. Bras. II. t. 36. 2. ex Brasil.
398. **Herpsilochmus**, Caban. 1847. (*Formicivora*, p. Ménétr.) Amer. mer. 3.
1. **MYIOTHERA pileata**, Licht. (*Formicivora pileata*, Ménétr. *Herpsilochmus pileatus*, Caban.) Orn. Not. 1. p. 224. sp. 1. ex Brasil. Bolivia.
 2. **MYIOTHERA rufomarginata**, Temm. (*Myiothera variegata*, Licht. - *scapularis*, Wied. - *Formicivora rufomarginata*, Ménétr.) Pl. col. 132. 1. mas. 2. faem. ex Brasil.
 3. **THAMNOPHILUS axillaris**, Tschudi (*Herpsilochmus axillaris*, Caban.) Faun. Peruan. p. 174. ex Amer. m. occ.
399. **Formicivora**, Sw. 1824. (*Eriodora*, Gloger, 1827.) America mer. 8.
1. **MOTACILLA grisea**, Gm. (*Sylvia grisea*, Lath. - *Myrmothera leucophrys*, Vieill. *Myiothera superciliaris*, Licht. faem. - *leucophrys*, Wied. nec Licht. - *Tamnophilus griseus*, mas. Spix. - *Formicivora nigrigollis*, Sw. - *deluzei*, Ménétr. faem. - *leucophrys*, Gr. - *grisea*, Strickl.) Pl. enl. 643. l. - Av. Bras. II. t. 41. 1. mas. - Ménétr. Myoth. t. 5. 2. faem. ex Cayenna, Bras. sept.
 2. **THAMNOPHILUS rufater**, Laf. (*griseus*, faem. Spix. - *Myiothera superciliaris*, Wied. nec Licht. - *nigrigollis*, Ménétr. nec Sw. - *Formicivora rufatra*, Caban.) Av. Bras. t. 40. 1. ex Brasil. Bolivia.

3. **MYIOTHERA leucophrys**, Licht. nec Wied. (Formicivora intermedia, Caban.) *Orn. Not.* 1. p. 225. sp. 3. ex Columbia.
4. **MYIOTHERA axillaris**, Vieill. (Myiothera fuliginosa, Licht. ex Illig. - Tannophilus melanogaster, Spix. - Formicivora brevicauda, Sw. - Formicarius cirrhatus, Gr. Formicivora axillaris, Caban.) *Pl. enl.* 643. 2. - *Spix, Av. Bras.* t. 43. 1. ex Bras.
5. **MYIOTHERA menetriesi**, Orb. (Formicarius menetriesi, Gr. - Formicivora menetriesi, Caban.) *Voy. Amer. m. Ois.* p. 184. ex Bolivia.
6. **MYIOTHERA unicolor**, Ménétr. (Formicarius unicolor, Gr. - Formicivora unicolor, Caban.) *Mon. Myioth. tab. 2.* 1. ex Bras.
7. **MUSCICAPA pygmaea**, Gm. (Tannophilus minutus, Laf. Myrmothera minuta, Orb. - Formicivora pygmaea, Caban.) *Pl. enl.* 831. 2. ex Brasil. Cayenna.
8. **MYIOTHERA quadrivittata**, Licht. (Formicivora quadrivittata, Caban.) *Orn. Not.* 1. p. 227. sp. 8. ex Guiana.
400. **Rhopoterpe**, Caban. 1847. (*Urotomus*, Strickl. nec Sw. Myrmothera, Vieill. p. - Formicarius, p. Gr.) Amer. mer. 3.
1. **TURDUS formicivorus**, Gm. (Myiothera formicivora, Ill. - Myioturdus palikour, Ménétr. - Formicarius torquatus, Gr. - Rhopoterpe formicivora, Caban.) *Orn. Not.* 1. p. 228. sp. 1. ex Bolivia.
2. **TANNOPHILUS gularis**, Spix. (Myiothera cinerea, Wied. Myrmothera gularis, Ménétr. - Formicarius gularis, Gr. Rhopoterpe gularis, Caban.) *Av. Brasil.* II. t. 41. 2. - *Mon. Myioth. t. 2.* 2. ex Brasil.
3. **MYIOTHERA guttata**, Vieill. (Formicarius guttatus, Gr. Rhopothera guttata, Caban.) *Gal. Ois. t.* 155. ex Bolivia.
401. **Ellipura**, Caban. 1847. (*Leptorhynchus?* Ménétr. p. Formicivora, p. Gr.) Amer. mer. 7.
1. **MYIOTHERA ferruginea**, Licht. (Formicivora ferruginea, Ménétr. - Drymophila variegata! Such. - Ellipura ferruginea, Caban.) *Pl. col.* 132. 3. ex Brasil.
2. **MYIOTHERA malura**, Natter. (Formicivora malura, Ménétr. nec Temm.) *Pl. col.* 353. 1. mas. 2. faem. ex Bras.
3. **TANNOPHILUS strictus**, Spix. (Formicivora malura faem. Ménétr. nec Temm.) *Av. Bras.* t. 40. 2? ex Bras.

4. **MYIOTHERA rufa**, Wied. (Formicivora rufa, Ménétr.) Mon.
Myoth. t. 9. 1. ex Brasil. sept. Bahia.
5. **MYIOTHERA squamata**, Licht. (Formicivora maculata, Sw.
Ellipura squamata, Caban.) Mon. *Myioth.* t. 5. 1. ex Br.
6. **MYRMOTHERA caerulescens**, Vieill. (F. caerulescens,
Ménétr.) Mon. *Myioth.* t. 6. 1. mas. 2. faem. ex Brasil.
7. **MYIOTHERA maculata**, Wied. (Leptorhynchus striolatus,
Ménétr. - Formicivora striolata, Gr. - *Ellipura maculata*, Caban.) Mon. *Myioth.* t. 10. 2. ex Brasil.
402. **Thamnomanes**, Caban. 1845. America m. 2.
1. **LANIUS caesius**, Licht. (Muscicapa caesia, Wied.) Pl.
col. 17. 1. 2. ex Brasil.
 2. **Thamnomanes glaucus**, Caban. *Orn. Not.* 1.
p. 23. sp. 2. ex Cayenna.
403. **Ramphocaenus**, Vieill. 1819. (Acontistes, Sund. 1836.
Scolopacinus, Bp. 1837.) Ad Troglodytinas accedit! America m. 4.
1. **Ramphocaenus melanurus**, Vieill. (Troglodytes rectirostris, Sw. - *gladiator*, Wied.) Gal. Ois. t. 128.
Sw. Zool. Ill. t. 140. ex Brasil.
 2. **SCOLOPACINUS rufiventris**, Bp. (*Ramphocaenus rufiventris*, Gr.) Pr. Zool. Soc. 1837. p. 119. - *Gr. et Mitch.*
Gen. B. t. 47. 2. ex Guatemala.
 3. **R. trinitatis**, Less. Rev. Zool. 1839. p. 42. ex Antill.
 4. **R. viridis**, Less. Tr. Orn. p. 377. sp. 2. ex Brasil.

SUBFAM. 63. MYIOTHERINAE.

404. **Drymophila**, Sw. 1824. nec Temm. (Myrmonax, Cab. 1847.
Myrmeciza, 1841. hinc Formicarius, p. Gr.) America m. 6.
1. **MYRMOTHERA longipes**, Vieill. (*Drymophila longipes*,
Sw. - *Formicarius longipes*, Gr. - *Myrmonax longipes*,
Caban.) Zool. Ill. 2. ser. t. 23. mas. ex Brasil.
 2. **MYIOTHERA loricata**, Licht. (*ruficauda*, Wied. faem.
Formicivora loricata, Ménétr. - *Drymophila leucopus*,
Sw. - *Myrmonax loricatus*, Caban.) Mém. Ac. Petersb.
t. 4. 1. mas. 2. faem. ex Brasil. sept. et mer.
 3. **TURDUS cinnamomeus**, Gm. (*Holocnemis cinnamomeus*, Strickl. - *Formicivora cinnamomea*, Gr. - *Myrmonax cinnamomeus*, Caban. - *Drymophila cinnamomea*, Bp.) Ann. Nat. Hist. 1844. p. 416, Fig. nulla. ex Br.

4. THAMNOPHILUS *myiotherinus*, mas, Spix. (Myiothera ardesiaca, Licht. - thamnophiloides, Voigt. - Formicivora ardesiaca et Myrmothena thamnophiloides, Ménétr. Formicarius thamnophiloides et Formicivora ardesiaca, Gr. - Myrmonax myiotherinus, Caban. - Drymophila myiotherina, Bp.) Av. Bras. II. t. 42. 1. ex Brasil.
5. THAMNOPHILUS *MYIOTHERINUS*, faem. Spix. (Lanius *lugubris*, Ill. - Myrmonax lugubris, Caban.) Av. Bras. t. 42. 2. ex Brasil.
6. MYRMONAX *leucophrys*, Caban. ex Schomb. Orn. Not. I. p. 211. sp. 6. ex Guiana.
405. Pyriglena, Caban. 1845. (Drymophila, p. Gr.) America m. 5.
1. LANIUS *domicella*, Licht. (Drymophila trifasciata, Sw. Myiothera domicella, Wied. - Formicivora domicella; Ménétr. - Myrmeciza melanura, Strickl. faem. - Myrmonax melanura, Caban.) Zool. Ill. 2. ser. t. 27. Ménétr. Fourm. t. 7. 1. mas 2. faem. ex Brasil. ssp. t.
 2. LANIUS *funebris*, Licht. (Pyriglena funebris, Caban.) Dubl. Mus. Berl. p. 47. ex Cayenna. Minor; subcristata.
 3. DRYMOPHILA *atra*, Sw. (Formicivora atra, Ménétr. - Pyriglena atra, Caban.) Zool. Journ. II. p. 153. ex Br. s.
 4. FORMICIVORA *maura*, Ménétr. (Pyriglena maura, Cab.) Monogr. Myioth. t. 7. a. plum. interse. ex Bras. mer.
 5. FORMICIVORA *atra*, Tschudi, nec Ménétr. (Pyriglena *picea*, Caban.) Faun. Peruan. p. 175. ex Peru.
406. Hypoenemis, Caban. 1847. America m. 2.
1. TURDUS *tintinnabulatus*, Gm. (Myiothera margaritacea, Licht. - Hypoenemis tintinnabulatus, Caban.) Pl. enl. 700. 2. - Wieg. Archiv. 1847. t. 4. 1. ex Cayenna, Guiana.
 2. Hypoenemis *paezinota*, Cab. ex Schomb. - Orn. Not. I. p. 213. - Wieg. Arch. 1847. t. 4. 2. 3. ex Guiana.
407. Holoenemis, Strickl. 1844. America m. 1.
- TERDUS *lineatus* et Sitta naevia, Gm. (Conopophaga naevia, Vieill. - Myioturdus lineatus, Ménétr. - Formicarius lineatus, Gr. - Holoenemis flammata, Strickl. - H. lineata, Caban.) Pl. enl. 823. 1. - Ann. N. Hist. 1841. t. 13. ex Cayenne.

408. **Pithys**, Vieill. 1823. (Dasycephala! p. Gr.) America m. 3.

1. **Pithys leucophrys**, Tschudi ex Vieill? (Dasycephala leucophrys, Gr.) Faun. Peruan. p. 176. t. 11. 2.
ex Amer. mer. occ.
2. **Pipra albifrons**, Gm. (Pithys leucops, Vieill. - Myiothera albifrons, Licht. - Dasycephala albifrons, Gr. Pithys albifrons, Caban.) Dubl. Mus. Berl. p. 41. sp. 476. *ex Brasil.*
3. **Turdus pectoralis**, Lath. (Myiothera pectoralis, Temm. Pithys pectoralis, Caban.) Pl. enl. 644. 2. *ex Cayenn.*

409. **Conopophaga**, Vieill. (Myiagrus, Boie. - Myioturdus, Wied. - Urotomus? Sw.)

America trop. 8.

1. **Myiagrus lineatus**, Wied. (Conopophaga vulgaris, Ménétr. - C. lineata, Caban.) Mém. Ac. Petersb. 1835. t. 14. 1. *ex Brasil. Rio Janeiro. Minas geraes.*
2. **C. ardesiacus**, Lafr. et Orb. Am. m. p. 188. *ex Boliv.*
3. **Myiothera perspicillata**, Ill. (Conopophaga nigrogenys, Less. - Myioturdus perspicillatus, Wied. - ruficeps, Sw. - C. perspicillata, Caban.) Mém. Ac. Petersb. 1835. t. 15. 1. - *B. of Br. t. 72. - Nat. Libr. x. Flyc. t. 16. ex Brasil. Rio Janeiro.*
4. **Turdus auritus**, L. (Pipra leucotis, Gm. - Conopophaga lencotis, Vieill. - C. aurita, Gr.) Pl. enl. 822. - Gal. Ois. t. 127. *ex Brasil. sept. Bahia.*
5. **C. ruficeps**, Lafr. (Todirostrum ruficeps, Lafr. 1843.) Mag. Zool. 1844. Ois. t. 91. *ex Columbia.*
6. **C. naevioides**, Lafr. Rev. Zool. 1847. p. 69. *ex Boliv.*
7. **C. melanogaster**, Ménétr. Mém. Ac. Petersb. 1835. t. 15. 2. *ex Brasil. Cuyaba.*
8. **C. dorsalis**, Ménétr. Mém. Ac. Petersb. 1835. t. 14. 2. *ex Brasil. Rio Janeiro.*

410. **Corythopis**, Sundev. 1836. (Formicarius, p. Gr.) America mer. 3.

1. **Myiothera calcarata**, Wied. (Formicarius calcaratus, Gr. - Corythopis calcaratus, Sundev.) Beitr. III. p. 1101. *ex Brasil.*
2. **CONOPHAGA nigrocineta**, Lafr. (Corythopis nigrocineta, Caban.) Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 4. 3. *ex Boliv.*
3. **Corythopis torquata**, Tschudi (Formicarius torquatus, Gr.) Faun. Peruan. p. 177. *ex Amer. m. occ.*

411. **Grallaria**, Vieill. 1816. (*Myioturdus*, *Boie* - *Codonistris*,
Gloger, p. - *Colobathris*, *Caban.*) America trop. 5.
 1. **TURDUS rex**, Gm. (*grallarius*, Lath. - *Grallaria fusca*,
Vieill. - Gr. rex, *Laf.* - *varia*, *Gr. ex Bod.* - *Coloba-*
thris rex, *Caban.*) *Pl. enl.* 702. - *Gal. Ois.* t. 154. *ex Br.*
 2. **G. imperator**, Natter. (*Colobathris imperator*, *Cab.*)
Laf. *Rev. Zool.* 1842. p. 333. *ex Cayenna.*
 3. **G. squamigera**, Fl. Prevost. (*Colobathris squamigera*,
Caban.) *Zool. Voy. Venus, Ois.* t. 1. *ex Columbia.*
 4. **Pitta macularia**, Temm. (*Myioturdus macularius*,
Laf. 1838. - *Grallaria macularia*, *Laf.* 1842. - *Colo-*
bathris macularia, *Caban.*) *Pl. col. fig. nulla.* *ex Bras.*
 5. **TURDUS tinniens**, Gm. (*Myiothera tinniens*, *Ill.* - *Myio-*
turdus tinniens, Ménétr. - *Grallaria tinniens*, *Sundev.*
Grallaria brevicauda, *Gr. ex Boddart.* - *Colobathris tin-*
niens, *Caban.*) *Pl. col.* 706. 1. *ex Cayenna*, *Peru.*
412. **Hipsibemont**, Caban. 1847. (*Grallaria*, p. *Gr.*) America trop. 2.
 1. **GRALLARIA ruficapilla**, *Laf.* (*Hypsibemon ruficapil-*
lus, *Caban.*) *Rev. Zool.* 1842. p. 333. *ex Bol. Bogot.*
 2. **GRALLARIA rufifusa**, *Laf.* (*Hypsibemon rufulus*, *Caban.*)
Rev. Zool. 1843. p. 99. *ex Columbia.*
413. **Chamaeza**, Vig. (*Chamaezosa*, *Caban.* - *Colonistris*, p.
Glog. - *Grallaria*, p. *Gr.*) America trop. 7.
 1. **MYIOTURDUS marginatus**, Wied. (*Turdus brevicaud-*
dus? *Vieill.* - *Chamaeza meralooides*, *Vig.* - *Myiothera*
campanisona, *Licht.* - *Grallaria brevicauda*, *Orb.* - *mar-*
ginata, *Gr.* - *Chamaezosa brevicauda*, *Caban.* - *Cha-*
maeza brevicauda, *Laf.* (*Mém. Ac. Petersb.* 1835. t. 1.
Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 11. *ex Brasil. m. et s.*
 2. **Chamaeza olivacea**, Tschudi. (*Grallaria olivacea*,
Gr. - *Chamaezosa olivacea*, *Caban.*) *Faun. Peruana*,
p. 178. *ex Peru.*
 3. **GRALLARIA guatimalensis**, Florent Prevost, *Zool.*
Voy. Venus, Ois. t. 2. *ex Amer. centrali.*
 4. **GRALLARIA nana**, *Laf.* *Rev. Zool.* 1842. p. 334. *ex Col.*
 5. **MYIOTURDUS fuscater**, *Laf.* (*Grallaria fuscata*, *Laf.*)
Rev. Zool. 1845. p. 341. *ex Bogota.*
 6. **MYIOTURDUS ochroleucus**, Wied. (*Turdus concretus?*
Licht. - *Grallaria ochroleuca*, *Gr.*) *Beitr. Nat. Br.* III.
p. 1032. *ex Brasil. sept. Bahia.*
 7. **GRALLARIA monticola**, *Laf.* 1847. - *O. des Murs, Pl.*
p. 53. *ex And. Peruvian.*

414. **Myiothera**, Ill. 1811. (Formicarius, Gr. ex Bodd. - Myrmothena, Vieill. - Myrmornis, Herm. - Myrmecophaga, Lacép. nec L. - Myiocinela, Sw.) America m. 3.
1. **TURDUS colma**, Gm. (Myiothera colma, Ill. - Myrmothera fuscicapilla, Vieill.) Pl. enl. 703. 1. ex Bras. m.
 2. **Myiothera tetema**, Ill. (ruficeps, Spix. - Formicarius cayenensis, Bodd. - Turdus cayanensis? et colma, var. β. Gm. - Myioturdus tetema, Wied. - Myrmothera tetema, Vieill.) Av. Bras. t. 72. 1. - Pl. enl. 821. ex Cayenna, Bras. s.
 3. **Myiothera analis**, Laf. - Orb. Voy. Am. Ois. t. 6. bis 1. ex Brasil.
415. **Pteroptochus**, Kittlitz. (Merulaxis, Less. - Leptonyx hinc Platyrurus, Sw. - Malacorhynchus, Ménér. - Scytalopus, Gould.) Amer. m. occ. 2.
1. **P. albicollis**, Kittl. (Megalonyx medius, Less. - albicollis, Laf. - Leptonyx albicollis vel pittoides, Orb.) Mém. Acad. Petersb. t. 3. - Voy. Am. m. t. 8. 2. - Zool. Ill. t. 60. - Kittl. Käpf. Voy. t. 16. 2. ex Chili m.
 2. **P. rubecula**, Kittl. (Megalonyx rubecula vel rufogularis, Laf. - Leptonyx rubecula, Orb.) Mém. Ac. Petersb. 1831. t. 2. - Voy. Am. m. t. 7. 3. 4. ex Chili m.
416. **Rhinoerypta**, Gr. 1841. (Rhinomyia, Geoffr. 1832.) Chili. Patagon. 1.
Rhinocrypta lanceolata, Geoffr. - Orb. et Laf. Voy. Am. m. Ois. t. 7. 1. - Mag. Zool. 1832. Ois. t. 3. Compl. Buff. Ois. t. 7. 1. 2. ex Patagonia.
417. **Hylactes**, King. 1830. (Megalonyx, Less. 1830. - Leptonyx, Sw. 1832.) Amer. m. occ. 2.
1. **Hylactes tarnii**, King. (Megal. ruficeps, Laf. - Lept. tarnii, Orb.) Voy. Am. m. t. 8. 1. ex Chili m.
 2. **PTEROPTOCUS megapodus**, Kittl. (Megalonyx rufus, Less. - Leptonyx macropus, Sw. - Hylactes rufus, Caban.) Mem. Ac. Pet. t. 4. - Cent. Zool. t. 66. - Zool. Ill. n. s. t. 117. ex Chili, Patagon.
418. **Triptorhinus**, Caban. (Troglodytes, p. Kittl.) America mer. 2.
1. **TOGLODYTES paradoxus**, Kittl. (Malacorhynchus chilensis, Ménér. - Platyrurus lepturus, Sw. - Leptonyx paradoxus, Laf. - Scytalopus paradoxus, Less. - Triptorhinus paradoxus, Caban.) Mém. Ac. Pet. t. 5. ex Chili.

2. **MERULAXIS orthonyx**, Laf. (Triptorhinus orthonyx, Caban.) Rev. Zool. 1843. p. 131. ex Columbia.
419. **Sarochalinus**, Caban. 1847. (Merulaxis, p. Less. - Malacorhynchus, Menetr. p.) America mer. 2.
 1. **MERULAXIS ater**, Less. (Malacorhynchus cristatellus, Mén.) Platyrurus corniculatus, Sw. - Sarochalinus ater, Cab. Cent. Zool. t. 30. - Mém. Ac. Petersb. 1831. t. 12. - Braz. B. t. 55. 56. ex Brasil. Rio Janeiro.
2. **MYIOTHERA rhinolophus**, Wied. (Malacorhynchus rhinolophus, Ménétr. - Sarochalinus rhinolophus, Caban.) Beitr. III p. 1051. ex Brasil. Rio Belmonte.
420. **Scytalopus**, Gould 1836. (Platyurus, Sw. 1837.) America mer. 3.
 1. **PLATYURUS niger**, Sw. (Scytalopus niger, Caban.) Anim. in Menag. sp. 128. ex Chile.
2. **Scytalopus fuscus**, Gould. (Malacorhynchus speluncæ? Mén.) Jard. et Selb. Ill. Orn. n. s. t. 12. ex Patag.
3. **MYIOTHERA indigotica**, Licht. (Malacorhynchus albiventris et indigoicus, Ménétr. - Scytalopus albogularis, Gould. - Sc. indigoicus, Cab.) Mém. Ac. Petersb. t. 13. 2. ex Bras. sept. et mer.
Quid Motacilla magellanica, Forster. - Scytalopus femoralis, et acetirostris, Tsch. Fn. Per. p. 183. nisi juv. specierum praeced?
421. **Sylvia axis**, Less. (Pteroptochos, p. Gr.) America mer. 1.
S. guttata: Less. (Pteroptochos guttatus, Gr.) Rev. Zool. 1840. p. 274. ex Amer. mer.
422. **Chamaea**, Gambel. 1847. (Parus, p. Auct.) America mer. 1.
PARUS fasciatus, Gambel, Pr. Acad. Nat. Sc. Philad. 1845. p. 265. t. 8. 3. ex Amer. mer.
Quid P. inornatus et montanus, Gamb. Ac. Phil. 1845. t. 8. 1. 2?
- FAMILIA 33. DENDROCOLAPTIDÆ.
- SUBFAM. 69. DENDROCOLAPTINÆ.
423. **Dendrocolaptes**, Herm. 1804. (Dendrocopus, Vieill. 1816.) America mer. 5.
 1. **GRACULA cayanensis**, Gm. (Gracula scandens, Lath.) Dendrocolaptes major, Herm. - picumnus, Licht. - Orthonocolaptes communis, Less.) Pl. enl. 621. - Vieill. Ois. dor. t. 79. - Lev. Promer. t. 26. ex Cayenna, Bras.
 2. **D. cyanotis**, Licht. - Lev. Promer. t. 25. ex Bras.

3. **DENDROCOPTES albicollis**, Vieill. ex Azara 241. (Dendrocolaptes decumanus, Ill. - picumnus, p. Licht. - falcirostris, Spix. - Xiphocolaptes albicollis, Less.) Berol. Tr. 1820. t. 1. 1. - Av. Bras. t. 88. ex Bras. Parag.
4. **DENDROCOPTES major**, Vieill. ex Azara 241. (Dendrocolaptes rubiginosus, Lafr.) Mag. Zool. 1833. Ois. t. 16. ex Parag.
5. **D. crassirostris**, Such. Zool. Journ. II. p. 115. ex Br.
424. **Dendroplex**, Sw. 1837. (Dendrocolaptes, p. Gr.) America mer. 2.
1. **ORIOLUS picus**, Gm. (Dendrocolaptes minor, Herm. - obsoletus? Licht. - Oriolus picoides, Shaw. - Dendrocoptes rectirostris, Vieill. ex Azara 243. - Dendroplex chrysolophus, Sw.) Pl. enl. 6057 - Lev. Prom. t. 27. ex Br. s.
 2. **D. picirostris**, Lafr. 1847. - O. des Murs. Pl. p. 51. ex N. Granada.
425. **Nasica**, Less. (Dendrocolaptes, p. Gr.) America mer. 5.
1. **N. longirostris**, Bp. (nasalis, Less. - D. longirostris, Ill.) Lev. Promer. t. 24. ex Brasil.
 2. **N. albicollis**, Less. - Ech. M. Sav. 1844. p. 275. ex Br.
 3. **N. rufigula**, Less. - Ech. M. Sav. 1844. p. 275. ex Br.
426. **Dendrocoptes**, Sw. 1837. (Premnopus, Cab. 1847. - Dendrocolaptes, p. Gr.) America mer. 7.
1. **DENDROCOLAPTES platyrostris**, Sp. Av. Br. t. 89. ex Br.
 2. **D. fortirostris**, Such. Zool. Journ. II. p. 115. ex Br.
 3. **D. lineatocephalus**, Gr. et Mitch. Gen. B. t. 43. ex Bogota.
 4. **D. guttatus**, Licht. (nigrirostris, Ill. - flammeus, Licht. pardalotus? Vieill. ex Azara 242.) Lev. Promer. t. 30. ex Bras. Surinam.
 5. **D. melanopeps**, Less. Rev. Zool. 1840. p. 269. ex Br.
 6. **D. chunchotambo**, Tsch. Fn. Per. t. 22. 1. ex Peru.
 7. **D. validus**, Tschudi, Faun. Per. t. 21. 2. ex Peru.
Quid Dendrocoptes maculatus, rufus, fuscus, et griseicapillus ex Azara 244. Vieill. N. D. Hist. Nat. XXVI. p. 117-119?
Quid D. reticulatus, Lev. - D. susurrans, Jard. Ann. XIX. p. 81?
427. **Xiphorhynchus**, Sw. 1827. America trop. 5.
1. **DENDROCOLAPTES trichilirostris**, Licht. (procurus, Temm. - falcularius? Vieill. - Xiph. wiedi, Hartl.) Pl. col. 28. - Gal. Ois. t. 175. - Trans. Ac. Berlin. 1818. t. 3. ex Brasil.
 2. **DENDROCOLAPTES PROCURVUS**, Lafr. (*Iafresnayanus*, Orb.) Voy. Am. m. t. 53. 2. ex Bolivia.

3. DENDROCOLAPTES *pucherani*, Lafr. (Xyphorhynchus pucherani, O. des Murs) Pl. p. 68. ex S. t. Fe de Bogota.
4. *X. flavigaster*, Sw. (Drycopus elurneirostris, Less. 1843. - Dr. flavigaster, O. des Murs) Pl. p. 52. ex Amer. centr. Realejo.
5. *X. leucogaster*, Sw. ex Amer. centr. Mexico.

428. **Picolaptes**, Less. nec Lafr. (Thripobrotus, Caban.) America trop. 14.

1. DENDROCOPIUS *angustirostris*, Vieill. ex Azara 242. (Dendrocolaptes bivittatus, Licht. - rufus, Wied. - Picolaptes coronatus, Less.) Berol. Trans. 1820. t. 2. 2. Ac. Bras. t. 90. 1. ex Brasil.
2. DENDROCOLAPTES *squamatus*, Licht. Berol. Tr. 1820. t. 2. 1. ex Brasil.
3. DENDROCOLAPTES *tenuirostris*, Licht. (gracilirostris, Steph. - Picolaptes spixii guttata, Less. - P. tenuirostris, Gr.) Av. Bras. t. 91. 2. - Less. Cent. Zool. t. 32. ex Mexico.
4. DENDROCOLAPTES *souleyeti*, Lafr. - O. des Murs, Pl. p. 69. ex Peru. Major tenuirostris; statura squamata: gula aldomineque rufis et rostro elongato, curvo, albo.
5. DENDROCOLAPTES *lacrymiger*, Lafr. - O. des Murs, Pl. p. 70. ex Columbia.
6. DENDROCOLAPTES *superciliosus*, Licht. (Dendrocopus pyrrhocaphaeus, Vieill. ex Azara 245. - Picolaptes superciliosus, Gr.) Berol. Tr. 1818. p. 204. ex Bras. m. Parag.
7. DENDROCOLAPTES *miniatius*, Illig. (Dendrocopus rubricaudatus, Vieill. ex Azara 246. - Picolaptes miniatius, Gr.) Licht. Berol. Tr. 1818. p. 202. ex Parag.
8. DENDROCOLAPTES *ocellatus*, Spix, Av. Bras. t. 91. 1. ex Brasil.
9. DENDROCOLAPTES *wagleri*, Spix (Picolaptes wagleri, Gr.) Av. Bras. t. 90. 2. ex Brasil.
10. DENDROCOLAPTES *affinis*, Lafr. (angustirostris, Bp.) Rev. Zool. 1839. p. 100. ex Mexico.
11. **P. promeropirhynchus**, Less. Rev. Zool. 1840. p. 270. ex Patagon.
12. **P. albicularis**, King, Pr. Zool. Soc. 1830. p. 30. ex Patagon.
13. DENDROCOLAPTES *albolineatus*, Lafr. Rev. Zool. 1840. p. 208. ex Mexico, Columbia.
14. **P. maculiventris**, Less. Echo du Monde Sav. 1844. p. 275. ex Bogota.

429. **Dendrocinclia**, Gr. (Dryocopus, Wied, nec Boie.) America trop. 6.

1. DENDROCOLAPTES *turdinus*, Licht. (Dryocopus turdinus, Wied.) Berol. Trans. 1818. t. 2. 1. ex Brasil.
2. DENDROCOLAPTES *fumigatus*, Licht. (Dendrocincia fuliginosus, Vieill. - Dendrocinclia fumigata, Gr.) Lev. Promer. t. 28. ex Brasil.
3. DENDROCOLAPTES *merula*, Licht. Berol. Trans. 1818. p. 208. ex Brasil.
4. DENDROCOLAPTES *perroti*, Lafresn. Mag. Zool. 1844. Ois. t. 54. ex Columbia.
5. DENDROCOLAPTES *atricristis*, Lafr. et Orb. Syn. Av. p. 127. - Voy. Am. m. t. 54. 1. ex Bolivia.
6. DENDROCOLAPTES *triangularis*, Lafr. Mag. Zool. 1843. Ois. t. 32. ex Columbia, Bogota.

430. **Glyphorhynchus**, Wied. (Sittacilla, Less. - Zenopha-sia, Sw.) America mer. 1.

- DENDROCOLAPTES *cuneatus*, Licht. (Gl. ruficaudus, Wied. Zenoph. platyrhyncha, Sw.) Berol. Trans. 1818. t. 3. 1. Guérin, Mag. Zool. 1833. Ois. t. 17. - Spix, Av. Bras. t. 91. 3. ex Brasil, sept. Bahia.

431. **Sittasomus**, Sw. (Neops p. Vieill.) Amer. trop. 4.

1. DENDROCOLAPTES *erythacus*, Licht. (sylviulus et xenops, Temm. - Neops spirurus, Vieill. - Sittasomus temmincki, Less. - olivaceus, Wied.) Berol. Trans. 1820. t. 1, 2. et 3. - Pl. col. 72. 1. - Lev. Prom. t. 31. 1. - Kittl. Küpf. Vog. t. 34. 2. ex Brasil, sept. S. Paulo.
2. *S. flammulatus*, Less. Traité d'Orn. p. 315. ex Br.
3. *S. griseus*, Jard. Ann. Nat. Hist. xix. p. 82. ex Br.
4. *S. perlatus*, Less. 1844. (Anabates squamiger, Lafr.) Orb. Voy. Am. m. t. 54. 2. ex Bolivia.

432. **Pygarrhicus**, Licht. 1837 (Dendrodromus, Gould, 1841.

Dromodendron, Gr. 1842.) America mer. 1.

- DENDRODROMUS *leucosternus*, Gould. (Dromodendron leucosternum, Gr. - Pygarrhicus leucosternus, Caban.) Voy. Beagle, B. t. 27. ex Patagon.

433. **Selerurus**, Sw. 1827. (Tinactor, *Wied.* - *Oxypyga, Ménétr.*) America mer. 3.

1. **THANOPHILUS caudacutus**, Vieill. (Myiothera umbretta, *Licht.* - caudacuta, *Lafr.* - Tinactor fuscus, *Wied.* *Oxypyga scanor, Ménétr.* - Formicarius umbrettus, *Gr.* *Selerurus albicularis, Sw.* - *Scl. caudacutus, Caban.*) *Mag. Zool. 1838. t. 10. ex Bras.*
2. **S. ruficollis, Sw.** *B. of Bras. t. 79. ex Bras.*
3. **S. guatimalensis, Hartl.** *Rev. Zool. 1844. p. 370. ex Amer. centr.*

FAMILIA 34. ANABATIDAE.

SUBFAM. 70. ANABATINAE.

434. **Lochmias**, Sw. 1827. (Picerthia, *Geoffr. 1832.*) America mer. 1.

- MYIOTHERA nematura, Licht.** (Myrmothera nematura, *Ménétr.* - Furnarius S.^thilairii, *Less.* - *Lochmias squamulata, Sw.* - *L. S.^thilairii, Gr.* - *L. nematura, Caban.*) *B. of Bras. t. 38. ex Bras.*

435. **Anabates**, Temm. (Phylidor, *Spix.* - Dendroma, *Sw.*

Anabacerthia, Lafr.)

America mer. 26.

1. **MOTACILLA guianensis, Gm.** *Azara 239?* (*Anabates ruficaudus, Temm.*) *Pl. enl. 686. 2. ex Brasil.*
2. **A. amaurotis, Temm.** (*Xenops nigricapillus, Less.*) *Pl. col. 238. 2. ex Brasil.*
- * 3. **A. echinatus, Temm. Mus. Lugd. ex S. t. F. de Bogot.**
- * 4. **A. puncticollis, Natter. Mus. Vindobon. ex Brasil.**
- * 5. **A. infuscatus, Natter. Mus. Vindobon. ex Brasil.**
6. **A. subulatus, Spix, Av. Br. t. 83. 1. ex Brasil.**
7. **A. cristatus, Spix, Av. Br. t. 84. ex Brasil.**
- * 8. **A. lophotes, Bp. Mus. Lugd. (subcristatus? Sw.) B. of Bras. t. 31. ex Buenos Ayres.**
9. **A. gutturalis, Lafr. - Orb. Voy. Am. m. t. 55. 3. ex Pat.**
10. **A. unirufus, Lafr. - Orb. Voy. Am. m. t. 55. 1. ex Bol.**
11. **A. leucopthalmus, Wied** (*Xenops gularis, Valenc.* *Sphenura sulphurascens, Licht.* - *Phylidor albicularis nec atrigularis, Spix*) *Av. Bras. II. t. 74. ex Brasil.*
12. **A. erythroptthalmus, Wied**, *Beitr. Nat. Bras. III. p. 1175. - O. des Murs, Pl. p. 44. ex Brasil.*

13. *A. atricapillus*, Wied (caniveti, Less. - Sphenura superciliaris, Licht. - Philydor superciliaris, Spix - Xe-nops melanocephalus, Less.) Cent. Zool. 16. - Av. Bras. t. 73. 1. ex Brasil.
14. *A. ferruginoventus*, Wied, Beitr. Nat. Bras. III. p. 1166. ex Brasil.
15. *A. aradoi*, Laf. Mag. Zool. 1832. t. 8. ex Bras.
16. *A. boissonneautii*, Laf. R. Zool. 1840. p. 104. ex Bog.
17. *A. gutturalatus*, Laf. et Orb. Syn. Av. p. 4. ex Bol.
18. *A. ruficaudatus*, Laf. et Orb. Syn. Av. p. 15. Chil.
19. *A. certithoides*, Laf. et Orb. Syn. Av. p. 15. Patag.
20. *XENOPS griseus*, Less. (Anabates griseus, Gr.) Traité Orn. p. 318. ex Brasil.
21. *XENOPS rufus*, Less. (Anabates rufus, Gr.) Traité Orn. p. 318. ex Brasil.
22. *SPHENURA poliocephala*, Licht. (Philydor ruficollis, Spix. - Anabates rufifrons, Valene. - Dendroma caniceps, Sw.) Azara 247. - Av. Bras. II. t. 75. ex Bras.
23. *A. montanus*, Tschudi, Faun. Peruan. p. 35. t. 20. 1. ex Peru.
24. *A. ochrotaenius*, Tschudi, Faun. Per. p. 35. t. 20. 2. ex Peru.
25. *A. melanorhynchus*, Tschudi, Faun. Peruan. p. 35. t. 21. 1. ex Peru.
26. *A. leucophrys*, Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 93. ex Bras.
436. *Xenops*, Ill. 1811. (Neops, Vieill. 1816.) America trop. 6.
1. *X. genibarbis*, Ill. (Neops ruficauda, Vieill. - X. hoffmannseggii, Cuv.) Levail. Promer. t. 31. 2. - Temm. Pl. col. 150. 1. ex Brasil.
 2. *X. rutilans*, Temm. (rutilus, Licht. - genibarbis et affinis, Sw. - Neops ruficauda, Vieill.) Pl. col. 72. 2. - Gal. Ois. t. 170. - Zool. Ill. t. 100. ex Brasil.
 3. *X. dentirostris*, Sw. Two Cent. and. a Quart. p. 353.
 4. *X. anabatoides*, Temm. (fuscus, Laf. ex Vieill.) Pl. col. 150. 2. ex Brasil.
 5. *X. rufosuperciliatus*, Laf. Mag. Zool. 1832. Ois. t. 7. ex Brasil.
 6. *X. abeillii*, Less. Rev. Zool. 1840. p. 97. ex Columbia.
437. *Oxyramphus*, Strickl. 1841. (Oxyrhynchus, Temm. 1820.) America mer. 1.
- OXYRHYNCHUS flammiceps*, Temm. (cristatus, Sw. - seratus? Mikan. 1820.) Delic. Flor. et Faun. Bras. 65. Zool. Ill. t. 49. - Pl. col. 125. ex Chili.

SUBFAM. 71. SYNALLAXINAE.

438. **Thripophaga**, Caban. (Anabates, p. Gr.) America mer. 2.
 1. **SPHENURA striolata**, Licht. (Xenops ruficollaris, Less.
Anabates stratus, Spix - A. macrourus, Wied.) *Av.*
Br. t. 43. 2. - Pl. col. 288. 1. - Cent. Zool. t. 36. ex
Brasil. Boliv.
 2. **ANABATES auritus**, Licht. (Thripophaga aurita, Caban.)
Tschudi, Conspr. sp. 192. - Faun. Per. p. 34. ex Peru.
439. **Anumbius**, Orb. 1838. (Sphenopyga, Caban.) America trop. 5.
 1. **MOTACILLA acuticaudata**, Less. (*Furnarius anumbi*,
Vieill. ex Azara 222. - *An. anthoides*, Lafr. - *Synallaxis*
major, Gould) *Voy. Beagle. t. 22. ex Patagonia.*
 2. **ANTHUS ruber**, Vieill. *ex Azara* 220. (*Anumbius ruber*,
Orb.) *N. Dict. II. Nat. xii. p. 118. ex Parag.*
 3. **A. striaticollis**, Orb. et Lafr. *Syn. Av. t. II. p. 18.*
 4. **A. striaticeps**, Orb. et Lafr. *Syn. Av. pl. II. p. 19.*
 5. **A. rufifrons**, Illig. (*Synallaxis rufifrons*, Spix. - *Sphe-*
nura frontalis, Licht. - *Malurus garrulus*, Sw.) *Zool.*
Ill. t. 138. - Av. Br. t. 85. 1. ex Brasil.
440. **Oxyurus**, Sw. (*Synallaxis*, p. Gr.) America mer. 1.
Motacilla spinicauda, Gm. (*Motacilla seticauda*, Forst.
Oxyurus ornatus et *australis*, Sw. - *O. patagonicus*, Less.
Synallaxis tupinieri, Less.) *Voy. Coq. t. 29. 1. ex Chili.*
441. **Synallaxis**, Vieill. (*Parulus*, Spix) America mer. 32.
 1. **S. ruficapilla**, Vieill. *ex Azara* 236. (*albescens*, Temm.
cinerous, Wied. - *Sphenura ruficeps*, Licht. - *Parulus*
ruficeps, Spix.) *Gal. Ois. t. 174. - Av. Bras. t. 86. 2.*
Pl. col. 227. 2. ex Brasil. Parag.
 2. **S. azarae**, Lafr. - *Orb. Am. m. Ois. p. 240. ex Boliv.*
 3. **S. humicola**, Kittl. *Mem. Ac. Petersb.* 1830. *t. 6. - Orb.*
Voy. Am. m. t. 17. 2. ex Bolivia.
 4. **S. leucocephala**, Lafr. et Orb. *Syn. Av. p. 24. Patag.*
 5. **S. aegithaloides**, Kittl. (*theleti*, Less.) *Mem. Ac.*
Petersb. 1830. *t. 7. ex Patag. Peru.*
 6. **S. fuliginiceps**, Orb. *Voy. Am. m. t. 17. 1. Boliv.*
 7. **S. albiceps**, Lafr. - *Orb. Voy. Am. m. t. 16. 2. Boliv.*
 8. **S. striaticeps**, Orb. *Voy. Am. m. t. 16. 1. Par. Bol.*

9. *S. ruficauda*, et *Sylvia russeola*, Vieilli. ex Azara 233.
(*Sphenura mentalis*? Licht. - *Synallaxis caudacutus*,
Temm.) Spix, Av. Bras. t. 86. l. ex Brasil.
10. *S. troglodytoides*, Lafr. Syn. Av. p. 22. Patag.
11. *S. malurooides*, Orb. Voy. Am. m. t. 14. 3. 4. Parag.
12. *S. anthoides*, King. Proc. Zool. S. 1831. ex Patag.
13. *S. phryganophila*, Vieilli. ex Azara 229. (*tessellata*,
Temm.) Pl. col. 311. l. ex Brasil. mer. Parag.
14. *S. candezi*, Lafr. et Orb. Rev. Zool. p. 165. 1838. ex
Colombia.
15. *S. rutilans*, Temm. Pl. col. 227. l. ex Brasil.
16. *S. cinerascens*, Temm. Pl. col. 227. ex Brasil.
17. *S. setaria*, Temm. Pl. col. 311. 2. ex Brasil.
18. *S. rufigularis*, Gould, Voy. Beagle, p. 77. t. 23.
ex Patag.
19. *S. brunnea*, Gould, Voy. Beagle, p. 78. fig. nulla.
ex Patag.
20. *S. sordida*, Less. (*flavigularis*, Gould) Voy. Beagle,
B. t. 24. ex Patag.
21. *S. pallida*, Wied, Beitr. Nat. Bras. III. p. 691. ex
Brasil.
22. *S. melanops*, Vieilli. ex Azara 232. (*dorsomaculata*,
Lafr.) Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 14. 1. 2. ex Parag.
23. *S. torquata*, Wied. (*bitorquata*, Lafr.) Orb. Voy.
Am. m. t. 15. 2. ex Brasil. Bolivia.
24. *S. torquata*, Lafr. nec Wied. (*maximiliani*, Orb.)
Voy. Am. t. 15. 1. - Azara 235. ex Parag. Boliv.
25. *S. patagonica*, Orb. Voy. Am. m. p. 249. ex Patag.
26. *S. cinnamomea*, Sic. ex Gm. nec Lafr. (*ruficauda*,
Spix) Av. Bras. t. 85. 2. ex Brasil.
27. *S. striaticollis*, Lafr. Rev. Zool. 1843. p. 290. ex Col.
28. *S. unirufa*, Lafr. Rev. Zool. 1843. p. 290. ex Col.
29. *S. fuliginosa*, Lafr. Rev. Zool. 1843. p. 290. ex Col.
30. *S. brachyura*, Lafr. Rev. Zool. 1843. p. 290. ex Col.
31. *S. gularis*, Lafr. Rev. Zool. 1843. p. 290. ex Col.
32. *S. terrestris*, Jard. Ann. Nat. Hist. xix. p. 80. ex Col.
442. *Sylviorthorhynchus*, O. des Murs (Schizura, Caban.) America mer. 1.
S. malurooides, O. des Murs. (S. desmursii, Gay - Schi-
zura malurooides, Cab.) Pl. p. 45. ex Amer. mer.

SUBFAM. 72. FURNARIINAE.

443. **Furnarius**, Vieill. (Opetiorhynchus, Temm. - Figulus, Spix.) Amer. mer. 4.
1. **MEROPS rufus**, Gm. (Turdus badius, Licht. - Op. ruficaudus, Wied. - Figulus albicularis, Spix.) Av. Bras. t. 70. ex Brasil.
 2. **TURDUS figulus**, Illig. (Opetiorhynchus rufus, Wied. Furnarius melanotis, Sw.) Pl. enl. 739. ex Brasil.
 3. **OPETIORHYNCHUS rectirostris**, Wied. (Furnarius rectirostris, Gr.) Beitr. N. Br. III. p. 679. ex Brasil.
Quid F. leucopus, griseus, longipennis et fasciatus, Swains. Two Cent. and a Quarter, p. 324-351?
444. **Cinclodes**, Gr. 1840. (Cillarous, Caban. 1844.) America mer. 7.
1. **MOTACILLA patagonica**, Gm. (M. gracula, Forst. - Furnarius chilensis, Less. - F. lessoni, Dumont. - Op. rupestrис, Kittl.) Mem. Ac. Petersb. I. t. 8. ex Chili, Patag.
 2. **UPUCERTHIA vulgaris**, Lafr. - Orb. Voy. Am. m. t. 57. 1. ex Bolivia, Chili, Parag.
 3. **CERTHIA antarctica**, Garn. (Furnarius fuliginosus, Less.) Voy. Coq. Zool. p. 670. ex Ins. Malvinas.
 4. **UPUCERTHIA nigrofumosa**, Lafr. (Furnarius inornatus, Less.) Orb. Voy. Am. m. t. 57. 2. - Voy. Beagle, t. 20. ex Chili, Bolivia, Peru.
 5. **UPUCERTHIA montana**, Lafr. (Cinclodes montanus, Gr.) Orb. Voy. Am. m. t. 56. 1. ex Bolivia, Peru.
 6. **UPUCERTHIA andecola**, Orb. (Cinclodes andecola, Gr.) Voy. Am. m. t. 56. 2. ex Bolivia.
 7. **C. palliatus**, Tschudi, Faun. Per. p. 21. ex Peru.
445. **Upucerthia**, Geoffr. (Cinclodes, p. Gr.) America mer. 1.
UPUCERTHIA dumetoria, Is. Geoffr. (dumetorum, Lafr. Cinclodes dumetorius, Gr.) Voy. Beagle B. t. 19. ex Patag.
446. **Ochetorhynchus**, Meyen (Cinclodes, p. Gr.) America mer. 1.
O. ruficaudus, (Cinclodes ruficaudus, Gr.) Mey. Nov. Act. Ac. Nat. Curios. Bon. XVI. Suppl. t. 11. ex Chili.
447. **Henicorhynchus**, Gr. (Eremobius, Gould, nec Humboldt). America mer. 2.
1. **E. phaeonura**, Gr. ex Gould, Voy. Beagle, B. t. 21. ex Patag.
 2. **E. melanura**, Gr. Gen. of Birds, p. 133. sp. 2. ex Patag.

448. **Limnornis**, Gould. (*Cinnicerthia*, Less.) America mer. 5.
 1. *L. cureirostris*, Gould, *Voy. Beagle*, B. t. 25. ex
La Plata.
 2. *L. rectirostris*, Gould, *Voy. Beagle*, B. t. 24. ex
La Plata.
 3. *L. unirufus*, Lafr. *Rev. Zool.* 1840. p. 105. ex *Bogota.*
 4. *L. canifrons*, Lafr. *Rev. Zool.* 1840. p. 105. ex *Bogota.*
 5. **CINNICERTHIA cinnamomea**, Less. - *Rev. Zool.* 1840.
 p. 105. ex *Bogota.*
449. **Cinlocerthia**, Gr. (*Stenorhynchus*, Gould, *nec Fr. Cuv.*) Antill. 1.
STERORHYNCHUS ruficaudus, Gould. (*Cinlocerthia rufi-*
cauda, Gr.) *Proc. Zool. Soc.* 1835. p. 186. ex *Jamaica.*
450. **Geobates**, Sw. (*Geositta*, p. Gr.) Americamer. 1.
G. brevicauda, Sw. *Two Cent. and a Quart.* p. 322.
451. **Geositta**, Sw. (*Geobates*, Sw.) America mer. 4.
 1. *ALAUDA cunicularia*, Vieill. ex *Azara* 148. (*Alauda fis-*
sirostra, Kittl. - *Geositta anthoides*, Sw. - *Certhilanda cu-*
nicularia, Lafr.) *Mém. Ac. Petersb.* 1835. t. 3. - *Orb.*
Voy. Am. m. Ois. t. 43. 1. ex *Parag. Patag. Boliv.*
 2. *Geositta peruviana*, Lafr. *Rev. Zool.* 1847. p. 75.
 ex *Peru. Minor.*
 3. *CERTHILAUDA tenuirostris*, Lafr. (*Geositta tenuirostris*,
Gr.) *Orb. Voy. Am. m. t. 43. 2.* ex *Peru, Bolivia.*
 4. *CERTHILAUDA maritima*, Lafr. (*Geositta maritima*, *Gr.*)
Orb. Voy. Am. m. t. 44. 1. ex *Bolivia.*

TRIBUS 2. OSCINES.

FAMILIA 35. MENURIDAE.

SUBFAM. 73. MENURINAE.

452. **Menura**, Davis. (*Parkinsonius*, Bechst.) Australia. 2.
 1. *M. superba*, Davis. (*lyra*, Shaw. - *novae-hollandiae*,
Lath. - *vulgaris*, Flem. - *paradisea*, Sw. - *Parkinso-*
nus mirabilis, Bechst. - *Megapodius menura*, Wagl.)
Linn. Tr. vi. t. 22. - *Gal. Ois. t. 192.* - *Vieill. Ois. dor.*
t. 14. 15. - *Gould, Austr. ill. t. 14.* ex *Austr.* *Fusca*,
dorso concolor: rectricibus elongatis, angustis, rufo variiis.
 2. *M. alberti*, Gould, 1850. ex *Austr.* *Valde affinis*
praecedenti et magnitudine subaequalis: dorso, uropygio, cris-
soque pulchre rufo-castaneis: rectricibus brevioribus, latiori-
bus, unicoloribus.

FAMILIA 36. MALURIDAE.

SUBFAM. 74. ORTHONYCHINAE.

453. **Orthonyx**, Temm. (Mohoua, Less.) Oceania. 2.
 1. **O. spinicauda**, Temm. (maculatus, Steph. - temmincki, Vig.) Pl. col. 428, faem. nec m. 429, mas nec f. ex *Nova Zelandia*.
 2. **O. ochrocephala**, Gr. ex Gr. (ieterocephala, Lafr. Muscicapa chloris, Forst. - Certhia heteroclitia, Quoy et Gaim. - Mohou hua, Less.) Voy. Astrol. Ois. t. 17. i. Mag. Zool. 1839. Ois. t. 8. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 46. ex *Nova Zelandia*.

SUBFAM. 75. TIMALIINAE.

454. **Psophodes**, Horsf. 1826. (Dasyornis, p. Less.) Australia. 2.
 1. **MUSCICAPA crepitans**, Lath. (Corvus olivaceus, Lath. Pica gularis, Wagl. - Dasyornis abeillii, Less.) Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 60. - Gould, Austr. III. t. 15. ex *Austr. orient.*
 2. **P. nigrigularis**, Gould, 1844. - Austr. III. t. 16. ex *Austr. occ.*
455. **Sphenostoma**, Gould. 1837. Australia. 1.
S. cristatum, Gould, Synops. - Austr. t. 117. ex *Austr.*
456. **Xerophila**, Gould. 1840. (Sphenostoma, p. Gr.) Australia. 1.
X. leucopsis, Gould. (Sphenostoma leucopsis, Gr.) Austr. III. t. 67. ex *Australia*.
457. **Chrysomma**, Hodgs. (Timalia, p. Gr.) Asia m. or. 1.
PARUS sinensis, Lath. (Gotah Finch, et Emberiza calfat var. a. Lath. - Timalia hypoleuca, Franklin. - T. horsfieldi, Jard. - T. bicolor, Lafr. - Pyctoris rufifrons, Hodgs. - Chrysomma sinense, Blyth, Cat. sp. 860.) Proc. Zool. Soc. 1845. p. 24. ex *India, China*.
458. **Timalia**, Horsf. 1820. As. mer. Oc. 4.
 1. **T. pileata**, Horsf. Zool. Res. Java, fig. mala. ex Bengal, Nepal, Arakan, Malacca, Java.

2. **Pitta thoracica**, Temm. (*Timalia thoracica*, Sw.) *Pl.*
col. 76. ex Java, Sumatra.
3. **T. nigricollis**, Temm. (*erythronotus*, Blyth. - *Bra-chypteryx nigrogularis*, Eyston.) *Pl. col. 594. 2. ex Penins. Malacc. Borneo.*
4. **T. maculata**, Temm. (*pectoralis*, Blyth. - *Malacopteron squamatum*? Eyston.) *Pl. col. 593. 1. ex Penins. Malacc. Sumatra, Borneo.*
5. **T. pirrhoptera**, Boie (*erythroptera*, Blyth. - *Bra-chypteryx acutirostris*? Eyston.) *Journ. As. Soc. xi. p. 794. ex Penins. Malacc. Sum. Borneo. Minima.*
6. **T. poliocephala**, Temm. *Pl. col. 593. 2. ex Sumatra.*
7. **T. striolata**, Müll. *Tijdschr. 1838. p. 32. ex Sumatra.*
- * 8. **T. larvata**, Müll. *Mus. Lugd. ex Sumatra. Minor:*
*ex toto olivaceo-rufa; pileofusco albo-striato; mento ardesiaco
albo marginato.*
9. **T. grammicephala**, Kuhl. (*Myiothera grammiceps*,
Temm.) *Pl. col. 448. 3. ex Java. Minima: laete rufa;
pileofusco albo-striato: gula pectoreque latissime albis.*

459. **Mixornis**, Hodgs. (*Timalia*, p. Gr.) Asia m. Ocean. G.

1. **TIMALIA gularis**, Horsf. (*Prinia pileata* hinc *Mixornis gularis*? Blyth.) *Zool. Res. Java*, fig. mala. - *Pl. col. 442. 1. ex Java. Media: cinereo-rufa; subtus striata, gula alba, ab domine subflavescens.*
- * 2. **M. sumatrana**, Bp. (*Timalia gularis* ex *Sumatra*, *Mus. Lugd.*) *Fig. nulla. Minor; subtus cum gula flavissima.*
- * 3. **M. borneensis**, Bp. (*gularis* ex *Borneo*, *Mus. Lugd.*)
Fig. nulla. Major: intenso rufa; genis nigricantibus: subtus, a gula alba, flavo-cinerea.
- * 4. **TIMALIA flavigularis**, Müll. *Mus. Lugd. ex Java. Oli-vaceo-rufa: subtus albo-cinerea; jugulo flavo-cinnamomeo.*
5. **TIMALIA poliopsis**, Boie. (*Myiothera melanothorax*,
Temm.) *Pl. col. 185. 2. Mus. Lugd. ex Java. Rufa;*
*subtus cum genis cana, criso lateribusque rufescentibus:
gula alba; collaris pectoralis niger.*
6. **M. chloris** vel *ruficeps*, Hodgs. (*Motacilla rubricapilla*?
Tickell.) *Pr. Zool. Soc. 1845. p. 23. ex Asia centr.*

460. **Turdirostris**, Hay. (*Macronus*, p. Gr.) Asia m. or. Oc. 12.

1. **T. superciliaris**, Hay. (*Macronus superciliaris*, Gr.)
Madr. Journ. XIII. p. 163. ex Penins. Malacc.
2. **Myiothera capistrata**, Temm. (*superciliaris*? Horsf.
Macronus capistratus, Gr.) *Pl. col. 185. 1. ex Java.*

- * 3. *Myiothera capistratoides*, Temm. Mus. Lugd. *Born.*
- 4. *Myiothera epilepidota*, Temm. (*Macronus epilepidotus*, Gr.) *Pl. col.* 448. 2. *ex Java.*
- 5. *Myiothera leucostigma*, Müll. Mus. Lugd. *ex Born.*
- * 6. *Myiothera murina*, Temm. Mus. Lugd. *ex N. Guinea.*
- 7. *Myiothera leucophrys*, Temm. Mus. Lugd. *ex Java.*
- 8. *Myiothera pyca*, Boie, Mus. Lugd. *ex Jav. Sumatra.*
- 9. *Myiothera concreta*, Müll. (*hypoides*, Temm.) Mus. Lugd. *ex Borneo.*
- 10. *Myiothera poliogenys*, Müll. Mus. Lugd. *ex Sumatr.*
- 11. *Myiothera umbratilis*, Müll. Mus. Lugd. *ex Borneo.*
- 12. *Myiothera pyrrhogensis*, Temm. (*Macronus pyrrhogensis*, Gr.) *Pl. col.* 442. 2. *ex Java.*

461. *Macronus*, Jard. (Timalia, p. Gr.). As. m. Oc. 2.
- 1. *TIMALIA leucottis*, Strickl. *Contr. Orn.* 1848. fig. tantum.
ex Asia mer.
 - 2. *M. ptilosus*, Jard. et Selb. (Timalia trichorhros, Temm.)
Ill. Orn. t. 150. *ex Penins. Malacc. Malaias.*

SUBFAM. 76. MALURINAE.

462. *Malurus*, Vieill. 1816. Australia 10.
- 1. *M. longicaudus*, Gould, Austr. III. t. 19. *ex Tasman.*
 - 2. *M. melanotus*, Gould, Austr. III. t. 20. *ex Austr. m.*
 - 3. *MOTACILLA cyanea*, Gm. (*superba*, Shaw. - *Malurus cyanus*, Vieill.) Lath. Gen. *Syn.* t. 53. - *Nat. Misc.* t. 10. - Jard. et Selb. *Ill. Orn.* t. 2. 3. - Gould, Austr. III. t. 18. *ex Austr. or.*
 - 4. *SAXICOLA splendens*, Quoy et Gaim. (*Malurus pectoralis*, Gould. - *M. splendens*, Blyth, *Cat. sp.* 785.) *Voy. Astrol.* t. 10. 1. - Gould, Austr. III. t. 21. *ex Austr. occ.*
 - 5. *M. elegans*, Gould, Austr. III. t. 22. *ex Austr. occ.*
 - 6. *M. pulcherrimus*, Gould, Austr. III. t. 23. *Austr. occ.*
 - 7. *M. lamberti*, Vig. et H. - White, *Journ. t. in p.* 256. fig. inf. - Philip. *Voy. t. p.* 157. mas. - Lewin, *B. of N. Holl.* t. 15. - Jard. et Selb. *Ill. Orn.* t. 72. 2. - Gould, Austr. III. t. 24. *ex Austr. sept. et or.*
 - 8. *M. leucopterus*, Quoy et G. - Zool. *Uran.* t. 23. 2? Gould, Austr. III. t. 25. *ex Austr. mer. et centr.*

9. **M. melanocephalus**, Vig. et H. - (*M. browni*, Jard.
nec Gould.) *Selb. Ill. Orn.* t. 72. 1. - *Gould, Austr.* III.
t. 26. ex *Austr. mer. or.*
10. **M. browni**, Vig. et Horsf. (*cruentatus*, Gould, 1833.)
Austr. III. t. 27. ex *Austr. sept.* *Minimus.*
463. **Amytis**, Less. Australia. 3.
1. **MALURUS textilis**, Quoy et Gaim. (*Amytis textilis*,
Gould.) *Less. Zool. Uran. Ois.* t. 23. 1. - *Gould,*
Austr. III. t. 28. ex *Austr. occ. sept.*
 2. **ANYTIS TEXTILIS**, Less. (*Dasyornis striatus*, Gould.) *Tr.*
Orn. t. 67. 2. - *Gould, Austr.* IV. t. 29. ex *Austr. m. or.*
 3. **ANYTIS macrourus**, Gould, 1833. *Austr.* IV. t. 30. ex
Austr. occ.
464. **Stipiturus**, Less. Australia. 1.
- MUSCICAPA malachura**, Shaw. (*Malurus palustris*,
Vieill.-gularis, Griff.) *Levaill. Afr.* t. 130. 2. - *Linn.*
Trans. IV. t. 21. - *Anim. Kingd.* II. t. p. 39. - *Gould,*
Austr. III. t. 31. ex *Austr. m. Tasmania.*
465. **Dasyornis**, Vig. p. 1830. (*Sphaenura*, *Licht.* 1823. p.) Australia. 2.
1. **MUSCICAPA brachyptera**, Lath. (*Malurus pectoralis*,
Steph. - *Dasyornis australis*, Vig.) *Jard. et Selb. Ill.*
Orn. t. 73. - *Gould, Austr.* III. t. 32. ex *Austr. m. or.*
 2. **D. longirostris**, Gould, *Austr.* III. t. 33. ex *Austr. occ.*
Quid D. brunneus, Gould, *Pr. Zool. Soc.* 1835. p. 150?
466. **Atrichia**, Gould, 1844. Australia. 1.
- Atrichia clamosa**, Gould, *Austr.* III. t. 34. ex
Austr. occ.
467. **Pellorneum**, Sw. 1831. (*Cinclidia?* Gould 1837.) Asia centr. 1.
- P. ruficeps**, Sw. (*Pellorneum olivaceum*, *Jerd.* - *Cincli-*
dia punctata, *Gould* - *Megalurus ruficeps*, *Sykes*) *Madr.*
Journ. 1839. ex *Asia mer.*
468. **Turdinus**, Blyth (Macronus, p. Gr.) Asia merid. 1.
- T. macrodactylus**, Blyth. (*Malacopteron macrodac-*
tylum, *Strickl.* - *Brachypteryx albicularis*, *Hartlaub.*
Macronus macrodactylus, *Gr.*) *Journ. As. Soc.* XIII.
p. 382. ex *Penins. Malacc.*

469. **Xiphorhamphus**, Blyth. 1843. (*Pomatorhinus*, p. *Caban.*
Pomatorhynchus, p. *Gr.*)

Asia centr. 1.

XIPHORHYNCHUS superciliaris, Blyth, 1842. (*hinc Xy-*
phorhamphus superciliaris, 1843. *Cat. sp. 836.*) *Journ.*
As. Soc. xi. p. 175. et XII. p. 947. ex Siki m.

470. **Pomatorhinus**, Ill or s.f. 1820. (*nec Pomatorhynchus, Boie*) *As. m. Ocean. 14.*

1. **P. montanus**, Horsf. *Zool. Res. Java* figura. *ex Java.*

2. **P. ruficollis**, Hodgs. *As. Res. xix. l. p. 182. ex Him. or.*

3. **P. ferruginosus**, Blyth, *J. As. Soc. xix. p. 597. ex Sikk.*

4. **P. phayrei**, Blyth, *Journ. As. Soc. xxii. p. 452. ex Arak.*

5. **P. horsfieldii**, Sykes, 1832. - *Pl. p. 22. ex India m.*

6. **P. melanurus**, Blyth, *Journ. As. Soc. xvi. p. 451. ex
 Ins. Ceylon.*

7. **P. leucogaster**, Gould. (*olivaceus*, *Blyth* - *monta-*
nus ex Assam, *Horsf. 1829.*) *Pr. Zool. Soc. 1837. p. 137.*
ex Asia centr. et orient.

8. **P. schisticeps**, Hodgs. *As. Recherch. xix. l. p. 181.*
ex Asia centr. et orient.

9. **P. erythrogenys**, Vig. - *Gould, Cent. Himal. B.*
t. 55. ex Asia centr.

10. **P. hypoleucus**, Blyth. (*Orthorhinus hypoleucus*, *Bl.*
juv.) *As. Soc. xiii. p. 371. et xiv. p. 590. ex Arakan.*

11. **P. temporalis**, Vig. et H. (*trivirgatus*, *Temm.* - *Tur-*
dus frivulus? *Lath.*) *Pl. col. 443. - Jard. et Selb. Ill.*
Orn. t. 69. - Gould, Austr. iv. t. 20. ex Austr. or.

12. **P. rubeculus**, Gould, 1839. *Austr. iv. t. 21. ex Austr. s.*

13. **P. superciliosus**, Vig. et H. - *Gould, Austr. iv.*
t. 22. ex Austr. mer.

14. **P. geoffroyi**, Less. *Zool. Coq. t. 29. 2. ex Ocean.*

SUBFAM. 77. TROGLODYTINAE.

471. **Thryothorus**, Vieill. 1816. (*Troglodytes*, p. *Gr.*) America. 2^o

a. AMERICANI SEPTENTRIONALES.

1. **SILVIA ludoviciana**, Lath. (*Certhia caroliniana*, *Wils.*

Thryothorus littoralis, *Vieill.* - *Thryothorus ludovicia-*
nus, *Bp.*) *Pl. enl. 730. 1. - Am. Orn. t. 12. 5. - Audub.*
Amer. t. 78. ex Amer. sept. or. et mer.

2. **T. arundinaceus**, Vieill. (*Thryothorus palustris*, *Bp.*
Certhia palustris, *Wils.*) *Ois. Am. s. t. 108. - Am. Orn.*
t. 12. 4. - Aud. Amer. t. 100. ex Am. s. or. et m.

3. **TROGLODYTES bewicki**, Aud. (Thryothorus bewicki, Bp.)*Aud. Am. t. 18. ex Pensylv. centr. Mont. Sax. occ.**Quid T. stellaris, Licht. Naum. V. Deutschl. m. p. 724. ex Carol?**b. MEXICANI.*4. **T. maculipectus**, Laf. *Rev. Zool.* 1845. p. 338. *ex Mex.*5. **T. leucotis**, Laf. *Rev. Zool.* 1835. p. 338. *ex Mexico.*6. **T. rufalbus**, Laf. *Rev. Zool.* 1845. p. 337. *ex Mex.*7. **T. mexicanus**, Licht. *nec Sie.* (*albicollis?*) *Cuv.* - *gut-*
tulatus, Hartl. - *Thryothorus guttulatus? Laf.* *ex Mex.*8. **Terythrophthalmus**, Licht. *Pr. Verz. Säug. Vög.*9. **T. deflexus**, Licht. - *Preis Verz. der Säug. u. Vög.*10. **T. albiniucha**, Cabat. *Pr. Bost. N. Hist.* 1847. p. 257.*c. AMERICANI MERIDIONALES.*11. **T. rutilus**, Vieill. (*Troglodytes rutilans, Sie.*) *B. of*
*Braz. t. 15. ex Amer. m. or.**12. **T. eidouxi**, Bp. - *Voy. Pole Sud. Ois.* t. 19. 6. *Bras.*13. **T. melanos**, Vieill. (*Troglodytes melanos, Gm.*) *N.*
*Dict. H. Nat. xxxv. p. 56. ex Bras.*14. **T. polyglottus**, Vieill. *ex Azara* 151. (*Troglodytes*
polyglottus, Gr. - T. omnisonus, Licht.) *Nouv. Dict.*
*H. N. xxxv. p. 59. ex Bras. mer. Parag.*15. **T. striolatus**, Spix. *Av. Bras.* t. 79. 2. - *Sv. B. of*
*Braz. t. 16. ex Bras.*16. **TURDES coraya**, Gm. (*Troglodytes coraya, Gr.*) *Pl. enl.*
701. 1. - *Spix. Av. Bras. t. 73. 2. ex Brasil.*17. **T. modulator**, Laf. - *Orb. Voy. Am. m. Ois.* p. 230.18. **T. fusciventris**, Laf. *Rev. Zool.* 1845. p. 337.
*ex Bogota.*19. **T. rosaceus**, Less. *Rev. Zool.* 1840. p. 262. *ex Chili.*20. **T. genibarbis**, *Sv. Two Cent. and a Quarter*, p. 323.21. **T. striatulus**, Laf. *Rev. Zool.* 1845. p. 338. *ex Bog.*22. **T. interscapularis**, Licht. *in Erman Reise Zool.*
p. 13. *ex Brasil.*472. **Troglodytes**, Vieill. 1807. (*Anorthura, Rennie.*) Eur. As. Afr. Am. 21.*a. ORBIS ANTIQUA.*

1. **MOTACILLA TROGLODYTES**, L. (**T. europaeus**, Cuv. - *par-*
vulus, Koch. - *regulus, Meyer.* *ex Br. nec L.* - *vulgaris et*
fumigatus Europei, Temm. - *Sylvia troglodytes, Lath.*
Anorthura troglodytes, Rennie.) *Pl. enl.* 65, 1. *Gould,*
Eur. t. 130. ex Eur. As. Afr. sept.

2. **T. fumigatus**, Temm. Mus. Lugd. ex Japon. Corribus obscurioribus vis distinctus!
3. **T. nepalensis** et subhimalayanus, Hodgs. Cat. Mamm. et B. 1846. App. p. 151. ex Asia centrali. Nepal.
4. **T. punctatus**, Blyth, Journ. As. Soc. xiv. p. 589. ex As. centr. Darjeeling.

b. AMERICANI SEPTENTRIONALES.

5. **T. hyemalis**, Vieill. (sylvia troglodytes, Wils.) Am. Orn. t. 8. 6. - Aud. B. of Am. t. 300. 1. 2. 3. ex Am. s. or. hyem. tantum frigidior. merid.
6. **T. aedon**, Vieill. (Sylvia domestica, Wils.) Ois. Am. s. t. 107. - Am. Orn. t. 8. 3. - Audub. Am. t. 83. ex Am. s. or.
7. **T. americanus**, Audub. (sylvestris, Gambel.) B. of Amer. t. 179. ex Am. s. or.
8. **T. parkmanni**, Audub. B. of Amer. t. Suppl. ex Am. s. occ. Flum. Columb.
9. **T. brevirostris**, Nuttal. - Audub. B. of Amer. t. 175. ex Am. s. or. a Nova-Anglia ad Floridam: hibernat in Carolina.
10. **T. leucogaster**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1836. p. 89. ex Mexico, Tamaulipa.

c. AMERICANI MERIDIONALES.

11. MOTACILLA *furva*, Gm. (Troglodytes furva, Licht.) Brown, Ill. t. 18. ex La Plata, Buenos Ayres.
12. **T. hornensis**, Less. 1834. (magellanicus, Gould. 1836.) Proc. Zool. Soc. 1836. p. 85. ex Patagonia, Chili.
13. SYLVIA *platensis*, Lath. (Troglodytes hyemalis et fulvus, Orb. nec Auct. - T. musculus, Licht. ex Azara 150. T. platensis, Less.) Pl. entl. 730. 2. ex Parag. Patagon.
14. **T. chilensis**, Less. (guereza, Cuv.) Voy. Coquille 1. p. 662. ex Patagonia.
15. **T. acquinocialis**, Sw. B. of Brazil. t. 13. ex Br.
16. **T. spilurus**, Vig. Zool. Beachey's Voy. B. t. 4. 1.
17. **T. tessellatus**, Orb. et Laf. Syn. Av. p. 25. Peru.
18. **T. pallidus**, Orb. et Laf. Syn. Av. p. 25. Patag.
19. **T. guarayanus**, Orb. et L. Syn. Av. p. 24. Boliv.
20. **T. murinus**, Less. Rev. Zool. 1844. p. 434. ex Peru.
21. **T. audax**, Tschudi, Fauna Peruana p. 22. ex Peru.

473. **Ramphocinclus**, Lafr. 1843. (Herminierus, Less. - Campylorhynchus, p. Gr.)

America trop. 3.

1. **TURDUS brachyurus**, Vieill. (Campylorhynchus brachyurus, Gr. - Ramphocinclus brachyurus, Lafr.) Rev. Zool. 1843. p. 66. ex Ins. S. t. Dominic.
2. **Ramphocinclus gutturalis**, Lafr. (Thryothorus gutturalis, Less. - Campylorhynchus gutturalis, Gr.) Rev. Zool. 1843. p. 67. sp. 3. ex Antill.
3. **TURDUS variegatus**, Gm. (scolopaceus, Licht. - Thryothorus longirostris, Vieill. - Opetiorhynchus turdinus? Wied. - Ramphocinclus tremulus, Lafr. - Herminierus guadelupensis et insastus, Less.) Gal. Ois. t. 168. Griff. Anim. Kingd. fig. mala. - Spix, Av. Bras. t. 79. 1. ex Antill.

474. **Campylorhynchus**, Spix. 1824. (Cychla, Wagl. 1827.

Picolaptes, Lafr. nec Less.)

America trop. 12.

1. **C. nuchalis**, Caban. Orn. Not. 1. p. 106. ex Venezuela.
2. **PICOLAPTES zonatus**, Less. (Campylorhynchus zonatus, Gr.) Cent. Zool. t. 70. ex Mexico.
3. **PICOLAPTES zonatoides**, Lafr. (Campylorhynchus zonatoides, Gr.) Rev. Zool. 1846. p. 92. ex Columbia.
4. **PICOLAPTES megalopterus**, Lafr. 1845. (Campylorhynchus megalopterus, O. des Murs) Pl. p. 54. ex Mexico.
5. **PICOLAPTES brunneicapillus**, Lafr. Campylorhynchus brunneicapillus, Gr.) Mag. Zool. 1833. Ois. t. 43.
6. **THRYOTHORUS guttatus**, Gould. (Campylorhynchus guttatus, Gr.) Proc. Zool. Soc. 1836. p. 39. ex Mexico.
7. **PICOLAPTES capistratus**, Less. 1842. (Campylorhynchus capistratus, Gr. - Picolaptes rufinucha, Lafr. - Campylorhynchus rufinucha, Lafr. 1845.) O. des Murs, Pl. p. 63. ex Mexico.
8. **PICOLAPTES brevirostris**, Lafr. (Campylorhynchus brevirostris, Gr.) Rev. Zool. 1845. p. 339. ex Bogota.
9. **PICOLAPTES cinnamomeus**, Lafr. (Campylorhynchus cinnamomeus, Gr.) Rev. Zool. 1844. p. 433. ex Guayaq.
10. **PICOLAPTES pallescens**, Lafr. (Campylorhynchus pallescens, Gr.) Rev. Zool. 1846. p. 93. ex Mexico.
11. **PICOLAPTES unicolor**, Lafr. Campylorhynchus unicolor, Gr.) Rev. Zool. 1846. p. 93. ex Guarayas.
12. **PICOLAPTES unicoloroides**, Lafr. (Campylorhynchus unicoloroides, Gr. Rev. Zool. 1846. p. 316. ex Bolivia.

475. **Cyphorhinus**, Caban. 1844. America mer. 4.

1. **C. thoracicus**, Tschudi (Platyurus affinis, Sw.) Braz. B. t. 57. ex Brasil.
2. **TURDUS cantans**, Gm. (Platyurus rubecula et Thryothorus carinatus, Sw. - Cyphorhinus carinatus, Tschudi C. cantans, Caban. 1847.) Pl. enl. 706. - Braz. B. t. 14.
3. **TROGLODYTES leucophrys**, Tschudi. (Cyphorhinus leucophrys, Caban.) Faun. Peruan. p. 185. ex Am. m. occ.
4. **TROGLODYTES leucostictus**, Licht. (Cyphorhinus leucostictus, Cab.) Orn. Not. I. p. 106. sp. 1. ex Guyan. Mex.

476. **Salpinetes**, Caban. 1847. (Thryothorus, p. Gr.) America occ. 2.

1. **TROGLODYTES obsoletus**, Say. (latifasciatus, Licht. Myiothera hinc Thryothorus obsoletus, Bp. - Salpinetes obsoletus, Caban.) Am. Orn. t. 1. 2. - Aud. Am. t. 360. 4. ex Amer. sept. occ.
2. **THRYOTHORUS mexicanus**, Sw. (Troglodytes mexicanus, Gr. - murarius, Licht. - Salpinetes mexicanus, Caban.) Orn. Nat. II. p. 324. sp. 2. ex Mexico.

477. **Tatare**, Less. Polynesia. 2.

1. **SITTA OTOTARE**, Less. (**Tatare otaitiensis** et fusca? Less.) - Tatare longirostris, Gr. ex Gm! - Oriolus murase, Forst.) Voy. Coq. Ois. t. 20. 2. ex Ins. Otaheiti. Fuscus, flavo intermixtus; subtus sulphureus; rostro brevior, rectiusculo.
2. **THRYOTHORUS luscinius**, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. p. 202. t. 5. 2. ex Arcip. Mariann. Inseln. Guam. Uniformiter fuscus, subtus albidus vix flavescens: alis brevibus: rostro longo, curvo.

FAMILIA 37. CERTHIIDAE.

SUBFAM. 79. CERTHIINAE.

478. **Certhia**, L. Eur. As. Am. s. 7.

1. **C. familiaris**, L. (scandulosa, Pallas. - brachidactyla? Natter.) Pl. enl. 681. - Gould, Eur. t. 237. ex Europe.
- * 2. **C. nattereri**, Bp. (costae, Parsud.) Fig. nulla. Mus. Selysan. Longchamp. ex Sabaudia, Helvetia. Minor: albicans nec rufescens: rostro nigerrimo: speculo alari anteposito: tectricibus caudae inferioribus candidis.

3. *C. familiaris*, Wils. (*americana*, Bp. - *Amer. Orn.*
t. 8. l. - *Aud. Am.* t. 419, ex *Amer. sept.*

4. *C. nepalensis*, Hodgs. (*himalayana*, Blyth. nec *Vig.*)
Journ. As. Soc. xiv. p. 581, ex *Nepal.*

5. *C. himalayana*, Vig. (*asiatica*, Sw.) *Pr. Zool. Soc.*
1831. p. 171, ex *Mont. Himal. Deyra doon.*

6. *C. discolor*, Blyth, *Journ. As. Soc.* xiv. p. 580, ex *Sikim.*
Species novae ex *Asia centrali* a Gouldo in *eximio*
opere The Birds of Asia describendae.

479. **Caudodromus**, Gr.

Asia centr. 1.

C. gracilis, Gr. (*Rimator malacoptylus*, Blyth. - *Meroa jerdoni*, Hodgs.) *Proc. Zool. Soc.* 1847. - *Gr. et Mitch. Gen. B.* t. 44. 2. ex *Darjeeling.*

480. **Salpornis**, Gr.

Asia merid. 1.

CERTHIA spilonota, Franklin. (*Salpornis spilonota*, Gr.)
Pr. Zool. Soc. 1831. p. 121. - *Gr. et Mitch. Gen. B.*
t. 44. 1. ex *Bengal.*

481. **Tichodroma**, Ill. (*Petrodroma*, Vieill.)

Eur. Asia. 2.

1. *CERTHIA muraria*, L. (*Tichodroma phaenicoptera*, Temm.
europea, Steph.) *Pl. ent.* 782. - *Gould, Eur.* i. 239.
ex *Europa m. Asia occ.* *Genis abdomine que cinereis;*
gula tantum abrupte nigra; rostro longiore.

* 2. *T. nepalensis*, Bp. (*muraria*, Hodgs.) *Cat. B. of Nepal.*
Mus. Lugd. ex *Asia centr.* *Genis abdomine que nigri-*
cantibus; gula sensim vix nigriore; rostro breve.

482. **Climacteris**, Temm.

Austral. 6.

1. *CERTHIA leucophaea*, Lath. (*leucoptera?* Vieill. - *pi-*
cumnus, Ill. - *Climacteris picumnus*, Temm. - *Cl. leuco-*
phaea, Gr.) *Pl. col. t.* 281. l. - *Gould, Austr.* iv. t. 98.
ex *Austr. orient. ex mer.*

2. *C. scandens*, Temm. (*Petrodroma bailloni*, Vieill.) *Pl.*
col. 281. 2. - *Kittl. Kupf. Vög. t. 6. l.* - *Austr. iv. t. 93.*
ex *Austr. or.*

3. *C. erythrops*, Gould, 1840. *Austr. iv. t. 95.* ex *Austr. m.*

4. *C. rufa*, Gould, 1840. *Austr. iv. t. 94.* ex *Austr. occ.*

5. *C. melanura*, Gould, 1842. *Austr. iv. t. 97.* ex *Austr. s.*

6. *C. melanotus*, Gould, 1846. *Austr. iv. t. 96.* ex *Austr. s.*

SUBFAM. 78. SITTINAE.

483. **Acanthisitta**, Lafr. Nova Zeland. 2.

1. MOTACILLA *longipes*, Gm. (Acanthisitta longipes, Gr.)
Zool. Ereb. et Terr. Av. t. 3. 1. ex Nov. Zealand.
2. SITTA *chloris*, Sparrm. (Acanthisitta tenuirostris, Lafr.)
Motacilla citrinella, Forst. - citrina, Gm. - Sitta punctata,
Quoy et Gaim. jun. - Acanthisitta chloris, Gr.) Mus.
Carls.t.33. - Zool. Ereb. et Terr. B. t. 3. 2. - Mag. Zool.
1842. t. 27. - Voy. Astrol. Ois. t. 18. 1. ex Nov. Zeel.

484. **Sittella**, Sw. Australia. 4.

1. SITTA *chrysopetra*, Lath. Gen. Syn. cum fig. - Gould,
Austr. iv. t. 101. ex Austr. mer. orient.
2. *S. pileata*, Gould. (Sitta melanocephala, Gould nec
Vieill.) Pr. Zool. Soc. 1837. p. 151. Austr. iv. t. 104.
ex Austr. occ. mer.
3. *S. leucocephala*, Gould, 1837. Austr. iv. t. 102. ex
Austr. sept.
4. *S. leucopetra*, Gould, 1839. Austr. iv. t. 103. Austr. s.

485. **Dendrophila**, Sw. (Orthorhynchus, Horsf. - Sitta, p. Gr.) Asia m. Oc. 4.

1. SITTA *frontalis*, Horsf. (velata, Temm.) Pl. col. 72. 3.
Sw. Ill. Orn. t. 2. ex Java.
2. SITTA *corallina*, Hodgs. (Dendrophila frontalis ex India,
Blyth.) Journ. As. Soc. v. p. 779. ex Asia mer.
3. *D. flavipes*, Sw. (Sitta azurea? Less. - S. flavipes, Gr.)
Gr. et Mitch. Gen. B. t. 45. ex Asia centr.
4. SITTA *gymnophrys*, Kuhl. ex Asia centr.

486. **Callisitta**, Bp. (Sitta p. Gr.) Asia centr. 1.

- SITTA *formosa*, Blyth, 1843. Gould, B. of Asia 1. t. 7.
ex Asia centr. Maxima; formosior; sed typical!

487. **Sitta**, L. Eur. As. Am. s. 12.

a. EUROPAEAE.

1. *S. europaea*, L. nec Auct. (uralensis, Licht. - euro-
pea var. sibirica, Pall. - sericea, Temm. - asiatica, Gould
ex Temm!) Gould, Eur. t. 236. - Wright, Scenska Fogl.
fig. bona. - Nilss. Illum. Fig. Skandin. Faun. fig. ex
Eur. s. et or. As. s. et oce. Subtus albo, abdomine rufes-
cente; rectricibus lateribus nigris, apice albis.

2. **S. caesia**, Wolf et Meyer. (europaea, Auct. nec L. - affinis, Blyth.) Pl. enl. 923. 1. - Gould, Eur. t. 234. - Bp. Faun. It. fig. - Graba, Fogl. Nord. figura optima hujus speciei quamvis Av. sept. ex Eur. m. et occ. Subtus rufescens: rectricibus lateribus nigris, apice albis.
3. **S. syriaca**, Ehrenb. (neumayeri, Michahell. - saxatilis, Schinz. - rupestris, Temm. - rufescens, err. Gould.) Bp. Faun. It. fig. - Gould, Eur. t. 235. ex Europa m. et As. occ. Subtus alba, abdomine rufescens; rectricibus plumbeis unicoloribus.

b. ASIATICAE.

- * 4. **S. roseolia**, Bp. ex Japonia. Subtus alba, lateribus crisoque pulchre castaneo-rosae!
5. **S. himalayensis**, Jard. (indica, Burt. - himalayana, Blyth.) Selby, Ill. Orn. t. 146. ex Asia centr. Subtus rufescens: rectricibus mediis macula centrali alba!
6. **S. castaneiventris**, Franklin, 1831. (castanea, Less. ferrugineiventris, Gould, 1840.) Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 145. - Guer. Icon. t. 23. 3. - Gould, Asia l. t. 9. ex Asia centrali. Minor: pileo dorso concolore: subtus fuscocastanea: rostro compresso.
7. **S. nepalensis**, Hodgs. 1831. (cinnamomeiventris, Blyth. 1842. - vitticauda, Jameson.) Gould, Asia l. t. 8. ex Asia cent. Nepal. Major: pileo dorso dilutiore: subtus intense castanea: rostro depresso.
8. **S. leucopsis**, Gould. (castanilia, Bp. in litt.) B. of Asia l. t. 10. ex Asia centrali. Fusca: pileo nigro: subtus cum genis alba; lateribus crisoque castaneis.

c. AMERICANAEE SEPTENTRIONALES.

9. **S. carolinensis**, Lath. (jamaicensis? L. - melanocephala, Vieill.) Sloane, Jamaica, t. 254. 1. - Gal. Ois. t. 71. - Wils. Am. Orn. t. 2. 3. - Aud. Am. t. 152. ex Amer. sept.
10. **S. canadensis**, Lath. (stulta, Vieill. - varia, Wils.) Pl. enl. 623. 2. - Wils. Am. Orn. t. 2. 4. - Aud. Am. t. 105. ex Amer. sept.
11. **S. pusilla**, Lath. (carolinensis minor, Br.) Wils. Am. Orn. t. 15. 2. - Aud. Am. t. 125. ex Amer. sept.
12. **S. pygmaea**, Vig. Zool. Beach. Voy. p. 25. t. 4. 2. Aud. Am. t. 419. ex Amer. occ. Monterey.

FAMILIA 38. PARIDAE.

SUBFAM. 31. PARINAE.

488. **Certhiparus**, Lafr. nec Hodgs. Nova Zelandia. 3.

1. **PARUS norae zealandiae**, Gm. (urostigma, Forst.) *Voy. Ereb. et Terr. B. t. 5. 1. ex Nova Zel. s.*
2. **PARUS albicillus**, Less. (senilis, Dubus. - Certhiparus albicillus, Gr.) *Voy. Ereb. et Terr. B. t. 5. 2. N. Z. sept.*
3. **PARUS ZELANDICUS**, Quoy et Gaim. (**Certhiparus maculicaudus**, Gr.) *Voy. Astrol. Ois. t. 11. 3.*
Vix hujus generis, an Parina Avis?

489. **Melaniparus**, Bp. (Parus, p. Gr.) Africa. 6.

3. **P. niger**, Vieill. (luctuosus, Licht.) *Lev. Afr. t. 137. 1.*
ex Africa mer.
4. **P. leucomelas**, Rüpp. *Faun. Abyssin. t. 37. 2. ex Africa orient.*
5. **P. leucopterus**, Sw. *B. of west. Afr. ex Afr. occ.*
6. **P. leuconotus**, Guér. 1843. (dorsatus, Rüpp.) *Syst. Vög. Nord-Ost. Afr. t. 18. ex Afric. or.*

490. **Lophophanes**, Kaup. (Megistina? Vieill. - Parus, p. Gr.) Eur. As. Am. s. 2.

1. **PARUS bicolor**, L. (Lophophanes bicolor, Kaup.) *Cat. t. t. 57. - Wils. Am. Orn. t. 3. 5. - Aud. Amer. t. 39. - Gould, Eur. t. 152. ex Amer. s. pres. bor. Species Danielis quia Groenlandica, Rossica quia Americana ditio-nis Rossici Imperii, minime vero Europaea!*
Quid Parus ignotus, Brunn. - stromaei, Lath?
2. **PARUS cristatus**, L. (Lophophanes cristatus, Kaup.) *Pl. enl. 502. 2. - Gould, Eur. t. 156. ex Eur. centr.*
Species crista instructae, vix autem congeneres!

491. **Parus**, L. Cosmop. 17.

A. CRISTATI. ASIATICI.

1. **P. melanolophus**, Vig. 1831. - Gould, Cent. Himal. B. t. 30. 2. *ex Asia centr.*
2. **P. MELANOLOPHUS**, Hodgs. nec Vig. (**rubidiventris**, Blyth. 1847.) *Journ. As. Soc. XVI. p. 445. ex Nepal.*
3. **P. xanthogenys**, Vig. 1831. (aplonotus, Blyth.) Gould, Cent. Himal. B. t. 29. 1. *ex Asia centr.*
4. **P. XANTHOGENYS**, Blyth, nec Vig. (spilonotus, Blyth) *Journ. As. Soc. XVI. p. 444. ex Darjiling.*

B. NON CRISTATI. Asiatici.

5. **P. dichrous**, Hodgs. Journ. As. Soc. Beng. 1844.
p. 943. ex Nepal.
6. **P. rufonuchalis**, Blyth. Journ. As. Soc. XVIII.
ex Simla.
7. **P. quadricinctatus**, Laf. Rev. Zool. 1840. p. 129.
ex Asia or.
8. **P. varius**, Temm. et Schl. Faun. Jap. t. 35. ex Japon.
9. **P. minor**, Temm. et Schl. Faun. Japon. t. 33. ex Japon.
10. **P. monticola**, Vig. 1831. - Gould, Cent. Him. B.
t. 29. 2. ex Asia centr.
11. **P. bokharensis**, Jaubert, Bull. Sc. Nat. ix. p. 77.
ex Asia centr. occ.

c. Oceanicus.

12. **P. cinereus**, Vieill. (Parus aticeps, Horsf. - nepalensis? Hodgs. - caesius? Tickell - schistinotus? Hodgs.
Pl. col. 287. 2. - Lev. Afr. t. 139. 2. ex Asia mer?
Malaiasia.)
- d. Africani.
13. **P. cinerascens**, Vieill. - Lev. Afr. t. 138. Afr. m.
14. **P. fuscus**, Vieill. - Lev. Afr. t. 139. 1. ex Afr. mer.
15. **P. ledouci**, Malherb. Mém. Acad. Metz, 1842. ex
Africa sept.

e. Europaei.

16. **P. major**, L. (fringillago, Pall.) Pl. enl. 3. 1. - Gould,
Eur. t. 150. ex Eur. Asia occ.
17. **P. ater**, L. (carbonarius, Pall.) Gould, Eur. t. 155. 1.
Naum. Vog. Eur. t. 24. f. 46. ex Eur. Asia.

492. **Cyanistes**, Kaup. (Parus, p. Gr.) Eur. As. Afr. 3.

1. **P. caeruleus**, L. (Cyanistes caeruleus, Kaup.) Pl.
enl. 3. 2. - Gould, Eur. t. 154. ex Europa.
2. **P. ultramarinus**, Bp. (teneriffae? Less. - violaceus,
Levaill. jun. - caeruleanus, Malherb. 1842.) Rev. Zool.
1841. p. 146. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 52. ex Afric.
sept. et occ.
3. **P. cyaneus**, Pall. (saabyensis, Sparrm. - Kujaesk.,
Gm.) Nov. Comm. Petrop. XIV. t. 23. 3. - Mus. Carls.
t. 25. - Gal. Ois. t. 68. - Gould, Eur. t. 153. ex
Eur. sept. orient. Asia sept.

493. **Poecilla**, Kaup. (Parus, p. Gr.)

Eur. As. Afr. Oc. 15.

a. EUROPAEI.

1. **P. sibiricus**, Gm. (einclus, Gr. ex Bodd. - japonicus et lathami? Steph.) Pl. enl. 708.3. - Gould, Eur. t. 151.2. ex Europa sept. or. Asia sept.
2. **P. lugubris**, Natterer. - Gould, Eur. t. 151. 1. ex Eur. mer. or. Dalmatia. Similis praecedenti, sed sane diversus!
3. **P. palustris**, L. (Poecilla palustris, Kaup.) Pl. enl. 3.3. Gould, Eur. t. 155. 2. ex Europa.
4. **P. borealis**, Selys, Bull. Acad. Brux. x. p. 28. ex Europa bor.
- 5? **P. frigoris**, Selys, Bull. Acad. Brux. x. p. 29. ex Europa bor.

b. AMERICANI SEPTENTRIONALES.

6. **P. atricapillus**, L. (hudsonicus, Mill. jun. - palustris var. β. Lath. - septentrionalis? Harris, 1846.) Br. Orn. III. t. 29. 1. - Pl. enl. 502.1. - Cimel. Phys. t. 21. d. jun. - Wils. Am. Orn. t. 8. 4. - Audub. Amer. t. 353.3.4. adult. t. 194. jun. ex Amer. s. bor.
7. **P. carolinensis**, Audub. Amer. t. 160. ex Am. s. m.
8. **P. melanotis**, Sandb. Report. Br. Assoc. VI. p. 99. Hartl. Rev. Zool. 1844. p. 216. ex Mexico, Guatém.
9. **P. rufescens**, Townsend. - Aud. Amer. t. 353. 1.2. ex Amer. sept. occ.
10. **P. minimus**, Townsend - Aud. Amer. t. 353. 5. 6. ex Amer. sept. occ.

c. ASIATICI NON EUROPAEI.

- * 11. **P. kamtschatkensis**, Bp. (Parus palustris ex Kamtschatka, Mus. Lugd.) ex Asia or. Major: albo-canescens: cauda longissima. Species pulcherrima et distinctissima.
12. **P. nuchalis**, Jerd. Madr. Journ. Sc. 1844. p. 131. ex Asia mer.
13. **Sira rinippectus**, Hodgs. (Leiothrix vinipectus, Gr. Parus vinipectus, Bp.) Blyth, Cat. 515. ex Himal. Nep.
14. **P. jouchistos**, Hodgs. Journ. As. Soc. Beng. 1844. p. 943. ex Nepal.
15. **P. erythrocephalus**, Vig. 1831. (Orites erythrocephalus, Blyth.) Cat. sp. 550. - Gould, Cent. Him. B. t. 30. 1. Quid P. elegans, Less. Tr. Orn. p. 456? - P. griffithii, Blyth. 1827? Quid P. ferrugineus, Sund. N. S. Fn. et Fl. Fenn. 1848. t. 1? Quid P. alpinus, Gm. ex Persia unque posteriore longissimo?

494. **Mecistura**, Leach. 1816. (Orites, Moehr. - Acredula, Koch. - Paroides, Brehm.) Eur. Asia s. 2.
 1. **PARUS caudatus**, L. (longicaudus, Br. - Mecistura va-
gans, Leach.) Pl. enl. 502. 3. - Gould, Eur. t. 157.
ex Europa.
 2. **PARUS trivirgatus**, Temm. et Schleg. Faun. Japon.
Av. t. 34. ex Japon.
495. **Psaltria**, Temm. (Parus, p. Gr.) Oceania. 1.
Psaltria exilis, Temm. (Parus exilis, Gr.) Pl. col.
 600. 4. *ex Java. Minima avis, genere distinctissima!*
596. **Panurus**, Koch. (Calamophilus; Leach. 1816. - Mystaci-
nus, Boie. - Paroides! p. Gr.) Eur. m. Afr. 1.
PARUS biarmicus, L. (barbatus, Br. - russicus, Gm.
Panurus biarmicus, Koch. - Paroides biarmicus, Gr.)
Pl. enl. 618. 1. 2. - Gould, Eur. t. 158. ex Europa.
497. **Ægithalus**, Vig. 1825. (Paroides, Koch. 1810. - Penduli-
nus, Brehm.) Eur. As. Afr. 4.
 1. **PARUS pendulinus**, L. (narbonensis, Gm. - Paroides
pendulinus, Gr.) Pl. enl. 618. 3. et 708. 1. - Jard. Ill.
Orn. t. 113. 2. - Gould, Eur. t. 159. ex Eur. mer.
 2. **PARUS capensis**, Gm. (Paroides capensis, Gr.) Sonn.
Voy. t. 115. ex Africa mer.
 3. **PARUS smithi**, Jard. (Paroides smithi, Gr.) Edinb. J.
Nat. Sc. n. s. t. 5. - Ill. Orn. t. 113. 1. ex Afr. m.
 4. **PARUS pensilis**, Licht. (Paroides pensilis, Gr.) *ex Afr. m.*
 5. **PARUS flammeiceps**, Burton. (Dicæum sanguinifrons,
Hay. - Aegithalus flammeiceps, Blyth, Cat. sp. 553. *ex*
Asia centrali, Masuri.

FAMILIA 39. TANAGRIDÆ.

SUBFAM. 82. EUPHONINÆ.

498. **Piproidea**, Sw. (Euphonia, p. Gr.) America mer. 1.
P. cyanea, Sw. (Euphonia cyanea, Gr.) Mag. Nat. H. 1827.
499. **Pipreola**, Sw. (Euphonia, p. Gr.) America mer. 1.
P. chlorolepidota, Sw. (Euphonia chlorolepidota,
Gr.) Magaz. Nat. Hist. 1837.

500. **Proenias**, Ill. 1811. (Tersina, Vieill. - Tersa, Gr. ex Vieill.) America trop. 1.
AMPELIS TERSA, L. (*Hirundo viridis*, Temm. faem. - Proc. nias **ventralis**, Ill. - *cyanotropus*, Wied. - *hirundinacea*, Temm. - Tersina caerulea, Vieill. - Tersa cayana, Steph. - *T. ventralis*, Gr.) *Gal. Ois. t. 110.* - *Zool. Ill. t. 28.* - *Lath. Hist. B. t. 85**. - *Pl. col. 5. 1. mas 2. faem.*
501. **Cypsnagra**, Less. (Leucopygia, Sw.) America mer. 1.
C. ruficollis, Gr. ex Licht. (*hirundinacea*, Less. - *Leucopygia ruficollis*, Sw.) *Cat. Berl. Mus. sp. 330. ex Brasil.*
502. **Procnopis**, Caban. 1844. America mer. 1.
TANAGRA melanota, Vieill. ex Azara 104. (*vittata*, Temm. *Calliste vittata*, Hartl.) *Pl. col. 43. 1. mas 2. faem. ex Bras.*
503. **Euphona**, Desmar. 1805. America calid. 24.
1. **PIFRA musica**, Gm. (*Parus musicus*, Lath. - *Tanagra musica*, Auct. - *Euphona musica*, Desmar. - *Eup. caeruleocephala*, Sw.) *Pl. enl. 809. 1. - Hist. Nat. Tang. t. 19.* mas 20. faem. ex *Antill.*
 2. **PIFRA elegantissima**, Bp. (*caelestis*, Dubus.) *Pr. Zool. Soc. 1827. p. 112. sp. 28. ex Mexico m.*
 3. **E. olivacea**, Desmar. *Hist. Nat. Tangar. t. 27. ex Cayenna*, an adult? *Minor.*
 4. **FRINGILLA violacea**, L. (*Pipra grisea?* et *Tanagra violacea*, Gm. - *Euphonia violacea*, Desm.) *Pl. enl. t. 114. 2. Hist. Nat. Tang. t. 21.* mas 22. faem. 23. jun. 24. faem. jun. ex *Bras. Guian.*
 5. **E. hirundinacea**, Bp. *Pr. Zool. Soc. 1837. p. 117. sp. 22. ex Guatemala.*
 6. **E. laniirostris**, Lafr. - *Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 22. 1. ex Bolivia.*
 7. **E. ruficeps**, Lafr. - *Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 22. 2. ex Bolivia.*
 8. **TANAGRA chlorotica**, L. (*violacea* var. *chlorotica*, Gm. *chrysogastra*, Cuv. ex Azara 99. - *Euphonia chlorotica*, Desm.) *Pl. enl. 114. 1. - Svensk. Akad. 1833. t. 10. 3. 2. II. Nat. Tang. t. 25.* jun. 24. ad. ex *Cayenn. Bras.*

9. *E. affinis*, Less. Rev. Zool. 1842. p. 175. ex Realejo.
10. *TANAGRA rufiventris*, Vieill. (*Euphonia rufiventris*, Gr.) Gal. Ois. t. Suppl. ex Bras. Minor.
11. *TANAGRA pectoralis*, Lath. (*Euphonia rufiventris*, Licht. nec Vieill. - *castaneiventris*, Vieill. - *E. pectoralis*, Wagl.) Gal. Ois. t. Suppl. ex Brasil.
12. *TANAGRA cayana*, L. sp. 14. (*cayana*, Gm. - *Euphonia cayennensis*? Desm. nègre. - *Euph. cayana*, Gm.) Pl. enl. 114. 3. - Hist. Nat. Tangar. t. 26. ex Guiana.
13. *TANAGRA viridis*, Vieill. (*Euphonia viridis*, Gr.) Pl. col. 36. 3. ex Brasil. Minor.
- 14? *TANAGRA chlorocyanea*, Vieill. (*Euphonia chlorocyanea*, Gr.) Enc. Meth. p. 781. ex Amer. m.
15. *TANAGRA tephrocephala*, Vieill. (*Euphonia tephrocephala*, Gr.) Enc. Meth. p. 781. ex Ins. S. tae Trinit.
16. *TANAGRA desmaresti*, Vieill. (*Euphonia desmaresti*, Gr.) Enc. Meth. p. 774. ex Brasil.
17. *TANAGRA leucocephala*, Gm. (*albifrons*, Lath. - *Euphonia leucocephala*, Gr.) Seba, Mus. I.t. 36. 6. ex Bras.
18. *TANAGRA aureata*, Vieill. ex Azara 98. (*Euphonia nigricollis*, Vieill. - *E. aureata*, Gr.) Orb. Voy. Am. m. IV. p. 267. sp. 248. ex Parag.
19. *TANAGRA pretrii*, Laf. nec Less. (*Euphonia pretrii*, Gr.) Mag. Zool. 1843. Ois. t. 42. ex Columbia.
20. *E. serrirostris*, Laf. - Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 21. 2. avis. 3. rostrum. ex Bolivia.
21. *E. umbilicalis*, Lesson, Traité Orn. p. 46. sp. 8. ex Brasil.
22. *E. occipitalis*, Dubus, Esq. Orn. t. 14. ex Mexico meridion.
23. *TANAGRA xanthogaster*, Sundev. (*Euph. xanthogastra*, Gr.) Scensk. Akad. 1833. t. 10. 1. ex Bras.
24. *TANAGRA jamaica*, L. (*Euphonia jamaica*, Gr.) Brown. Ill. t. 26. - Gosse, Orn. Ill. Jam. t. 59. m. et f. ex Ant.
25. *TANAGRA aenea*, Sundev. (*chalybea*, Mikan. - *Euphonia pyrrhuloides*, Natter. - *Euph. aenea*, Gr.) Scensk. Akad. 1833. t. 11. 4. - Delic. Flor. et Fa. Bras. figura. ex Brasil. Rostro valido ut in sequenti et in *E. laniirostris*.
26. *E. cinerea*, Laf. Rev. Zool. 1846. p. 277. ex Columb. Rostro valido, bidentato!

504. **Calliste**, Boie, 1826. (*Aglaias, Sw.*, 1827. - *Callospiza, Gr.*, 1840.) Amer. mer. 42.
1. **TANAGRA cayana**, L. sp. s. (*cayanensis*, Gm. - *Calliste cayana*, Hartl. Azara 95.) *Pl. enl.* 201. 2. et 290. l. - *Desm. Tangar.* t. 10. ex *Cayenna*, Bras. Parag.
 2. **TANAGRA gyrota**, L. (*Aglaias chrysoptera*, Sw. - *Calliste gyrota*, Gr.) *Pl. enl.* 133. 2. - *Desm. Tang.* t. 6. mas 7. faem. ex *Brasil.*
 3. **AGLAIA GYROLA**, Sw. (*viridissima*, Laf. - *Calliste desmaresti*, Gr.) *Zool. Ill.* 2. ser. t. 28. ex *Antill.*
 4. **TANAGRA GYROLA**, Wied. (*peruviana*, Desm. - *Aglaias melanotus*, Sw. - *Calliste peruviana*, Gr.) *Desm. Tang.* t. 11. - *Sw. Orn. Dr. B. of Braz.* t. 31. ex *Peru.*
 5. **AGLAIA PERUVIANA**, Sw. nec Desm. (*gyroloides*, Laf. - *Calliste cyanoventralis*, Gr.) *R. Zool.* 1847. p. 277. ex *Peru.*
 6. **TANAGRA flava**, Lath. (*formosa*, Vieill. ex Azara 96. - *Calliste flava*, Gr.) *Sw. Zool. Ill.* fig. bona. ex *Parag.*
 7. **TANAGRA thoracica**, Temm. (*Calliste thoracia*, Gr.) *Pl. col.* 42. 1. ex *Brasil.*
 8. **TANAGRA citrinella**, Temm. (*cyanoventralis*, Vieill. - *elegans*, Wied. - *Calliste citrinella*, Gr.) *Sw. Orn. Dr. B. of Bras.* t. 6. ex *Brasil.*
 9. **TANAGRA punctata**, L. (*Calliste punctata*, Gr.) *Pl. enl.* 133. l. - *Ed. B. t. 262.* - *Desm. Tang.* t. 8. adult. 9. jun. ex *Brasil.*
 10. **TANAGRA festiva**, Shaw. (*tricolor* var. *Lath.* - *trichroa*, *Licht.* - *cyanoccephala*, Vieill. - *Calliste festiva*, Gr.) *Pl. enl.* 33. 2. - *Pl. col.* 215. 2. - *Nat. Misc.* t. 537. *Sw. B. of Braz.* t. 5. - *Kittl. Kupf. Vogt.* t. 31. 2. ex *Bras.*
 11. **TANAGRA tatao**, L. (*Aglaias paradisea*, Sw. - *Calliste tatao*, Gr.) *Pl. enl.* 127. 2. et 7. l. - *Desm. Tang.* t. 1. mas. ex *Cayenna*, Bras.
 12. **TANAGRA tatao**, Wied. (*tricolor*, Gm. - *Calliste tricolor*, Boie.) *Pl. enl.* 33. 1. - *Pl. col.* 215. 1. - *Desm. Tang.* t. 3. mas 4. faem. ex *Brasil.*
 13. **AGLAIA CHILENSIS**? *Vig.* 1832. (*yenê*, Laf. - *Calliste chilensis*, Gr.) *Orb. Voy. Am. m. Ois.* t. 24. 2. ex *Boliv.*
 14. **AGLAIA cucullata**, Sw. (*Calliste cucullata*, Gr.) *Orn. Dr. B. of Braz.* t. 7. ex *Brasil.*
 15. **AGLAIA cyanoptera**, Sw. (*Tanagra argentea*, Laf. 1843. - *Calliste cyanoptera*, Gr.) *Orn. Dr. B. of Braz.* t. 8. ex *Brasil.*
 16. **TANAGRA brasiliensis**, L. (*Calliste brasiliensis*, Gr.) *Pl. enl.* 179. l. ex *Brasil.*

17. AGLAIA *nigricincta*, Bp. (Calliste nigrocineta, Gr.)
Proc. Zool. Soc. 1837. p. 121. ex Peru.
18. TANAGRA *schranki*, Spix. (Aglaia melanotis, Sw.
Calliste schranki, Gr.) Av. Br. t. 51. 1. 2. - Orb. Voy.
Am. m. t. 24. 1. ex Brasil. Bolivia.
19. AGLAIA *caeruleocephala*, Sw. (cyanocollis, Orb.
Calliste caeruleocephala, Gr.) Voy. Am. m. t. 25. 1. Bol.
20. TANAGRA *fastuosa*, Less. (Calliste fastuosa, Gr.) Cent.
Zool. t. 58. ex Brazil.
21. TANAGRA *mexicana*, L. sp. 10. (flaviventris, Vicill.
Calliste mexicana, Gr.) Pl. enl. 290. 2. - Edw. Glean.
t. 350. - Desm. Tang. t. 5. ex Mexico, Brasil.
22. TANAGRA BARBADENSIS, Br. (mexicana var. β . Lath. - Calliste albiventer, Gr.) Pl. enl. 155. 1. ex Guiana.
23. AGLAIA *nigroviridis*, Laf. (Calliste nigroviridis, Gr.)
Mag. Zool. 1843. t. 43. ex Bogota.
24. AGLAIA *labradorides*, Boissonn. (Calliste labradorides, Gr.) Rev. Zool. 1840. p. 67. - Voy. Venezuela. t. 5. 1.
ex Bogota.
25. AGLAIA *vassori*, Boissonn. (diva, Less.) Calliste vassori, Gr.) Mag. Zool. 1841. t. 41. ex Bogota.
26. AGLAIA *parzudakii*, Laf. (Calliste parzudakii, Gr.)
Mag. Zool. 1843. t. 41. ex Bogota.
27. AGLAIA *leclancheri*, Laf. (Calliste leclancheri, Gr.)
Mag. Zool. 1841. t. 42. ex Columbia.
28. AGLAIA *atricapilla*, Laf. Rev. Zool. 1843. p. 290.
ex Columbia.
29. C. *thalassina*, Strickland, Ann. Hist. Nat. 1844.
p. 419. ex Brasil.
30. TANAGRA *calliparaea*, Licht. (Calliste calliparaea,
Tschudi) Faun. Per. p. 28. ex America m. occ.
31. CALLOSPIZA *xanthocephala*, Tschudi. (Calliste xanthocephala, Gr.) Faun. Per. t. 17. 2. ex Amer. m. occ.
32. CALLOSPIZA *pulchra*, Tschudi. (Calliste pulchra, Gr.)
Faun. Per. t. 18. 2. ex Amer. m. occ.
33. PROCNOPIS *atrocacrulea*, Tschudi. (Calliste atrocacrulea, Gr.) Faun. Per. t. 13. 2. ex Amer. mer. occ.
34. PROCNOPIS *argentea*, Laf. 1843. (Calliste argentea, Gr.)
Tschudi, Faun. Per. t. 14. 2. ex Columb. Peru.
35. AGLAIA *aurulenta*, Laf. Rev. Zool. 1843. p. 290. ex Col.
36. TANAGRA *arthus*, Less. Ill. Zool. t. 9. ex Mexico.

37. *Aclaiia wilsoni*, Lafr. 1847. (Calliste wilsoni, Gr.) *O. des Murs Pl. p. 56. 1. ex Peru.*
 38. *Aclaiia fanny*, Lafr. 1847. (Calliste fanny, Gr.) *O. des Murs Pl. p. 56. 2. ex Nova Granada.*
 39. *C. chrysotis*, Dubus, Esq. Orn. t. 7. ex Mexico.
 40. *C. larvata*, Dubus, Esq. Orn. t. 9. ex Mexico.
 41. *Tanagra frugilegas*, Tschudi, Faun. Per. t. 17. 1. ex Amer. mer. occ.
 42. *Tanagra analis*, Tschudi, Faun. Per. t. 18. 1. ex Bol.

SUBFAM. 83. TANAGRINAE.

505. **Tanagrella**, Sw. 1837. (Hypothlypis, Caban. 1847.) Americamer. 3.
1. *Motacilla velia*, L. (Sylvia vicia, Lath. - Tanagrella temnostris, Sw. - T. iridina, Hartlaub, 1841. - T. vicia, Strickl.) Desm. Tang. t. 2. ex Cayenn. Peru. Fronte unicolor; pectore lateribusque cyaneis.
 2. *T. cyanomelas*, Wied. (multicolor, Sw. nec Vieill.) Pl. enl. 669. 3. ex Brasil. Macula frontali lutea; pectore lateribusque canis.
 3. *T. ruficollis*, Gm. (Fringilla martinicensis? Gm. - rufo-barbata, Jacq. - Tachyphonus ruficollaris, Lafr. - Tanagrella ruficollis, Gr.) Gosse, Ill. Jam. t. 58. ex Jamaica.
506. **Nemosia**, Vieill. 1816. Americamer. 9.
1. *Tanagra atra*, Gm. (melanopsis, Lath.) Pl. enl. 714. 2. Desm. Tang. t. 42. ex Guiana.
 2. *Tanagra pileata*, Gm. (Hylophilus cyanoleucus, Wied ex Azara 105. m. 110. f. - Nemosia pileata, Vieill.) Pl. enl. 720. 2. - Desm. H. Nat. Tang. t. 41. ex Guiana. Bras. Parag. Bolivia.
 3. *N. verticalis*, Lafr. Rev. Zool. 1840. p. 227. ex Bog.
 4. *N. flavicollis*, Vieill. (Sylvia melanoxantha, Licht. Tanagra speculifera, Temm.) Gal. Ois. t. 75. - Pl. col. 36. 1. 2. ex Brasil.
 5. *N. ruficapilla*, Vieill. Enc. Meth. p. 788. ex Brasil.
 6. *N. sordida*, Lafr. - Orb. Voy. Am. m. t. 18. 2. ex Bolivia.
 7. *Tanagra guira*, L. (nigricollis, Gm. - Nemosia nigricollis, Vieill. ex Azara 102. - Hylophilus guira, Wied. - N. Guira, Gr.) Pl. enl. 720. 1. - Edw. B. t. 351. 2. ex Par. Bol.
 8. *N. nigrogenys*, Lafr. R. Zool. 1843. p. 273. ex Columb.
 9. *N. fulvescens*, Strickl. Ann. Nat. Hist. 1844. p. 420.

507. **Tachyphonus**, Vieill. 1816. (Comarophagus? Boie) America mer. 17.

1. **TANAGRA loricata**, Licht. (Tachyphonus loricatus, Vieill.) Cat. Dupl. Berl. Mus. 340. mas. 341. faem. ex Brasil.
2. **T. phoeniceus**, Sw. (sancius, Strickland.) Two Cent. and a Quarter p. 311. ex Brasil.
3. **T. quadricolor**, Vieill. - (suechii, Sw. - Tanagra auricapilla, Spix. - Muscicapa galeata, Licht. - M. melanops? Vieill. ex Asara 101.) Av. Bras. t. 52. ex Brasilia merid. Parag.
4. **T. taenatus**, Boissonn. Rev. Zool. 1839. p. 67. ex Sta Fe de Bogota.
5. **TANAGRA penicillata**, Spix. (Tachyphonus penicillatus, Gr.) Av. Bras. t. 49. 1. ex Brasil.
6. **T. olivaceus**, Swainson, in Brand's Journ. XXXIX. p. 218. ex Brasil.
7. **FRINGILLA cristata**, Gm. (araquira, Vieill. ex Asara 136. Emberiza araguira, Orb. - Tachyphonus rubescens, Sw.) Pl. enl. 181. 1. - Ois. Chant. t. 28.* ex Parag.
8. **TANAGRA cristatella**, Spix (Emberiza ruficapilla, Sparrm. - Fringilla pileata, Wied - Paserina ornata, Less. - Tachyphonus fringilloides, Sw. - T. cristatellus, Gr. - T. pileatus, Hartl. ex Asara 114.) Av. Bras. t. 53. 1. Mus. Carls. t. 44. ex Bras.
9. **T. brevipes**, Lafresn. Rev. Zoologiq. 1846. p. 206. ex Columbia.
10. **T. delatrii**, Lafresn. Rev. Zoologiq. 1847. p. 72. ex Mexico.
11. **T. capitatus**, Orb. (Nemosia gularis, Vieill. ex Asara 137. - Tanagra! capitata, Gr.) Voy. Am. m. t. 19. 2. ex Brasil. Parag.
12. **TANGAVIUS involucratus**, Lesson. (Tachyphonus involucratus, Gr.) Revue Zoologique, 1839. p. 41. ex Mexico.
13. **T. ruficeps**, Strickl. Ann. N. Hist. 1844. p. 419. ex Brasil.
14. **T. flavipectus**, Lafresn. Rev. Zool. 1840. p. 227. ex Bogota.
15. **T. canigularis**, Lafresn. Rev. Zool. 1848. p. 11. ex Columbia.
16. **T. albitempora**, Lafresn. Rev. Zool. 1848. p. 12. ex Columbia.
17. **T. lachrymosus**, Dubus, Esq. Orn. t. 10. ex Mexico.

508. **Pyrrota**, Vieill. (Tachyphonus, p. Gr.) America mer. 2.
1. **Oriolus leucopterus** et Tanagra nigerrima, Gm. (rufa, Bodd. - Oriolus melaleucus, Sparre. - Pyrrota leucop-tera, Vieill. ex Azara 76. - Tachyphonus nigerrimus, Gr.) Pl. enl. 179. 2. et 711. - Mus. Carls. t. 31. - Desm. Tang. t. 45. mas 46. faem. - Gal. Ois. t. 82. ex Bras. Parag.
 2. **TANAGRA coryphaeus**, Licht. (vigorsi, Sw. - Agelaius coronatus, Vieill. ex Azara 77. - Tachyphonus coryphaeus, Hartl.) Jard. et Selb. Orn. Ill. t. 36. 1. ex Parag.
500. **Stephanophorus**, Strickl. America mer. 1.
- TANAGRA *caerulea* et leucocephala, Vieill. ex Azara 93. (diadema, Temm. - Fringilla splendida? Licht.) Gal. Ois. t. 54. - Pl. col. 243. ex Bras. trop.
510. **Tanagra**, L. (Thraupis, Boie 1826.) America mer. 21.
1. **T. sayaca**, L. (sayaca, Wied. - diaconus, Less. - cana? Sic. - Saltator cyanopterus, Vieill. ex Azara 92.) Pl. enl. 178. 1. mas. - Edw. B. t. 351. - Desm. Tang. t. 15. mas 16? ex Cayenn. Bras. Glaucescens; humeris cyaneis.
 2. **T. episcopus**, L. (argentata? Gr. - virens? Strickl. ex L' - Gracula glauca, Sparre.) Mus. Carls. t. 54. ex Cayenna, Brasil. Caerulans; humeris albo-caeruleis.
 3. **T. caelestis**, Spix (seriopetra? Sw.) Av. Br. t. 55. 1. Laete caeruleus; humeris, fascioque alari, albis.
 4. **T. fasciata**, Licht. (axillaris, Spix.) Av. Bras. t. 54. 2. ex Brasil. Fusco-cinerea; humeris nigris fascia alba.
 5. **T. olivascens**, Licht. (palmarum, Wied. - prelatus? Less. - episcopus vel sayaca, faem. Aliq.) Pl. enl. 178. 2. mas nec faem. ex Brasil.
 6. **T. ornata**, Sparre. (arciepiscopus, Desm.) Mus. Carls. t. 95. - Tang. t. 17. mas 18. faem. - Sp. Av. Bras. t. 55. 2. Sw. B. of Br. t. 42. ex Peru. Cyanea; humeris flavis.
 7. **T. vicarius**, Less. Cent. Zool. t. 68. ex Mexico. Capite, humerisque cyaneis; speculo alari flavo!
 8. **T. inornata**, Sw. Orn. Dr. B. of Br. t. 40. ex Bras.
 9. **T. cyanocephala**, Orb. (maximiliani, Laf.) Voy. Am. m. Ois. t. 23. 1. ex Peru. Bolivia. Minor: viridis; pilo cerviceoque cyaneis: gula, pectore, abdomineoque cinerascentibus: alis subtus, femoribusque flavis.
 10. **T. olivi-cyanea**, Laf. (Tachyphonus! olivicyaneus, Gr.) Rev. Zool. 1843. p. 60. ex Columbia. Major: viridis; capite, pectore, abdomineoque cyaneis: alis subtus, crissos, femoribusque flavissimis.

11. **TANAGRA montana**, Lafr.-Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 23. 1.
ex Bolivia. Maxima; cyanea; capite nigro; abdomine flavo.
12. **TANAGRA palpebrosa**, Lafr. Rev. Zool. 1847. p. 71.
ex Peru. Ardesiaca; humeris uropygioque cyaneis; macula utrinque palpebrali, majore auriculari, corporeque subtus flavis.
13. **T. striata**, Gm. Azara 94. (chrysogaster, Cuv. - darwini, Bp.) Voy. Beagle B. t. 36. ex Peru, Parag.
Mas nigra; capite, collo, alarumque tectricibus caeruleis; pectore uropygioque aurantiacis; abdomine flavo; femoribus cinereis.
Faem. olivacea, capite, collo, alarumque tectricibus caeruleis;
subtus ex toto, cum uropygiō, flava; femoribus cinereis.
14. **TANAGRA eximia**, Boissonn. 1840. (cucullata, Jard.) Ill.
Orn. n. s. t. 43. ex Bogota. Cyanea; dorso, fascia que alarum dupliciti viridibus; jugulo, alis, caudaque nigris; abdomine flavissimo.
15. **T. flavinucha**, L. et Orb. Voy. Am. m. t. 21. ex Bolivia.
Nigerrima; humeris uropygioque cyaneis; subtus, cum nucha, flavissima.
16. **T. victorina**, Lafr. (elegans, Less.) R. Zool. 1842. p. 336.
ex Bog. Similis precedentia, sed major, et dorso viridi.
17. **T. sumptuosus**, Less. Tr. Orn. p. 463. ex Columb.
Nigro-holosericea; pileo aureo; humeris caeruleis; subtus omnino flava.
- * 18. **TANAGRA dubusia**, Bp. Mus. Lugd. ex Columbia.
Nigra; pileo aurantio; dorso, humeris, pectoreque azureis;
crisso rufa.
- * 19. **TANAGRA selysia**, Bp. Mus. Lugd. ex Quito. Nigricans; dorso sordide caerulecente: superciliis protractis cyaneis; abdomine flavo.
Bernardo Dubus et Edmondo Selys, Amici, Ornithologis, salutatibus exsul quem veniunt visitatum gratus!
20. **TANAGRA igniventris**, Lafr. (Tachyphonus igniventris, Gr.) Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 25. 2. ex Bolivia.
Nigra; humeris uropygioque cyaneis; macula utrinque auriculari, abdomineque coccineis.
21. **TANAGRA lunulata**, Dubus. (constantii, Boissonn. 1840. erythrotis, Less. - Aglaia erythrotis, Jard.) Bull. Ac. Brux. 1839. p. 441. figura. - Esq. Orn. t. 4. - Selb. Ill. Orn. n. s. t. 36. ex Bogota.
Quid T. leucophaca, Licht. (capistrata, Sp.) Av. Bras. t. 54. 1?

511. **Spindalis**, Jard. (Tanagra, p. Gr.) Americamer. 4.

1. **FRINGILLA sena**, L. (bahamensis, Br. - Spindalis zena, Jard.) Catesb. Car. t. 42. ex Ins. Baham.
2. **TANAGRA multicolor**, Vieill. Gal. Ois. t. 76. ex S. Dom. Jugulo flavo; rectricibus alarum minoribus rufis.
3. **TANAGRA nigricephala**, Jam. (zenoides, Lafr. - Spindalis bilineatus, Jard.) Ill. Orn. t. 9. - O. des M. Pl. p. 40. ex Jamaica. Major; subtus aurantius; jugulo candido.
4. **TANAGRA pretoria**, Less., nec Lafr. (nigro-aurita? Cass. 1847. zena, Vig. Orb. nec L.) Cent. Zool. t. 45. - Voy. Cuba, Ois. t. 11. ex Ins. Cuba. Dorso olivaceo; humeris rufis; jugulo rufo-flavo; abdomine albo; rostro Euphaino!

512. **Lanio**, Vieill. 1810. (Pogonothraupis, Caban. 1847.) America mer. 5.

1. **TANAGRA atricapilla**, Gm. (Lanio atricapillus, Vieill.) Pl. enl. 809. 2. ex Cayenna.
2. **TACHYPHONUS tenuirostris**, Sw. (luctuosus, Orb. - Pyrrhaga luctuosa, Lafr. - Lanio tenuirostris, Gr.) Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 20. ex Bolivia.
3. **TANAGRA cristata**, L. (cirrhomelas? Vieill. - brunnea, Spix. - Tachyphonus cristatus, Vieill. - Lanio cristatus, Gr.) Pl. enl. 7. 2. et 301. 2. - Desmar. Tangar. t. 47. mas. 48. faem. 49. var. nigra. - Spix. Av. Bras. t. 49. 2. ex Cayenna, Brasil.
4. **TACHYPHONUS versicolor**, Lafr. (Pyrrhaga versicolor, Orb.) Voy. Am. m. t. 19. ex Bolivia.
5. **Lanio aurantius**, Lafr. Rev. Zool. 1846. p. 204. ex Columbia.

513. **Lamprotes**, Sw. (Orthogony? Strickl. 1844. - Sericosypha, Less.) Amer. mer. 2.

1. **TANAGRA ruficollis**, Sw. (rubrigularis, Spix - Saltator niger? Vieill. - Erythrolanius rubricollis, Less.) Av. Bras. t. 56. 1. ex Bras.
2. **L. albo-cristata**, Lafr. (Sericosypha sumptuosa, Less.) Mag. Zool. 1844. Ois. t. 50. ex Columbia. Boliv. Potius ad Ampelidas quam ad Tanagridas pertinens!

*514. **Cyanicterus**, Bp. (Pyranga, p. Gr. - Tachyphonus, p. Less.) Rostrum longum curvum. Amer. mer. 1.

- Pyrrhaga cyanictera, Vieill. (Tachyphonus cyanicterus, Less. - **Cyanicterus venustus**, Bp.) Gal. Ois. t. 81. ex Am. mer. Mas azureus; abdomine tantum flavo. Faem. viridi-cyaneo; subtus omnino flava.

515. **Pyranga**, Vieill. 1807. (*Phaenisoma*, Sw. 1837. - *Phae-nicosoma!* Caban. 1847.) America. 12.

1. **TANAGRA rubra**, L. (*erythromelas*, Vieill.) *Pl. enl.* 127. 1. mas. 156. 1. faem. - *Desm. Tang.* t. 34. mas ad. *Wils. Am. Orn.* t. 11. 3. 4. - *Aud. Am.* t. 354. 3. mas 4. faem. ex Amer. sept.
2. **TANAGRA aestiva** et mississipensis mas, et olivacea faem. *Gm.* (*rufus*, *Sparrm.* - *variegata*, *Lath.* - *Pyranga aestiva*, *Vieill.* - *Loxia virginica?* *Gm.* - *hepatica*, *Sw.*) *Edw. Gl.* t. 230. - *Lath. Syn.* t. 46. - *Mus. Carls.* t. 94. *Desm. Tang.* t. 32. adult. t. 33. jun. - *Wils. Am. Orn.* t. 6. 3. 4. - *Aud. Am.* t. 44. ex Amer. sept.
3. **P. azarae**, Lafr. (*P. coccinea*, Gr. ex Bodd. - mississippiensis, *p.* *Lath.* - *saira?* *Spix.* faem. - *livida*, *Sw.* faem. mississippiensis, *Orb.* - *Tanagra mississippiensis*, *Licht.* *Tachyphonus ruber et chloricterus?* *Vieill. Enc.* m. et f. *Saltator ruber et flavus*, *Vieill. ex Azara 88.* mas et 87. faem. *Phaenisoma azarae*, *Cab.* *Pl. enl.* 741. - *Av. Br.* t. 48. 1. faem. ex *Parag. Bolivia*.
4. **TANAGRA ludoviciana**, Wils. (*Pyranga erythropsis*, *Vieill.* - *P. ludoviciana*, *Bp.*) *Am. Orn.* t. 20. 1. - *Aud. Am.* t. 344. 1. mas. 2. faem. ex *ocellid. Amer. sept.*
5. **P. bidentata**, Sw. *Mag. Zool.* 1827. ex *Brasil.*
6. **P. mexicana**, Less. *Rev. Zool.* 1839. p. 41. ex *Mex.*
7. **P. sanguinolenta**, Lafr. *R. Zool.* 1839. p. 97. ex *Mex.*
8. **P. cucullata**, Dubus, *Rev. Zool.* 1848. p. 245. ex *Mex.*
9. **P. erythrocephala**, Swains. 1847. (*rubriceps*, Gr.) *Mitch. Gen. B.* t. 89. 2. ex *Mexico*.
10. **P. leucoptera**, Trudeau. 1837. (*bivittata*, *Lafr. ardens* *Tschudi.*) *Rev. Zool.* 1842. p. 70. ex *Inas. Cuba. Minor.*
11. **P. albicollis**, Lafr. - *Orb. Voy. Am. m. Ois.* t. 26. 2. ex *Bolivia*.
Quid Pyranga cinerea, icterops, et chlorocephala, Vieillot?
*Quid Tanagra viridis, Spix. (Lamprotes viridis, Gr. - Orthogonyx viridis, Strickl., 1844. - *Pitylus olivaceus* 1834. *hinc Phae-nisoma olivacea?* Less.) Av. Bras. t. 48. 2. ex Brasil?*

516. **Ramphocelus**, Desmar. 1805. (*Ramphopis*, Vieill. 1816.) Amer. mer. 11.

1. **TANAGRA jacapa**, L. (*albirostris*, Bodd. - *Lanius carbo*, *Pall.* - *Ramphopis purpureus*, Vieill. - *Ramphocelus atro-coccineus*, Sw. - *R. jacapa*, Gr.) *Pl. enl.* 128. 1. mas 2. faem. - *Edw. Glean.* t. 267. - *Desmar. Tangar.* t. 30. mas 31. faem. - *Sw. Orn. Draw.* t. 20. ex *Cayenn. Br.*

2. **TANAGRA brasiliæ**, L. (*Ramphocelus coccineus*, Vieill.
R. brasilius, Bp.) *Pl. enl.* 127. 1. - *Edw. Glean.* t. 343.
Desm. Tang. t. 28, adult. 29, jun. - *Gal. Ois.* t. 79. - *Sw.*
Orn. Dr. B. of Bras. t. 18, 19. ex Brasil.
3. **R. dimidiatus**, Lafr. (*Ramphocelus melanogaster*,
Sw.) *Mag. Zool.* 1837. t. 81. ex Mexico m. Columb.
4. **R. luciani**, Lafr. *Mag. Zool.* 1839. *Ois.* t. 2. ex Col.
5. **R. affinis**, Less. *Rev. Zool.* 1840. p. 1. et 133. ex Mex.
6. **R. nigrigularis**, Spix. (*ignescens*, Less.) *Av. Bras.*
t. 47. - *Cent. Zool.* t. 24. - *Sw. Orn. Dr. B. of Bras.*
t. 17. ex Bras. Mexico.
7. **R. atrisericeus**, Lafr. - *Orb. Voy. Am. m. Ois.* t. 26. 1.
ex Bolivia.
8. **R. atricoccineus**, Sw. *B. of Braz.* t. 20. ex Bras.
9. **TANAGRA sanguinolenta**, Less. (*Tachyphonous sanguinolentus*, Gr.) *Cent. Zool.* t. 39. ex Mexico.
10. **R. passeriniti**, Bp. ex Am. s. Mexico vel Cuba.
Minor: colore uropygi*ii* constanter rubro!
11. **R. flamigerus**, Jard. (*icteronotus*, Bp. 1837. - varians, Lafr.) *Selby. Ill. Orn.* t. 131. - *Dubus. Esq. Orn.*
t. 15. ex Amer. m. Bolivia. Major: colore uropygi*ii*,
secundum aetatem et tempus, rubro, aurantio, flavo!

FAMILIA 40. ALAUDIDÆ.

SUBFAM. 83. ALAUDINÆ.

517. **Melanocorypha**, Boie. 1828. (*Calandra hinc Saxilauda*,
Less. - *Londra*, Sykes.) Eur. As. Afr. 6.
1. **ALAUDA calandra**, L. (*undata*, Gm. - *matutina*, Bodd.
torquata? Blyth.) *Pl. enl.* 363. 2. fig. pessima 662, jun.
Gould, *Eur.* t. 162. 2. ex Eur. m. Afr. s. As. occ.
- *2. **ALAUDA clot-bey**, Temm. *Mus. Luggd.* ex *Deserto Egypt.*
Cinereo-isabellina, subtus alba; pectoris maculis rotundis, genis, abdomine neque nigris; litura utrinque suboculari et genali alba; remigibus secundariis apice lato, rostricibus lateralibus basi latissime, albo-cinnamomeis.
Species pulcherrima colore deserti quod habitat, rostro robustissime fere *Paradoxornithes*! pestilentialis flagelli Flage, Archiatro Gallo-Egyptiac o dictat!
3. **ALAUDA tatarica**, Pall. (*nigra* Steph.-saxicoloides? Boie.
mutabilis, Gm. jun. - *yeltoniensis*, Forster. - *Tanagra sibirica*, Gm. ex Sparre. - *Saxilauda tatarica*, Less.) *Pl. enl.* 650. 1. - *Mus Carls.* t. 19. - *Lev. Afr.* t. 191?
Gould, *Eur.* t. 161. ex As. s. et Eur. or. s.

4. ALAUDA ***mongolica***, Pall. (sinensis, Waterh. 1839. - Melanocorypha mongolica, Gr.) Zoogr. Ross.-As. t. 33. 1. ex Asia or.
5. ALAUDA ***leucoptera***, Pall. (sibirica, Gm. jun. - calandra affinis, Pall. Itin. - bimaculata? Ménétr. - Calandrella sibirica, Brandt. - Phileremos siberica, Keys. et Bl.) Zoogr. Ross.-As. t. 33. 2. ex Asia sept. Europ. or.
6. ***M. cinctura***, Gould, Voy. Beagl. B. p. 87. ex Ins. Afr. occ. Cap Verde dictis.
518. ***Mirafra***, Horsf. 1820. (Plocealauda, Hodg. 1844. - Geocoraphus, Caban. 1847.) As. Afr. Oc. 9:
1. ***M. javanica***, Horsf. (Alauda mirafra, Temm.) Pl. col. 305. ex Malaia s. a.
 2. ***M. assamica***, Mac Clell. (assamensis, Bl. - Alauda mirafra, Jerd. - Plocealauda typica, Hodg.) Pr. Zool. Soc. 1839. p. 162. ex Bengal. Nepal. Assam.
 3. ***M. flavigollis***, Mac Clell. Pr. Zool. Soc. 1839. p. 163. ex Asia mer.
 4. ***M. phoenicura***, Frankl. Pr. Zool. Soc. 1831. p. 119. ex Asia mer.
 5. ***M. cantillans***, Jerd. Journ. As. Soc. 1844. p. 960. ex Asia mer.
 6. ***M. erythroptera***, Jerd. 1844. (M. javanica, Jerd. nec Horsf.) Ill. Ind. Orn. t. 438. ex Asia mer.
 7. ***M. affinis***, Jerd. Journ. As. Soc. XIII. 1844. p. 959. ex Asia mer. Ceylon.
 8. ***M. hayi***, Jerd. Journ. As. Soc. XIII. 1844. p. 959. ex Coromandel.
 9. ***M. horsfieldi***, Gould, Austr. Ill. t. 77. ex Austr. or. m.
519. ***Megalophonous***, Gr. (Brachonyx, Sw. - Corypha, Gr.) Africa mer. 12.
1. ALAUDA ***crassirostris***, Vieill. (magnirostris, Steph. turdina, Merr. - grypania? Licht. 1842. - Calendula erasistrostris, Sw.) Lev. Afr. t. 193. ex Africa mer.
 2. ALAUDA ***guttata***, Laf. (Megalophonous guttatus, Gr.) Rev. Zool. 1839. p. 259. ex Afr. mer.
 3. ALAUDA ***lagepa***, Smith. (Megalophonous lagepa, Gr.) Ill. S. Afr. Zool. t. 87. 2. ex Africa mer.
 4. ALAUDA ***rufipilea***, Vieill. (ruficapilla, Steph.) Levaill. Afr. t. 198. ex Afr. mer.
 5. ALAUDA ***ruficeps***, Rüpp. (Megalophonous ruficeps, Gr.) Faun. Abyssin. t. 38. 1. ex Afr. or.

6. ALAUDA *planicola*, Licht. (Mirafræ africana, Smith.
suberistata, Sundev. - Megalophonus africanus, Gr.) Ill.
S. Afr. Zool. t. 88. 1. ex *Africa mer.* Major.
7. MIRAFRA *africanoides*, Smith. (Megalophonus africanoides, Gr.) Ill. *S. Afr. Zool.* t. 88. 2. ex *Afr. mer.*
Media.
8. MIRAFRA *sabota*, Smith (Megalophonus sabota, Gr.) Ill.
S. Afr. Zool. t. 89. 1. ex *Africa mer.* Minor.
9. MIRAFRA *cheniana*, Smith (Megalophonus chenianus,
Gr.) Ill. *S. Afr. Zool.* t. 89. 2. ex *Afr. m.* Media.
10. BRACHONYX *apiata*, Vieill. (clamosa, Steph. - crepitans,
Merr. - Megalophonus apiatus, Gr.) *Levaill. Afrt.* 194.
Smith, Ill. S. Afr. Zool. t. 110. 1. ex *Afr. mer.* Media.
11. BRACHORYX PYRRHONOTA, Smith, nec Vieill. (*fasciolata*,
Sund.) Ill. *S. Afr. Zool.* t. 110. 2. ex *Afr. m.* Media.
12. ALAUDA *ferruginea*, Lofr. 1839. (Megalophonus fer-
rugineus, Gr. - Certhilauda nivosa? Sw. - Smith, Ill. S.
Afr. Zool. Av. t. 29. ex *Afr. mer.* et occ.
520. ALAUDA, L. (Lululla et Calandrella, Kaup. - Calendula, Sw.
Erana, Gr. - Heterops, Hodgs.) Eur. As. Afr. 11.
a. CALANDRELLA, Kaup. Brachidactyla.
1. *A. calandrella*, Bonelli. (arenaria, Steph. - brachy-
dactyla, Temm. - dukhunensis, Sykes. - testacea? Pall.
Emberiza baghaira, Frankl. - E. olivacea, Tickell. - Ca-
landrella brachydactyla, Kaup. - Phileremos moreotica?
v.d.Muhle.) Vieill. *Faun. Fr.* t. 74. 1. - Bory, *Zool.*
Exp. Mor. Ois. t. 6. 1. - Gould, *Eur.* t. 163. ex *Eur.*
m. et or. As. et Afr. s. Rostro crassulo.
Emberizarum hortulanorum europaeorum, Dolyc-
honichum oryzivorum americanarum, apud
Gastronomos indos vices sustinet.
2. ALAUDA *deserti*, Licht. (isabellina, Temm. - lusitanial
Degland, ex Gm.) Pl. col. 244. 2. ex *Africa s. orient.*
Arab. accidentaliter *Eur. m.* Rostro elongato.
3. ALAUDA *conirostris*, Sund. Mus. Stockh. ex *Afr.*
meridionali. Rostro conico.
4. ALAUDA *cineræa*, Lath. (Megaloph. cinereus, Gr.) Lev.
Afr. t. 190. ex *Afr. m.* Rostro recto, brevi, acuto.
5. *A. pispolletta*, Pall. ex cl. synon. (raytal? Ham. - Calan-
drella raytal? Blyth, *Cat.* 737.) Zoogr. Ross. Asiat.
sp. 154. Mus. Lugd. ex *Desertis Gangi et Indi. Mar.*
Caspic. Rostro brevissimo, rotundo!

b. ALAUDA, Kaup. Cauda longula.

6. **A. arvensis**, L. (caelipets, Pall. - longipes? Lath. - dulcivox, Hodgs.) *Pl. enl.* 363. 1. - *Gould, Eur.* t. 166.
ex Eur. As. Afr. s. Major.
7. **A. cantarella**, Bp. (italica? Gm.) *Intr. Faun. It.* p. 5.
ex Italia centrali. Minor; obscurior.
Quid Alauda montana, Crespon. (Al. cairii!!! Gerbo!) *ex Montibus Galliae meridionalis?*
Quid Alauda kollyi, Temm. *Pl. col.* 305. 1. *ex Gallia sept. or?*
8. **A. guligula**, Frankl. nec Sykes. (ganggetica, 1842 et gracilis, var. Blyth. - triborhyncha, orientalis et leiopus?
var. Hodgs.) *Pr. Zool. Soc.* 1831. p. 119. sp. 65. *ex As. m. Bengal.*
9. **A. malabarica**, Scopoli. (deva, Sykes.) *Blyth, Cat.* sp. 734. *ex Asia, mer. Malabar.*
10. **A. japonica**, Temm. et Schlegel, *Faun. Jap.* t. 47.
ex Japon.

c. LULULLA, Kaup. Cauda brevis.

11. **A. arborea**, L. (nemorosa, Gm. - cristata, Pall. - cristatella, Lath. - anthirostris, Landbeck, 1843.) *Pl. enl.* 503. 2. - *Gould, Eur.* t. 167. *ex Europe. Asia occ.*

521. **Galerida**, Boie. (Alauda, p. Gr.) Eur. Afr. As. 7.
1. **ALAUDA cristata**, L. (galerita, Pall.) *Pl. enl.* 503. 1.
Gould, Eur. t. 165. ex Eur. Afr. s.
 - *2. **G. abyssinica**, Bp. (Galerida cristata ex Abyssinia, Rupp.) *Similis praeed. at distincta colore deserti sequentis.*
 - *3. **G. isabellina**, Bp. (Alauda isabellina, Rupp? nec Temm.) *ex Nubia aegyptiaca. Similis praeedentia, sed minor: cristata plumis valde elongatis: rostro Galeridum, minime Alaudino nec Mirafriño.*
 4. **ALAUDA senegalensis**, Gm. (Alauda cristata, var. Sundev.) *Pl. enl.* 504. 1. *ex Afr. occ.*
 5. **ALAUDA chendoola**, Franklin. (gulgula, Sykes. - Crested Calandre-Lark, Salt. - Galerida chendoola, Blyth, *Cat. Calc.* sp. 740.) *ex Indiae desertis.*
 6. **ALAUDA pyrrhonota**, Vieill. (erythronota? Steph. - albescens, Lafr. - codea, Smith. - Megalophonus albescens, Gr.) *Ill. S. Afr. Zool. t. 87. 1. - Levail. Afr. t. 197. ex Africa mer.*
 7. **G. boysei**, Blyth. (olim Certhialauda) *Journ. As. Soc. xv.* p. 41. *ex Bengal.*

522. **Certhilauda**, Sw. 1827. (Corydalis, Temm. nec Botanic.

Alaemon, K. et Bl. 1840.)

Afr. As. Eur. m. 7.

1. **C. garrula**, Smith 1833. (albifasciata, Lafr.) Mag. Zool. 1836. Ois. t. 58. - Ill. S. Afr. Zool. t. 106, 1. ex Afr. m.
2. ALAUDA breviunguis, Sundev. Mus. Holm. ex Afr. m.
3. **C. semitorquata**, Smith, 1833. (rufopalliatata, Lafr.) Mag. Zool. 1836. Ois. t. 59. - Ill. S. Afr. Zool. t. 106. 2. ex Africa mer.
4. **C. subcoronata**, Smith, Ill. S. Afr. Zool. t. 90, 2. ex Africa mer.
5. ALAUDA africana, Gm. (capensis, Bodd. - Certhilauda longirostris? Sw.) Pl. enl. 712. - Lev. Afr. t. 192. - Smith, Ill. S. Afr. Zool. t. 90. 1. ex Afr. m.
6. ALAUDA duponti, Vieill. (ferruginea, v.d. Mühl. - Alaemon duponti, Keys. et Blas.) Faun. Fr. t. 36. 2. - Roux, Orn. Prov. t. 186. ex Afr. s. As. occ. accid. Eur. mer.
7. ALAUDA desertorum, Stanley. (bifasciata, Licht. - Sarcicola pallida, Blyth. - Certhilauda desertorum, Bp.) Salts, Trav. App. p. 60. - Rüpp. Atl. t. 5. - Pl. col. 393. - Gould, Eur. t. 168. ex As. occid. Afr. or. et s. accidentaliter Eur. mer.

523. **Otocoris**, Bp. 1839. (Eremophila, Boie 1828. - Phileremos, Brehm. 1831. - Philamus, Gr. 1840.)

Eur. As. Am. s. 7.

- *1. ALAUDA albigula, Brandt. (Otocoris albigula, Bp.) Mus. Lugd. ex Atpl. Ross.-Asia t. Fusca: colli lateribus pectoro que ex toto nigri: gula alba.
2. ALAUDA alpestris, L. (flava, Gm. - nivalis, Pall.) Pl. enl. 650. 2. - Gould, Eur. t. 164. ex Eur. As. s. Major.
3. ALAUDA cornuta, Sw. ex Wils. (alpestris ex America, Auct.) Amer. Orn. t. 5. 4. - Aud. Am. 1200. ex Amer. s. Major.
4. ALAUDA chrysolaema, Wagl. (alpestris ex Mexico, Auct.) Bp. Pr. Z. Soc. 1837. p. 111. sp. 21. ex Mex. Minor.
5. ALAUDA sprangeri, Aud. (olim rufa? nec Lath.) B. of Am. 2 ed. t. 486. ex occid. Amer. sept. Texas.
6. ALAUDA penicillata, Gould (Otocoris scriba, Bp. alpestris, Gm. jun.) Itin. t. XII. p. 62. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 92. ex Persia, Asia min. vix Europ!
7. ALAUDA bilophata, Temm. (bicornis, Hempr.) Pl. col. 241. 1. ex Asia occ. Arabia.

524. **Macronyx**, Sw. (Anthus p. Gr.) Africa. 3.

1. **ALAUDA capensis**, L. (Macronyx flavicollis, Sw.) *Pl. enl.* 504. 2. - *Lev. Afr.* t. 195. - *Rüpp. Faun. Abyss.* t. 38. 2. *ex Africa mer. et or.* *Rostro recto, integro.*
2. **ALAUDA flaviventris**, Sw. *B. of west. Afr.* I. p. 215. *ex Afr. mer. et occ.* *Rostro curvo, emarginato.*
3. **Macronyx ameliae**, Tarragon, 1845. - *Gr. et Mitch.* *Gen. B. t. 54. ex Afr. m. P. Natal.*

FAMILIA 41. MOTACILLIDAE.

SUBFAM. 34. ANTHINAE.

525. **Corydalla**, Wig. (Cichlops, Hodgs. - Anthus p. Gr.) Europa. Asia. 2.

1. **ANTHUS richardii**, Vieill. (longipes, Hollandise. - rupes-tris, Ménétri.) Gould, *Eur. t. 135.* - *Roux, Orn. Prov.* t. 189. 100, *ex Eur. m.* *Afr. s. Major:* *subtus albida.*
- *2 **C. sinensis**, Bp. *Mus. Lugd.* *ex China mer. Minor:* *obscurior; subtus fusco-ferruginea.*
Quid Cichlops monticulus et C. forticeps, Hodgs. ex Nepal?

526. **Agrodroma**; Sw. (Anthus, p. Gr.) Eur. As. Afr. Oc. 2.

1. **ALAUDA campestris**, Br. (mosellana? Gm. - grandior, Pall. - *Anthus campestris, Bechst.* - *rufescens, Temm.* *rufus, Vieill.*) *Pl. enl.* 661. 2. - *Gould, Eur. t. 137.* *ex Eur. As. occ. Afr. sept.*
2. **Agrodroma australis**, Sw. *nec Auct. Two Cent.* *and a Quarter. p. 316. ex Ocean.*
Quid A. palustris, Meissn. Bull. v. p. 112, xv. p. 152?

527. **Anthus**, Bechst. (Spipola, Leach. - Pipastes et Leimonip-tera, Kaup.) Cosmop. 33.

a. EUROPAE.

1. **ALAUDA spinolettæ**, L. (*Anthus aquaticus, Bechst.* *A. coutelli, Audouin.* - *A. obscurus e Pyrenaeis, Auct.* *A. montanus, Aliq. aestiv.* - *A. spinolettæ, Bp.*) *Pl. enl.* 661. 2. - *Exp. Eg. Ois. t. 5. 5. ex Eur. Africa s.*
2. **ALAUDA obscura**, Gm. (*Anthus petrosus, Montag.* - *ru-pestris, Nilss.* - *littoralis, Brehm.* - *aquaticus, Selby.* *montanus, Koch.* - *campestris, Bewick.* - *A. obscurus et immutabilis? Degland.*) *Lewin, Brit. B. t. 94.* - *Gould, Eur. t. 138. ex Eur. s. occ. Ins. Britann. Scand. n.*

3. *ALAUDA pratensis*, L. (sepiaria, Br. - Anthus pratensis, Bechst. - A. sepiarius, Vieill. - Leimoniptera pratensis, Kaup.) Pl. ent. 660. 2. - Gould, Eur. t. 136, ex Eur. Asia, Africa sept.
4. *MOTACILLA cervinina*, Pall. (Anthus pratensis, Eversm. rufigularis, Brehm. - cecili, Audouin. - A. aquaticus, Blyth. - rosaceus? Hodgs. - pratensis rufigularis, Schleg. cervinus, Keys. et Bl.) Exp. Egypt. Hist. Nat. t. 5. 6. Gould, Eur. t. 140, ex Eur. m. As. Afr. s.
5. *A. pratensis japonicus*, Temm. et Schleg. Faun. Jap. t. 24, ex Japon.
6. *A. arboreus*, Bechst. (Alauda trivialis? L. - turdina, Scopoli-minor, Bewick. - Motacilla spipola, Pall. - Piptastes arboreus, Kaup. - Dendronanthus trivialis, Blyth. Cichlops thermophilus? Hodgs.) Pl. ent. 660. 1. - Expéd. Eg. Ois. t. 5. 5. - Gould, Eur. t. 139. - Temm. et Schleg. Faun. Japon. t. 23. vix distinctus ex Eur. As. Afr. s.

b. AFRICANI.

7. *A. sordidus*, Rupp. (gouldi, Fraser, 1843.) Faun. Abyss. t. 39. 1. ex Africa or.
8. *A. scapularis*, Licht. Cat. 1842. sp. 50. ex Afric. m.
9. *A. cinnamomeus*, Rupp. F. Abyss. p. 103. ex Afr. or.
10. *A. raalteni*, Temm. - Licht. Cat. 1842. sp. 54. Afr. m.
11. *A. chloris*, Licht. Cat. 1842. sp. 49. ex Africa m.
12. *A. obtusirostris*, Sundev. Mus. Holm. ex Afr. m.
13. *A. caffer*, Sundev. Mus. Holm. ex Afric. m. Minor.
14. *A. brevicaudus*, Sund. M. Holm. ex Afr. m. Minor.
15. *A. leucophrys*, Vieill. Gal. Ois. t. 262. ex Afr. m.

c. ASIATICI.

16. *A. similis*, Jerdon. 1850. (Agrodroma similis, Jerd.) Ill. Ind. Orn. t. 135. ex India.
17. *A. maculatus* et brevirostris, Hodgs. (Dendronanthus maculatus, Blyth.) ex India.
18. *A. agilis*, Frankl. (hortulanus? Hodgs.) Proc. Zool. Soc. 1832. p. 91. ex Asia mer. et or.
19. *A. striolatus*, Blyth. 1837. (Cichlops ubiquitarius vel pelopus? Hodgs.) ex Asia centr. Nepal.
20. *A. montanus*, Blyth. (rufescens, Jerd. nec Vicill.) Journ. As. Soc. 1847. XVI. p. 435. ex Mont. Nilgheris.
21. *A. rufulus*, Vieill. (pratensis ex Sumatra, Raffles. - malayensis, Eyton. - agilis, Jerd. nec Frankl. - pallescens, Sundev.) Gal. Ois. t. 161. ex Asia m. et or. Ocean.

d. OCEANIC.

22. *ALAUDA novae-zelandiae*, Gm. (littorea, Forst.)
Lath. Gen. Hist. vi. t. 53. ex Ocean.
23. *A. grayi*, Bp. (Alauda nova-zelandiae var. β . Lath.)
Portlock's Voy. t. in p. 38. ex Oceania. Minor.
24. *A. australis* et pallescens, Vig. et H. nec Sw. - Gould.
Austr. iv. t. 73. ex Australia. An species unica?

e. AMERICANUS SEPTENTRIONALIS.

25. *ALAUDA ludoviciana* et rubra, Gm. (rufa, Wils. - ru-
bens, Merr. - Anthus ludovicianus, Bp. - A. pipiens,
Aud.) Edw. B.t. 297. - Wils. Am. Orn. t. 42. 4. - Aud.
Am. t. 10 et 80. - Richards. Faun. Bor. Am. t. 44.
ex Amer. sept. or. et occ.

f. AMERICANI MERIDIONALES.

26. *ALAUDA rufa*, Gm. sp. 28. (bonariensis, Bodd. - Anthus
rufus, Bp. - A. variegatus, Vieill. nec Cerv.) Pl. enl. 738.
1. nec 2. ex Bras. m. La Plata. Minimus.
27. *A. chii*, Vieill. ex Azara 146. (turdinus, Merr.) Spix,
Av. Bras. t. 76. 2. ex Bras. m. Parag.
28. *A. corredorsa*, Vieill. ex Azara 145. - Orb. Voy. Am.
m. IV. p. 225. ex Parag.
29. *A. furcatus*, Orb. (breviunguis, Spix.) Av. Bras. t.
76. 1. ex Bras. Bolivia.
30. *A. herminieri*, Less. R. Zool. 1839. p. 101. ex Col.
31. *A. payensis*, Less. Compl. Buff. VIII. p. 167. ex Peru.
32. *A. fuscus*, Vieill. ex Azara 147. ex Bras. Parag.
33. *A. rufescens*, Orb. et Laf. Syn. Av. p. 37. ex Boliv.
34. *A. pacclipterus*, Wied. Beitr. N. Br. I. p. 633. ex Br.

SUBFAM. 35. MOTACILLINAE.

528. *Budytes*, Gv. v. (Motacilla, p. Gr.) Eur. As. Afr. 9.
1. *MOTACILLA flava* et boarula, L. (verna, Br. - flaveola, Pall.
chrysogastra, Bechst. - neglecta, Gould. - flava var. 2.
vulgaris, Sundev.) Pl. enl. 674. 2. - Edw. B.t. 258. - Bp.
Fn. It. t. 32. 1. - Gould, Eur. t. 146. ex Eur. Afr. s.
2. *MOTACILLA cinereocapilla*, Savi. (feldeggi, Micha-
helles, 1831. - dalmatica, Bruch. 1833. - flava var. 4. dalma-
tica, Sundev.) Bp. Faun. It. t. 31. 2. ex Eur. m. et or.
3. *Budytes nigricapilla*, Bp. (Mot. flava var. 3. borealis,
Sundev. - M. melanocephala, Savi, nec Licht.) Faun. It.
t. 31. 3. ex Dalmat. Ital. Scand. Lapponia.

4. MOTACILLA FLAVA, Ray, nec L. (campestris? Pall. - flaveola,
Temm. nec Pall. - anglorum, Prevost. - flava var. 1.
anglica, Sundev.. - *Budytes rayi*, Bp.) Gould, B.
of Eur. t. 145. ex Eur. occ. Brit.
5. MOTACILLA melanoccephala, Licht. nec Savi. (flava
var. 5. africana, Sundev.-Budytes melanoccephala, Rüpp.)
Atl. t. 33. 6. ex Nubia, Senegal.
6. MOTACILLA citreola, hinc citrinella, Pall. (shelobriuscha,
Lepech.-aureicapilla, Less. - calcarata, Hodgs.) Lepech.
It. II. t. 8. 1. - Gould, Eur. t. 144. - Wern. Atl. Man.
Temm. fig. ex Europa orient. Asia.
7. MOTACILLA viridis, Scopoli, (M. caerulescens? Lath.
australis? Steph. - bistrigata, Raffles, 1821. - beema,
Sykes. - Budytes flava et neglecta, Jerdon, nec Auct. Eur.
flava var. melanotis? Temm. - B. viridis, Blyth, Cat. 775.)
Lath. Gen. Hist. B. 54*. - Brown, Ill. t. 33. fig. mala.
ex Asia m. Malacc. Ocean.

529. Pallenura, Bp. ex Pall. (Calobates, Kaup.-Motacilla, p. Gr.) Eur. As. Afr. 2.

1. MOTACILLA FLAVA, Br. (*sulphurea*, Bechst. - boarula,
Auct. nec L. - melanope, Pall. - Calobates sulphurea,
Kaup.) Pl. enl. 28. 1. - Edw. B. t. 259. - Gould, Eur.
t. 147. ex Europa, Asia, et Afric. sept.
*2. Pallenura javensis, Bp. (Motacilla boarula ex Java,
Temm.) Mus. Bp. Romae. ex Malaisia, Ocean.

530. Motacilla, Scopoli ex L. (Pallenura, Pall.)

Eur. As. Afr. 9.

1. M. alba, L. (cinerea, Bodd. adult. - cinerea, Gm. juv.
albeola, Pall.) Pl. enl. 652. adult. 1. aest. 2. hyem. et 674. 1.
juv. - Gould, Eur. t. 143. ex Eur. Asia occ.
2. M. alba, Angl. (lugubris, Temm. 1820. - garrelli,
Gould, 1837.) B. of Eur. t. 141. ex Ins. Britann.
3. M. alba, Jerd. (dukunensis, Sykes.) Proc. Zool.
Soc. 1832. p. 91. ex India occ. et m.
4. M. lugens, Illig. (albeola, var. camschatca, Pall.-lugu-
bris, Temm. 1836. - leucoptera, Vig.) Gould, Eur.
t. 142. minime Europaea! - Kittl. Kupf. Vög. t. 21. 1.
Krusenst. Voy. t. 85. - Temm. et Schleg. Faun. Jap.
t. 25. ex Asia orient.
5. M. luzoniensis, Scopoli (alba var. y. Lath. - leucopus,
Gould. - alboides; Hodgs. - hodgsoni, Blyth.) Sonn.
Voy. t. 20. - Lath. Hist. of B. figura. ex Nepal. Bengal.
Ins. Philipp.

6. **M. maderaspatana**, Br. nec L. (maderaspatensis, Gm. variegata, Steph. nec Vieill. - picata, Frankl.) Lath. Gen. Hist. vi. t. 54. ex As. mer. et India occ.
7. **M. capensis**, L. (afra, Gm.) Pl. enl. 28. 2. - Levaill. Afr. t. 177. - Kittl. Kupf. Wög. t. 21. 2. ex Afr. m.
8. **M. ridua**, Sunderval. (capensis adult. Lichet. sed temere) Levaill. Afr. t. 178. ex Afr. merid.
9. **M. longicauda**, Rupp. Faun. Abyssin. Av. t. 20. 2. ex Africa orient.

531. **Nemoricola**, Blyth. (Motacilla, p. Gr.) Asia oriental. 1.
MOTACILLA *indica*, Gm. (variegata, Vieill. nec Steph. - af- finis, Tickell. - thoracica, Müll.) Lev. Afr. t. 179. ex As. m. et or. Malacc. Oc. Borneo.

FAMILIA 42. CINCLIDAE.

SUBFAM. 36. EUPETINAE.

532. **Enicurus**, Temm. (Henicurus, Caban.) Asia. Ocean. 8.
 1. **TURDUS leschenaulti**, Vieill. (Motacilla speciosa, Horsf. - Enicurus coronatus, Temm.) Pl. col. 113. Gal. Ois. t. 145. ex Java.
 2. **E. maculatus**, Vig. (fuliginosus, Hodgs.) Gould, Cent. Himal. B. t. 27. ex Asia centr.
 3. **E. immaculatus**, Hodgs. As. Res. xix. p. 190. Arakan.
 4. **E. schistaceus**, Hodgs. As. Res. ix. p. 189. ex As. c.
 5. **E. ruficapillus**, Temm. (diadematus, Müll. 1835. ex Boie.) Pl. col. 534. ex Java.
 6. **E. frontalis**, Blyth. Journ. As. Soc. XVI. p. 156. ex Penins. Malacc.
 7. **E. velatus**, Temm. Pl. col. 160. ex Java.
 8. **E. scouleri**, Vig. 1831. (heterurus, Hodgs.) Gould, Cent. Himal. B. t. 28. ex Asia centr.

533. **Grallina**, Vieill. (Tanypus, Oppel.) Australia. 1.
CORVUS *cyanoleucus* et Gracula picata, Lath. (Tanypus australis, Oppel. - Grallina melanoleuca, Vieill. - bicol. Vig. - australis, Gould. - picata, Blyth) Gal. Ois. t. 150. - Austr. II. t. 54. ex Austr. univer.

534. **Eupetes**, Temm. (Ajax, Less. 1829.) Asia. Ocean. 4.

1. **E. macrocercus**, Temm. Pl. col. 516. ex Sumatr.

2. **E. ajax**, Temm. (Ajax typicus, Less.) Pl. col. 58.

ex Sumatra.

3. **E. caerulescens**, Temm. Pl. col. 574. ex N. Guin.

4. **Ajax diana**, Less. (Eupetes diana, Gr.) Belang. Voy.

Ind. Or. Ois. t. 3. ex Asia mor.

SUBFAM. 87. CINCLINAE.

535. **Cinclus**, Bechst. 1802. (Hydrobata, Vieill. 1816. nec Boie.) Eur. As. Am. 7.

a. ORBIS ANTIQUI.

1. **STURNUS CINCLUS**, L. (Turdus cinclus, Lath. - Merula aquatica, Br. - **Cinclus aquaticus**, Bechst. - C. europaeus, Steph. - Hydrobata albicollis seu bicolor, Vieill.

II. **cinclus**, Bl. - H. aquatica, Gr.) Pl. Lenl. 940. - Gal. Ois.

t. 52. - Gould, Eur. t. 83. ex Europ. centr. et m.

As. occ. et s. Bicolor; ex rufescente brunneus, capite dilutior; gula pectoreque albis: abdomine rufo.

2. **C. melanogaster**, Temm. (Cinclus aquaticus var.

Auct.) Gould, Eur. t. 84. ex Eur. occ. Bicolor: fuscus, capite obscuro; gula pectoreque albis; abdomine nigro.

3. **C. leucogaster**, Eversmann, ex Siberia occ. Bi-

color: fuscus, capite cinereo; gula, abdomineque albis.

4. **C. pallasi**, Temm. (Sturnus cinclus var. Pall.) Gould,

Eur. t. 85. adult. et jun. non europaei! ex Siberia or. Japon. Unicolor: fusco-brunneus; rostro valido, pallide fuscus: pedibus albicantibus.

5. **C. PALLASI**, Vig. nec Temm. (C. **tenuirostris**, Gould.

asiaticus, Sw. - Hydrobata asiatica, Bl.) Gould, Cent.

Himal. B. t. 24. ex Asia centr. Unicolor: brunneo-rufescens: rostro gracili, pedibusque fuscis.

Similis C. pallasi, sed colore dilutiore, et rostro valde tenuiore.

b. AMERICANI.

6. **C. PALLASI**, Bp. nec Temm. (mexicanus, Sw. - americanus,

Richards. - **unicolor**, Bp.) Americ. Orn. t. 16. I.

Aud. Am. t. 370. ex Amer. s. Unicolor; ex canescente fuscus: rostro nigro; pedibus flavidis.

7. **C. leucocephalus**, Tschudi. (Hydrobata leucocephala, Gr.) Faun. Peruan. t. 15. I. ex Peru.

Fuscus; capite pectoreque albis: rostro nigro; pedibus flavis.

536. **Zoothera**, Vig. 1831. (Myiophaga, Less.)

Asia. Ocean. 3.

- * 1. **Z. cinclops**, Bp. (melanoleuca? Hartl. - Cinclus palasi? Less.) *Mus. Lugd.* Patria ignota. *Minor: fuscus; gula, pectore, abdomineque albis: rostro elongato, curvo, inter Cinclos et Zootheras medio.*
- 2. **Myiothera andromeda**, Temm. (Myiophaga andromeda, Less. - Zoothera andromeda, Hartl.) *Pl. col. 302.*
ex Java. Media.
- 3. **Z. monticola**, Vig. (*Turdus rostratus?* Hodgs.) *Gould, Cent. Hist. B. t. 22. ex Asia centrali. Major.*
- 4. **Z. marginata**, Blyth. (*marmorata?* Gr.) *Journ. As. Soc. XVI. p. 141. ex Aracan.*

FAMILIA 43. PITTIDAE.

SUBFAM. 33. PITTINAE.

Duo, praeter characteres, Zoologiae sunt tamquam faces, *Geographia scilicet et Anatomia*. Itaque ut Pittas, inter Volucres referrem, eo solummodo argumentis ex Anatomia desumptis atque extra omnem contentionem collocatis me perduci paterer, *Geographia* repugnante.

537. **Brachyurus**, Thunb. (Paludicola hinc Heleornis, Hodgs.

Pitta, p. Gr) Cauda brevissima, truncata: corpore subtus haud fasciato.

As. Afr. Oc. 22.

a. GIGANTES. Subtus pallidi.

- 1. **Myiothera caerulea**, Raffles. (*Pitta gigas*, Temm. - *P. caerulea*, Bl.) *Pl. col. 217. ex Sumatra. Caeruleus; genis, corporeque subtus fulvescentibus: occipite subristato: paleo, vitta postoculari, collarique interrupto nigris.*
- 2. **Pitta cyanea**, olim *gigas*, et *Brachyurus cyaneus*, Blyth. *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 55. - Gould, B. of Asia, t. 3. ex Aracan, Tonasseri m. Cyaneus; subtus albo-caerulescens, maculis nigris variegatus: occipite subristato, rubro: gula fulvescente.*
- 3. **Paludicola nepalensis**, Hodgs. (*Pitta nuchalis* hinc *nepalensis*, Blyth. - *Heleornis nepalensis*, Hodgs. - *Hydrornis nepalensis*, Blyth.) *Gould, B. of Asia t. 2. ex Nep. Boot. Caeruleo-virens, occipite laevi, caeruleoscenti; sincipite, genis, corporeque subtus fulvis; gula albicans.*
- 4. **Pitta maxima**, Forsten, Verh. Nat. G. Nederl. Ind. p. 14. *ex Gilolo. Niger; capite laevi: tectricibus alarum argenteo-cyanis: pectore lateriburgae albis; abdomine rubro.*

b. BRACHYURI. Subtus flavescentes.

Virentes; capite obscurō, vittis dilutioribus: ventre rubro: tectricibus alarum argenteo-caeruleis: cauda nigra, apice virescenti-caeruleo.

5. **Pitta strepitans**, Temm. (versicolor, Sw.) Pl. col. 333.

Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 77. - Gould, Austr. iv. t. 1. ex Australiā or. Major: viridis; subtus ochraceus: pīleo brunneo: genis, cervice, gula, abdomineque medio nigris: ventre rubro.

6. **Pitta irena** nec elegans! Temm. Pl. col. 591. ex Timor.

Major: rostro robustiore: viridis, cyaneo-varius: subtus flavescentis: capite nigro, superciliis flavescentibus: abdomine rubro.

7. **Pitta cyanoptera**, Temm. (hippocrepis? Wagl. -

maliacensis ex Sumatra? Blyth. - P. velata! Gr. ex Sitta velata! Temm. - Turdus macrourus fasciatus? Bodd. - Corvus brachyrurus madagascariensis! Gm.) Pl. enl. 257? Pl. col. 218. ex Sumatra, Borneo. Viridis: tectricibus alarum uropygiisque azureis; genis, cervicique nigris: subtus ochraceus; ventre rubro.

- 8? **Turdus malaccensis**, Scopoli. (Pitta superciliaris?

Wagl. - P. malaccensis, Gr. nec Schleg. - P. cyanoptera ex Malacca, Anct.) Sonn. Voy. II. t. 110. ex Asia m. or. Simillima praecedenti: minor: rostro robustiore: dorso, aliisque submaculatis.

9. **CORVUS BRACHYURUS**, L. (C. brachyrurus **bengalensis**,

Gm. - Turdus triostegus, Sparm. - Pitta bengalensis, Vieill. - P. brachyura, Gr.) Pl. enl. 258. - Albin. Av. I. t. 31. - Edw. B. t. 324. - Mus. Carls. t. 84. - Royle, Ill. Him. Bot. t. 7. 3. - J. Gr. Ill. Ind. Zool. II. t. 35. 2. Gould, Cent. Him. B. t. 23. ex India cisgangética. Obscure viridis, dorso minime maculata; genis nigris; gula alba; pectore, abdomineque ex brunneo flavis: uropygio, tectricibus alarum minoribus, caudaeque apice cyaneis: speculo alari albo.

10. **Pitta nymphæ**, Schlegel, Faun. Japon. t. Supp. A.

ex Corea. Dilute viridis: genis mentoque nigris: gula pectoraque albo-cinerascensibus: abdomine latissime rubro.

- * 11. **Pitta maculata**, Temm. Mus. Luggd. ex Asia centr.

Himal. Laetissimo viridis, dorso maculis nigris ornato! genis nigris: gula, pectore, abdomineque ex brunneo flavis: crissō rubro.

12. **Pitta brachyura**, Vig. et Horst. nec L. (**vigorsi**, Gould)
*Austr. iv. t. 2. ex Austr. Sumbawa. Major: corona
 occipitalis albo-virens; uropygio, tectricibus alarum minoribus,
 caudaeque apice viridi-caeruleis; gula nigra.*
13. **Pitta angolensis**, Vieill. 1803. (palib., Fraser, 1842.)
*O. des Murs, Pl. p. 46. ex Africa occ. Guinea.
 Obscure viridis; vitta superciliaris rufa; gula rosea; uropygio
 maculisque alaribus argenteo-cyanis: remigibus rectricibus
 que unicoloribus: speculo alari nullo.*
- c. **ERYTHROGASTRL.** Subtus rubri.
*Fusco-olivacei; capite brunneo: uropygio, tectricibusque
 alarum exteme plus minus caeruleis.*
14. **Pitta mackloti**, Temm. Pl. col. 547. ex N. Guinea.
*Major: rostro robusto: virens, subtus ruber: facie fuso-violettae;
 cervice rufo-brunnea: fascia lata pectorali, alis, cauda-
 que caeruleis: gula nigricante.*
15. **Pitta celebensis**, Forst. (forsteni, Temm.) Verh. N.
*Gesch. Ned. Ind. p. 16. ex Celebes. Minor: rostro
 debilitate: vitta verticali caeruleante: fascia pectorali cyanea
 minus lata; gula rufescens.*
16. **Pitta erythrogaster**, Cuv. - Pl. col. 212. - Griff.
*Anim. Kingd. I. t. in p. 545. ex Ina. Philipp. Minor:
 caerulea; capite rufa; dorso viridi: abdomine coccino.*
17. **Pitta venusta**, Müll. Pl. col. 590. ex Sumatra.
*Purpureo-nigricans; stria postoculari utrinque protracta, tec-
 tricimque alarum marginibus, caeruleis: abdomine rubro.*
18. **Pitta granatina**, Temm. (coccinea? Eyt.) Pl. col. 506.
*ex Borneo, Malacca? Pileo cerviceque rubris, caeruleo-marginatis; fronte genisque nigris: dorso pectoreque gra-
 natinis: abdomine rubro.*
- d. **IRIDES.** Subtus obscuri.
19. **Pitta bandii**, Müll. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Ind. t. 2.
*ex Borneo. Pileo cerviceque argenteo-caeruleis; dorso
 rubro; genis, cervice, pectore, tectricibusque alarum nigris;
 gula et fascia alari alibi: abdomine atro-cyaneo.*
20. **Pitta iris**, Gould, 1842. Austr. iv. t. 3. ex Austr. s.
*Dilute viridis; capite, collo, corporeque subtus, nigris: tec-
 tricibus alarum minoribus viridi-cyanis: criso cinnamonomeo-
 rubente.*
- e. **MELANOCEPHALL.** Subtus virides.
- Virides: capite nigro: criso rubro: uropygio, tectricibusque
 alarum minoribus argenteo-caeruleis.
21. **Pitta malaccensis**, Schlegel, nec Gr. (P. schlegeli, Bp. in
 litt. - **cucullata**, Hartl. adult. - rhodogastra, Hodgs.
 jun. - nigricollis, Blyth.) Ann. N. H. 1844. p. 410. t. 20.
ex Nepa l. Assam. Pileo brunneo!

22. **Pitta melanoccephala**, Forsten, nec Wagl. (**forsteni**,
Bp.) Verh. Nat. Gesch. Nederl. Ind. p. 19. ex Celeb.
Capite colloque ex parte nigris: remigibus ex toto nigris;
quarta et quinta omnium longissimis: cauda viridi.
23. **Pitta atricapilla**, Müll. nec Temm. (**Pitta mulleri**, Bp.)
Verh. Nat. Gesch. Nederl. Ind. p. 19. ex Celebes.
Capite colloque ex parte, caudaque nigris: remigibus nigris:
magna ex parte albis; tertia et quarta omnium longissimis:
rostro brevi, nigro.
24. **Pitta atricapilla**, Quoy et Gaim. nec Cuv. (**P. novae-**
guineae, Schlegel.) Voy. Astral. Ois. t. 8. 3. ex
N. Guineae. Capite colloque ex parte nigris: remigibus
nigris; quarta, quinta, et sexta tantum, albo-signatis: cauda
fusco-viridi.
25. **Pitta atricapilla**, Cuv. (philippensis, Vieill. Schleg.
melanocephala, Wagl. - macrorhyncha, J. Gr. - brevi-
cauda, Gr. ex Bodd. Turdus. - Corvus brachyrurus philip-
pensis, Gm.) Pl. enl. 89. ex Ins. Philipp. Minor:
capite colloque nigris (tamquam Merulinisi): remigibus fero
ex toto candidis: cauda nigerrima, extremo apice caeruleante:
rostro elongato, nigro.
Quid Pitta arvensis, J. Gr. in Griff. Anim. Kingd. I. t. in p. 530?
Quid Pitta cyanuroides, Gr. Gen. of B. p. 214. sp. 31. ex Lesson?
538. **Pitta**, Vieill. p. (Brachyrurus, Thunb. p.) Cauda longula,
cuneata: corpore subtus fasciata. Asia. Ocean. 3.
1. **TURDUS cyanurus**, Gm. exclusa patria. (**Pitta cyanura**,
Vieill. - Myiothera affinis, Horsf.) Pl. enl. 355. - Gal.
Ois. t. 153. ex Java. Rufo-olivacea: vittis superciliari-
bus flavissimis: nucha nigra: collaris angusto, cyaneo: abdomen
ex toto fasciato.
- * 2. **Pitta schwaneri**, Temm. Mus. Lugd. ex Born. Rufo-
olivacea: vittis superciliariibus aureo-flavis: nucha medio nigra:
collaris nullo: pectorale, lateribusque aureo-flavis, nigro-lineatis:
abdomine azurvo.
3. **P. elegans**, nec irenai Temm. (boschi, Müll. et Schleg.)
Less. Voy. Bon. Ois. t. 3. - Verh. Nat. Gesch. Ned. Ind.
Av. t. 1. ex Sumatra. Rufo-olivacea: vittis supercilia-
ribus flavo-aurantiis: nucha omnino rufo-aurantia: collaris
lato, nigro: abdomine latissimo chalybaco-cyaneo, undis pec-
toralibus flavo-aurantiis.
- Novum nomen huic speciei subdole datum evanescat; praesertim
quam van den Bosch neque eget adulatione, nec quid-
quam cum Naturae investigatione habeat commune.

* 539. **Cacopitta**, Bp. (Macronus, p. Gr.) Pseudo-Myiotherae
majores, *Malaiasia nanae*, haud Timaliinae! Oceania. 5.

* 1. **C. atrigularis**, Bp. Mus. Lugd. ex Borneo. Brunnea,
dorsi plumis centro dilatioribus: subtus albido-fulvescens,
plumis pectoris nigro-marginatis: criso fulvo: genis gulaque
nigris.

* 2. **Myiothera loricata**, Müll. Mus. Lugd. ex Sumatra.
Major: rufa; subtus nigra, plumis margine transversim albis:
gula alba.

* 3. **Myiothera lepidopleura**, Temm. Mus. Lugd. ex Java.
Major: rufa, plumis nigro-marginatis; loris nigris; gula alba.

* 4. **Myiothera perspicillata**, Temm. Mus. Lugd. Java.
Media: brunneo-olivacea; genis, pectoreque plumbeis albo-
striatis: mento, lorisque albis: rostro crasso.

* 5. **Myiothera leucogrammica**, Temm. Mus. Lugd. ex
Borneo. Minor: rufo-olivacea; subtus nigerrima, plumis
medio longitudinaliter albis; gula alba.

540. **Brachypteryx**, Horsf. Oceania. 5.

1. **Myiothera leucophrys**, Temm. (Brachypteryx leuco-
phrys, Gr.) Pl. col. 448. 1. ex Java.

2. **B. malaccensis**, Hartl. Rev. Zool. 1844, p. 402. ex
Asia mer. or.

3. **B. leptura**, Kuhl. - Gray, Genera of B. p. 209, sp. 4.
ex Java.

4. **B. montana**, Horsfield, in Linnean Transact. XIII.
p. 157. ex Java.

* 5. **B. albifrons**, Boie. Mus. Lugdunens. ex Java.
Mas nigro-cyanco; macula frontali alba. Faemina rufa.

541. **Oligura**, Ruppel, nec Hodggs. Africa. 3.

1. **Trochilus micrurus**, Rupp. (Tr. brevicaudatus, Gr.
Oligura micrura, Rupp. Syst.) Faun. Abyssin. t. 41. 1.
ex Abyssinia, Kordofan.

2. **O. brachyptera**, Lafresnaye, ex Sennar.

3. **O. meridionalis**, Sundev. Mus. Holm. ex Afr. m.

542. **Tesia**, Hodgs. 1837. (Oligura, Hodgs.) Asia centr. 2.

1. **Tesia cyaniventer**, Hodgs. (Saxicola olivacea,
Mac Clell. - auriceps, Hodgs. 1847.) Journ. As. Soc.
Bengal. 1837. p. 101. ex Nepal, Sishim, Assam.

2. **Sylvia castaneo-coronata**, Burton, 1845. (Tesia
flaviventer, Hodgs. 1837. - T. castaneo-coronata, Gr.
Oligura flaviventer, Hodgs. 1845.) Gr. et Mitch. Gen.
B. t. 47. 1. ex Nepal. Darjiling.

543. **Pnoepyga**, Hodgs. 1845. (Anura, 1841. - *Tesia*, p. Gr.) Asia centr. 3.

1. **Tesia albiventris**, rufiventer, et unicolor, Hodgson. ex
India s. Nepal.
2. **Tesia pusilla**, Hodgs. (*Pnoepyga pusilla*, Blyth, Cat.
1061.) *Journ. As. Soc. xiv. t. p. 588. ex Nepal. Simil-
lima praecedenti, sed minor.*
3. **Tesia caudata**, Blyth. (*Pnoepyga caudata*, Blyth. Cat.
1062.) *Journ. As. Soc. Beng. xiv. t. 588. ex Darjil.
Siskim, Assam.*

544. **Microura**, Gould. Oceania 2.

1. **M. squamata**, Gould. *Icon. Av. fig. bona. Mus. Lugd.*
*ex Java. Brunnea, rufo-punctata: gula, abdomineque me-
die, albis.*
- * 2. **M. superciliaris**, Mill. *Mus. Lugd. ex Java. Rufo-
viridis; subtus cum genis plumbea: pileo, lineaque postoculari
fuscis.*

545. **Comaroptera**, Sundeval. Africa. 2.

1. **C. olivacea**, Sundeval. *Mus. Holmiens. ex Africa
meridionali.*
2. **Sylvia brevicaudata**, Rüppel. (*Comaroptera brevi-
caudata*, Bp.) *Zoologie. Atl. t. 35. b. ex Africa
orientali.*

SUBFAM. 89. MYIOPHONINAE.

546. **Arrenga**, Less. (*Myiophonus*, p. Gr. - *Pitta*, p. Temm.) As. Ocean. 2.

1. **Turdus cyaneus**, Horsf. (*Pitta glauca*, Temm. - *Myio-
phonus cyaneus*, Gr. - *Arrenga glauca*, Less.) *Pl. col.
194. ex Java.*
2. **Myiophonus horsfieldi**, Vig. 1831. - *Gould, Centur.
Himalayan Birds, t. 28. ex Asia centr. Mont.
Nilgherries.*

547. **Myiophonus**, Temm. Asia. Ocean. 2.

1. **M. temminckii**, Vig. 1831. (*M. nitidus?* Gr.) *Gould,
Cent. Himalayan Birds, t. 21. ex Asia centr. Assam,
Arakan.*
2. **Turdus flavirostris**, Horsfield. (*Myiophonus metal-
licus*, Temminck. - *M. flavirostris*, Gray.) *Pl. col. 170.
ex Java.*

FAMILIA 44. TURDIDAE.

SUBFAM. 90. IXODINAE.

548. **Parisoma**, Sw. 1831. (*Egithina?* p. Vieill.) Africa. 3.

1. **P. subcaeruleum**, Gr. ex Vieill. (*Parisomarufiventer*,
Sw.) Levaill. Afr. t. 126. ex Africa occ.

2. **P. galinieri**, Guérin, 1843. (*frontale*, Rüpp.) Syst.
Ost. Afr. Vög. t. 22. ex Africa orient.

3. **PARUS monacus**, Gr. (*Egithina atricapilla?* Vieill.
Rubigula aberrans hinc *Pycnonotus atricapillus*, Blyth.)
Levaill. Afr. t. 140. ex Ceylon.

549. **Erpornis**, Hodgs. 1845. Asia centr. 1.

Erpornis xanthochlora, Hodgs. Pr. Zool. Soc.
1845. p. 23. ex Nepal, Arakan, Malacca.

550. **Trichostoma**, Blyth. (*Malacopteron et Macronus* p. Gr.) As. m. Malaias. 4.

1. **MALACOCINCLA abbotti**, Blyth. (*Malacopteron abbotti*, Gr.
Trichostoma abbotti, Cat. sp. 838.) Journ. As. Soc. xiv.
p. 601. ex Arakan.

2. **MALACOPTERON olivaceum**, Strickl. (*Trichostoma olivaceum*, Blyth.) Ann. Mag. N. Hist. 1847. p. 132. ex Pe-
ninsula Malacc.

3. **BRACHYPTERYX bicolor**, Less. 1839. (*Macronus bicolor*,
Gr. - *Malacopteron ferruginosum* hinc *Trichostoma bi-
color*, Blyth.) Journ. As. Soc. xiii. p. 383. ex Penins.
Malacea, Sumatra.

4. **T. rostratum**, Blyth. (*Malacopteron rostratum*, Gr.)
J. As. Soc. xi. p. 795. ex Peninsula Malacea.

551. **Malacopteron**, Eyton. (*Napothera*, p. Boie.) Asia. 2.

1. **M. major**, Blyth. Journ. As. Soc. xvi. p. 461. ex Pe-
ninsula Malacea.

2. **M. magnum**, Eyton. (*Napothera capistrata?* Boie.) Pr.
Zool. Soc. 1849. p. 103. ex Penins. Malacea.

552. **Alicippe**, Blyth. (olim *Trichostoma*, p. Bl. - *Malacopteron*
et Macronus, p. Gr.) Asia, Ocean. 9.

1. **TRICHOSTOMA affinis**, Blyth. (*Malacopteron affine*, Gr.
Alicippe affinis, Bl. Cat. 845.) Journ. As. Soc. Bengal.
1842. p. 795. ex Penins. Malacea.

2. **SETARIA albicularis**, Blyth. (*Macronus albogularis*,
Gr. - *Alcippe albogularis*, *Cat. 834.*) *Journ. As. Soc.*
xiii. p. 385. ex Penins. Malacc.
3. **MALACOPTERON cinereum**, Eyton. (*Alcippe cinerea*,
Blyth, Cat. 846.) *Pr. Zool. Soc. 1839. p. 103. ex Pe-*
nins. Malacc.
4. **A. phayrei**, Blyth, *Journ. As. Soc. xiv. p. 601. ex*
Arakan.
5. **SIVA nepalensis**, Hodgs. (*Alcippe nepalensis*, *Blyth,*
Cat. 849.) *Ind. Rev. 1838. p. 89. ex Himal. Arakan.*
6. **BRACHYPTERYX sepiaria**, Horsf. (*Alcippe sepiaria*, *Blyth,*
Cat. 840.) *Linn. Tr. xii. p. 156. ex Java.*
7. **TIMALIA poiocephala**, Jerd. (*Macronus poliocephalus*,
Gr. - *Alcippe poiocephala*, *Blyth, Cat. 850.*) *Madras*
Journ. xiii. p. 169. ex India m.
8. **BRACHYPTERYX atriceps**, Jerd. 1839. (*Macronus atriceps*,
Gr. - *Alcippe atriceps*, *Blyth, Cat. 851.*) *Madras Journ.*
x. p. 250. ex Ind. m.
9. **TIMALIA striata**, Blyth. (*Brachypteryx maculatus*, *Eyt.*
Macronus striatus, Gr. - *Alcippe striata*, *Cat. 852.*) *Journ.*
As. Soc. xi. p. 783. ex Penins. Malacc.
553. **Ixidia**, Hodgs. (*Ixodia! - Pycnonotus p. Gr. Blyth.*) *Malaysia.* 1.
Ixidia cyaniventris, Blyth. (*Malacopterum aureum*,
Eyton. - *Turdus sp. 6. Raffles.* - *Pycnonotus cyaniven-*
tris, Bl. Cat. 1278.) *Journ. As. Soc. xi. p. 792. ex*
Penins. Malaccce, Sumatra.
554. **Phyllastrephus**, Sw. 1831. Africa. 3. 55. **Ash**
 1. **Ph. capensis**, Gray. (*terrestris, Sw.*) *Levaill. Afr.*
t. 112. 1. ex Afric. mer.
2. **Ph. scandens**, Sw. *B. of west. Afr. t. 30.* ex Afr. occ.
3. **TURDUS senegalensis**, Gm. (*Phyllastrephus lugubris*,
Gr. ex Bodd.) *Pl. entl. 563. 2. ex Afr. occ.*
555. **Alcopus**, Hodgs. 1847. (*Sibia, Hodgs. 1837. - Heteropha-*
sia, Blyth, 1842.) Asia merid. 4.
 1. **SIBIA picaoides**, Hodgs. (*Heterophasia ceculoides, Bl.*)
Journ. As. Soc. Beng. 1839. p. 38. ex Himal. Darjil.
2. **CINCLOSOHA capistratum**, Vig. (*Sibia nigriceps, Hodgs.*
S. capistrata, Gr.) *Proc. Zool. Soc. 1831. p. 56. ex Him.*
3. **HYPsipetes gracilis**, MacClell. *Pr. Zool. Soc. 1839.*
p. 159. ex Assam.
4. **LEIOPTILA annectens**, Blyth. (*Sibia annectens, Gr. 1847.*)
ex India.

556. **Hypsipetes**, Vig. Genus incertae sedis: medium quasi inter Ixodinas, Edoliinas et Phyllornithinas. Asia m. Oc. 8.

1. **H. olivacea**, Jard. (err. ganeesa in tab. nec Sykes. - Ixo-
cinela olivacea, Blyth.) Selb. Ill. Orn. t. 168. ex Ins.
Mauritius.
2. **H. psaroides**, Vig. - Gould, Cent. Himal. B. t. 10.
ex Asia n. Arakan.
3. **H. nilgheriensis**, Jerd. Madr. Journ. x. p. 245.
ex Mont. Nilgheris, Ceylon.
4. **H. concolor**, Blyth, J. As. Soc. xviii. ex Tenasser.
5. **H. macstellandi**, Horsf. (viridis? Hodgs.) Pr. Zool.
Soc. 1839. p. 159. ex *Assam*, *Arakan.*
6. **IxoCINCLA virescens**, Blyth. (hinc Hypsipetes virescens,
Bl. Cat. 1251.) Journ. As. Soc. xiv. p. 579. et xv. p. 51.
ex Ins. Nicobar.
7. **H. malaccensis**, Blyth, Journ. As. Soc. xiv. p. 574.
ex Malacca.
8. **H. philippensis**, Strickl. Ann. Nat. Hist. 1844.
p. 415. ex Ins. *Philip.*

557. **Jole**, Blyth. (Criniger, p. Gr.) Asia m. Oc. 2.

1. **Jole olivacea**, Blyth. (Criniger. sp. 10. nec Cr. oliva-
ceus, Gr. gut Trichophorus olivaceus, Sw.) Journ. As. Soc.
xiii. p. 386. et xiv. p. 573. ex *Java*, *Malacca.*
2. **Jole virescens**, Blyth, Journ. As. Soc. xiv. p. 573.
ex Arakan.

558. **Andropadus**, Sw. 1831. (Polyodon, Lafresn. nec Hodgs.) Africa. 3.

1. **TURDES importunus**, Vieill. (Turdus clamosus, Steph.
Trichophorus brachypodioides? Jard. - Ixo importu-
nus, Temm. - Polyodon importunus, Lafresn - Andro-
padus vociferus et familiaris, Sw. - A. importunus, Gr.)
Lev. Afr. t. 106. 2. - Mag. Zool. 1832. Ois. t. 4. ex Afr. m.
2. **A. latirostris**, Strickl. Ann. Nat. Hist. xv. p. 127.
3. **A. gracilirostris**, Strickl. Ann. N. Hist. xv. p. 127.

559. **Hemixos**, Hodgs. (nec Hemipus! - Picnonotus, p. Gr.) Asia. 2.

1. **H. flavala**, Hodgs. (Pycnonotus flavulus, Gr.) Mitch.
Gen. B. t. 59. ex *Assam*, *Arakan*, *Tenasserim.*
Alis lituris daubus flavis.
2. **CRINIGER ictericus**, Strickl. (Turdus indicus, Jerd.
nec Gm. - Hemixos icterica, Blyth. Cat. 1255.) Ann. et
Mag. N. H. 1844. p. 411. ex *Ind. m.* *Ceylon.*

561. **Trichophorus**, Temm. (olim Criniger. - Trichas, Glog.
1827, nec Sw.)

Asia. Africa. 14.

a. AFRICANI.

1. **CRINIGER barbatus**, Temm. (Trichophorus strigilatus,
Sw. - T. barbatus, Temm.) Pl. col. 88. ex Afr. occ.
Major: olivaceus, cauda subrufescens: gula flava.
- * 2. **CRINIGER icterus**, Temm. Mus. Lugd. ex Afr. occ.
Guinea. Similis Tr. barbatus, sed duplo minor.
- * 3. **CRINIGER poliocephalus**, Temm. Mus. Lugd. ex Afr.
occ. Medius: fuscocastaneus, subtus albidus; pilo, genis,
caudaque nigro-plumbeis.
4. **Tr. tephrogenys**, Jard. (gularis, Sw. nec Horsf.)
Selb. Ill. Orn. t. 127. ex Africa occ.
5. **Tr. olivaceus**, Sw. (Criniger olivaceus, Gr.) B. of
west. Afr. 1. p. 284. ex Afr. occ.
6. **Tr. flaviventris**, Smith. (Criniger flaviventris, Gr.)
Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 59. ex Afric. mer.

b. ASIATICI.

7. **T. striatus**, Blyth (Alc. striatus, Hodgs.) Journ. As.
Soc. xi. p. 184. XII. et p. 925. ex Himal. Dargiling.
8. **T. flaveolus**, Gould. (xanthogaster, Hodgs. - Criniger
flaveolus, Blyth.) Proc. Zool. Soc. 1836. p. 6. (214) ex
Himal. Arakan. Cristatus! olivaceus; subtus flavus,
gula alba.
9. **TURDUS gularis**, Horsfield. (Trichoxos phaiocephalus,
Hartl. 1844. - Pyconotus ruficaudatus, Eyton. 1845.
Trichophorus caniceps, Lafresn. - Tr. gularis, Temm.)
Linn. Trans. XIII. p. 150. ex Pen. Malacca. Java.
- * 10. **T. gutturalis**, Müll. Mus. Lugd. ex Borneo. Simi-
lis Tr. gularis, sed major; gula latissime alba; abdomen
rufo-cinereo, minime flavante!
- * 11. **NAPOTHERA sulphurata**, Müll. (Trichophorus sulphu-
reus, Temm.) Mus. Lugd. ex Borneo. Similis prae-
cedent, sed minor; gula anguste alba; abdomine flavissimo.
- * 12. **T. sulphuraceus**, Temm. (**flavicaudus**, Bp.) Zool.
Astr. et Zelée t. 15. 1. (Tr. analogus) ex Amboina.
Viridi-olivaceus, subtus flavo-virens; gula, cauda subtus api-
ceque late, flavissimis.
- * 13. **T. pulexulentus**, Müll. Mus. Lugd. ex Sumatra.
Nigricans: subtus allus, pectore cinereo; gula candida.
- * 14. **T. striolatus**, Müll. Mus. Lugd. ex Sumatra. Nigri-
cans; subtus omnino allo cinereo quo substriatim nebulosus.

561. **Setornis**, Less. 1839. (Criniger, Gr. p.) Asia or. mer. 1.

BRACHYPSUS criniger, Hay. (*Setornis criniger*, Less. - Criniger sp. 14. Gr.) *Less. Rev. Zool.* 1839. p. 167. ex *Penninsula Malacca, Sumatra.*

562. **Microscelis**, Gr. (*Micropus*, Sw. - *Microtarsus*, Eyton.) Asia Ocean. 5.

1. **Microscelis melanoleucus**, J. Gray, *Zool. Misc.*

p. 1. ex *Asia mer.*

2. **MICROTARSUS MELANOLEUCUS**, Eyton, nec Gr. (M. species 3. Gr. *Brachypodus tristis*, Blyth.) *Proc. Zool. Soc.* 1839. p. 102. ex *Peninsula Malacca.*

3. **TURDUS amaurotis**, Temm. (*Orpheus amaurotis*, Schl.) *Pl. col.* 497. - *Faun. Jap.* t. 30. ex *Japonia.*

4. **TURDUS squamiceps**, Kittl. (*Microscelis squamiceps*, Gr.) *Mém. Acad. Petersb.* 1825. t. 16. - *Kupf. Vög.* t. 21. n.

5. **TURDUS philippensis**, Gm. (*Microscelis philippensis*, Gr.) Kittl. *Kupf. Vög.* t. 12. 2. ex *Ins. Philipp.*

563. **Picnonotus**, Kuhl. (*Ixos*, p. Temm. - *Brachypus* p. Sw.

Hemitarsus, Sw. nec Gould.)

Asia Oc. 3.

1. **TURDUS ochrocephalus**, Gm. (*Ixos ochrocephalus*, Temm. - *Trichophorus cristiceps* hinc Criniger ochrocephalus, Blyth) - *Microscelis ochrocephalus*, Gr. - *Sturnus zeylanicus*? Gm.) *Brown, Ill. t. 22.* - *Pl. col.* 136. ex *Penins. Malacca, Java, Sumatra.* Major: *cinerous, albo-striatus, gula alba, crissos flavescente: alis caudae viridibus: pileo flavo-ochraceo.*

*2. **P. inornatus**, Kuhl. (*Ixos inornatus*, Müll.) *Mus. Lugd.* ex *Sumatra.* *Medius: olivaceus; subtus cinereo-virens: pileo cinereo-fuscenscente: gula albida.*

*3. **P. simplex**, Kuhl. (*Ixos simplex*, Müll.) *Mus. Lugd.* ex *Sumatra.* *Minor: olivaceus; subtus cinereus, crissos tantum virescens; pileo concolor; gula vix albicans.*

564. **Brachypus**, Sw. 1824. nec Wolf. (*Brachypodus*, Blyth.)

Alcurus, Hodgs. 1844.)

Asia m. Oc. 15.

1. **TURDUS dispar**, Horsf. - *Pl. col.* 137. ex *Java.* *Gula sanguinea!*

2. **Turdus bimaculatus**, Horsf. (*Lanius bimaculatus*, Less. - *Haematornis bimaculatus*, Sw. - *Pycnonotus bimaculatus*, Gr.) *Less. Cent. Zool.* t. 75. ex *Java.* *Loris aurantiis!*

3. **BRACHYPSIS gularis**, Gould (rubineus, Jerd. - Pycnonotus gularis, Blyth.) Ill. Ind. Orn. t. 37. ex Ind. m. Travancore. Minor; flavo-olivaceus; pīeo, genisque nigris.
4. **LANIUS melanocephalus**, Gm. (Turdoides hinc Ixos atriceps, Temm. - Pycnonotus melanocephalus, Gr. Ixos metallicus? Eyston) Pl. col. 147. ex Burmania, Malaisia, Java, Ins. Bawean. Flavo-olivaceus; capite, remigibus, caudaeque fascia subterminali nigris.
5. **Ixos squamatus**, Temm. (Pycnonotus squamatus, Gr.) Pl. col. 453. 2. ex Java. Niger; dorso aliquo flavo-olivaceo; gula alba; pectore albo-squamato; criso aureo; cauda apice alba.
6. **B. cinereiventris**, Blyth, Journ. As. Soc. xiv. p. 576. ex Tipperra.
7. **B. poliocephalus**, Jerd. (Pycnonotus poliocephalus, Gr.) Ill. Ind. Orn. t. 31. ex India mer.
8. **Ixos virescens**, Temm. (Ixocinclia virescens, Bl. - Microscelis virescens, Gr.) Pl. col. 382. 1. ex Java. Virescens; subtus albo-fuscumque nubulosus.
9. **PYCNONOTUS xantholaimus**, Jerd. Ill. Ind. Orn. t. 35. ex India m. Simillimus sequenti; sed major, magis cristatus, et gula flavo; cauda obsolete fasciolata.
10. **Ixos leucogrammicus**, Müll. (Pycnonotus leuogrammicus, Gr.) Tijdschr. 1835. p. 362. ex Sumatra. Medianus: subrufatus; virescens, plumis capitis, dorsi, pectoris que rachidibus albis; gula abdomineque albis.
- * 11. **Ixos tigus**, Müll. Mus. Lugd. ex Sumatra. Similis preced, viridis et subtus squamatus; sed minor, et macula auriculari flava.
12. **Ixos tympanistrigus**, Müll. (cristatellus, Mus. Lugd. - Pycnonotus tympanistrigus, Gr.) Tijdschr. 1835. p. 353. ex Sumatra. Rufo-fuscus; subtus albido; pectore cinerascente, criso flavescente; capite vix cristato: rectricibus extimis apice albis.
- * 13. **Ixos poliopsis**, Muhl. Mus. Lugd. ex Sumatra. Plumbeus, dorso, aliis, tectricibusque caudae superioribus flavo-olivaceis; criso aureo: cauda apice nigro.
14. **Ixos chalcocephalus**, Temm. Pl. col. 453. 1. Java. Cinereus, subtus dilutior: capite nigro: cauda apicem versus nigro albo terminata.
- * 15. **Ixos vidua**, Temm. Mus. Lugdunens. ex Borneo. Mas nigro-fuliginosus; tectricibus alarum albis. Faem. ex toto cinereo-fuliginosa; aliis unicoloribus.

565. **Ixos**, Temm. (olim Turdoidea - Brachypas, p. Sie. - Alcarus, p. Hodgs. - Picnonotus, p. Gr.) As. Eur.m. Afr. 27.

a. Asiatici et Oceanici.

1. **Lanius jocosus**, L. (emeria, Shaw. - Gracula cristata, Scopoli. - Sitta chinensis, Osbeck. - Pyconotus jocosus, Blyth.) Cat. Calc. Mus. sp. 1260. ex India, Arakan, China. Macula auriculari, crissaque rubris; abdomine flavo.

2. **I. pyrrhotis**, Hodgs. - Pl. ent. 508. ex India. Macula auriculari, crissaque rubris; abdomine albo: major; collaris vix illo.

* 3. **I. erythrotis**, Bp. ex Sw. Mus. Lugd. ex Java. Simillimus praecedens; macula auriculari, crissaque rubris; abdomine albo: sed minor; collari nigro interrupto.

4. **I. pygmaeus**, Hodgs. (Pycn. pseudocaser hinc bengalensis, Blyth. - caser ex India, Auct. - Ixos caser, Temm.) ex Him. Assam, Bengal. Crisso tantum rubro; abdomine albo: major; pectore, cerviceque nigris; macula auriculari brunnea.

5. **MUSCICAPA haemorrhoa**, Gm. (Turdus haemorrhous, Horsf. - Haematornis caser, Jerd. nec L. - II. pusillus, Blyth. - Picnonotus haemorrhous, Gr. - Haematornis chrysoroides, Lafr.) Brown, Ill. Zool. t. 31. 1. ex Ind. m. Ceylon, Arakan. Crisso tantum rubro: medius; pectore cerviceque cinereis; macula auriculari nulla.

6. **PYCONOTUS nigrripileus**, Blyth, J. As. Soc. XVI. p. 472. ex Tenasserim.

7. **I. leucotis**, Gould. (Picnonotus leucotis, Blyth.) Proc. Zool. Soc. 1836. p. 6. ex Sind. Macula auriculari alba.

8. **BRACHYPUS leucogenys**, J. Gr. (Ixos plumigerus, Lafr. Haematornis cristatus, Burn. - Picnonotus leucogenys, Blyth.) Ill. Ind. Zool. II. t. 35. 3. ex Cashmir. Cinerovo-viridis, genis albis: subtus cinereus; gula, pectoreque nigra; crisso taurum flavo; cauda apice albo.

9. **BRACHYPUS melanocephalus**, J. Gr. (plumifer, Gould. - Vanga flaviventris, Tickell. - Pyconotus melanocephalus, Blyth. - Aleurus melanocephalus, Hodgs.) Ill. Ind. Zool. t. 35. 1. ex Assam, Arakan, Nepal. Viridi-olivaceus; subtus a mento viridi-flavus: capite cum crista elongata ex toto nigro: cauda unicollere.

10. **TERDUS analis**, Horsf. (Muscicapa pidi? Gm. - M. goiavier? Scopoli. - Picnonotus goiavier, Gr.) Sonn. Voy. t. 28. ex Pen. Malacc. Singap. Java, Borneo. Gula alba; pectore cinereo, fusco-nebulosa; crisso flavo.

11. PYCNONOTUS *flavescens*, Blyth, Journ. As. Soc. xiv.
p. 668. ex Arakan.
12. TURDUS *chrysorrhaeus*, Lath. (Muscicapa haemorrhous var. β . Gm. - Ixos chrysorrhaeus, Temm.) Brown,
Ill. Zool. t. 31. 2. ex Java. Simillimus Ix. aurigaster
ex Afr. sed crissio aurantiaco facie tantum cum mento nigra.
13. PYCNONOTUS *flavirictus*, Strickl. (Ixos virescens,
Tickell, nec Temm. - Trichophorus virescens, Jerd. - Cri-
niger tickelli, Blyth) Ann. et Mag. N. H. 1844. p. 43.
ex Ind. m. Ceylon.
14. PYCNONOTUS *plumosus*, Blyth, Journ. As. Soc. xiv.
p. 567. ex Penins. Malacc.
15. PYCNONOTUS *brunneus*, Blyth, Journ. As. Soc. xiv.
p. 568. ex Penins. Malacc.
16. PYCNONOTUS *finlaysoni*, Strickl. Ann. Mag. N. H. 1845.
p. 411. ex Birmania, Arakan.
17. MUSCICAPA *sinensis*, Gm. (Turdus palmarum, Mus.
Lugd. nec L. - occipitalis, Less. ex Temm. - Pycn. sinen-
sis, Blyth. - P. occipitalis, Gr.) Eyd. et Gerv. Voy. Favor.
t. 14. - Mag. Zool. 1836. Ois. t. 66. ex Ias. Philipp.
Viridis; subtus albus; capite laevi, sincipite lorisque nigris;
nucha genisque albis.
18. PYCNONOTUS *fusqueti*, Gr. ex Eydoux et Soul. Voy.
Bonit. Ois. t. 5. ex Ocean.
19. PYCNONOTUS *gourdinii*, Gr. ex Hombr. et Jacquin. Voy.
Pole Sud, Ois. t. 14. 1. ex Oceania.
- b. Africani.
20. I. *arsinoe*, Licht. (Pyconotus arsinoe, Gr.) Cat.
Doubl. Berl. Mus. p. 39. sp. 442. ex Afr. Egypt. Ara-
bia. Fusco-cinereus; capite nigricante; abdomine sordide
albo; crissio candido.
21. TURDUS *obscurus*, Temm. (Pyconotus obscurus, Bl.
Ixos obscurus, Bp. - Haematornis lugubris, Less.) Man.
Orn. II. p. 608. ex Afr. s. Hispania. Major: dilutior
quam proximus Ixos arsinoe, abdomen tamen obscurore.
- *22. I. *ashanteus*, Bp. (obscurus ex Ashantea, Mus. Lugd.)
ex Afr. occ. Simillimus praecedenti, sed valde minor.
23. HAEMATORNIS *flavicollis*, Sw. (Pyconotus flavicollis,
Gr.) B. of western Afr. t. p. 259. ex Afr. occ. Brun-
neo-olivaceus: subtus dilutior; gula juguloque flavis.
24. TURDUS *capensis*, Gm. (Pyconotus caser? et capensis,
Gr.) Briss. Orn. III. t. 27. 3. - Lev. Afr. t. 105. ex
Africa mer. Subtus ex toto nigricans; crissio flavissimo.

25. **TURDUS nigricans**, Vieill. (capensis var. Lath. - levaillantii, Temm. - Ixos xanthopygius, Ehrenb. - Pyconotus nigricans, Gr.) *Pl. enl.* 317. - *Lev. Afr.* t. 106. t. ex Africa mer. et or. Gula nigerrima; pectore abdomineque albo-canescensibus: crisso pallido flavo.
26. **TURDUS aurigaster**, Vieill. nec chrysorrhacus, Temm. (Haematornis aurigaster, Sw. - Pyconotus aurigaster, Gr.) *Lev. Afr.* t. 107. 2. ex Africa mer. Similis Ix. chrysorrhaeo ex Java, sed crisso flavo.
27. **TURDUS cafer**, L. (Ixos cafer, Bp. - Ix. haemorrhous, Temm. Mus. Lugd.) *Pl. enl.* 563. 1. - *Lev. Afr.* t. 107. 1. ex Afr. m. Simillimus Ix. haemorrhous ex India; pectore cereiceps cinereis, auribus concoloribus: sed valde minor.
566. **Bradornis**, Smith. Africa. 2.
1. **B. marequensis**, Smith, Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 113. a. adult. b. jun. ex Africa mer.
 2. **B. major**, Smith, Ill. S. Afr. Zool. fig. nulla. ex Afr. m.
- SUBFAM. 91. TURDINAE.
567. **Myiomela**, Hodg. (olim Muscicula-Copsychus, p. Blyth.) Asia centr. 1.
MUSCISILVIA leucura, Hodg. (Notodela! leucura, Blyth.
Myiomela leucura, Gr.) *Pr. Zool. Soc.* 1845. p. 27. ex Nepal, Maseri.
Huc, potius quam ad Eupetes, spectat Ajax diana, Less. Bengal. Voy. Ind. or. Ois. t. 3.
568. **Copsychus**, Wagl. 1827. (Gryllivora, Sw. 1831. - Cercotrichas, Boie. - Dahila hinc Polypeira, 1841. Hodgs.) Asia. Ocean. 5.
1. **TURDUS mindanensis**, Gm. (aemanus? Horsf. - Laninus musicus, Raffl. excl. synon. - Gryllivora magnirostris et rosea? Sw. - Copsychus mindanensis, Blyth) *Pl. enl.* 627. 1. ex Penins. Malacca.
 - *2. **TURDUS pluto**, Temm. Mus. Lugd. ex Borneo. Splendide nigerrimus; tectricibus alarum exterioribus, rectricibusque extinis utrinque tribus, maxima ex parte albis. Juv. subtus ardesiacus. Juv. pectoro sordido rufescente, abdome albo.
 3. **GRACULA saularis**, L. (Gryllivora intermedia, Ste. - Dahlia docilis, Hodgs. - Copsychus saularis, Wagl.) *Edu. B. t.* 181. ex Bengal, Nepal, Arakan.
 4. **C. luzoniensis**, Kittl. *Kupf. Vog. t.* 11. 2. - Mem. Ac. Pet. 1835. t. 2. et t. 7. ex Ins. Philipp.
 5. **TURDUS cinnamomeiventris**, Lafresn. (Saxicola albiscapulata, Rupp.) *Faun. Abyss.* t. 26. 1. - Mag. Zool. 1836. t. 55. ex Africa, m. et or.

569. **Kittacincla**, Gould. 1830. (*Copsychus*, p. *Gr.*) Ocean. 1.
TURDUS macrourus, Gm. (tricolor, Vieill. - Gryllivora
 longicauda, Sw. - *Copsychus macrourus*, Wagl. - *Kit-*
tacina maeroura, Gould.) *Lath. Syn. III. t. 39. - Lev.*
Afr. t. 114. - Kittl. Kupf. Vog. t. 11. 1. ex Ocean.
570. **Geocichla**, Kuhl. (*Turdus*, p. *Gr.*) Asia. 12.
 1. **TURDUS unicolor**, Tickell. (*Geocichla unicolor*, Blyth.)
Cat. Calc. Mus. p. 163. sp. 954. ex As. centr. Masuri.
 2. **TURDUS dissimilis**, Lath. (*Geocichla dissimilis*, Blyth.)
Journ. As. Soc. XVI. p. 144. ex Bengal. 572
 3. **TURDUS cyanotus**, Jard. (*Geocichla cyanotus*, Blyth.)
Selby, Ill. Orn. t. 46. ex India, Gumsur.
 4. **TURDUS citrinus**, Lath. (*macei*, Vieill. - *lividus*, Tick.
rubeculus, Horsf. - *Geocichla citrina*, Blyth.) *Pl. col. 445.*
ex Bengal, Nepal, Assam, Arakan.
 5. **G. rubiginosa**, Müll. (*Turdus rubiginosus*, Gr.)
Verh. N. G. Nederl. Ind. p. 172. ex Malaia s. i.
 6. **G. innotata**, Blyth. (*Turdus innotatus*, Gr.) *Journ.*
As. Soc. XVI. p. 146. ex As. m. or. Ins. Nicobar.
 7. **TURDUS interpres**, Kuhl. *Pl. col. 458. Java, Sumatr.*
 8. **TURDUS vanikorensis**, Quoy et Gaim. - *Voy. Astrol.*
Ois. t. 7. ex Ocean.
 9. **MERULA castanea**, Gould, 1835. (*Turdus castaneus*,
Gr. - rubro-canus, Hogds.) *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 56.*
ex Asia centr. Darjiling.
 10. **TURDUS badius**, Lath. - *White*, *Voy. t. in p. 157. ex*
Australia.
 11. **TURDUS poliocephalus**, Lath. (*fuliginosus*, Lamb.
Merula nester, Gould.) *Jard. et Selb. Ill. Orn. n. s. t. 37.*
ex As. m.
 * 12. **TURDUS terrestris**, Kittl. (*T. aonala schkae?* Gm. - *Myio-*
thera passerina, Mus. *Lugd.*) *ex Ins. Bonin. Minor:*
olivaceo-rufus, dorso nigro vario; coda magis rufescens; gu-
la, abdomineque medio, albis: criso albo nigroque vario.
571. **Oreocinclæ**, Gould. (*Turdus*, p. *Gr.*) Rectricibus qua-
 tuordecim! As. Eur. Ocean. 2.
 1. **TURDUS varius**, Horsf. (*lunulatus*, *Sundev*, *ex Lath.*
Oreocincla lunulata et macrorhyncha, Gould, 1837.)
Zool. Res. Java, figura. - Gould, Austr. IV. t. 7. ex
Malaia s. Austral. accid. Eur? Minor: olivaceus;
subitus albus, plumis apico perfusis; gula fusco-varia; remi-
gum secunda et sexta acqualibus; quinto omnium longissima.

2. **Terdus varius**, Pall. (*aureus*, Hollandre. - whitii, Eyt. squamatus, Boie, 1845. - Oreocinclala whitii et parvirostris, Gould. - O. dauma? Bl.) Zoogr. Ross-As. t. p. 449. sp. 88. - Strom, Svenska Fogl. 1839. p. 95. II. p. 119. Gould, Eur. t. 81. ex Asia centr. et sept. Japon. accid. Eur. Major: olivaceus; subtus albus, plumis apice nigro-lunulatis: gula alba: remigum secunda et quinta aequalibus; terita omnium longissima.
- Quid O. piloptera, ex Ceylon, et O. nilgheriensis, ex Maser, Blyth, Journ. As. Soc. xlvi. p. 142. et 181?

572. **Turdus**, L. (Merula, Leach, 1816. Boie. - Ixocossyphus, Arceuthornis, Cichloides et Copsychus, Kaup.) Cosmop. 60.

1. **TURDI VIREI**. Subtus guttulatus. Sexus inter se similes.

a. *Orbis antiqui.*

1. **T. viscivorus**, L. (Ixocossyphus viscivorus, Kaup.) Pl. enl. 489. - Gould, Eur. t. 77. - Naum. Vög. Eur. t. 66. 1. ex Eur. minime vero oriental. nec Siberia. Major: olivaceus: tectoribus alarum inferioribus albis: rectricibus lateralibus apice albis.
2. **T. viscivores** et oreocinlocoides? Hodgs. (*hodgsoni*) Homeyer, 1842. - Oreocinchla mollissima? Blyth. - O. rostrata? Aliq. err. Rhea n. p. 150. sp. 8. Gatt. Turd. ex As. centr. Nepal. Darjiling. Simillimus praecedenti; rostro longiore, robustiore: alis subtus fascia transversa, lata, nigra.
3. **T. guttatus**, Vig. 1831. Smith, Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 30. ex Afr. mer. Rufo-olivaceus; subtus albus, guttulis nigris rotundatis: tectoribus alarum albo-guttatis!
4. **T. strepitans**, Smith. (Merula letsitsirupa, Smith, 1846. - crassirostris, Licht, 1842. nec Gm. - Merula simensis, Rupp.) Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 37. mas. - Faun. Abyss. t. 29. 1. jan. ex Afr. mer. et or. Olivaceo-caudens; subtus albo-ochraceus, maculis crebris obscuratis: tectoribus alarum inferioribus, remigumque pugno interno ad basin, ochraceo-ferrugineis: rostro elongato; mandibula, pedibus flavis.
5. **T. pilaris**, L. (Sylvia! pilaris, Sav. - Arceuthornis pilaris, Kaup.) Pl. enl. 490. - Gould, Eur. t. 76. - Naum. Vög. Eur. t. 67. 2. ex Eur. et As. s. Fusco-castaneus, capite uropygiisque canis: subtus albus; gula, pectoreque nigro-maculatus; loris nigris.

6. **T. dubius**, Bechst. (naumanni, Natter. Temm. Cuv. ruficollis, var. β . Pall.) Vög. Deutschl. t. 5. 1. 2. fig. mala. Naum. Vög. Deutschl. t. 68. 1. 2. - Gould, Eur. t. 79. adult. ex Eur. or. As. occ. satis frequens autumn. in Hungaria; accidental. in Germania. Cinerous-olivaceus, marginibus remigum et tectricum majorum tantum rufescens; superciliis postice dilatatis albo-rufescens; subtus ochraceus, pectore rufescens; lateribus maculis magnis, crebris, obscuratis, rufo-ferrugineis! saepius albo-limbatis: tectricibus alarum inferioribus rufo-ferrugineis, externis apice aliis: rectricibus basi rufis.
7. **T. eunomus**, Temm. (fuscatus, Pall. - dauma? Lath. naumanni, Schleg.) Pl. col. 514. - Zoogr. Ross-As. t. in p. 451. ex As. s. et or. Japon. minime Europ. Fusco-brunneus, als fore omnino rufus; superciliis albo-rufescens; postice dilatatis: subtus albidos; pectore, lateribusque macululis magnis, nigricantibus, ovatis: tectricibus alarum inferioribus rufo-ferrugineis: rectricibus minime rufescens.
8. **T. cardis**, Temm. Pl. col. 518. ex Asia or. Japon. Mas niger, merulinus; abdomine albo nigro-lunulatus. Faem. olivacea, turdinal. subtus alba, pectore lateriusque rufescens, undique nigro-maculata.
9. **T. musicus**, L. - Pl. enl. 406. - Gould, Eur. t. 78. 1. Naum. Vög. Deutschl. t. 68. 2. ex tota Europa exclusa boreal. Afr. s. Medius: olivaceus; subtus albo-rufescens, lateribus cinereis, guttulis nigricantibus: tectricibus alarum inferioribus albo-rufescens.
10. **T. iliacus**, L. (illas, Gesn.) Pl. enl. 51. - Gould, Eur. t. 78. 2. ex Eur. et As. s. Afr. s. Minor: brunneo-olivaceus, superciliis albidi; subtus albus, guttulis nigris, crebris; lateribus, tectricibusque alarum inferioribus, vividerufis.
- b. Americani.
11. **T. mustelinus**, Gm. (melodus, Wils.) Vieill. Ois. Am. s. t. 62. - Wils. Am. Orn. t. 2. 1. - Aud. t. 73. ex Amer. s. univers. Medius; rufo-olivaceus; subtus canidus, gula, pectore, lateribusque, maculis nigris rotundis.
12. **T. solitarius**, Wils. nec Gm. (minor, Vieill. part. Bp. Syn. - Naum. Is. 1826. - nanus, Audub. - guttatus, Tschudi nec Vig. - pallasi, Caban. - Muscicap. guttata? Pall. - Merula solitaria et silens? Sw.) Wils. Am. Orn. t. 43. 2. - Aud. Am. t. 58. et 419. - Richards. Faun. Bor. Am. t. 35. ex Am. s. univ. Minor; olivaceus, cauda rufescens; subtus albus, gula, pectoreque nigro-guttulatis: remigum secunda et sexta subaequalibus; tortia, quarta, et quinta, omnium longissimis.

13. **T. minor**, Gm. (parvus, Jardine. - olivaceus, Brewer.
wilsonii, Sw. nec Bp. - swainsoni, Tschudi. - brunneus!
Gr. ex Bod.) Vieill. Ois. Am. s. t. 63. - Richards.
Faun. Bor. Am. t. 36. ex Am. s. et m. Minor: oliva-
ceus, cauda dorso concava: subtus albus, gula, pectoreque ru-
fescente, nigro guttulatis: remigium prima et tertia aequali-
bus; secunda omnium longissima.
14. **T. mustelinus**, Wils. nec Gm. (wilsoni, Bp. - Caban.
nec Sw. - Merula minor, Sw. - T. fuscescens! Gr. ex Shaw.)
Am. Orn. t. 43. 3. - Faun. Bor. Am. t. 36. - Aud. Am.
t. 164. ex Amer. s. Cinnamomeo-olivaceus; subtus albidae,
pectore rufescenti; gula tantum maculis paucis fuscis: remi-
gium secunda quintam superante; tertia et quarta omnium
longissimis.
15. **T. densirostris**, Vieill. ex Antill. Major: fus-
cus, plumis margine dilutioribus: subtus albus; gula, pectore
cinerascens, lateribusque fuso-varius: alis brevibus; remi-
gibus secundariis, tetricibus caudae, rectricibusque apice, al-
bis: rostro elongato, pedibusque robustis.
16. **T. montanus**, Lafren. Rev. Zool. 1844. p. 167. ex
Ins. Guadalu. Minor: fuliginosus; subtus cinerascens,
maculis nigricantibus subfuscatis: rectricibus lateralibus
macula apicali interno alba.
17. **T. herminieri**, Laf. Rev. Zool. 1844. p. 167. ex
Ins. Guadalu. Brunneo-olivaceus: subtus albus, ex toto
tamquam squamatus: rostro robusto elongato, subtus et apice,
pedibusque flavis.
2. **TURDI ERRATICI**, Selys.
Gula tantum striata, vel discolor: tectrices alarum infe-
riores plus minus rufae. Sexus saepe dissimiles.
- a. Americani.
18. **T. naevius**, Gm. (Orpheus meruloides, Bp. - Mimus
meruloides, Bp.) Vieill. Ois. Am. s. t. 66. - Richards,
Faun. Bor. Am. B. t. 38. - Aud. Am. t. 369. 2. 3.
Kittl. Kupf. Vog. t. 25. 1. ex Am. s. o. c. Plumbeus,
superciliosi et fasciis alaribus, rufis; subtus aurantio-rufus,
fusca pectorali lata nigra.
19. **T. aurantiostriata**, Hartl. Rev. et Mag. Zool.
1850. p. 158. ex Venetia et la. Laete olivaceus, remigibus
intus nigricantibus; subtus albidae, pectore lateribusque ci-
nerascentibus; gula vix striata; criso albo; annulo oculari
nudo, rostro, pedibusque aurantiis.
20. **T. jamaicensis**, Gm. (leucophthalma, Hill. - ca-
pucinus, Hartl.) Gosse, Ill. Jam. t. 24. ex Antill.
Nigricans, capite fuso-castaneo: subtus cinereus; gula alta,
fuso-striata.

21. **T. ferrugineus**, Wied. (olivaceus, Laf. nec L. - famigatus, Licht. - variegatus et striatus? L. jun.) Beitr. N. H. Bras. III. p. 649. ex Brasil. Rufo-olivaceus; remigibus intus ferrugineis: subtus dilutior, ventre albicante; gula obsolete fuscoc-striolata.
Jun. ferrugineo-guttatus, abdomine fuscoc-undulato.
- * 22. **T. palliatus**, Bp. (rufo-palliatus? Laf.) Rev. Zool. 1840. p. 259. - Mus. Lugd. ex Mexico. Ciaco-olivaceus, dorso abdomineque rufo-cinnamomeis: gula alba, nigro-guttulata; remigum prima quintam aequante; secunda et tertia omnium longissimis.
23. **T. grayi**, Bp. Pr. Zool. Soc. 1837. p. 118. sp. 32. ex Mex. m. Olivaceo-fuscus: subtus flavo-cinnamomeus; gula tantum vix fuscente striata: tectricibus alarmi inferioribus, remigumque margini interno, aurantio-cinnamomeis: remigum prima sextam aequante; quarta et quinta omnium longissimis.
24. **T. crotopezus**, Illig. (leucocelias, Vieill. ex Azara 80. albiventer, Spix.) Av. Bras. t. 69. ex Brasil. Minor: rufo-olivaceus; gula nigricans, albo-striolata; pectore abdomeque allis.
Faem. subtus fuscus. Jun. abdome medio tantum albo.
25. **T. albicollis**, Vieill. (humilis, Licht.) Spix, Av. Bras. t. 70. ex Brasil. Major: fuscus, dorso subrufescente, alis caudaque cinerascentibus: gula nigro-maculata; collaris late albo; abdome medio crisoque allis; lateribus rufis.
- * 26. **T. gymnopis**, Temm. Mus. Lugd. ex Bras. Medius; brunneo-olivaceus; subtus cinnamomeo-cinereus, criso albo: gula albicante, fuscocento substriolata: orbitis late nudis: tectricibus alarmi inferioribus fluorescentibus.
27. **T. chocchi**, Vieill. ex Azara 79. (rufiventris, Licht.) Spix, Av. Bras. t. 68. ex Bras. Parag. Major: brunneo-olivaceus; abdome crisoque ferrugineus; gula alba fuscoc-striolata: palpebris nudis, tumidis, flavissimis.
28. **T. magellanicus**, King. (falklandicus, Quoy et Gaim. - maluinum, Licht. - Merula magellanica, Blyth.) Proc. Zool. Soc. 1830. p. 14. ex Patagon. Major: brunneo-olivaceus, capite nigricante; subtus omnino rufo-cinereus, gula nigro-striolata.
Faemina valde minus rufascens.
29. **T. migratorius**, L. (canadensis, Br. - Merula migratoria, Gould) Pl. enl. 556. I. - Gould, Eur. t. 74. - Vieill. Ois. Am. s. t. 60. mas. 61. jun. - Wils. Am. Orn. t. 2. 2. Aud. Am. t. 131. ex Am. s. accidental. Europa (aufugus!). Fuso-olivaceus; subtus rufus; capite nigro-ardesiaco; jugulo albo, nigro-striato; ventre pure albo: remigum secunda omnium longissima.

b. Orbis antiqui.

30. **T. olivaceus**, L. (migratorius ex Europa, Auct? - Merulella olivacea, Blyth.) *Lev. Afr.* t. 98. 99. ex *Afr.* accid. *Eur.* m. *Medius: cinereo-olivaceus; gula alba, fuso-striolata; abdomine ferrugineo; crasso albo; rostro pedibusque flavidis.*
- * 31. **T. olivaceinus**, Bp. *Mus. Lugd.* ex *Afr.* m. *Similimus precedenti; sed valde minor.*
32. **T. libonyanus**, Smith. 1836. (*Merula libonyana*) *Ill. S. Afr. Zool. Av.* t. 38. ex *Afr.* m. *Similis preced. sed major, abdomine vix rufescente; gula medio immaculata.*
33. **T. pallidus**, Gm. ex *Lath.* (*daulios*, *Temm.*) *Pl. col.* 515. - *Faun. Japon. Av.* t. 26. ex *Japonia*, *As. or. s.* ultra lacus Baikal. numquam Europ. *Olivaceo-rufus, capite olivaceo-cinerascente, superciliis concoloribus: subtus albidos, mento, gula, pectoreque fuscescentibus, lateribus minime rufescitibus: rectricibus alarum inferioribus albis: rectricibus extimis utrinque tribus apice late albo.*
- * 34. **T. pelios**, Bp. *Mus. Lugd.* ex *Asia centrali.* *Similis T. pallido: minor; supra cinereo-olivaceus unicolor; subtus albus, pectore vix canescente, lateribus dilute flavo-cinnamomeis: rectricibus alarum inferioribus rufis: rectricibus immaculatis: rostro ex toto flavido!*
35. **T. obscurus**, Gm. ex *Lath.* (*pallidus*, *Temm. nec Gm. pallens*, *Pall.* - *Schleg.* - *T. iliacus pallidus*, *Naum.* - *T. seysfertzii*, *Brehm.* - *dubius*, *Aliq.* - *naumanni*, *Wern.* nec *Temm.* - *T. werneri*, *Géné.*) *Atl. Man. Orn. Temm. figura.* - *Mém. Acad. Taurin.* XXXVII. p. 291. cum fig. *Faun. Jap.* t. 27. 1. adult. ex *Japon.* 2. juv. ex *Hollandia.* ex *As. s. or. et centr.* *Malaias: accidentaliter Europa. Olivaceus, capite fuscescente, superciliis, mento, crissaque albidis: subtus albidos, gula, pectoreque fuscis, jugulo, lateribusque cinereo-fuscescentibus: rectricibus alarum inferioribus cinereis: rectricem extima tantum macula pareva apicali alba.*
36. **T. chrysolaus**, *Temm. Pl. col.* 537. adult. - *Faun. Jap.* t. 28. adult. et jun. ex *Japonia*. *Flavido-brunneus, capite olivaceo-rufescente, minime cinerascente; superciliis concoloribus: subtus albidos, gula fusca, jugulo, lateribusque bruneo-aurantiis; rectricibus unicoloribus.*
37. **T. ruficollis**, Gm. ex *Pall.* (*erythrurus*, *Hodgs.*) *Pall.* *Zoogr. Ross. As. II. t. in p. 452. ex As. s. or. et Mus. Lugd.* ex *As. centr.* *Major: fuso-olivaceus; subtus albus: superciliis, gula, pectore, rectricibusque lateralibus, intense rufis.*
38. **T. atrigularis**, *Temm. ex Natterer.* (*dubius*, *Schleg.* ex *Bechst.* - *bechsteini*, *Naum.* - *Cichloides bechsteini*, *Kaup.*) *Vög. Deutschl.* t. 60. 1. ad. 2. jun. - *Gould, Eur. t. 75.* ex *Asia s.* accident. *Eur. or. Olivaceo-nigrans; subtus fuso-rufescens: facie, genis, pectoreque nigris.*

3. MERULAE.

Nigri, vel obscuri, minime guttulati: gula, tectricesque
alarum inferiores concolores. Sexus dissimiles.

a. Orbis antiqui.

39. *T. sibiricus*, Gm. ex Pall. (leucocillus, Pall. - atro-
cyanus, Homeyer, 1843. - mutabilis, Temm. - auroreus?
Pall. faem.) Gould, Eur. t. 82. - Faun. Japon. t. 31 jun.
ex Siber. or. Japon. Java: raris. et ac. in Sibiria
occidentali et Europa (semel tantum captus postquam
Schlegelius merito speciem ex europea expulit.) Mani-
ger; superciliosus, tectricibusque alarum inferioribus albis.
Faem. Fusco-olivaceos; subtus albido, fusco-maculata.
40. *T. torquatus*, L. (Merula torquata, Gesner. - Sylvia!
torquata, Savi. - Copsychus torquatus, Kaup.) Pl. enl.
171. mas. 172. faem. - Gould, Eur. t. 73. - Naum. Vög.
Deutschl. t. 70. ex Eur. A. s. o. c. Afr. s. Nigricus, semi-
torque pectorali albo; remigibus margine exteriori albante.
41. *T. ferrugineus*, Müll. Verh. N. G. Nederl. Ind. p. 201.
ex Sumatra, Bornee. Fuliginosus; abdome rufo-
castaneo; criso-albo.
- * 42. *T. smithi*, Ep. (Merula obscura? Smith, nec Gm.) Ill.
S. Afr. Zool. t. 36. ex Afr. mer. Nigricus; uropygia,
abdome, aliquo interne, nitide rufo-aurantii.
43. *T. simillimus*, Jerd. (nigripileus? Lafr. - Merula
simillima, et nigripilea? Blyth.) Delessert, Voy. Ind.
et Mus. Lugd. ex Asia centr. et m. Medius: fus-
cus; pileo nigro, plumis subelongatis: rostro aurantio.
44. *T. albicinctus* et albicollis, Royle. (collaris, Sovel.
nivicollis, Hedges. - Merula albocincta, Blyth.) Ill. Him.
Botan. t. 8. 3. ex Himal. Darjiling. Nigerrimus;
collo, gulaque albis. Faem. fusca; collo, gulaque albido.
45. *T. paecilopterus*, Vig. (bubil? Gm. - persicus?
Lath. - Lanius boulboul? Lath. - Merula brunnea hinc
boulboul, Blyth.) Gould, Cent. Himal. B. t. 14. ex
Himal. Darjil. Major: niger, alis medio canescensibus;
rostro robusto, subincavo, aurantio; pedibus flavo-cinereis.
46. *T. merula*, L. (Merula vulgaris, Ray. - M. merula, Boie.
Sylvia merula, Savi.) Pl. enl. 2. mas. 555. faem. - Gould,
Eur. t. 72. - Naum. Vög. t. 71. ex Eur. A. s. o. c. Afr.
s. Madag. Mas nigerrimus; rostro palpebrisque flavis.
Faem. nigrinus, subtus rufo-nebulosa; rostro nigricante.

* 47. *T. mandarinus*, Bp. (*T. merula et Merula vulgaris ex China, Auct.*) *Mus. Lugd.* ex *Asia or. China*. *Simillimus* praecedenti, *at valde major*.

b. *Americani*.

48. *T. gigas*, Fraser, *Pr. Zool. Soc.* 1840. p. 59. ex *Columbia*. *Maximus*; *nigro-olivaceus*; *subtus fuscocinereus*; *cōpīte caudae fuliginosis*; *gula nigro-striata*; *rostro pedibusque flavis*.

49. *T. fuscater*, Laf. - *Orb. Voy. Am. m. t. 9. 1.* ex *Bolivia*. *Major*; *fusco-fuliginosus*; *subtus dilutior*; *gula, tectricibus alarum inferioribus, concoloribus*.

50. *T. chiguano*, Laf. - *Orb. Voy. Am. m. t. 9. 2.* ex *Peru, Columbia*. *Medius*; *fuliginosus-cinerous*; *subtus dilutior*; *gula albida*; *tectricibus alarum inferioribus rufis*.

51. *MERULA INFUSCATA*, Laf. (*Turdus infuscatus*, Gr.) *Rev. Zool.* 1844. p. 41. ex *Mexico*. *Medius*; *nigricans*; *rostro, pedibusque flavis*.

52. *T. carbonarius*, Illig. (*flavipes*, Vicell. ex Azara, Spix, *Ar. Bras.* t. 67. 2. ex *Brasil*). *Minor*; *niger-rimus*; *alis fuliginosis*; *dorso, uryglio, crasso, lateribusque schistaceis*; *rostro flavidio*. *Faem. fusco-olivacea, alis rufescen-tibus*; *abdomine schistaceo*; *rostro fuso*.

53. *T. xanthoscelus*, Jard. *Contr. Orn.* 1847. p. 1. ex *Insula Tabago*. *Mas niger*; *rostro pedibusque flavis*. *Faem. fusco-olivacea*.

54. *T. serranus*, Tschud. *Fn. Per.* p. 188. ex *Am. m. occ.* *Nigricans*; *subtus fusco-olivaceus*, *pectore rufescente*, *crisso nigricante*; *plumarum pilorum rachidis ferrugineis*.

55. *T. rusitorques*, Hartl. (*Milvulus rusitorques*, Gr. err.) *Rev. Zool.* 1844. p. 214. ex *Guate-mala*. *Nigro-fuli-ginosus*; *mento albe*; *collo undique*, *pectoreque laete cinnamo-meis*; *rostro flavo*.

56. *T. aurantius*, Gm. (*leucogenys*, Lath. - *Merula ja-micensis*, Br. - *M. saltator*, Hill.) *Sloane Jam.* t. 250. 2. *Gosse, Ill. Br. Faun.* t. 23. ex *Antill.* *Nigricans*, *gula et abdomine albidis*; *rostro pedibusque aurantiis*.

Quid Turdus africanus (Jacq. *Vög.* t. 14.) - *borbonicus* (Briss. *Orn.* II. t. 24. 3) - *amboinensis* (Sob., *Thes.* I. t. 62. 4.) - *philippensis* - *vi-ridis* - *cinereus* (Briss. *Orn.* II. t. 25. 3.) *abyssinicus* - *barbaricus* - *tripolitanus* - *pacificus* - *niloticus* - *sandwichensis*, *Gmelin?*

Quid T. asiaticus, Lath? *Quid T. indicus*, Bodd. *Pl. ent.* 584. 1?

Quid T. brevicaudus - *brachyrurus* - *melanocephalus* - *cinereus leucopterus*, Vieillot?

Quid T. hypopyrhns, Hartlaub?

Quid Merula olivatra - *atro-sericea* - *Turdus minimus* - *oligolepis* (*gymnopis*, Temm.) Lafresnaye, *Rev. Zool.* 1848. ex *Caracas?*

Turdus micropus sen *plerides*, Hodgs. (*wardii*, Jerd.) *proven-* - *thera cinclops?*

573. **Melanotis**, Bp. (*Mimus*, p. *Boie*. - *Orpheus*, p. *Sw.* - *Turdus*, p. *Gr.*) Mexico. 1.

TURDUS melanotis, Temm. nec *Gould*. (*Orpheus caerulescens*, *Sw.* - *Melanotis caerulescens*, *Bp.*) *Pl. col. 498.*
ex Mexico.

574. **Mimus**, Boie, 1826. (*Orpheus*, *Sw.* 1827.) America. 19.

a. AMERICANI SEPTENTRIONALES.

1. **TURDUS plumbeus**, L. nec Gm. (*ardosiacens*, *Vieill.* - *Mimus plumbeus*, *Gr.*) *Pl. enl. 560.* - *Ois. Am. s. t. 58.*
ex Antill. Fusco-plumbeus: gula alba, atro-punctata.

2. **TURDUS rubripes**, Temm. *Pl. col. 409.* - *Voy. Cuba, Ois.*
t. 4. ex Antill. Dilute plumbeus: gula nigra; abdomine rufo: pedibus rubris!

3. **TURDUS felivox**, Vieill. (*lividus*, *Wils.* - *carolinensis*, *Gr.*
ne Br. - *Muscicapa! carolinensis*, *L. ex Catesb.*) *Carol.*
t. 66. - *Am. Orn. t. 20. 3.* - *Ois. Am. s. t. 67.* - *Voy.*
Cuba, Ois. t. 7. - *Aud. Am. t. 128. ex Amer. s.*

4. **TURDUS montanus**, Towns. (*Mimus montanus*, *Bp.*)
Aud. Am. t. 369. 1. ex Amer. s. occ.

5. **TURDUS polyglottus**, L. (*Orpheus leucopterus*, *Vig.*)
Mimus polyglottus, *Boie.* *Wils. Am. Orn. t. 10. 1.*
Aud. Am. t. 21. ex Amer. sept.

6. **TURDUS orpheus**, L. (*Mimus orpheus*, *Gr.*) *Edu. B. t. 78.*
Vieill. Ois. Am. s. t. 68. ex Antill.

7. **TURDUS fuscatus**, Vieill. - *Ois. Am. s. t. 57. bis. ex*
Antillia. Major: fusco-fuliginosus; culbus cisereo-fusca;
obsolete maculatus; rectricibus lateraliibus apice albis: rostro
sordido flavo.

8. **TURDUS dominicus**, L. (*Merula dominicensis*, *Br.* - *Mimus dominicus*, *Gr.*) *Pl. enl. 558. 1. ex Ins. St. Domin.*

9. **TURDUS gilvus**, Vieill. (*Mimus gilvus*, *Gr.*) *Ois. Am. s.*
t. 68. ex Antill.

b. AMERICANI MERIDIONALES.

10. **TURDUS ORPHEUS**, Spix. (*lividus*, *Licht.*) *At. Br. t. 71. 2.*
ex Brasil.

11. **TURDUS thenka**, Molin. (*Orpheus australis*, *Less.*) *Hist.*
Nat. Chili. p. 222. ex Chili.

12. **TURDUS thilius**, Molin. (*Mimus thilius*, *Gr.*) *Hist. Nat.*
Chil. t. 221. ex Chili.

13. *TURDUS calandria*, Lafr. (saturninus, *Licht.* - Orpheus modulator, *Gould*. - O.calandria, *Gr.*) *Azara* 223. - *Orb.* *Voy. Am. m. Ois. t. 10. 2.* ex *Parag. Bolivia*.
14. *TURDUS tristriatus*, Vieill. ex *Azara* 224. (Orpheus tricau-datus, *Orb.*) ex *Parag. Bolivia*.
15. *ORPHEUS trifasciatus*, Gould, 1837. *Voy. Beagle*, *B. t. 16.* ex *Ins. Galapag.*
16. *ORPHEUS parvulus* et melanotis, Gould, 1837. *Voy. Beagle*, *B. t. 17 et 18.* ex *Ins. Galapag.*
17. *TURDUS dorsalis*, Lafr. (Mimus dorsalis, *Gr.*) *Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 11. 2* ex *Bolivia*.
18. *TURDUS patagonicus*, Lafr. (Mimus patagonicus, *Gr.*) *Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 11. 2.* ex *Patagonia*.
19. *MIMUS longicaudatus*, Tschudi, *Faun. Per.* *t. 15. 2.* ex *Amer. m. occ.*
575. *Toxostoma*, Wagl. 1831. (Harpes, *Gambel*, 1847. - Harpo-rhynchus, *Caban*, 1847. - Pomatorhinus, *Temm.* nec *Horsf.*) America calid. 5.
1. *TURDUS rufus*, L. (carolinensis, *Br.* - *Toxostoma rufum*, *Caban.*) *Pl. enl. 645.* - *Wils. Am. Orn. t. 14. 1.* - *Vieill. Ois. Am. s. t. 50.* - *Aud. Am. t. 116.* ex *Amer. s.*
 2. *ORPHEUS longirostris*, Lafr. (*Toxostoma longirostris*, *Caban.*) *Mag. Zool.* 1839. *Ois. t. 1.* ex *Mexico*.
 3. *ORPHEUS curvirostris*, Sw. (*Mimus curvirostris*, *Gr.*) *Phil. Mag.* 1827. p. 369. ex *Mexico*.
 4. *T. vetula*, Wagl. (*Pomatorhinus turdinus?* *Temm.*) *Pl. col. 441.* ex *Mexico*.
 5. *HARPE rediviva*, *Gambel*. - *LaPeyr. Atlas. Voy. t. 37.* ex *California sept.*
Quid Pomatorhinus albicollis, *Horsf.* (*Orthorinus hypoleucus*, *Blyth.*) *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 57?*
576. *Donacobius*, Sw. 1831. (Cichla, *Wagl.* 1827.) America mer. 2.
1. *D. atricapillus*, Gr. ex L. (*Gracula longirostris*, *Pall.* *Turdus brasiliensis* et *Oriolus japa-canis*, *Gm.* - *Mimus brasiliensis*, *Wied.* - *Turdus pratensis*, *Vieill.* ex *Azara* 219. - *Donacobius vociferans*, *Sw.*) *Zool. Ill. n. s. t. 27.* ex *Parag. Bras.*
 2. *D. albo-lineatus*, Orb. *Voy. Am. m. Ois. t. 12. 1.* ex *Bolivia*.

577. **Catharus**, Bp. (Turdus, p. Auct.) Rostrum Turdorum: pedes elongati, robusti: alae breves, rotundatae; remigium prima octavam aequante; tertia, quarta et quinta omnium longissimis: cauda brevis, rotundata. America mer. 1.

* **Turdus immaculatus**, Bp. Mus. Lugd. ex Caracas.
Similis T. minoribus Amer. s. sed absque macularum vel suspicione. Rufo-oliveaceus: subtus albus; pectore, lateribusque ardescentia.

578. **Chaetops**, Sw. (Argya, Less.) Africa mer. 1.
Milvus frenatus, Temm. (Chaetops burchelli, Sw.)
Chaetops frenatus, Gr.-Crateropus fraenatus, Bp. in litt.)
Pl. col. 385. ex Afr. mer.

579. **Crateropus**, Sw. Africa. 14.

1. **C. bicolor**, Jardine, Edinb. Journ. Nat. Sc. n. s. iii. t. 3. - Smith, Ill. S. Afr. Zool. Av. figura. ex Africa meridionali. Albus: alis, caudaque nigris.
2. **C. reinwardtii**, Sw. Zool. Ill. n. s. t. 80. ex Afr. occ.
3. **C. squamiceps**, Rupp. Zool. Atl. t. 12. ex Afr. or.
4. **C. leucocephalus**, Rupp. Zool. Atl. t. 4. ex Afr. or.
5. **Ixos plebeius**, Rupp. (Crateropus plebeius, Gr.) Zool. Atl. t. 23. ex Afr. or.
6. **C. platycercus**, Sw. B. of west. Afr. 1. p. 274. ex Africa occidentali.
7. **C. atripennis**, Sw. (Phyllanthus capucinus, Less.) B. of west. Afr. 1. p. 278. ex Afr. occ.
8. Mono! **atriceps**, Less. (Crateropus orioloides, Sw. - Cr. atriceps, Gr.) B. of west. Afr. 1. t. 31. ex Afr. occ.
9. **C. leucopygius**, Rupp. Fn. Abyss. t. 30. 1. Afr. or.
10. **C. rubiginosus**, Rupp. Vog. Ost. Afr. t. 19. Afr. or.
11. **C. swainsoni**, Smith, Ill. S. Afr. Zool. fig. null. Afr. m.
12. **C. jardinitii**, Sm. 1830. Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 6. Afr. m.
13. **C. acaciae**, Rupp. Zool. Atl. t. 18. ex Afr. or.
14. **C. limbatus**, Rupp. Syst. Uebers. p. 48. ex Afr. or.

580. **Cinclosoma**, Gould, ex Vig. et Horsf. Coloribus saltem analogiam cum Accentoribus (an affinitatem?) praebet. Australia. 4.

1. **Turdus punctatus**, Lath. (Cinclosoma punctatum, Vig. et Horsf.) Gould, Austr. iv. t. 4. ex Austr. or. et m.
2. **C. castanotus**, Gould. Austr. iv. t. 5. ex Austr. mer. et occ.
3. **C. cinnamomeum**, Gould. Austr. iv. t. 6. ex Austr. centrali.
4. **C. castaneithorax**, Gould. Pr. Zool. Soc. 1848. 139. sp. 5. ex Austr. or. m.

581. **Cynclorhamphus**, Gould. Australia. 3.
1. **C. cantillans**, Gould, (err. cantatoris) Austr. III. t. 75.
ex Austr. or. m.
 2. **ANTHUS rufescens**, Vig. et Horsf. (*Megalurus rufescens*, Gr. - *Cynclorhamphus rufescens*, Gould.) B. of Austr. III. t. 76. *ex Austr. univer.*
 3. **MEGALURUS cruralis**, Vig. (*Cyncloramphus cruralis*, Gould.) Austr. III. t. 74. *ex Australia or. m.*

SUBFAM. 92. CALAMOHERPINAE.

582. **Megalurus**, Horsf. (*Sphenacacus*, Gould, *nec Strickl.*) Ocean. 6.
1. **M. palustris**, Horsf. (*Malurus marginalis*, Reinw. *Turdus tocklae?* Buchan.) Pl. col. 65. 2. *ex Asia m. Bengal. Aracan. Java.*
 2. **M. isabellinus**, Sw. Two Cent. and a Quart. cum fig.
 3. **MALURUS galactotes**, Temm. (*Sphenacacus galactodes*, Gould. - *Megalurus galactotes*, Vig. et Horsf.) Pl. col. 65. - Gould, Austr. III. t. 35. *ex Austr. or. m.*
 4. **SPHENACACUS gramineus**, Gould, 1845. (*Megalurus gramineus*, Gr.) Austr. III. t. 36. *ex Austr. m. Tasman.*
 5. **M. citrinus**, Gr. et Mitch. Gen. B. t. 48. *ex Oceania.*
 6. **M. punctatus**, Quoy et Gaim. (*Megalurus punctatus*, Gr.) Voy. Astrol. Ois. t. 18. 3. *ex Ocean.*
583. **Sphenura**, Licht. p. nec Gr. quae *Dasyornis*, Vig. Africa. 2.
1. **S. acaciae**, Licht. Cat. Doubl. Mus. Berl. p. 40. sp. 454.
ex Nubia.
 2. **TURDUS erythropterus**, L. (*Sphenura erythroptera*, Licht.) Cat. Doubl. Mus. Berl. p. 41. sp. 55. *Nubia, Senn.*
584. **Heterura**, Hodgs. (*Cynclorhamphus*, Jard.-Alauda! p. Gr.) Asia centr. 1.
- M. sylvana**, Hodgs. (*Cyncloramphus sylvanus*, Jard.) Contr. Orn. 1848. cum fig. *ex Nepal.*
585. **Sphenacacus**, Strickland, *nec Gould*. (*Laticilla*, olim *Eurycerus?* Blyth. - *Drymoica*, p. Gr. - *Dasyornis*, Smith.) Africa. 1.
1. **MOTACILLA africana**, Gr. (*Muscicapa dubia*, Forst. *Synallaxis cantor*, Less. - *Dasyornis africanus*, Smith. *Sphaenura tibicen*, Licht.) Lev. Afr. t. 112. 2. - Sw. Zool. Ill. t. 170. *ex Africa mer.*
Quid *Eurycerus burnesii*, Bl. J. As. Soc. xiii, p. 374. *ex Sindhi?*

586. **Chaetornis**, Gr. (Sphaenura, Bl.) Asia mer. 2.
 1. **Megalurus striatus**, Jord. (Dasyornis locustelloides *hinc*
Sphaenura striata, Blyth, mas.) *Madr. Journ. Sc.* 1841.
xiii. p. 169. ex Asia m. Bengal.
Quid Chaetornis collarioniceps, Gr. ex Bl. J. Soc. Beng. 1842. 2?
587. **Locustella**, Gould, 1836, ex Boie. (Calamodyta, p. Gr.) Eur. As. Afr. 3.
 1. **SYLVIA locustella**, Penn. (Motacilla naevia, Bodd.
Acrocephalus fluviatilis, Vaum.-Locustella rayi, Gould.)
Pl. enl. 581. 3. - Gould, Eur. t. 103. ex Europa.
 2. **SYLVIA certhiola**, Pall. (Calamodyta certhiola, Gr.)
Wern. Iconogr. Man. Temm. figura. ex Asia occ.
minime Europea!
 3. **L. rubescens**, Blyth, *Journ. As. Soc. Soc.* xiv. p. 582. ex
Bengal.
588. **Calamanthus**, Gould. (Praticola, Gr. nec Koch.) Australia. 2.
 1. **ANTRUS fuliginosus**, Vig. (Praticola anthoides, Sw.
Calamanthus fuliginosus, Gould.) *Austr. III. t. 70.*
ex Tasmania.
 2. **C. campestris**, Gould, *Austr. III. t. 71. ex Australia*
orientali.
589. **Hylacola**, Gould. (Calamanthus, p. Gr.) Australia. 2.
 1. **ACANTHIZA pyrrhopygia**, Vigors. (Hylacola pyrrhopy-
gia, Gould.) *Gould, Austr. III. t. 39. ex Austr.*
 2. **EE. cauta**, Gould, *Austr. III. t. 40. ex Australia*
meridionali.
590. **Chthonicola**, Gould. (Calamanthus, Gr. p.) Australia. 1.
SYLVIA sagittata, Lath. (Anthus minimus, Vig. - Chtho-
nica minima, Gould. - sagittata, Gr.) *Gould, Austr.*
III. t. 72. ex Austr. m. et or.
591. **Bradypterus**, Sw. nec Hodges. (Drymoica, p. Gr.) Africa. 1.
SYLVIA brachyptera, Vieill. (Bradypterus platyrurus,
Sw. - Calamoherpe saltator, Boie) *Lev. Afr. t. 122.*
ex Africa m.
592. **Hemipteryx**, Sw. (Drymoica, p. Gr.) Africa. 1.
SYLVIA textrix, Vieill. (Drymoica textrix, Smith) *Lev.*
Afr. t. 131. - Ill. Zool. S Afr. t. 74. 1. mas. ex Afr. m.

593. **Suya**, Hodgs. (*Drymoica*, *Blyth.* – *Drymoica*, p. *Gr.*) Asia m. Oc. 10.

1. ***S. criniger***, Hodgs. (*Drymoica criniger*, *Blyth.*) *As.*

Res. xix. p. 183. ex Himal.

2. ***Prinia sylvatica***, Jerd. (*Drymoica sylvatica*, *Blyth.*) *Madr. Journ. xi. p. 4. ex Nilgheris.*

3. ***Drymoica robusta***, Blyth, *J. As. Soc. xviii. p. 57. ex Ceylon.* *Similis precedentis; sed obscurior, lateribus fusco; rostro pedibusque robustioribus.*

4. ***Prinia neglecta***, Jerd. (*Drymoica neglecta* ex *Mednapur him Dr. neglecta*, *Blyth.*) *J. As. Soc. xvi. p. 459. ex India cent.*

*5. ***Drymoica blythii***, Bp. (*Dr. sp. 802. Bl. Cat.*) *Calc. Mus. p. 142. ex Java.* *Similis Dr. sylvatica; sed minor, loris gulaque albidiioribus.*

6. ***Drymoica jerdoni***, Blyth, *J. As. Soc. xvi. p. 459. ex Ind. mer.*

7. ***Prinia inornata***, Sykes. (*Drymoica inornata*, *Blyth.*) *Pr. Zool. Soc. 1832. p. 80. ex Ind. mer. Ceylon.*

8. ***Prinia franklini***, Blyth. (*macroura*, *Flanklin.* – *fusca*, *Hodgs.* – *Sylvia longicaudata?* *Tickell.* – *Drymoica franklini*, *Blyth.*, *Cat. 805.* – *Suya franklini*, *Bp.*) *J. As. Soc. xiii. p. 376. ex Nepal, Arakan.*

9. ***Drymoica buchanani***, Blyth. (*Prinia rufifrons*, *Franklin*, *nec Rupp.* – *brunneifrons*, *Hodgs.* *Ann. Mag. N. H. 1845. p. 29.* – *Sylvia longicauda* var. *a?* *Lath.*) *J. As. Soc. xiii. p. 376. ex Nepal, Bengal, Ind. m.*

10. ***Drymoica lepida***, Blyth, *J. As. Soc. xiii. p. 376. et xvi. p. 460. ex Bengal, Sindh.*

594. ***Horistes***, Hodgs. (*Drymoica*, p. *Gr.*) Asia centr. 2.

1. ***H. pollicaria***, Blyth. *Pr. Zool. Soc. 1845. ex Himal.*

2. ***H. brunneifrons***, Blyth. (*schistilatus*, *Hodgs.* – *Nivicola schistilata*, *Hodgs.*) *Pr. Zool. Soc. 1845. p. 30. ex summo cacumine. Mont. Himalay.*

595. ***Orthotomus***, Horsf. (*Edela*, *Less.*) Asia m. Oc. 8.

1. ***Motacilla longicauda et sutoria***, Gm. (*Sylvia guzarrata*, *Lath.* – *S. ruficapilla*, *Hutton.* – *Orthotomus bennetti et lingoo*, *Sykes.* – *O. sphænurus*, *Siv.* – *O. sutoria et patia*, *Hodgs.* – *O. longicauda*, *Blyth.*) *Gould, Cent. H. B. t. 71. – Mag. Zool. 1836. t. 52. 53. ex India, Ceylon, Malacca.*

2. **O. edela**, Temm. (*Motacilla sepium*, Raffles. - Edela ruficeps, Less.) *Pl. col.* 599. 2. - *Mag. Zool.* 1836. t. 51. *ex Sumatra, Asia or. m.*
3. **O. cineraceus**, Blyth, *Journ. As. Soc.* xiv. p. 580. *ex Malacca.*
4. **O. sepium**, Horsf. - Blyth, *Cat. Calc. Mus.* p. 145. sp. 818. *Pl. col.* 599. 1. *ex Java.*
5. **O. longirostris**, Sw. *Two Cent. and a Quart.* p. 343. *ex Ocean.*
6. **O. atrigularis**, Temm. *Pl. col.* figura nulla. *ex Java.*
7. **O. cucullatus**, Temm. *Pl. col.* 599. 3. *ex Java.*
8. **O. sericeus**, Temm. *Pl. col.* figura nulla. *ex Java.*

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 596. Drymoica , Sw. p. nec Temm. | Africa. | 44. |
| 1. SYLVIA macroura , Lath. (<i>Malurus capensis</i> , Steph. <i>Drymoica maculosa</i> , Gr. ex Bodda.) <i>Pl. enl.</i> 752. 2. - <i>Lev. Afr. t. 129. 130. ex Africa.</i> | | 21. |
| 2. Dr. superciliosa , Sw. <i>B. of west Afr. t. 11. ex Africa occ.</i> | | 21. |
| 3. SYLVIA thoracica , Shaw. (<i>gutturalis</i> ; <i>Boie</i> . - <i>Apalis thoracica</i> , <i>Sw.</i> - <i>Drymoica thoracica</i> , Gr.) <i>Lev. Afr. t. 123. - Nat. Misc. t. 909. - Zool. Ill. n. s. t. 119. ex Africa occ.</i> | | 24. |
| 4. MOTACILLA subflava , Gm. (<i>Sylvia flavicans</i> , Vieill. - <i>Drymoica subflava</i> , Gr.) <i>Lev. Afr. t. 127. ex Afr. m.</i> | | 26. |
| 5. SYLVIA diophrys , Shaw. (<i>Drymoica diophrys</i> , Gr.) <i>Lev. Ois. Afr. t. 128. - Nat. Misc. t. 973. ex Africa m.</i> | | 27. |
| 6. SYLVIA oxyura , Shaw. (<i>Drymoica oxyura</i> , Gr.) <i>Lev. Afr. t. 133. - Nat. Misc. t. 957. ex Africa m.</i> | | 28. |
| 7. DRYMOICA coryphaea , Gr. - <i>Lev. Afr. t. 120. ex Afr. m.</i> | | 29. |
| 8. SYLVIA undata , Lath. (<i>Drymoica undata</i> , Gr.) <i>Pl. enl. 582. 2. ex Africa m.</i> | | 29. |
| 9. SYLVIA fulvicapilla , Vieill. (<i>Drymoica fulvicapilla</i> , Gr.) <i>Lev. Afr. t. 124. 1. 2. ex Africa mer.</i> | | 30. |
| 10. SYLVIA minuta , Shaw. (<i>anthophila</i> , Boie. - <i>Parus fuscus?</i> Vieill. - <i>Drymoica minuta</i> , Gr.) <i>Lev. Afr. t. 134. - Nat. Misc. t. 997. ex Africa mer.</i> | | 31. |
| 11. DR. ocularia , Smith, <i>Ill. Zool. S. Afr. Av.</i> t. 75. 1. <i>ex Africa mer. Minor.</i> | | 32. |
| 12. DR. pectoralis , Smith, <i>Ill. Zool. S. Afr. Av.</i> t. 75. 2. <i>ex Africa mer. Minor.</i> | | 33. |
| 13. DR. substrigata , Smith, <i>Ill. Zool. S. Afr. Av.</i> t. 72. 1. <i>faem. ex Africa mer. Pectore striato.</i> | | 34. |

14. **Dr. pallida**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 72.
2. mas. ex Africa mer. Pectore immaculato.
15. **Dr. ruficapilla**, Smith, nec Auct. (Dr. **smithi**, Bp.)
Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 73. 1. mas. ex Africa mer.
16. **Dr. levallantii**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av.
t. 73. 2. ex Africa mer. Digits interno medium longitudo subaequalis!
17. **Dr. terrestris**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av.
t. 74. 2. ex Africa mer.
18. **Dr. capensis**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 76.
1. mas. ex Africa mer.
19. **Dr. subruficapilla**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av.
t. 76. 2. faem. ex Africa mer.
20. **Dr. affinis**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 77.
1. faem. ex Africa mer.
21. **Dr. cherina**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 77. 2.
ex Africa mer. Minima.
22. **Dr. aberrans**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 78.
faem. ex Africa mer.
23. **Dr. chiniana**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 79.
ex Africa mer. Major. Aberrans.
24. **Dr. natalensis**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 80.
mas. ex Africa mer. Maxima. Aberrans.
25. **Dr. subcinnamomea**, Smith, Ill. Zool. S. Afr.
Av. t. 111. 1. ex Africa mer. Aberrans: major: uropygio, abdomineque castaneis.
26. **Dr. fasciolata**, Smith, Ill. Zool. S. Afr. Av.
t. 111. 2. ex Africa mer. Minor: pectore undulato.
27. **Dr. clamans**, Rüpp. (Prinia clamans) Zool. Atl. t. 2.a.
Pl. col. 466. 2. ex Africa or. Nubia.
28. **Dr. gracilis**, Rüpp. (Prinia gracilis) Zool. Atl. t. 2.b.
Pl. col. 466. 1. ex Africa or. Egypto.
29. **Dr. pulchella**, Rüpp. (Prinia pulchella) Zool. Atl.
t. 35. a. ex Afr. or. Kordofan.
30. **Dr. inquieta**, Rüpp. Zool. Atl. t. 36. b. ex Arab.
31. **Dr. ruficeps**, Rüpp. Zool. Atl. t. 36. a. ex Abyss.
32. **Dr. rufifrons**, Rüpp. Faun. Abyss. t. 41. 2. ex Abyss.
33. **Dr. mystacea**, Rüpp. Syst. Uebers. Vög. Ost-Afr.
t. 10. ex Africa or. Gondar.
34. **Dr. robusta**, Rüpp. Syst. Uebers. Vög. Ost-Afr.
t. 13. ex Africa or. Abyss.
35. **Dr. lugubris**, Rüpp. (Cisticola lugubris) Syst. Uebers.
Vög. Ost-Afr. t. 11. ex Africa or. Abyss.

36. **Dr. erythrogenys**, Rüpp. (*Cisticola erythrogenis*)

Syst. Ubers. Vög. Ost-Afr. t. 12. ex Afr. or. Abyss.

37. **Dr. polychroa**, Gr. ex Temm. *Pl. col. 466. 3. Afr. or.*

38. **Dr. mentalis**, Fras. *Pr. Z. Soc. 1843. p. 16. Afr. occ.*

39. **Dr. strangii**, Fras. *Pr. Zool. S. 1843. p. 16. Afr. occ.*

40. **Dr. lateralis**, Fras. *Pr. Zool. S. 1843. p. 16. Afr. occ.*

41. **Dr. ruficapilla**, Fras. *Pr. Zool. S. 1843. p. 16. Afr. occ.*

42. **Dr. rufa**, Fras. *Pr. Zool. Soc. 1843. p. 17. ex Afr. occ.*

43. **Dr. rufigularis**, Fras. *Pr. Zool. S. 1843. p. 17. Afr. occ.*

44. **Dr. uropygialis**, Fr. *Pr. Zool. S. 1843. p. 17. Afr. occ.*

597. **Prinia**, Horsf. (*Drymoica et Prinia, Blyth.*)

Asia mer. Oc. 11.

1. **P. familiaris**, Horsf. (*Orthotomus prinia, Temm.*)

Zool. Res. Java cum figura, - Sw. Zool. Ill. n.s. t. 97.

Pl. col. figura nulla. ex Java.

2. **P. gracilis**, Jerdon, nec Franklin. (*hodgsoni, Blyth.*)

Journ. As. Soc. xiii. p. 376. ex Nepal. India m.

3. **P. gracilis**, Franklin, nec Malurus gracilis, Rüpp. *Proc.*

Zool. Soc. 1831. p. 119. ex India centr.

4. **P. rufescens**, Blyth. *J. As. Soc. 1831. p. 119. ex Arakan.*

5. **P. socialis**, Sykes, *Pr. Zool. Soc. 1832. p. 80. Ind. m.*

6. **P. stewarti**, Blyth. (*Sylvia Kalaphutki? B. Hamilt.*)

Journ. As. Soc. xvi. p. 455. ex Bengal.

7. **ORTHOOTORUS flavigaster**, Deless. (*Prinia flavigaster,*

Blyth.) Cat. Mus. Calc. p. 144. sp. 813. ex Bengal,

Tenasserim, Malacca.

8. **P. olivacea**, Gr. ex Raffles, *Linn. Tr. xiii. p. 313. ex*

Sumatra.

9. **P. OLIVACEA**, Strickl. nec Raffles. (*stricklandi, Bp.*)

Ann. Nat. H. xv. p. 426. ex Java.

10. **P. icterica**, Strickl. *Ann. N. H. xv. p. 126. ex Ocean.*

11. **P. pileata**, Gr. ex Blyth, *Journ. As. Soc. 1842. p. 204.*

ex Asia meridionali.

598. **Calamoherpe**, Meyer. (*Acrocephalus, Naum.-Acrobates,*

Jerd. nec Sw. - Arundinaceus, Less. - Dumeticola, Bl.) Eur. As. Afr. Oc. 18.

G. EUROPAEAE.

1. **TURDUS ARUNDINACEUS**, L. nec Motacilla arundinacea, Auctorum.

(*Sylvia turdoides, Boie ex Meyer. - Acrocephalus*

lacustris, Naum. - Turdus junco, Pall. - Muscipetula lacus-

tris, Koch. - Salicaria turdina! Schleg.) *Pl. enl. 513.*

Gould, Eur. t. 106. ex Europa, As. occ. Afr. or.

2. MOTACILLA *arundinacea*, Gm. (salicaria! *Strikl*, ex Gm.
Sylvia strepera, Vieill. - affinis, Hardy. - Salicaria arun-
 dinacea, Selby. - Calamoherpe arundinacea, Boie. - C.
 salicaria, brehmi, piscinarum, alnorum et arbustorum,
 Brehm. - Acrocephalus arundinaceus, Rüpp. ex Br.
Aer. salicarius, Blyth.) Pl. enl. 531. 2? - Gould, Eur.
 t. 108. ex Europa.
3. SILVIA *palustris*, Bechst. (Calamoherpe palustris et
 arbustorum! Boie.) Gould, Eur. t. 109. Eur. centr. et or.

b. ASIATICA E

4. C. *orientalis*, Bp. (Salicaria turdina orientalis, Schleg.)
Faun. Jap. p. 50, tab. 21. B. ex Japonia, Borneo,
 Celeb. Sumatra. Simillima C. turdoides; sed minor; atis
 caudaque brevioribus.
5. C. *affinis*, Hodgs. (Dumetica thoracica, Blyth. - Cala-
 modyta affinis, Gr.) Mitch. Gen. B. t. 49. 2. As. centr.
6. SILVIA *scita*, Eversm. (Calamoherpe scita, Bp.) As. occ.
7. ACROCEPHALUS *agricolus*, Jerd. Madr. Journ. 1844.
 p. 131. ex India, Afghanistan.
8. ACROBATES *brunnescens*, Jerd. (Acrocephalus brun-
 nescens, Blyth. - Acr. arundinaceus et turdooides ex India,
 Auct.) Journ. As. Soc. xv. p. 288. ex Arakan.
9. SALICARIA *cantans*, Temminck et Schleg. (Calamodyta
 cantans, Gr.) Faun. Jap. t. 19. ex Japon.
10. SALICARIA *cantillans*, Temm. et Schleg. (Calamodyta
 cantillans, Gr.) Faun. Jap. t. 20. ex Japon.
11. SILVIA *montana*, Horsf. (Acrocephalus montanus, Bl.)
Linn. Tr. XIII. p. 166. ex As. mer. Java.

c. AUSTRALASIANAE.

11. ACROCEPHALUS *longirostris*, Gould. (Calamodyta
 longirostris, Gr.) Austr. III. t. 38. ex Austr.
12. ACROCEPHALUS *australis*, Gould. (Calamodyta austra-
 lis, Gr. - Sylvia arundinacea, Lewin.) B. of N. Holl.
 t. 18. - Gould, Austr. III. t. 37. ex Austr.

d. AFRICANA E.

13. SALICARIA *pallida*, Ehrenb. (Calamodyta pallida, Gr.)
Keys. et Bl. Eur. Wbth. nota sp. 201. ex Syria,
 Egypt. Nubia.
14. SALICARIA *languida*, Ehrenb. (Calamodyta languida,
 Gr.) Keys. et Bl. Eur. Wbth. nota sp. 201. ex Afr. or.

15. *SALICARIA rufescens*, Keys. et Bl. (Calamodyta ru-
fescens, Gr.) *Eur. Wbth.* nota sp. 201. ex Afr. m.
16. *SYLVIA babaecula*, Vieill. (Calamoherpe loquax, Boie.
Calamodyta babaecula, Gr.) *Lev. Afr. t. 121. 1.* Afr. m.
17. *SYLVIA baeticula*, Vieill. (*Sylvia isabella*, Boie. - Ca-
lamodyta baeticula, Gr.) *Lev. Afr. t. 121. 2.* ex Afr. m.
18. *CURRUCA cinnamomea*, Rüpp. (Calamodyta cinna-
momea, Gr.) *Fn. Abyss. t. 42. 1.* ex Afric. or.

599. *Ædon*, Boie 1826. nec *Vieill.* (*Erythropygia*, Smith 1835.
Agrobates, Siv. nec Jordon.)

Eur. m. Afr. 6.

1. *SYLVIA galactodes*, Temm. (*Turdus arundinaceus*, var. β .
Lath. - rubiginosus, Meyer.) *Pl. col. 251. 1.* - Gould,
Eur. t. 112. ex Eur. mer. Afric. sept.
2. *SYLVIA familiaris*, Ménatr. (*Ædon familiaris*, Gr.
Pandicilla familiaris, DeFilippi.) *Cat. Raisonn. p. 32.*
ex Eur. or. As. occ.
3. *SALICARIA leucoptera*, Rüpp. (Calamodyta leucoptera,
Gr.) *Syst. Ost-Afr. t. 15.* ex Afr. or.
4. *MALURES tinniens*, Licht. (*Ædon tinniens*, Gr.) *Verz.*
1842. p. 13. sp. 70. ex Afr. m. *Similis M. ruficollis*, Temm.
sod major, magis variegata.
5. *ERYTHROPYGINA paena*, Smith 1846. (*Ædon paena*, Gr.) *Ill.
Zool. S. Afr. Av. t. 50.* a. mas. b. jun. ex Afr. m.
6. *ERYTHROPYGINA pectoralis*, Smith. (*Ædon pectoralis*,
Gr.) *Ill. Zool. S. Afr. Av. t. 49.* ex Afr. m.
7. *SYLVIA leucophrys*, Vieill. (*Turdus pipiens*, Steph.
Ædon leucophrus, Gr.) *Lev. Afr. t. 118.* ex Afr. m.

600. *Cisticola*, Less. 1831. (*Drymoica*, p. Gr.)

Eur. m. Afr. Oc. 12.

a. EUROPAEA.

1. *SYLVIA CISTICOLA*, Temm. (*Selicaria cisticola*, Keys. - *Cis-
ticola schaenicola*, Bp.) *Pl. col. 6. 3.* - Gould,
Eur. t. 113. ex Eur. m. Italia, Africa s.

b. ASIATICA.

2. *PRINIA cursitans*, Frankl. (*Cisticola cursitanus*, Blyth.)
Jerd. *Ill. Ind. Orn. t. 6.* ex India. Vix ab europaea distineta!
3. *C. omalura*, Blyth, *J. As. Soc. XVIII. p. 145.* sp. 822.
ex Ceylon. *Nigricans: cauda subaequali!*
4. *C. brunneiceps*, Temm. et Schleg. *Faun. Japon.*
t. 20. *C.* ex Japon.

C. AUSTRALASIANAE.

5. **C. magna** et campestris? 1845. *Gould*, *Austr.* III. t. 41.
ex Austr.
6. **SYLVIA exilis**, *Lath.* (*Cisticola exilis*, *Gould.*) *Austr.*
III. t. 42. *ex Austr.*
7. **C. lineicapilla**, *Gould*, 1847. *Austr.* III. t. 43. *ex Austr.*
8. **C. isura**, *Gould*, 1847. *Austr.* III. t. 44. *ex Austr.*
9. **C. ruficeps**, *Gould*, *Austr.* III. t. 45. *ex Austr.*

601. **Calamodyta**, *Meyer*. (*Salicaria!* *Selby.* - *Acrocephalus*,
p. Naum. - *Calamoherpe*, *p. Boie.* - *Calamodus*, *Kaup.*
Lusciniola! *Gr.*) Eur. As. Afr. 4.

1. **MOTACILLA SCHENAENUS**, *L?* *neo Scopoli*. (*Sylvia phragmitis*, *Bechst.* - *S. schenaenus*, *Vieill.* - *Salicaria phragmitis*, *Selby.*) *Gould*, *Eur.* t. 110. - *Descr. Eg.* t. 13. 4. *ex Eur. As. Afr.* *Pileo variegato: criso, uropygialisque immaculatis.*
2. **MOTACILLA SCHENAENUS**, *Scop. nec L.* (*Sylvia aquatica*, *Lath.* - *salicaria*, *Meyer.* - *paludicola*, *Vieill.* - *cariceti*, *Naum.* - *Salicaria aquatica*, *Keys.* - *Calamodyta aquatica*, *Degland.*) *Descr. Egypt.* t. 13. 4. - *Gould*, *Eur.* t. 111. 2.
ex Europ. mer. et oce.
3. **SYLVIA lanceolata**, *Temm.* (*Salicaria lanceolata*, *Schleg.* *Cisticola lanceolata*, *Degland.* - *Calamodyta lanceolata*, *Gr.*) *Man. Orn.* III. p. 614. *ex Eur. m. or. As. s.* *Pileo vittato: criso, uropygialisque nigro-guttulatis.*
4. **SYLVIA melanopogon**, *Temm.* (*bonellii*, *Naum.* - *fuscescens?* *Vieill.* - *Salicaria melanopogon*, *Keys.* - *Lusciniola!* *melanopogon*, *Gr.* - *Cettia!!! melanopogon*, *Degl.*) *Pl. col.* 245. 8. - *Roux, Orn. Prov.* t. 233. *ex Eur. m.*

602. **Arundinax**, *Blyth.* Asia centr. 1.
PHRAGMATICOLA olivacea *hinc Arundinax olivaceus*, *Blyth*,
J. As. Soc. xiv. p. 595. ex Bengal, Arakan.

603. **Cettia**, *Bp.* (*Calamodyta*, *p. Gr.*) Eur. Afr. 2.
1. **SYLVIA CETTI**, *Marmorata* (*sericea*, *Natter.* - *platura*, *Vieill.* *Salicaria cetti*, *Schleg.* - *Cettia sericea* *et altisonans*, *Bp.* - *C. cetti*, *Degland.*) *Pl. ent.* 655. 2. - *Bp.* *Faun. Ital.* t. 29. 3. - *Gould*, *Eur.* t. 114. *ex Eur. m.*
 - *2. **C. africana**, *Bp.* *Mus. Lugd.* *ex Afr.* *Major*; *jungulo obsolete subguttulata!*

604. **Luscinopsis**, Bp. (Pseudo-luscinia, Gr. ex Bp. - Potamodus? Kaup. - Acrocephalus p. Naum.)

Eur. s. Afr. 2.

1. **SYLVIA LUSCINOIDES**, Savi. (*L. savii*, Bp. - Salicaria luscinoides, Keys. - Potamodus luscinoides, Bp. in litt. Cettia luscinoides, Degland.) *Icon. Faun. Ital.* t. 30. 2. Gould, *Eur. t. 104.* ex Eur. mer.

2. **SYLVIA fluviatilis**, Meyer. (Acrocephalus stagnatilis, Naum. - Locustella! fluviatilis, Degland. - Salicaria fluviatilis, Schleg.) *Exp. Eg. Ois. t. 13. 3.* - Gould, *Eur. t. 102.* ex Eur. mer. et or. Afr. sept.

605. **Hypolais**, Brehm. 1828. (Muscicapoides, p. *Selys*, 1830.

Chloropeta, Smith. - Phyllopeuste, Gr. ob err. Angl. nec Meyer. - Ficedula, p. Schleg.)

Eur. As. Afr. 6.

a. **SPURIAE**. Rostrum longum, angustum: alae breviores. Color cinerascens, subtus vix flavescentes.

1. **SYLVIA olivetorum**, Strickl. (Calamodyta olivetorum, Gr. - Hypolais olivetorum, *Selys*. - Salicaria olivetorum, v.d. Mühle.) Gould, *Eur. t. 107.* ex As. occ. Eur. m. or. Maxima: brunnio-olivacea; cauda valde rotundata: prima remigum valde breviores tectricibus alarum exterioribus; teritia omnium longissima.

2. **SYLVIA elaeica**, Linderm. (Ficedula ambigua, Schleg. Hypolais ambigua, Degland.) *Rev. Ois. Europ. App. p. 53.* ex Grecia. Media: cinerea, vix olivascens; subtus flavescentes, criso albidocauda disarcicata: remigum prima longiore tectricibus exterioribus; tertia et quarta omnium longissimis.

b. **LEGITIMAE**. Rostrum breve, latum: alae longiores: cauda truncata. Color viridis, subtus flavus.

3. **MOTACILLA HYPOLAIS**, L. (*M. salicaria*; Bp. - Salicaria italicica, De Filippi. - Sylvia ambigua, Durazzo, nec Schlegel. - Ficedula hypolais, Schlegel. - S. icterina, Gerbe, nec Vieill. nec Bp. - Hippolais icterina, Degland.) *Pl. enl. 581. 2.* - *Icon. Faun. Ital.* t. 28. 2. - *O. des Murs, Pl. p. 58. 1.* ex Eur. univers. exclusa Britannia. Major: cinereo-olivacea; subtus, cum loris et striola superciliari, pallide flavo: remigum secunda valde breviores quarta; prima aequali tectricibus extornis; tertia omnium longissima.

4. **SYLVIA polyglotta**, Vieill. (Hypolais, Gerbe, nec Auct.

Ficedula polyglotta, Schleg. - Sylvia hypolais, Durazzo.

Hippolais polyglotta, Degland.) O. des Murs, Pl. p. 43. I.

Schlegel, Bijdragen Dierkunde, 1848. tab. sig. eximia.
ex Gallia, Italia, Scandinavia. Minor: remigium prima valde longiore tectricibus externis; secunda
sextan aequante; quarto omnium longissima.5. **SYLVIA obscura**, Smith, Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 112.1. faem. ex Afr. m. er. Cinerosa-olivacea, subtus flavida:
supercilios angustis, pure flavis: rostro parum depresso, vi-
bris longiusculis.6. **CHLOROPETA natalensis**, Smith. (Sylvia natalensis, Gr.)Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 112. 2. faem. ex Afr. m. Fla-
vo-olivacea; subtus flavissima: rostro valde depresso, vi-
bris brevibus.

SUBFAM. 93. SYLVIINAE.

606. **Phyllopleuste**, Meyer, 1822. (Sylvia, Boie. - Asilus,

Bechst. ex Moehr. - Trochilus, Aliq. - Phylloscopus,

Boie, 1826. - Sibilatrix, Kaup. - Ficedula, p. Schlegel,) Eur. As. Afr. Oc. 12.

a. EUROPEAE.

1. **SYLVIA ICTERINA**, Eversm. nec Vieill. (Phyllopleuste evers-
mani, Bp.) Add. Zool. Ross-As. II. cum figura. ex
Asia occ. Russia m.2. **SYLVIA sibilatrix**, Bechst. (sylvicola, Lath. - Sibila-
trix sylvicola, Kaup.) Pl. col. 245. 3. - Bp. Faun. It.
t. 27. 1. - Gould, Eur. t. 131. 3. ex Europa.3. **MOTACILLA trochilus** et acerula; L. (Ficedula sitis,
Kaup. - Sylvia flaviventris, Vieill. - icterina, Temm.
Gould, nec Auct.) Pl. enl. 651. I. - Descript. Eg. t. 27. 2.
Bp. Fn. It. t. 27. 2. - Gould, Eur. t. 131. 1. ex Eur.
Asia, Afric. sept.4. **SYLVIA rufa**, Lath. (abietina, Nilss. - hypolais! Penn.
nec L. - collybita, Vieill. - loquax? Engl.) Bp. Faun.
Ital. t. 27. 3. - Gould, Eur. t. 131. 2. ex Europa.5. **SYLVIA bonellii**, Vieill. (natereri, Temm. - prasynopiga?
Licht. - Phyllopleuste bonellii, Bp.) Pl. col. t. 124. 3.
Bp. Faun. It. t. 27. 4. ex Eur. mer. Afr. sept.
Subitus argentea!Quid S. angusticauda, Gerbe, Cat. Fn. Aule, p. 139. Gall. or?
Quid S. tamaricis, Crespon, Orn. Gard, et Fn. merid. Gall. m?

b. ASIATICAE.

6. **SYLVIA brevirostris**, Strickl. Pr. Zool. Soc. 1836. p. 98.
ex Asia occ. Smyrna.

7. *Sylvia fuscata*, Blyth, J. As. Soc. XI. p. 113. *As. centr.*
 8. *Sylvia griseola*, Blyth, J. As. Soc. 1847. p. 443. *As. c.*
 9. *Ficedula coronata*, Temm. (*Sylvia coronata* Gr. nec L.)
*Schleg. Faun. Jap. t. 18. ex Japon. Similis Ph. si-
 bilatrici Europae; sed minor; rostro longiore, pedibus bro-
 vioribus; criso flavido; superciliis postice confluentibus: alis
 brevioribus; remigum prima longiore tectricibus; quarta et
 quinta omnium longissimis.*

c. OCEANICA.

10. *Sylvia javanica*, Horsf. (*Phyllopneuste magnirostris*
et trochilus? Blyth.) Linn. Tr. XIII. p. 156. *ex Java.*

d. AFRICANA.

11. *Sylvia umbro-virens*, Rüpp. (*Phyllopneuste umbro-
 virens*, Bp.) Faun. Abyss. p. 112. *ex Afr. or.*

Quid Motacilla madagascariensis, Gm. - Briss. Orn. III. t. 2?

607. *Morornis*, Hodgs. (*Reguloides*, p. Blyth.) Asia centr. 4.

1. *M. flaviventris*, Hodgs. (*Regulus flaviventris*, Gr.)
Pr. Zool. Soc. 1845. p. 31. ex Nepal.
 2. *M. fuliginiventris*, Hodgs. (*Regulus fuliginiven-
 tris*, Gr.) *ex Nepal.*
 3. *M. fulciventris*, Hodgs. (*Regulus fulciventris*, Gr.)
Pr. Zool. Soc. 1845. p. 31. ex Nepal.
 4. *M. fortipes*, Hodgs. (*Regulus fortipes*, Gr.) *Pr. Zool.*
Soc. 1845. p. 31. ex Nepal.

608. *Abrornis*, Hodgs. (*Regulus*, p. Gr.) Asia centr. 10.

1. *Pn. viridanactrufa*, Blyth. (*Abrornis tenuiceps?* Hodgs.
Regulus viridanus, Gr.) J. As. Soc. 1843. p. 987. *ex As. c.*
 2. *Pn. affinis*, Tickell. (*Sylvia indica*, Jerd. - *Regulus af-
 finis*, Gr.) Journ. As. Soc. II. p. 87. *ex As. centr.*
 3. *Pn. lugubris*, Blyth. (*Regulus lugubris*, Gr.) Journ.
As. Soc. 1843. p. 968. ex As. centr.
 4. *Pn. nitidus*, Blyth. (*Regulus nitidus*, Gr. - *Hippolais*
swainsonii? Hodgs.) Journ. As. Soc. 1843. p. 995. *As. c.*
 5. *Pn. tristis*, Blyth. (*Sylvia trochilus*, Jerd. - *Regulus*
tristis, Gr.) Ann. N. H. 1843. p. 178. *ex As. centr.*
 6. *Pn. trochiloides*, Sundev. (*reguloides*, Blyth. - *Re-
 gulus trochiloides*, Gr.) Journ. As. Soc. 1842. p. 191.
 7. *Pn. flaveolus*, Blyth. (*Abrornis xanthogaster*, Hodgs.
Regulus flaveolus, Gr.) *ex As. centr.*

8. *Pa. erochroa*, *Hodgs.* (*Abrornis pulchra*, *Hodgs.* - *Regulus erochrous*, *Gr.*) *Cat. Mamm. et B. Br. Mus.*
App. p. 152. ex Nepal.
9. *Abbr. chloronotus*, *Hodgs.* (*Regulus chloronotus*, *Gr.*)
Cat. Mamm. et B. Br. Mus. *App. p. 152. ex Nepal.*
10. *Pa. schisticeps*, *Blyth.* (*Abrornis xanthoschistos*,
Hodgs. - *Regulus schisticeps*, *Gr.*) *Journ. As. Soc.*
xiv. p. 592. ex Nepal.
Quid Sylvia senegalensis, *Gr. ex Bodd.* (*S. rufigaster*? *Lath.*)
Pl. ent. 582. 1. et S. flavescentia, *Gr. ex Gm.* *Pl. ent. 582. 3?*
Quid Sylvia hadiceps, *Fras. Pr. Zool. Soc. 1812. p. 144?*
Quid Sylvia maculata, *Lath.* *Pl. ent. 654. 2?*
609. **Neornis**, *Hodgs.* nec *Hartl.* (*Sylvia*, p. *Gr.*) Asia mer. 1.
A. flavolivacea, *Hodgs.* juv. (*cacharensis*, *Hodgs.* - *Sylvia*
flavolivacea, *Gr.* - *Drymoica brevicaudata*, *Blyth.*
adult.) *Journ. As. Soc.* *xiv. p. 590. et xvi. p. 450. ex*
Asia centr.
610. **Tribura**, *Hodgs.* (*Calamodyta*, p. *Gr.*) Asia centr. 1.
SYLVIA luteiventris, *Horsf.* (*Tribura luteiventris*, *Hodgs.*
Calamodyta luteiventris, *Gr.*) *Pr. Zool. Soc. 1845. p. 30.*
ex Nepal.
611. **Regulus**, *Cuv.* 1800. ex *Ray.* (*Sylvia!* *Sw.*) Ad *Paridae*
accedit! Eur. As. Am. s. 3.
1. *MOTACILLA REGULUS*; *L.* (*M. cristatus*, *Ray.* - *auricillus*, *Selby.* - *flavicapillus*, *Naum.* - *crococephalus*,
Brehm. - *vulgaris*, *Flem.*) *Gould, Eur. t. 148. 1. ex Eur.*
 2. *SYLVIA ignicapilla*, *Brehm.* (*Regulus ignicapillus*,
Licht. - *pyrocephalus*, *Brehm.* - *mystaceus*, *Vieill.*) *Pl.*
ent. 652. - Gould, Eur. t. 148. 2. ex Eur.
 3. *SYLVIA REGULUS*, *Wils.* (*Parus hinc* *Regulus satrapa*,
Licht. - *R. tricolor*, *Natt.*) *Am. Orn. t. 8. 2. - Bp. Am.*
Orn. t. 2. 4. - Aud. Am. t. 183. ex Am. s. *Simillimus*
praecepit, sed cauda longiore; crista antices sulphurea; dorso ci-
nerascente.
612. **Reguloides**, *Blyth.* (*Regulus*, p. *Gr.*) Eur. or. As. Am. 3.
1. *MOTACILLA proregulus*, *Pall.* (*Regulus proregulus*,
Licht. - *R. modestus*, *Gould.* - *Phyllopeuste reguloides*,
Hodgs. - *Reguloides proregulus*, *Bl.*) *Gould, Eur. t. 149.*
ex Asia centr. accid. Europa or. vix autem occid.

2. *AEBORNIS castaneiceps*, Hodgs. (*Regulus castaneiceps*, Gr.) *Gr.* et *Mitch.* *Gen. B. t. 49.* 1. ex *A sia centr.*
 3. *MOTACILLA calendula*, L. (*Sylvia calendula*, Lath. - *Regulus calendula*, Bp. - *rubineus*, Vieill.) *Ois. Am. s. t.* 104. 105. - *Ed. B. t. 254.* 2. - *Wils. Am. Orn. t. 5.* 3.
Aud. Am. t. 195. ex *Amer. sept.*
Quid Regulus cuvieri, Aud. B. of Amer. t. 55?

613. **Acanthiza**, Vig. et Horsf. 1825.

Australia. 13.

a. ARBOREAE. Graciles.

1. *SYLVIA pusilla*, Lath. (*Acanthiza pusilla*, Vig.) *White,* *Journ. t. in p. 257.* - *Austr. III. t. 53.* ex *Austr.*
 2. *A. diemensis*, Gould, 1827. *Austr. III. t. 54.* ex *Tasm.*
 3. *A. ewingi*, Gould, *Austr. III. t. 55.* ex *Austr.*
 4. *A. uropygialis*, Gould, 1837. *Austr. III. t. 56.* *Austr.*
 5. *A. apicalis*, Gould, *Austr. III. t. 57.* ex *Austr.*
 6. *A. pyrrhopygia*, Gould, 1847. *Austr. III. t. 58.* ex *Australia.*

b. TERRESTRES. Robustiores.

7. *A. inornata*, Gould, 1840. *Austr. III. t. 59.* ex *Austr.*
 8. *A. nana*, Vig. et H. - Gould, *Austr. III. t. 60.* ex *Austr.*
 9. *A. lineata*, Gould, 1837. *Austr. III. t. 61.* ex *Austr.*
 10. *A. reguloides*, Vig. et H. - Gould, *Austr. III. t. 62.*
 ex *Austr.*
 11. *SAXICOLA chrysorrhoea*, Quoy et Gaim. (*Acanthiza chrysorrhoea*, Gr.) *Voy. Astr. Ois. t. 10.* 2. - *Gould,* *Austr. III. t. 63.* ex *Australia.*
 12. *SAXICOLA macularia*, Quoy et Gaim. (*Acanthiza macularia*, Gr.) *Voy. Astral. Ois. t. 10.* 3. ex *Oceania.*
 13. *A. buchanani*, Vig. et H. *Linn. Tr. xv. p. 227.* *Oceania.*

614. **Pyrrholaemus**, Gould, (*Acanthiza*, p. Gr.)

Australia. 1.

Pyrrholaemus brunneus, Gould, 1840. (*Acanthiza*! *brunnea*, Gr.) *Austr. III. t. 68.* ex *Austr.*615. **Gerygone**, Gould. (*Acanthiza*!! p. Gr. *olim Psilopus*,
Gould, nec Temm.)

Oceania. 10.

a. Australasianae.

1. *PSILOPUS OLIVACEUS*, Gould, 1836. (*G. albicularis*,
Gould.) *Austr. II. t. 97.* ex *Austr.*

2. *G. fusca*, Gould, Austr. II. t. 98. ex Austr.
3. *G. culicivora*, Gould, Austr. II. t. 99. ex Austr.
4. *G. magnirostris*, Gould, Austr. II. t. 100. Austr.
5. *G. laevigaster*, Gould, Austr. II. t. 101. Austr.
6. *G. chloronotus*, Gould, Austr. II. t. 102. Austr.

b. Oceanianae.

7. *G. flaviventris*, Gr. Voy. Ereb. et Terr. Zool. t. 4. 1.
ex Nova Zeeland.
8. *G. albifrontata*, Gr. Voy. Ereb. et Terr. Zool. t. 4. 2.
ex Nova Zeeland.
9. *G. igata*, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Ois. t. 11, 2.
ex Ocean.
10. *G. longirostris*, Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Ois.
t. 10. 4. ex Ocean.

616. ***Smicrornis***, Gould. (Pardalotus, p. Gr.) Minimi! Australia. 3.

1. *S. brevirostris*, Gould. (Pardalotus brevirostris, Gr.)
Austr. II. t. 103. ex Austr. orient. merid.
2. *S. flavescentis*, Gould. (Pardalotus flavescentis, Gr.)
Austr. II. t. 104. ex Austr. sept.
- *3. *S. occidentalis*, Bp. (Smicrornis ex Austr. occ. Gould.)
Introd. B. of Austr. p. 43. Fig. nulla. ex Austr. occ.

617. ***Melizophilus***, Leach. (Luscinia, p. Gr.) Eur. Africa. 1.

- MOTACILLA ***provincialis***, Gm. (Sylvia dartfordiensis,
Lath. - S. ferruginea, Vieill. - S. undata? Gr. ex Bodd.)
Pl. enl. 655. 1. - Gould, Eur. t. 129. ex Eur. m. et occ.

618. ***Pyrophthalia***, Bp. (Thamnodus? Kaup.) Eur.m.As.Afr. 3.

1. MOTACILLA ***melanocephala***, Gm. (Sylvia ruficola,
Vieill. - ochrogenion? Linderm. 1842. faem. - Curruc
manca? Ehrenb.) Pl. col. 245. 3. - Gould, Eur. t. 129.
ex Eur. merid. Afr.
2. SYLVIA ***sarda***, Marmora. - Temm. Pl. col. 245. 2. - Gould,
Eur. t. 127. ex Eur. m. Sardinia, Italia.
3. CURRUCA ***affinis***, Blyth, J. As. Soc. XIV. p. 564. ex Ceylon.

619. ***Sylvia***, Lath. (Alsoeus, Kaup. - Luscinia, Gr. ex L' - Ster
parola, Bp. - Erythroleuca, Kaup.) Eur. As. Afr. 6.

1. MOTACILLA ***Sylvia***, Pall. (*S. curruca* et sylviella? Lath.
leucopogon, Heckel, nec Meyer. - Curruca garrula, Koch.)
Pl. enl. 380. 3. - Descr. Eg. t. 5. 3. - Gould, Eur. t. 125. 2.
ex Eur. Afr.

2. MOTACILLA SYLVIA, L. (*S. cinerea*, Bp. ex Briss. - S. fruticeti, Vieill.) Descr. Eg. t. 5. 2. - Pl. enl. 579. 3. et 581. 1. - Gould, Eur. t. 125. 1. ex Eur. Afr. As. occ.
3. **S. conspicillata**, Marmorata. (icterops? Ménétriés.) Pl. col. 6. 1. - Gould, Eur. t. 126, ex Eur. m. As. occ.
4. **S. subalpina**, Bonelli. (leucopogon, Meyer. - passerina, Temm. - mystacea, Ménétrié. - Erythroleuca subalpina, Kaup.) Pl. col. 6. 2. et 251. 2. 3. - Gould, Eur. t. 124. ex Europ. mer.
- Quid Sylvia guttata, Landbeck, Wurtemb. Nat. Jahr. v. 1849. p. 253. t. 2. Avis pennas mutans. ex Graecia?*

620. **Curruea**, Briss. (Sylvia, Lath. - Adornishinc Sylvia, p. Gr.) Eur. As. Afr. 8.

a. EUROPEAE.

1. MOTACILLA **atricapilla**, L. (moschita, Gm. faem. - Sylvia atricapilla, Lath. - rubricapilla? Landb. faem. - Curruca atricapilla, Br. - Monachus atricapillus, Kaup.) Pl. enl. 580. 1. 2. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 94. 2. - Gould, Eur. t. 120. ex Eur. etiam bor. As. Afr.
2. SYLVIA **ruppellii**, Temm. (capistrata, Rüpp. - Curruca ruppelli, Bp.) Pl. col. 245. 1. - Zool. Atl. t. 19. a. b. Gould, Eur. t. 122. ex Ins. orient. Mediterranei et Mar. rubri.
3. MOTACILLA **hortensis**, Gm. (salicaria? L. - Sylvia hortensis var. a. Lath. - S. aedonia, Vieill. - Epilais hortensis, Kaup.) Pl. enl. 579. 2. - Gould, Eur. t. 121. ex Eur. univers. Afr. sept.
4. SYLVIA **orphea**, Temm. (grisea, Vieill. - Curruca, Br. C. orphea, Boie.) Pl. enl. 579. 1. - Gould, Eur. t. 119. ex Eur. m. et centr. Africa s.

b. ASIATICA non Europea.

5. **C. jerdoni**, Blyth. (Sylvia jerdoni, Bl. Calc. Cat. Mus. sp. 1122. - Philomela orphea, Jerd.) Journ. As. Soc. XVI. p. 439. ex India.

c. AFRICANAE non Europeae.

6. **C. heinekeni**, Jard. (Sylvia atricapilla var. Aliq.) Ill. Orn. t. 94. 1. ex Ins. Madeira.
7. **C. chocolatina**, Rüpp. (Sylvia chocolatina, Gr.) Syst. Uebers. Vög. Ost-Afr. t. 14. ex Africa o.
8. SYLVIA **crassirostris**, Rüpp. Zool. Atl. t. 33. a. ex Africa orient.

621. **Adophonecus**, Kaup. (*Nisoria*, *Bp.*) Europa. Asia. 1.

SYLVIA nisoria, Bechst. (*Nisoria undata*, *Bp.* - *Adophonecus nisorius*, *Kaup.*) Gould, Eur. t. 128. ex Eur. centr. et or. As. occ.

622. **Iduna**, Keys. et Bl. (*Lusciola*, p. *Keys. et Bl.*) Asia s. Eur. or. 1.

MOTACILLA salicaria, Pall. nec L. (*Sylvia caligata*, *Licht.*

Lusciola caligata, *Keys. et Bl.* - *Iduna caligata*, *Gr.*)

Figura nulla. ex As. occ. Eur. or. m.

SUBFAM. 94. SAXICOLINAE.

623. **Philomela**, Br. (*Daulias*, *Boie.* - *Luscinia*, *Gr.* ex L.) Eur. As. Afr. 2.

1. **MOTACILLA luscinia**, L. (*Sylvia luscinia*, *Lath.* - *Lusciola luscinia*, *Keys. et Bl.* - *Luscinia philomela hinc Philomela luscinia*, *Bp.*) Pl. enl. 615.2. - Gould, Eur. t. 116. ex Eur. univers. As. occ. Afr. or.

2. **LUSCINIA major**, Br. (*Sylvia philomela*, *Bechst.* - *Motacilla aedon*, *Pall.* - *Philomela major*, *Sie.*) Gould, Eur. Birds. t. 117. ex Eur. s. et or. As. Afr. occ.

624. **Calliope**, Gould. (*Melodes*, *Keys. et Bl.* - *Cyanecula et*

Bradybates, p. *Gr.*) Asia Eur. or. 2.

1. **TURDUS eamtschatkensis**, Gm. (*Motacilla calliope*, *Pall.* - *Accentor calliope*, *Temm.* - *Calliope lathami*, *Gould.*) *Lath. Supp. t. frontisp.* - *Cyanecula calliope*, *Gr.*) Gould, Eur. t. 118. ex As. s. etiam or. acc. Eur. or.

2. **C. pectoralis**, Gould, 1837. (*Bradybates pectoralis*, *Gr.*) *Icones Av. figura.* ex *Himal.*

625. **Rubecula**, Br. (*Dandalus*, *Boie.*) Eur. As. Afr. 4.

1. **MOTACILLA rubecula**, L. (*Sylvia rubecula*, *Lath.* - *Dandalus rubecula*, *Boie.* - *Rubecula familiaris*, *Blyth.*) Pl. enl. 360. 1. - Gould, Eur. t. 98. ex Eur. univ. As. occ. Afr. orient.

2. **NEMURA flavolivacea**, Hodgs. (*Ianthia flavolivacea*, *Hodgs.* - *Erithaca flavolivacea*, *Blyth.*) *Pr Zool. Soc. 1845.* ex As. centr. *Sikim.*

3. **SYLVIA komadori**, Temm. (*Lusciola komadori*, *Schleg.*) *Pl. col. 570.* - *Fn. Jap.* fig. opt. m. et faem. ex *Japon.*

4. **SYLVIA akahige**, Temm. (*Lusciola akahige*, *Schlegel.*) *Pl. col. 571.* - *Fn. Jap.* fig. exim. m. et faem. ex *Japon.*

626. **Cyanecula**, Br. (Pandicilla, Bl.) Eur. As. Afr. 2.

1. MOTACILLA *suecica*, L. (Sylvia suecica, Lath. - cyanecula, Meyer. - wolfsi, Br. - sperata var. a? Lath. faem. Cyanecula suecica, Blyth.) Pl. enl. 361. 2. et 610. 1. 2. 3. Gould, Eur. t. 97. ex Eur. etiam bor. As. etiam or. Africa sept.
2. MOTACILLA *caerulecula*, Pall. (caeruligula err. Aliq. Sylvia cyanea, Eversm. - Lusciola caerulecula, Schleg.) Addend. Fn. Ross. Pall. II. cum figura. - Kittl. Kupf. Vög. t. 17. 2. ex Siberia occ. Rossia. Mocula pectoralis rufa.

627. **Ruticilla**, Brehm. 1828. ex Ray. (Ficedula, Boie. - Phaenicura, Sw.)

Eur. As. Afr. s. 12.

1. MOTACILLA *phaenicura* et *erithacus*? L. (Phaenicura ruticilla, Sw. - Ruticilla phaenicura, Bp. - R. simplex? Less. - R. tithys ex Afghanistan? Hutton.) Pl. enl. 351. 1. 2. Gould, Eur. t. 95. ex Eur. As. Afr.
2. SYLVIA *tithys*, Scopoli. (Motacilla tithys, L. - atrata et gibraltariensis, Lath. - Ruticilla erithaca, Bp.) Edw. B. t. 29. - Gould, Eur. t. 96. ex Eur. As. Afr.
3. MOTACILLA *erythrogaster*, Guldenst. (Nov. Comm. Petr. xix. tab. 16. et 17. - Mot. auoreo, var. ceraunia, Pall.) ex Europa orient. As. occid.
4. MOTACILLA *aurorea*, Pall. (Phaenicura reevesii? Gray) Kittl. Kupf. Vög. t. 26. 1. - Schleg. Faun. Jap. fig. opt. mas. et faem. ex Siberia or. Japon. minime Europa!
5. **R. tricolor**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1849. As. centr.
6. **R. leucoptera**, Blyth, Journ. As. Soc. XII. p. 692. et XVI. p. 134. ex Malacc. Java.
7. PHAENICURA *frontalis*, Vig. 1831. (tricolor? Hodgs. Ruticilla frontalis, Blyth.) Gould, Cent. Him. B. t. 26. 1. ex Asia centr.
8. PHAENICURA *atrata*, Jard. (**R. indica**, Blyth.) Selb. Ill. Orn. t. 86. 3. ex India mer.
9. PHAENICURA *caeruleocephala*, Vig. 1831. (Ruticilla caeruleocephala, Blyth.) Gould, Cent. Him. B. t. 25. 2. ex Himal.
10. PHAENICURA *fuliginosa*, Vig. 1831. (plumbea, Gould. rubricauda, Hodgs. - Ruticilla fuliginosa, Blyth.) Pr. Zool. Soc. 1831. p. 35. et 1835. p. 185. ex Him. Darjil.
11. PHAENICURA *leucoccephala*, Vig. 1831. (Sylvia erythrogaster var. Lath. - Ruticilla leucocephala, Blyth.) Gould, Cent. Him. B. t. 26. 2. ex Himal.

12. *Sylvia erythronota*, Eversm. (Ruticilla erythronota,
Gr.) Addend. Pall. Zoogr. Fasc. II. figura bona.
ex Caucas. reg. Asia t.

Quid Ruticilla melanura, Less. Rev. Zool. 1840. p. 265?
Quid Rut. schisticeps, Gr. ex Hodgs. List. Nep. Append.?

628. **Petrocinela**, Vig. 1825. p. (Monticola 1822. *hinc* Petrocos-
syphus, p. Boie. - Petrophila, *Sic.* - *Turdus*, p. Gr.) Eur. As. Afr. Oc. 4.

1. *Turdus saxatilis*, L. (Lanius infaustus, Gm. - *Saxicola*
montana, Koch. - *Petrocossyphus saxatilis*, Boie.) Pl.
enl. 562. - Gould, Eur. t. 86. *ex Eur. mer.*

2. *Turdus explorator*, Vieill. (perspicax, Shaw.) Nat.
Misc. t. 961. - Lev. Afr. t. 103. *ex Africa m.*

3. *Turdus supesteris*, Vieill. (rupicola, Licht. - rocar,
Steph. - *Petrocinela montana*, Sic.) Lev. Afr. t. 101. 102.
ex Africa mer.

4. *TURDUS eremita*, Gm. (philippensis, Gr. ex Bodd.) Pl.
enl. 339. *ex Ins. Philipp.*

Quid Petr. castaneicollis, Less. Rev. Zool. 1840. p. 166. *ex Him.?*

629. **Petrocossyphus**, Boie, p. (*Petrocinela*, Vig. p. - *Tur-
dus*, p. Gr.) An genus distinctum? Eur. As. Afr. Oc. 4.

1. *Turdus manillensis*, Gm. (manillae, Bodd. - olivaceus?
Bodd.) Pl. enl. 636. mas. 564. 2. faem. *ex Ins. Philipp.*
China, Japon. Abdomine castaneo.

2. *Turdus affinis*, Blyth, Journ. As. Soc. 1843. p. 177.
ex Asia centr.

3. *Turdus cyanurus*, L. (solitarius, Gm. - azureus, Cresp.
minime hybridus cum saxatili, sed jun. - Merula caerulea,
Br. - Petr. longirostris, Blyth.) Pl. col. 250. - Edw. B.
t. 18. - Gould, Eur. B. t. 87. *ex Europ. m. Afr. s.*

4. **PETROCINELA pandoo** mas et mala faem. Sykes. (*Turdus*
solitarius, var. a. *Lath.* - *T. cyanurus parvirostris*, Blyth.)
ex Asia mer.

630. **Orocetes**, Gr. 1840. (Petrophila, Sic. - *Turdus*, p. Gr.) Asia. 2.

1. **PETROCINELA cinchlorhyncha**, Vig. (Petrophila cya-
nocephala, Sic. - *Petrocossyphus aurantiiventer*, Less.
1840. - *Orocetes cyanocephala* *hinc* *Turdus cinchlorhyn-
chus etaurantiiventris*, Gr. - *T. melanotus*, Dubus 1839.)
Gould, Cent. Him. B. t. 10. *ex Asia centr. Nepal,*
Darjiling. Major: speculo alari nullo.

2. *Turdus erythrogaster*, Vig. 1831. (*Petrocincla rufiventris*, Jard. - *Petrocossyphus ferrugineiventris*, Less.)
Gould, Cent. Ill. B. t. 13. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 120. ex Asia centr. Minor: speculo alari allo.
631. **Grandala**, Hodgs. Asia centr. 1.
G. coelicolor, Hodgs. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 50.
ex Nepal.
632. **Sialia**, Sw. America s. 3.
1. *MOTACILLA SIALIS*, L. (*Sylvia sialis*, Lath. - *S. wilsoni*, Sw.) Edw. B. t. 24. - Pl. ent. 390. 1. mas et 2. faem. - Wils. Am. Orn. t. 3. 5. - Aud. Am. t. 113. ex Amer. s. or.
2. *S. mexicana* et *azurea*? Sw. 1827. (*occidentalis*? Towns. caeruleicollis, Vig.) Aud. Am. t. 318. 2. 3. - Zool. Beach. Voy. t. 3. ex Am. s. occid. Mexico.
3. *S. arctica*, Richards. - Sw. Faun. Bor. Am. t. 39. Aud. Am. t. 318. 4. 5. ex America boreal.
633. **Thamnobia**, Sw. (*Saxicoloides*, Less.) Africa. As. m. 7.
1. *SILVIA cambaiensis*, Lath. (*Saxicoloides erythrurus*, Less. facm. - *Thamnobia cambaiensis*, Blyth.) Cat. Mus. Calc. p. 165. sp. 966. ex As. m. Agr. a.
2. *MOTACILLA fulicata*, L. (*Oenanthe pygmaea*, Vieill. *Micropus leucopterus*? Less. - *Thamnobia leucoptera*, Th. *pygmaea*, Gr. - *Th. fulicata*, Blyth.) Pl. ent. 185. 1. Lev. Afr. t. 188. 2. ex Afr. m.
3. *OENANTHE rufiventris*, Vieill. (*Thamnobia rufiventris*, Sw.) Lev. Afr. t. 188. 1. ex Afr. mer.
4. *T. atrata*, Sw. Two Cent. and a Quart. p. 292. As. centr.
5. *T. frontalis*, Gr. ex Sw. (*Saxicola albifrons*, Rüpp.) Syst. Uebers. t. 17. ex Afr. or. et occ.
6. *SAXICOLA melaena*, Rüpp. (*Thamnobia melaena*, Gr.) Faun. Abyss. t. 28. 2. ex Afr. or.
7. *T. albispecularis*, Gr. ex Eyd. et Gerv. Mag. Zool. 1836. Ois. t. 64. 65. ex Ocean. Quid *Cyanecula fastiosa*, Less. Rev. Zool. 1840. p. 286. ex Hym.?
634. **Ephthianura**, Gould. (*Cynura*, Brehm.) Australia 3.
1. *ACANTHIZA albifrons*, Jard. (*Fluvicola leucocephala*, Less. - *Cynura torquata*, Brehm. - *Ephthianura albifrons*, Gould.) Ill. Orn. t. 56. - Gould, Austr. Ill. 64. ex Austr. m. et or.

2. *E. aurifrons*, Gould, Austr. III. t. 56. ex Austr. m.
 3. *E. tricolor*, Gould, Austr. III. t. 66. ex Austr. mer.

635. **Petroica**, Sw. Austr. N. Zel. 7.

1. **MUSCICAPA multicolor**, Vig. et Horsf. (Petroica multicolor, Sw. - Petroica boobang? Less.) Gen. Syn. t. 100.
2. **MUSCICAPA erythrogaster** et multicolor, Gm. (erythrogaster, Lath. - Petroica pulchella, Gould, mas. - P. modesta, Gould, faem.) Gen. Syn. III. t. 50. - Shaw, Gen. Zool. Ill. n.s. t. 36. - Lewin, B. of N. Holl. t. 17. Gould, Austr. t. III. t. 3. ex Austr. m. Tasmania. Cauda nigra, rectricibus lateraliibus albis.
3. **MUSCICAPA goodenori**, Vig. et Horsf. (Petroica goodenovii, Jard. et Selb.) Ill. Orn. I. t. 8. - Austr. t. 5. ex Austr. m. Minor; sincipite rubro.
4. **P. phoenicea**, Gould. (Muscicapa erythrogaster var. Lath.) Austr. III. t. 6. ex Austr. or. m. Tasmania.
5. **P. bicolor**, Sw. (Muscicapa cucullata? Lath.) Ill. Zool. 2. ser. t. 43. - Gould, Austr. III. t. 7. ex Austr. occ.
6. **P. fusca**, Gould. (Muscicapa vittata, Quoy et Gaim.) Voy. Astral. t. 3. 2. - Austr. III. t. 8. ex Tasm.
7. **P. superciliaris**, Gould, Austr. III. t. 8. ex Austr. centr.

636. **Erythrodrysas**, Gould. (Petroica, p. Gr.) Australia. 2.

1. **SAXICOLA rhodinogastra**, Drapiez. (Muscicapa lathamii, Vig. - Petroica rhodinogastra, Jard. - Erythrodrysas rhodinogastra, Gould. - E. erythrogaster! Gr.) Zool. Journ. I. t. 13. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 8. Austr. III. t. 1. ex Oceania, Tasmania.
2. **PETROICA rosea**, Gould, 1838. (Erythrodrysas rosea, Gould.) Austr. III. t. 2. ex Austr. or. m.

637. **Miro**, Less. (Petroica, p. Gr.) Nov. Zeland. 6.

1. **MUSCICAPA macrocephala**, Gm. (Turdus minutus, Forst. - Pachycephala? australis, Steph. - Miro forsterorum, Gr.) Lath. Gen. Syn. t. 55. ex Nov. Zeland.
2. **MUSCICAPA australis**, Sparrm. (Muscicapa longipes, Gm. - Saxicola longipes, Temm. - Myiothera novae-zelandiae, Less.) Mus. Carls. t. 69. - Voy. Coq. Ois. t. 19. 1. ex N. Zel.

3. *Petroica dieffenbachii*, Gr. *Voy. Ereb. et Terr.*
Zool. B. t. 6. 1. ex N. Z. eel.
4. *Muscicapa toitoi*, Garnot. (*Petroica toitoi*, Gr.) *Zool.*
Coquille, Ois. t. 15. 3. ex N. Z. eel.
5. *Muscicapa albifrons*, Gm. (*saxicolina*, *Licht.*-*Turdus ochrotarsus*, *Forst.*-*Petroica albifrons*, Gr.) *Voy. Ereb. et Terr. Zool. B. t. 6. 1. ex Nova Zealandia.*
Nigra: fronte, speculo clari, abdomine, rectricibusque lateralibus basi latissime, albis.
6. *Petroica chrysoptera*, Quoy et Gaim. *Voy. Astrol. t. 4. 2. ex N. Zealandia.*

638. *Hodgsonius*, Bp. (*Bradypterus*, *Hodgs.* nec *Sv.*-*Bradybat-*
tes! *Gr.* nec *Tschudi*, - *Sylvania*, *Blyth.* nec *Nuttall.*) Asia.

BRACHYPTERUS phaenicurooides, *Hodgs.* (*Bradybates phaenicurooides*, Gr.) *Gen. B. p. 181. sp. 1. ex Nepal.*
Caeruleo-plumbeus; abdomine medio, maculisque alaribus tribus albis: rectricibus lateribus basi flavo-ferrugineis.
Faem. et juv. rufo-olivacea, albidò striata: abdomine albo-rufescente.

639. *Pogonocichla*, Caban. Africa. 1.

MUSCICAPA stellata, Vieill. (*Pogonocichla stellata*, Cab.)
Lev. Afr. t. 157. ex Afric. m. Olivacea; subtus flava;
capite aliisque plumbeis: macula parva gulari media, antecularique utrinque, albis: rectricibus duabus mediis nigris;
cacteris flavis, apice rachidibusque nigris.

640. *Tarsiger*, Hodgs. (*Nemura*, p. *Gr.*) Asia centr. 1.

T. chrysea, Hodgs. (*Nemura chrysea*, Gr.) *Ann. Mag. N. H. 1845. p. 198. ex Himal. Nepal. Viridi-*
oliveus; subtus viridi-aureus: rectricibus lateralibus a-
basi fere omnino aurantiis.

641. *Nemura*, Hodgs. (*Ianthia*, *Blyth.*) Asia centr. 3.

1. *N. rufiflatus* mas. et cyanura faem. *Hodgs.* (*Ianthia rufi-*
lata, *Bl.* nec *Erythaca tytleri*, *Jam.* quae *Erythrosterna parva*,
Bpl.) *Pr. Zool. Soc. 1845. p. 17. ex Himal. Darjil.*
2. *MOTACILLA cyannura*, Pall. (*Nemura cyannura*, Gr. - *Lus-*
ciola cyannura, *Schleg.*) *Fn. Jap. t. 21. ex As. or. Jap.*
3. *IANTHIA hyperythra*, Blyth. (*Nemura hyperythra*, Gr.)
Journ. As. Soc. xvi. p. 132. ex Darjiling.

642. **Cinelidium**, Blyth. (Callene, Blyth. - Ruticilla, p. Gr.) Asia merid. 1.
C. frontale, Blyth. (nec Ruticilla frontalis, Gr. ex Vig.)
Journ. As. Soc. 1842. p. 181. et 1843. p. 954. ex Sikkim.
643. **Larvivora**, Hodgs. (Ruticilla, p. Gr.) Asia merid. 2.
1. **L. cyanea** et brunnea, Hodgs. (Phaenicura superciliaris, Jerd.) *Journ. As. Soc.* 1837. p. 102. ex India.
Plumbeo-cyanea; subtus aurantio-ferruginea: superciliis, crisoque albis.
2. **CALLIOPE cruralis**, Blyth. (homochroa, Hodgs. - Ruticilla cruralis, Gr. - Brachypteryx cruralis, Blyth.)
Journ. As. Soc. 1843. p. 933. ex India.
644. **Bessonornis**, Smith 1836. (Cossypha, Vig. 1825.) Africa. 13.
1. **CosSYPHUS vociferans**, Sw. (Turdus reclamator, Vieill.)
Cossypha vociferans, Vig. *Zool. Ill.* t. 179. - *Lev. Afr.* t. 104. ex Africa mer.
2. **TURDUS phaenicurus**, Gm. (Motacilla pectoralis, Shaw. - Saxicola superciliaris, Licht. - Petrocincla superciliosus, Sw.) *Lev. Afr.* t. 111. - *Nat. Misc.* t. 965. Afr. m.
3. **COSSYPHA natalensis**, Smith. (Bessonornis natalensis, Gr.) *Ill. Zool. S. Afr. Av.* t. 60. ex Afr. m.
4. **B. humeralis**, Smith 1836. (Cossypha humeralis, Auct.)
Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 48. ex Afr. m.
5. **TURDUS albicapillus**, Vieill. (leucoceps, Sw.) *B. of western Afr.* I. p. 282. ex Afr. or.
6. **PETROCINCLA ALBICAPILLA**, Sw. nec Vieill. (Bessonornis swainsoni, Bp.) *B. of west. Afr.* t. 32. ex Afr. or.
7. **COSSYPHA semirufa**, Rüpp. (nigricapilla, Guérin.) *Syst. Uebers. Ost. Afr. Vög.* t. 21. ex Afr. or.
8. **B. cyanocampter**, Caban. *Mus. Berol.* ex Boissoneau.
Patria ignota. Fusco-olivacea; subtus flavo-ferruginea; capite, genis, cervicibus nigris: superciliis protractis albo-caeruleis: humoris cyaneo-guttatis: rectricibus laterali bus ferrugineis.
9. **COSSYPHA gutturalis**, Guérin. (Bessonornis gutturalis) *Gr.* *Rev. Zool.* 1843. p. 102. ex Afr. or. *Gula alba!*
10. **COSSYPHA poensis**, Strickl. - *Fras. Zool. typic.* figura. ex Afr. occ. *Chalybaeo-nigricans; subtus rufa, gula sensim lurida cinerea: remigibus basi rufis: rectricibus laterali bus apice albis.*
11. **COSSYPHA brevipes**, Waterh. (Bessonornis brevipes, Gr.) *App. Alex. Expéd. Disc.* ex Afr. m.

12. **TURDUS auraticollis**, Vieill. (Bessonornis auraticollis, Gr.) *Lev. Afr. t. 19.* ex Africa.
- * 13. **TURDUS diadematus**, Temm. *Mus. Lugd.* ex Afr. occ. Guinea. Fusco-olivacea; subtus alba: genis et collis lateribus plumbeis; vortice rufo-aurantio: remigibus fusco-unicoloribus: rectricibus nigricantibus; lateralibus apicis albis. Juv. tectricibus alarum, remigibusque secundariis macula apicali fulva!
- * 645. **Thamnolaea**, Caban. 1850. (Thamnobia, p. Gr.) Africa. 3.
1. **TURDUS cinnamomeiventris**, Lafr. (*Copsychus cinnamomeiventris* p. *Consp. hujus p. 267.*) *Mag. Zool. 1836.* t. 56. ex Afr. mer. Niger; uropygio crisoque intenso castaneis; abdomen albidu-ruso: humeris candidis. Faem. fusco-ardesiaca; uropygio, abdomineque fusco-castaneis; humeris concoloribus.
 2. **SAXICOLA albiscapulata**, Rüpp. (*Copsychus cinnamomeiventris* p. *Consp. hujus p. 267.*) *Fn. Abyss. t. 26.* t. ex Afr. or. s e p t. Similis praecedenti sed faemina mari hand diversa, humeris etiam albis.
 3. **SAXICOLA ET THAMNOBIA semirufa**, Rüpp. *Faun. Abyss. t. 26.* 1 et 2. ex Afr. or. s e p t. Nigra: abdomine rufo-castaneo unicolor: speculoalarum albo.
- * 646. **Myrmecocichla**, Caban. 1850. (Saxicola, p. Gr.) Africa. 3.
1. **SYLVIA formicivora**, Vieill. (leucoptera, Sw.) *Lev. Afr. t. 186.* et *187.* ex Afr. m. Fusca, subtus pallidior: humeris ex parte, remigibusque interne albis.
 - * 2. **TURDUS aethiops**, Licht. *Mus. Berol.* ex Afr. occ. Senegal. Fusca, unicolor, humeris concoloribus: remigibus interne albis.
 3. **OENANTHE nigra**, Vieill. (Saxicola nigra, Gr. - Commandeur, Let.) *Lev. Afr. t. 189.* ex Afr. m. Fusca; subtus pallidior: humeris albo-roseis.
- * 647. **Dromolaea**, Caban. 1850. (Saxicola, p. Gr.) Afr. Eur. M. A. s. occ. 7.
1. **SYLVIA cursoria**, Vieill. (Saxicola cursoria, Gr.) *Lev. Afr. t. 190.* ex Afr. m.
 2. **OENANTHE monticola**, Vieill. (*Vitiflora rupicola*, Boie. Gryllivora capensis, Sw. - Saxicola monticola, Gr.) *Lev. Afr. t. 184.* 1. ex Afr. m.
 3. **SAXICOLA cinerea**, Vieill. (levaillantii, Smith.) *Lev. Afr. t. 184.* 2. ex Afr. m. Fusco-cinerea, subtus dilutior: rectricibus extimis basi externo albis.
 4. **SAXICOLA monacha**, Rüpp. (*gracilis*, Licht.) *Temm. Pl. col. 359.* 1. ex Abyssinia.

5. *Turdus leucurus*, Gm. (*Saxicola cachinnans*, Temm.
Sax. leucura, K. et Bl. - *leucocapilla*, *Aliq.* mas adult.
Vitiflora leucura, *Bp. 1837.*) *Descr. Egypt.* t. 5. 1. - *Lath.*
Syn. III. t. 38. - *Gould*, *Eur. t. 88.* ex *Eur. mer.*
Asia, Africa.
6. *SAXICOLA LEUCURA*, Blyth, nec Auct. (*opistholeuca*,
Strickl.) *Journ. As. Soc. XLV. p. 137.* ex *Ind. s. Sindhi.*
7. *SAXICOLA albifasciata*, Rüpp. *Syst. Uebers. Vög.*
t. 16. ex *Abyssinia.*

648. **Saxicola**, Bechst. (*Oenanthe*, *Vieill.* - *Vitiflora*, *Leach.*) *Eur. As. Afr. Oc. 21.*
a. *Europaea.*

1. *MOTACILLA oenanthe*, L. (*vitiflora*, Pall. - *Oenanthe ci-*
nerea, *Vieill.* - *Saxicola rostrata*? *Ehrenb.*) *Pl. enl. 554.*
Gould, *Eur. t. 90.* ex *Eur. univers. As. Afr. s.*
Groenlandia!
2. *S. squalida*, Eversm. (*melanoleuca*, *Steph.* - *valida*,
Licht.-olivastra, *Rüpp.*) *Mus. Berol. et Lugd.* ex *Afr.*
or. scpt. Major; *rostro, pedibusque longioribus, validioribus.*
3. *MOTACILLA STAPAZINA*, Pall. nec *Vieill.* (*Saxicola saltator*,
Ménétr. - *libanotica*? *Ehrenb.*) ex *As. occ. Afr. or.*
et Eur. finitim.
4. *OENANTHE STAPAZINA*, Vieill. (*Motacilla stapazina*, Gm.
Vitiflora rufescens, Br. - *Saxicola stapazina*, Koch, nec Pall.)
Edw. B. t. 31. fig. suppl. - *Gould*, *Eur. t. 91.* ex *Eur.*
mer. Asia, Africa. *Gula nigra; tarsis longioribus.*
5. *OENANTHE albicollis*, Vieill. (*Saxicola aurita*, Temm.)
Edw. B. t. 31. fig. sup. - *Pl. col. 275. 1.* - *Gould*, *Eur. t. 92.*
ex *Eur. m. As. Afric.* *Gula alba; tarsis brevioribus.*
6. *MOTACILLA leucomela*, Pall. *Temm. part. (longirostris?*
Gm. - gutturalis? *Licht.*) *Gould*, *Eur. t. 89.* ex *Asia*
occ. et Eur. or. finitim.
7. *S. lugens*, Licht. (*leucomela*, *Temm.* ex part. nec *Pall.*)
Pl. col. 257. 3. ex *Africa, Arabia.*
b. *Africanae non Europeae.*
8. *S. infuscata*, Smith, *Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 28.* mas.
ex *Africa mer.* *Maxima;* ex *toto fuliginoso-cinerea;*
subtus dilutior, abdomine subflavescente.
9. *S. familiaris*, Steph. (*Motacilla caffra?* L. - *Oenanthe*
explorator, *Vieill.* - *Turdus sordidulus*, *Forst.*) *Lev.*
Afr. t. 183. ex *Afr. m.*
10. *S. baroica*, Smith. ex *Afr. m.*
11. *S. deserti*, Rüpp. - *Pl. col. 359. 2.* *Afr. or. As. occ.*

12. *S. isabellina*, Rüpp. Zool. Atl. t. 28. 2. ex Afr. or.
 13. *S. pallida*, Rüpp. (isabellina, Temm.) Zool. Atl. t. 34. 1.
Pl. col. 472. 1. ex Afr. or.
 14. *S. melanura*, Rüpp. - *Pl. col. 257. 2.* ex Nubia.
_{Arabia. Dilute cinerea, unicolor: cauda nigra.}
 * 15. *S. maesta*, Licht. Mus. Berol. ex Egypt. Major:
_{alba; genis, colli lateribus, gula, dorsoque nigris: alis, caudaque fuscis; alarum fascia transversa alba latisima.}
 16. *S. sperata*, Gr. ex Lath. Vail. Afr. t. 183. ex Afr. m.

c. Asiaticae non Europeae.

17. *S. picata*, Blyth, Journ. As. Soc. xvi. p. 131. ex
_{Ind. s. Sindh.}
 18. *S. atrigularis*, Blyth, Journ. As. Soc. xvi. p. 130. 1.
_{ex Ind. s. Sindh.}

d. Oceanicae.

- * 19. *S. melanoleuca*, Müll. Mus. Lugd. ex Timor.
_{Nigra; subtus alba: alis partim, maculaque auriculari utrinque, albis.}
 * 20. *S. luctuosa*, Müll. Mus. Lugd. ex Samao. Nigra;
_{subtus alba: alis albo-varisis.}
 * 21. *S. pyrrhonota*, Müll. Mus. Lugd. ex Timor. Mini-
_{ma: nigra; gula, abdomineque albis: dorso rufo.}

649. *Campicola*, Sw. 1827. (Saxicola, p. Gr.) Afr. As. Oc. 2.
 1. *MOTACILLA pileata*, Gm. (Sylvia imitatrix, Vieill. - Saxi-
_{cola pileata, Gr.) Lev. Afr. t. 181. 182.}
 2. *SAXICOLA bifasciata*, Temm. *Pl. col. 472. 2.* ex Afr. m.

650. *Pratincola*, Koch. 1816 nec Sw. (Fruticicola, MacGill.
_{Rubetra, Gr.) Eur. As. Afr. 9.}
 1. *MOTACILLA rubetra*, L. (Sylvia rubetra, Lath. - Saxicola
_{rubetra, Temm.) Pl. ent. 678. 2. - Gould, Eur. t. 93.}
_{ex Europa, Afr. s. Asia occ.}
 2. *MOTACILLA rubicola*, L. (maura, Pall. - tschekamschik?
_{Lepech. - Sylvia rubicola, Lath. - S. muscipeta, Scopoli.}
_{Saxicola rubicola, Temm. - Pratincola rubicola, Koch.)}
_{Pl. ent. 678. 1. - Gould, Eur. t. 94. ex Europ. Asia.}
 * 3. *MOTACILLA sybilla*, Gm. (rubicola var. caffra, Licht.
_{Saxicola maura, p. Temm. - Pratincola pastor, Strickl.}
_{1844. - P. sybilla, Caban.) Lev. Afr. t. 180. ex Afr. m.}
 4. *SYLVIA hemprichii*, Ehrenb. (Saxicola hemprichi,
_{Keys et Bl.) Fig. nulla- ex Afr. s. or.}

5. MOTACILLA **caprata**, L. (Lucionensis var. a. Lath. - sylvatica? Tickell. - Saxicola fruticola, Horsf. - bicolor et erythropygia, Sykes. - Sax. caprata, Blyth.) Pl. enl. 235. 1. 2. ex Asia mer. et or. Malaisia.
6. **Pr. indica**, Blyth. (Saxicola rubicola ex India, Auct.) - Journ. As. Soc. XVI. p. 129. ex Asia mer.
7. **Pr. leucura**, Blyth. Journ. As. Soc. XVI. p. 474. ex Sindh.
8. **Pr. ferrea**, Hodgs. Journ. As. Soc. XVI. p. 129. ex Himal. Darjiling.
9. **Pr. insignis**, Hodgs. List Mamm. et B. Br. Mus. App. p. 153. ex Nepal.
Quid Motacilla servida et leucorhoa, Gmel. Pl. enl. 583. 1. 2?
651. **Origma**, Gould. Austral. occ. 1.
MUSCICAPA **rubicata**, Lath. (Muscicapa solitaria, Lewin. Origma rubricata, Gould.) B. of New Holl. t. 16. Gould, Austr. III. t. 69. ex Austr. or. mer.
652. **Accentor**, Bechst. 1802. (Prunella, Vieill. - Spermolegus et Tharraleus, Kaup.) Vix hujus Familiae! Forsan cum Cinclosomis subfam. Accentorinam, minime vero Grayanam, constituendum! Asia, Europ. 12.
1. MOTACILLA **alpina**, Gm. (Sturnus collaris, Scop. - maurusitanicus, Lath. - Accentor alpinus, Bechst. - Turdus minor? Baldacconi.) Pl. enl. 663. 2. - Gould, Eur. t. 99. ex Eur. m. in alpestribus.
2. ACCENTOR **nepalensis**, immaculatus et cacharensis, Hodgs. (himalayanus? Bl. 1840.) ex As. centr. Himal.
3. **A. variegatus**, Blyth. Journ. As. Soc. XII. p. 958. ex Sikim.
4. **A. strophius**, Hodgs. Pr. Zool. Soc. 1845. p. 34. Gr. et Mitch. Gen. B. t. 51. ex Nepal.
5. **A. atrigularis**, Hutton. - Brandt, Journ. As. Soc. XVIII. sp. 727. ex Asia centr. sept.
6. MOTACILLA **modularis**, L. (Curruca sepiaria, Br. - Sylvia modularis, Lath. - Accentor modularis, Cuv. - Tharraleus modularis, Kaup.) Pl. enl. 615. 1. - Gould, Eur. t. 100. ex Europa.
7. **A. rubidus**, Temm. et Schleg. Faun. Jap. Av. t. 32. ex Japon.
8. MOTACILLA **montanellus**, Pall. (Spermolegus montanellus, Kaup.) Zool. Ross-Asiatica II. ex Sibiria or.
15. April. 1850.

9. *A. montanellus*, Temm. nee Pall? (**temminckii**, Brandt.)

Gould, Eur. t. 101. - Wern. Atl. Temm. Man. figura.
ex Sibiria occ. Eur. or. accid.

10. *A. altaicus*, Brandt, Bull. Acad. Petersb. ex Sibir.

11. *A. mollis*, Blyth, Journ. As. Soc. xiv. p. 581. ex Sikim.

Species novas ex Asia centr. a Blytho missas optime merito
Equiti Jardino, in opere "Contributions to Ornithology" cum
figuris edendas vidimus prope Lockerby Caledonise in "Jardine
Hall" Doctrinae Ornithologicae et domesticae felicitatis asylo.

653. **Sericornis**, Gould. Medium inter Anthinos et
Seiuros!

Australia. 7.

1. *S. frontalis*, Gr. ex Vig. (Sericornis parvulus, Gould.)

Austr. III. t. 49.

2. *S. humilis*, Gould, 1837. - Austr. III. t. 47.

3. *S. citreogularis*, Gould, 1837. (Muscicapa barbata?
Lath.) Austr. III. t. 46.

4. *S. osculans*, Gould, 1847. Austr. III. t. 48.

5. *S. maculatus*, Gould, 1847. Austr. III. t. 51.

6. *S. laevigaster*, Gould, 1847. Austr. III. t. 50.

7. *S. magnirostris*, Gould, 1837. Austr. III. t. 52.

SUFBAM. 95. SYLVICOLINAE.

Ad Tanagridas potius quam ad Turdidas spectat haec
Americana Subfamilia ob remigem primam nullam!

654. **Seiurus**, Sw. 1827. (Henicocichla, Gr. 1840.). Amer. s. Antill. 5.

1. *TERDUS auricapillus*, L. (coronatus, Vieill. - Seiurus
aurocipillus, Sw. - Henicocichla auricapilla, Cabanis)
Edw. B. t. 252. - Wils. Am. Orn. t. 14. 2. - Vieill.
Ois. Am. s. t. 64. - Aud. Am. t. 143. ex Am. s. or.

2. **MOTACILLA noveboracensis**, Gm. (Sylvia noveboracensis,
Lath. - Turdus aquaticus, Wils. - Seiurus te-
nuirostris, Sw. - Mniotilla!!! noveboracensis, Gr.) Pl.
enl. 752. 1. - Vieill. Am. s. t. 82. - Wils. Am. Orn.
t. 23. 5. - Aud. Am. t. 426. ex Am. s. or.

3. **TURDUS motacilla**, Vieill. (Iudovicianus? Aud.) Ois.
Am. s. t. 65. - Aud. Am. t. 19? ex America sept.
mer. Mexico. Obscurior; superciliis latis albis: abdo-
mine rufescente.

4. **Seiurus gossii**, Ep. (noveboracensis, Gosse) Ill. B.
Jamaica t. 28. ex Jamaica.

5. **Seiurus sulphurascens**, Orb. (Enicocichla sulphu-
rascens, Gr.) Voy. Cuba Ois. t. 6. ex Ins. Cuba.

655. **Sylvicola**, Sw. 1827. (Ficedula, p. Cuv. - Rhimamphus;
Hartl. ex Rafin. - Mniotilla! Gr. ex Vieill.) America. 30.

a. Americanae septentrionales.

1. MOTACILLA **coronata**, umbria et canadensis sp. 27. L.
(cineta et pinguis, Gm. - Sylvia coronata, Lath. - Sylvicola coronata, Sw. - Mniotilla coronata, Gr.) Pl. enl. 709. l. - Edw. B. t. 298. - Vieill. Ois. Am. s.t. 78 et 79. Wils. Am. Orn. t. 17. 4. et t. 45. 3. - Aud. Am. t. 153. ex Amer. s. or.
2. SYLVIA **auduboni**, Towns. (Sylvicola auduboni, Bp. Mniotilla auduboni, Gr.) Aud. Am. t. 395. 1. 2. Am. s. occ.
3. MOTACILLA **ruficapilla**² Gm. (Sylvia ruficapilla, Lath. nee Vieill. - palmarum, Bp. - petechia, Aud. - Sylvicola ruficapilla, Bp. - Mniotilla palmarum, Gr.) Vieill. Am. s. t. 73. - Bp. Am. Orn. t. 10. 2. - Aud. Am. t. 163. adult. et 145. jun. - La Sagra, Voy. Cuba, Ois. t. 8. ex Am. s. media et mer. Antill.
4. MOTACILLA **maculosa**, Gm. (Sylvia maculosa, Lath. - S. magnolia, Wils. - Sylvicola maculosa, Sw.) Edw. B. t. 255. - Vieill. Ois. Am. s. t. 93. - Wils. Am. Orn. t. 23. 2. - Sw. Faun. Bor. Am. B. t. 40. - Aud. t. 123. 414. adult. et 50. jun. ex Amer. s. unive.
5. SYLVIA **maritima**, Vieill. (Sylvicola maritima, Sw. Mniotilla maritima, Gr. - Certhiola maritima, Gosse) La Sagra, Voy. Cuba, Ois. t. 10. - Gosse, Ill. B. of Jam. fig. - Wils. Am. Orn. t. 54. 3. - Bp. Am. Orn. t. 3. 3. - Aud. Am. t. 414. ex Amer. s. etiam bor.
6. MOTACILLA **pensilis** et flavigollis, Gm. (superciliosa, Bodd. - Sylvia pensilis, Lath. - Sylvicola pensilis, Bp. Mniotilla superciliosa, Gr.) Pl. enl. 686. 1. - Catesb. Carol. t. 62. - Vieill. Ois. Am. s. t. 72. - Wils. Am. Orn. t. 12. 6. - Aud. Am. t. 85. ex Am. s. univers.
7. MOTACILLA **virens**, Gm. (Sylvia virens, Lath. - Sylvicola virens, Sic.) Edw. B. t. 300. - Vieill. Ois. Am. s. t. 92. Wils. Am. Orn. t. 17. 3. - Aud. Am. t. 399. Am. s. bor.
8. MOTACILLA **blackburniae**, Gm. (Sylvia blackburniae, Lath. - Sylvicola blackburniae, Jard.) Vieill. Ois. Am. s. t. 96. - Wils. Am. Orn. t. 23. 3. - Aud. Am. t. 135. ex Amer. s. bor.

9. MOTACILLA PENNSYLVANICA et *icterocephala*, L. (Sylvia icterocephala, Lath. - Sylvicola icterocephala, Sw.)
Pl. enl. 731. 2. - *Edw. B. t.* 301. - *Aud. Am. t.* 59.
Wils. Am. Orn. t. 14. 5. - *Vieill. Ois. Am. s. t.* 90.
Amer. s. bor.
10. SYLVIA *castanea*, Wils. (Sylvicola castanea, Sw.) *Am. Orn. t.* 14. 4. - *Aud. Am. t.* 69. *ex Am. s. univers.*
11. SYLVIA *nigrescens*, Towns. (lippa, Licht. - Sylvicola nigrescens, Aud. - Vermivora nigrescens, Bp.)
Aud. Am. t. 395. 5. 6. *ex Amer. sept. occ. Mexico.*
12. MOTACILLA *striata*, Gm. (Sylvia striata, Lath. - autumnalis? Wils. jun. - Sylvicola striata, Sw.) *Vieill. Ois. Am. s. t.* 75. 76. - *Wils. Am. Orn. t.* 30. 3. et 54. 4.
Aud. Am. t. 123. *ex Amer. sept. univ.*
13. MOTACILLA *tigrina*, Gm. (Sylvia tigrina, Vieill. - Mniotilla tigrina, Gr.) *Edw. Glean. t.* 257. *ex Amer. sept.*
- 14? SYLVIA *montana*, Wils. (tigrina, Bp. - Mniotilla montana, Gr.) *Am. Orn. t.* 44. 2. - *Aud. Am. t.* 414. *ex Am. sept. univ.*
15. SYLVIA *discolor*, Vieill. (minuta, Wils. - Sylvicola discolor, Bp.) *Am. Orn. t.* 25. 4. - *Aud. Am. t.* 14.
ex mer. et occ. Amer. sept.
- 16? SYLVIA *pumila*, Vieill. (Mniotilla pumila, Gr.) *Ois. Am. s. t.* 100. *ex Amer. sept.*
17. SYLVIA *occidentalis*, Towns. (Sylvicola occidentalis, Aud. - Mniotilla occidentalis, Gr.) *Aud. Am. t.* 395. 3. 4.
ex occid. Amer. sept.
18. SYLVIA *townsendi*, Aud. (Mniotilla townsendi, Gr. - Sylvicolatownsendi, Bp.) *Am. t.* 318. 1. *ex occid. Am. s.*
19. MOTACILLA *canadensis*, L. sp. 42. (caerulescens, Gm. - Sylvicola canadensis, Sw. jun. - Sylvic. pannosa? Gosse. - Sylvia macropus? Vieill. - Sylvia sphagnosa, Bp. jun. - S. palustris, Stephens. - S. pusilla, Wils. jun. - S. leucoptera, Wils.) *Pl. enl.* 685. 2. - *Edw. B. t.* 252. - *Wils. Am. Orn. t.* 15. 7. adult. et t. 43. 4. jun. - *Vieill. Ois. Am. s. t.* 80. - *Aud. Am. t.* 155. adult. t. 148. jun. - *La Sagra, Voy. Cuba, Ois. t.* 9. - *Gosse, Ill. B. Jamaic. t.* 377 *ex Amer. sept. bor. Antill.*
20. SYLVIA *caerulea*, Wils. (S. rara? Wils. jun. - populorum, Vieill. - azurea, Steph. - bifasciata, Say. - Sylvicola caerulea, Sw. - Hypothimis! azurea, Boie - Culicivora coerulea, Gr.) *Edw. B. t.* 362. - *Wils. Am. Orn. t.* 17. 5. adult. et t. 27. 2. jun. - *Bp. Am. Orn. t.* 11. 2. - *Aud. Am. t.* 48. adult. t. 49. jun. *ex mer. Amer. s.*

b. Mexicanae aut ex Antillis haud Americanae boreales.

21. **S. taeniata**, Dubus. (Mniotilta taeniata, Gr.) Esq. Orn.
figura. ex Mexico m. S. Pedro, Oaxaca.
22. **S. eoa**, Gosse. (Mniotilta eoa, Gr.) Ill. B. of Jamaic.
t. 34. ex Antill.
23. **S. pharetra**, Gosse. (Mniotilta pharetra, Gr.) Ill. B.
of Jamaic. t. 38. ex Antill.
- c. Americanae meridionales. Aberrantes: an hujus generis?
24. **SYLVIA pyrrhonota**, Vieill. (Mniotilta pyrrhonota,
Gr.) Azara 163. ex Parag.
25. **SYLVIA rubida**, Vieill. (Mniotilta rubida, Gr.) Azara
166. ex Parag.
26. **SYLVIA sylvestris**, Vieill. (Mniotilta sylvestris, Gr.)
Azara 169. ex Parag.
27. **SYLVIA pyrrholeuca**, Vieill. (Mniotilta pyrrholeuca,
Gr.) Azara 231. ex Parag.
28. **SYLVIA ruficollis**, Vieill. (Mniotilta ruficollis, Gr.)
Azara 240. ex Parag.
29. **S. aureola**, Gould. (Mniotilta aureola, Gr.) Voy.
Beagle, B. t. 28. ex Chilli.
30. MOTACILLA chrysoccephala, Gm. (aurantia, Bodd.
Mniotilta aurantia, Gr.) Pl. enl. 58. 3. ex Guiana.
Quid Motacilla dominica (Br. Orn. III. t. 27. 3.) et M. calidris
(Edw. B. t. 121. 2.) L?
Quid Motacilla ochroleuca - junctorum - ruficauda - fuscicollis -
incana - murina - auricollis (Br. Orn. III. t. 26. 1.) - semitor-
quata - fulva - fusca - bananivora - linea - et grisea (Pl. enl.
714. 1.) Gmelin?
- Quid Motacilla striata, Forst. (Mill. Cimel. Physic. t. 15. A. B.)
et M. gularis, Mill. Cimel. Physic. t. 30. C?
- Quid Sylvia virescens (viridicans, Shaw) et S. carolinensis (Mot-
acilla rubiginosa, Pall. - Pl. enl. 58. 1.) Latham?
- Quid Sylvia ardosiae - melanorhoa et chrysopus, Vieillot?

*656. **Pachysylvia**, Bp. (Mniotilta, p. Gr.) Media quasi inter
Sylvicolas et Vireones: corpus concretum, decur-
tatum: alae ampliae, breves; remigum prima brevissima!
secunda aequali duodecimae; tertia, quarta, quinta et
sexta omnium longissimis: cauda parva, angusta, truncata. America.

1*i*

SYLVICOLA decurtata, Bp. (Mniotilta decurta, Gr.) Proc.
Zool. Soc. 1837. p. 118. sp. 31. ex Mexico. Viridis;
subitus allo-virescens; capite colloque supra plumbeis, subitus
albis: remigibus, rectricibus quo subfuscis viridi-marginatis.

657. **Parula**, Bp. 1838. (*Chloris, Boie, nec Botan.* - *Sylvicola, Caban.* 1847. - *Mniotilla, p. Gr.*) America. 4.

1. **PARUS americanus**, L. (*Motacilla eques, Bodd.* - *ludoviciana, Gm.* - *pusilla, Wils.* - *torquata, Vieill.*) *Pl. enl. 731. t. - Am. Orn. t. 28. 3. - Ois. Am. s. t. 99. Aud. Am. t. 15. ex Am. s. Media: alis albo-maculatis: abdomine albo.*

*2. **SYLVIA mexicana**, Licht. (*Sylvicola mexicana, Caban.* minuta? *Sw.*) *Mus. Berol. ex Mex. Major: pileo cervicalis canis; superciliis albis: uropygio viridi: alis immaculatis.*

3. **SYLVIA brasiliensis**, Licht. (*venusta, Temm.* - *pitiayami?* *Vieill. ex Azara 109.* - *plumbea, Sw.* - *Mniotilla venusta, Gr.* - *Parula brasiliana, Blyth.*) *Pl. col. 293. t. - Zool. Ill. t. 139. ex Brasil. Minor: alis albo maculatis: abdomine flavo.*

Quid Sylvia speciosa, Wied. - Mniotilla speciosa, Gr. ex Azara 107. Pl. col. 293. 2. ex Brasil?

658. **Trichas**, Sw. nec Glegér. (*Geothlypis, Caban 1847.*) America. 8.

1. **MOTACILLA TRICHAS**, Gm. (*marilandica, L.* - *Trichas personatus et brachydactylus?* *Sw.* - *Sylvia roscoei, Aud.* *Regulus mystaceus, Steph.*) *Pl. enl. 709. 2. - Edu. B. t. 237. - Wils. Am. Orn. t. 6. 1. et 18. 4. - Aud. Am. t. 23. ex Am. sept. univ.*

2. **SYLVIA philadelphica**, Wils. (*agilis, Wils. nec Aud.* 2. ed. jun. - *Trichas philadelphica, Bp.*) *Aud. Am. t. 30. 4. adult. et 138. jun. ex Am. s. et occ. Pennsylv.*

3. **T. macgillivrayi**, Audub. *Am. t. 399. 4. 5. ex Oregon.*

4. **T. delafieldi**, Aud. *Orn. Biogr. v. p. 307. ex Calif.*

5. **SYLVIA velata**, Vieill. (*canicapilla, Wied.* - *Trichas velatus, Sw.*) *Ois. Am. s. t. 74. ex Brasil.*

6. **MOTACILLA aequinoctialis**, Gm. (*Trichas aequinoctialis, Gr.*) *Pl. enl. 685. t. - Vieill. Ois. Am. s. t. 81. ex Cayenna.*

*7. **SYLVIA vegeta**, Licht. (*Trichas vegeta, Caban.*) *Mus. Berol. ex Mexico. Viridi-olivaceus, pileo conserente; annulo oculari albidus; gula pectoraque albo-murinisi; abdomen crissaque flavis.*

8. **SYLVIA leucoblephara**, Vieill. (*unisona, Licht.* - *Trichas superciliosus, Sw.* - *Tr. leucoblepharus, Gr.*) *Ex Azara 153. ex Parag. Bras. Olivaceus; subtus albus; pileo fusco-plumbeo; superciliis albis nigrisque.*

* 659. **Myiothlypis**, Caban. 1850. (Trichas, p. Gr.) America mer. 2.

1. TRICHAS *nigricristatus*, Laf. (Setophaea nigriceps, Licht.) Rev. Zool. 1840. p. 230. ex Bogota.
2. TRICHAS *luteo-ceridus*, Bp. ex Bog. Laete viridis; sub-tus, cum superciliis antice, luteus. An praecedentis faemina?

660. **Rhimamphus**, Bp. ex Rafin. 1819. (Dendroica, Cab. ex Gr.

Sylvicola, p. Sw. - Mniotilla, p. Gr.) America. 4.

1. MOTACILLA *aestiva* et petechia? L. (albicollis, Gm. - canadensis, Bodd. - Sylvia aestiva et petechia, Lath. - S. citrinella, Wils. - S. childreni, Aud. jun. - Sylvicola aestiva, Sw. - Rhimamphus citrinus, Hartl. ex Rafin. Mniotilla aestiva, Gr.) Pl. enl. 58. 2. - Edw. B. t. 256. Vieill. Ois. Am. s. t. 95. et 91. - Am. Orn. t. 15. 6. Aud. Am. t. 95. adult. et t. 35. jun. - Richards. Faun. Bor. Am. t. 41. ex Am. s. univers.
2. SYLVIA *ruficapilla*, Vieill. nec Lath. (Mniotilla ruficapilla, Gr.) Azara 164. ex Paraguay. Flavo-viridis; subtus flavissima, rufo-striata; capite ex toto rufa.
3. SYLVIA *rathbonia*, Aud. (Sylvicola rathbonia, Bp.) Am. t. 63. ex Am. s. occ.
4. SYLVIA *parus*, Wils. (autumnalis? Wils. jun. - Sylvicola parus, Jard. - Mniotilla parus, Gr.) Am. Orn. t. 44. 3. et t. 23. 4. - Aud. Am. t. 134. adult. et t. 88? jun. ex Amer. sept.
5. SYLVIA *pinus*, Lath. (vigorisi, Aud. jun. - Mniotilla pinus, Gr. - Motacilla pinus, Gm. - Sylvicola pinus, Bp.) Edw. B. t. 277. - Wils. Am. Orn. t. 19. 4. - Aud. Am. t. 140. et t. 30. ex Am. s. med. et mer.

661. **Mniotilla**, Vieill. (Oxyglossus, Sw.) America s. 1.

MOTACILLA *varia*, L. (Sylvia varia, Lath. - Gerthia maculata, Wils. - Mniotilla varia, Vieill. - Oxyglossus varius, Sw. - Nectarinia varia, Hahn.) Ausl. Vög. Am. figura. - Am. Orn. t. 19. 3. - Aud. Am. t. 38. ex Am. s.

662. **Ægithina**, Vieill. (Mniotilla, p. Gr.) America s. 1.

Ægithina leucoptera, Vieill. (Mniotilla leucoptera, Gr.) Ois. Am. s. t. 84. ex Amer. sept.

* 663. **Hemithraupis**, Caban. 1850. (Hylophilus, p. Gr.) Ad

Tanagrinas tenuirostres accedit.

America mer. 3.

1. **H. ruficeps**, Wied. Beitr. Nat. Brasil. III. p. 725. ex Brasil.

2. *Nemosia floricollis*, Vieill. et hujus *Consp.* p. 236.
 3. *Nemosia guira*, *Consp.* hujus, p. 236.

* 664. **Granatellus**, Dubus. Rostrum longulum, curvum, compressum, vibrissis nullis: pedes graciles, digitis brevibus: alae brevissimae, rotundatae: cauda longa, rotundata. Ad Nemosiam et Tanagrellam *Tanagridarium* proxime accedit!

Mexico. 1.

* **Granatellus venustus**, Dubus, Esq. *Orn.* t. 34.
Mus. Bruxell. ex Mexico. Ardesiacus; loris genisque nigris; vitta utrinque postoculari, gula nigro-marginata, lateribusque albis; pectora, medio abdominis, crisoque rubro-rosis; cauda nigra; rectricibus tribus extimis apice albis.

* 665. **Cardellina**, Dubus. Rostrum breve, subulatum, robustum, basi valde plumatum, vibrissis rigidis: pedes gracie, digitis brevibus: alae longae, subrotundatae; remige prima quintam subaequante; secunda tertia et quarta omnium longissimis: cauda longula, emarginata. Ad *Tanagrinas* quam maxime accedit et potius pertinet! Mexico. 2.

* 1. **Cardellina amicta**, Dubus. (*Parus erythropis*, *Licht.*) *Esq. Orn.* 1850. t. 25. *Mus. Bruxell. et Berol. ex Mexico. Cano-ardesiacus; fronte, gula et semi-collaris rubro-mindatis; vertice genisque nigris; occipite, uropygio, ab domineque albis.*

2. **Setophaga rubra**, Sw. 1827. (*miniata*, *Lafr.* - *Sylvia argyrotis*, *Illig.*) *Mag. Zool.* 1836. *Ois.* t. 54. *ex Mexico. Rubra; remigibus rectricibusque fuscis; macula utrinque auriculari argentea.*

666. **Setophaga**, Sw. 1827.

America. 12.

a. *Americanae septentrionales.*

1. **Muscicapa ruticilla**, L. (*flavicauda*, *Gm. faem.* - *Setophaga ruticilla*, *Sw.*) *Educ. B.* t. 257. - *Wils. Am. Orn.* t. 6. 6. - *Aud. Am.* t. 40. - *Sw. B. of Bras.* t. 71. *ex Amer. s. univers.*

2. **S. picta**, Sw. (*Muscicapa tricolor*, *Licht.*) *Zool. Ill. n. s. t. 3. ex Mexico, Zaca toca s. Nigra; abdomine medio rubro, lateribus nigris; alarum fascia latissima, rectricibusque extimus utrinque tribus fore omnino, albis.*

* 3. **S. multicolor**, Bp. (*Motacilla multicolor?* *Gm.* - *Setophaga nigra*, *Gr. ex Bodd.*) *Mus. Senkenb.* *ex Mexico. Nigra; fronte, fascia alarum angusta, macula rectricum extimarum, ventreque albis; pectora ab domineque rubris.*

4. **MUSCICAPA vulnerata**, Wagl. (larvata, Licht. - miniatia, Sw. 1837. nec Lafr. - Setophaga castanea, Lafr.

1839. - S. miniatia et vulnerata, Gr.) Isis 1831. p. 520.

ex Mexico, Zaca tecas. Cinereo-nigricans; fronte, gulaque nigra; vertice castaneo; pectore, abdomineque rubris; rectricibus extimis utrinque tribus apice albis.

Quid Sylvia russeicanda, Vieill. (Setophaga russeicanda, Gr.) Ois.

Am. s. t. 71. et Dumicola ruficauda, Sw. (Setophaga ruficauda, Gr.) Faun. Bor. Am. p. 469?

Quid Setophaga olivatra, Gr. ex Less. Traité Orn. p. 392?

b. Americanae meridionales.

5. **S. verticalis**, Lafr. - Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 35. 1.

ex Bogota. Plumbea; abdomine flavo: vertice castaneo; rectricibus tribus extimis albis.

6. **S. castaneo-capilla**, Caban. in Schomb. Mus. Berol.

ex Guiana. Fusco-plumbea; subtus omnino flava, latribus fuscis; pileo castaneo; rectricibus extimis apice albis.

7. **S. ornata**, Boissonn. (citreola, Licht.) Rev. Zool. 1840.

p. 70. ex Sta. Fe de Bogota. Fusco-plumbea; genis mento, criso, rectricibusque extimis albis; fronte, vertice, gula, pectore, abdomineque flavis; occipite, cerviceque nigris.

8. **S. flaveola**, Lafr. Rev. Zool. 1844. p. 81. sp. 5. *ex Columbia. Similis S. ornatae, sed facie colore albo omnino destituta.*

9. **S. albidiadema**, Lafr. Rev. Zool. 1848. p. 8. *Columbia.*

10. **S. melanocephala**, Tschudi, Faun. Per. p. 192.
tab. 12. fig. 1. ex Peru.

11. **S. chrysogastra**, Tschudi, Faun. Per. p. 192.
ex Peru.

667. **Basileuterus**, Caban. 1847. (Setophaga, Trichas et Helmitheros, p. Gr.)

Mexico. Am. m. 8.

1. **SYLVIA vermiciora**, Vieill. ex Azara 154. nec Lath. (verticalis, Licht. - Setophaga auricapilla? Sic. - Trichas bivittatus, Gr. ex Lafr? - Basileuterus vermiculus, Cab.) Schomb. Reise III. p. 666. *ex Bras. Guiana, Parag. Olivaceo-viridis; subtus flavissimus: superciliis albidis; vertice longitudinaliter awantiacio, fascia lata nigra utriusque marginato.*

*2. **B. hypoleucus**, Cabanis, Mus. Berol. *ex Brasil.*
Minor. Similis praecedenti, sed corpore subtus albo.

*3. **SYLVIA culicivora**, Licht. (Basileuterus culicivorus, Caban.) Mus. Berol. *ex Mexico, Xalapa. Cinerreo-virens; subtus flavus; vertice medio flavo.*

- * 4. *SYLVIA chrysophrys*, Licht. (Basileuterus chrysophrys, Caban.) *Mus. Berol.* ex *Mexico*, *Real-Arribia*. *Viridi-olivaceous; subtus flavus: vertice, genisque castaneis; superciliis flavo-aureis, nigro-marginatis.*
5. *SETOPHAGA rufifrons*, Sw. (*Sylvia aurigula*, *Licht.* - *Basileuterus rufifrons*, *Caban.*) *Two Cent and a Quart.* p. 294. *Mus. Berol.* ex *Mexico*. *Cinereo-virens; pileo castaneo; superciliis albis: gula pectoreque flavis: abdomine albido.*
6. *SETOPHAGA brunneiceps*, Lafr. - *Orb. Voy. Am. m.* *Ois. t. 34. 3. ex Sta. Fe de Bogota. Viridis: pileo castaneo, superciliis albis: subtus omnino flava.*
- 7? *SETOPHAGA cinnamomeiventris*, Lafr. (*Muscicapa cinnamomeiventris*, 1843.) *Rev. Zool. 1844. ex Nova Granada.*
8. *SETOPHAGA coronata*, Tschudi, *Faun. Peruan.* p. 16. ex Amer. m. occ.
9. *SETOPHAGA tristriata*, Tschudi, *Faun. Peruan.* p. 16. ex Amer. m. occ.
- * 10. *SYLVIA lachrymosa*, Licht. (*Basileuterus lachrymosus*, *Caban.*) *Mus. Berol.* ex *Mexico*. *Maximus!* (an gen. distinct!?) *plumbeo-virens; subtus flavus, pectore, lateribusque rufescens; vertice flavo: superciliis latissime nigris: maculis utrinque duabus ocularibus, restringimque apicibus albidis.*
Quid Trichas ruficeps et Tr. concolor. Gr. ex *Orb.* et *Lafr.* *Syn.* *Av. p. 50. ex Amer. m?*
668. *Helminthos*, Rafin. (*Vermivora*, Sw. 1827. - *Dacnis*, Bp. nec Cuv. - *Helminae*, Aud. 1839.) America. 11. 11.
1. *SYLVIA vermicaria*, Lath. (*Helmitheros migratorius*, Rafin. - *Vermivora fulvicapilla*, Sw. - *Vermivora pennsylvanica*, Aliq.) *Edw. B. t. 305. - Wils. Am. Orn. t. 24. 4. - Aud. Am. t. 34. ex Am. s. or.*
2. *SYLVIA swainsoni*, Aud. (*Vermivora swainsoni*, Bp.) *Am. t. 198. ex Amer. sept. occ.* 28
3. *MOTACILLA protonotarius*, Gm. (*citreo*, Bodd. - *Sylvia protonotarius*, Lath. - *Vermivora protonotarius*, Bp. *Helinaea protonotarius*, Aud. - *Mniotilla citrea*, Gr.) *Pt. enl. 704. 2. - Vieill. Ois. Am. s. t. 83. - Wils. Am. Orn. t. 24. 3. Aud. Am. t. 3. ex Am. sept. m. Major.* 18
- * 4. *SYLVIA blanda*, Licht. *Mus. Berol.* ex *Ins. Cuba*. *Media: plumbea; subtus albo-virens; capite, collo, pectoreque flavo-viridibus.* 4. 11

5. **SYLVIA SOLITARIA**, Wils. (Helinaia solitaria, Aud. - Vermivora solitaria, Sw. - Helmitheros solitarius, Bp.) *Edw. B. t. 277. 1. - Am. Orn. t. 15. 4. - Aud. Am. t. 20. ex Amer. sept. univers. Minor.*
6. **MOTACILLA CHRYSOPTERA**, L. (flavifrons, Gm. - Vermivora chrysoptera, Sw.) *Edw. B. t. 299. - Wils. Am. Orn. t. 15. 6. - Bp. Am. Orn. t. 1. 3. - Vieill. Ois. Am. s. t. 97. - Aud. Am. t. 414. ex Am. s. univers.*
7. **SYLVIA BACHMANI**, Aud. (Vermivora hinc Helmitheros bachmani, Bp.) *Am. t. 185. ex Am. s. m. rara.*
8. **SYLVIA PEREGRINA**, Wils. (tenessae et bicolor? Vieill. Vermivora peregrina, Bp.) *Vieill. Ois. Am. s. t. 90.* Am. Orn. t. 25. 2. - Aud. Am. t. 154. - Sw. Faun. Bor. Am. Av. t. 42. 2. ex Amer. s. m. occ.*
9. **SYLVIA CARBONATA**, Aud. (Vermivora carbonata, Bp.) *Am. t. 60. ex Am. s. bor.*
10. **SYLVIA RUBRICAPILLA**, Wils. (leucogaster, Shaw. nashvillii, Vieill. - mexicana! ex Greenlandia!! Reinhardt!!! - Vermivora rubricapilla, Sw. - Mniotilla ruficapilla, Gr.) *Am. Orn. t. 27. 3. - Aud. Am. t. 89. - Sw. Faun. Bor. Am. t. 42. 1. ex merid. occ. Am. s.*
11. **SYLVIA CELATA**, Say. (Vermivora celata, Jard. - Heli-naia celata, Aud.) *Bp. Am. Orn. t. 5. 2. - Aud. Am. t. 178. ex Am. s. centr. et mer.*

669. **Myiodictes**, Aud. 1839. (Wilsonia, Bp. nec Botan. - Sylvania, Nutt. nec Blyth. - Setophaga! p. Gr.) America. 4.
1. **MUSCICAPA CANADENSIS**, L. (canadensis cinerea, Br. - bona-partii, Aud. - **S. pardalina**, Bp. - Setophaga! canadensis, Gr. ex Sw. - nigricincta, Laf. 1843.) *Br. Orn. n. t. 39. 4. - Wils. Am. Orn. 26. 2. - Aud. Am. t. 103. et t. 5. ex Amer. s. univers.*
2. **SYLVIA MITRATA**, Lath. (Muscicapa eucullata, Wils. Wilsonia mitrata, Bp. - Muscicapa selbyi, Aud. jun. Setophaga! mitrata, Gr. ex Hartl.) *Wils. Am. Orn. t. 26. 3. Aud. Am. t. 90. adult. t. 9. jun. ex Amer. sept.*
3. **SYLVIA FORMOSA**, Wils. (Sylvieola formosa, Jard. Myiodictes formosa, Audub.) *Am. Orn. t. 25. 3. - Aud. Am. t. 38. ex Am. s. mer. occ.*
4. **MUSCICAPA PUSILLA**, Wils. (M. wilsonii hinc Wilsonia pusilla, Bp. - Sylvia petasodes? Licht.) *Aud. Am. t. 124. ex Am. sept. mer. Mexico coloribus vividioribus!*

FAMILIA 45. MUSCICAPIDAE.

SUBFAM. 97. MUSCICAPINAE.

670. **Culicivora**, Sw. America. 4.

1. **MOTACILLA caerulea**, L. (cana, Gm. - *Sylvia caerulea*, Lath. - *Culicivora caerulea*, Sw.) *Edw. Glean.* t. 302.

Vieill. Am. s. t. 88. - Wils. Am. Orn. t. 18. 5. - Audub.

Am. t. 84. ex Amer. sept. Caeruleo-cinerea; subtus alba; fronto caudaque nigra; rectricibus extimis albis, rachide nigra. Faem. fronte concolor.

* 2. **CULICIVORA mexicana**, Bp. *Mus. German.* ex *Mexic.*

Similis praecedenti, sed minor, magis cinerea: fronte concolor: cauda nigra, rectricibus extimis albis, rachide nigra.

3. **SYLVIA dumicola**, Vieill. ex *Azara* 168. (*caerulea* var.

Aliq. - leucogastra, Wied. - bivittata, Licht. - Motacilla caerulea var. β . capite nigro, Gm. - Culicivora atricapilla, Sw. - C. leucogastra et dumicola, Gr.) *Pl. enl.* 704. I. - *Sw. Zool. Ill. n. s. t. 57. ex Brasil. Cayenn. Parag. Plumbea; subtus alba; pileo, genis, caudaque nigra; rectricibus extimis albis.*

* 4. **SYLVIA bilineata**, Licht. (*Culicivora bilineata, Caban.*)

Mus. Berol. ex Amer. mer. Cartagena. Plumbea; subtus alba; pileo, caudaque nigra; superciliis, rectricibus que extimis albis.

5. **CULICIVORA budytoides**, Laf. - *Orb. Syn. Av.* p. 56.

ex Amer. mer.

*Quid Culicivora elegans, Less. *Voy. Thetis*, II. p. 323?*

* 671. **Stenostira**, Caban. et Bp. 1850. (*Platystira*, p. Sw.) Africa. 1.

MUSCICAPA scita, Vieill. (*tenella*, Licht. - *Platystira longipes*, Sw. - *scita*, Gr.) *Lev. Afr. iv. t. 154. - Nat. Libr. x. Flycatch. t. 21. ex Afr. mer. Fusco-plumbea; fascia oculare, caudaque nigra; pectore ardesiae: superciliis, mento, gulae marginibus, abdomine, alarum fascia transversa, rectricibusque extimis, albis.*

672. **Muscicapula**, Blyth. 1843. Asia. 3.

1. **MUSCICAPA sapphira**, Tickell. (*M. saphirina*, Gr.) *Jerd. Ill. Ind. Orn. t. 32. ex Sikim.*

2. **MUSCICAPA superciliaris**, Jerd. (*hemileucura*, Hodgs.)

Dimorpha albicularis, Blyth. Jard. Contr. Orn. 1848. cum fig. ex Asia centr. et mer.

3. **MUSCICAPA maculata**, Tickell, nec Auct. (Muscicapula melanoleuca, Blyth.) *Journ. As. Soc.* II, p. 574. et xvi.
p. 127. ex *Asia centr. Malaiasia*.

673. **Hemipus**, Hodgson, nec *Hemixos*? (Lanaria, Blyth.

Quid Thamnoctaphus, Tickell?) Asia. 2.

1. **MUSCICAPA picata**, Sykes. (variegata? *L.* - tyrannides, Tickell. - hirundinacea, Jerd. nec Temm. - Lanaria picacea-color hinc Hemipus picatus, Blyth.) *Journ. As. Soc.* II, p. 574. ex *Nepal, Arracan, Ceylon*. *Fusca, subtus albida; pileo, cervice, alis, caudaque frontundata, nigris: alarum fascia, rectricumque lateratum apice, late albis.*
2. **MUSCICAPA capitalis**, MacClell. (picaceicolor, Hodgs. *Hemipus capitalis, Blyth.*) *Pr. Zool. Soc.* 1839. p. 159. et 1845. p. 33. ex *Assam. Darjiling*.

674. **Muscicapa**, L. p. Boie ex *L.* (Butalis, Gr., nec Boie. - Ficedula, Br. nec Cuv.)

Eur. As. Afr. 3.

1. **M. atricapilla**, L. (nigra, Br. - ficedula, Gm. - muscipeta, Bechst. - Emberiza luctuosa, Scopoli.) *Pl. enl.* 565. 2.m. nupt. temp. 668. 1. faem. - *Edw. B. t.* 30, 1.2. *Gould, Eur. t. 63, 1. ex Eur. Afr. sept. Remigium prima brevissima.*

- * 2. **M. speculigera**, Selys, *Mus. Longchamps*. ex Afr. sept. *Nigerrima; subtus alba; fronte, scapularibus, speculoque alarum albis: collaris nullo. Media inter affinissimas M. albicapillam et collarem!*

3. **M. collaris**, Bechst. (albicollis, Temm. - streptophora, Vieill.) *Gould, Eur. t. 63, 2. ex Eur. As. Afr. s. Remigium prima longiuscula.*

Quid Musicapa obscura. - maculata. - rufiventris (Pl. enl. 572, 3.) tectec (Br. Orn. II, t. 39, 1.) - madagascariensis (Br. III, t. 24, 5.) melanictera (Brown, Ill, t. 82) - fuscescens. - philippensis. undulata. - caledonica (olivacea, Forst.) - naevia. - flavifrons (heteroclitia, Forst.) - nigrifrons. - comata. - sinensis. - nitens. grisea - et flavicollis, Gmel?

Quid Musicapa cochinchinensis. - cambaiensis. - passerina - et nitida, Latham?

Quid Musicapa griseicapilla. - tricolor. - albicollis. - melanoleuca. - musica - et polychoptera, Vieill?

Quid Musicapa picata. - latirostris - et ruficanda, Swainson?

675. **Butalis**, Boie. (Muscicapa, Gr.)

Eur. As. Afr. 11.

a. Europea.

1. **MUSCICAPA grisola**, L. - *Pl. enl.* 565. 1. - *Gould, Eur. t. 65, ex Eur. As. occ. Afr. sept.*

b. Africanae.

2. BUTALIS *adusta*, Boie. (Muscicapa undulata, Licht. - M. adusta, Gr.) *Lev. Afr.* t. 156. ex *Afr.* m.
3. MUSCICAPA *chocolatina*, Rüpp. (fumigata? Guerin. Butalis chocolatina, Bp.) *Syst. Uebers. N. Ost. Afr. Vog.* t. 20. *Mus. Sinkeb.* ex *Abyssin.* *Fusca; subtus albo-plumbea: rostro sylviano!* sed vibrissis longis, rigidis, instructo.
4. MUSCICAPA *semipartita*, Rüpp. *Fn. Abyss.* t. 40. i. ex *Cordofan.* *Dilute plumbea, remigibus apice obscurioribus, rectricibus concoloribus: subtus flavo-rufa: cauda rotundata: rostro parum depresso.*
5. MUSCICAPA *albifrons*, Sparrm. *Mus. Carls.* t. 24. ex *Africa mer.*
6. MUSCICAPA *fraseri*, Strickl. *Ann. Nat. Hist.* xv. p. 128. ex *Ins. Fernando Po.*

c. Asiaticae.

7. MUSCICAPA *pondiceriana*, Licht, ex Gm. (Butalis pondiceriana, Bp.) *Mus. Berol.* ex *India.*
8. BUTALIS *terrificator*, Hodgs. *Journ. As. Soc.* xvi. 120. ex *Nepal.*
9. MUSCICAPA *cinereo-alba*, Temm. et Schleg. *Faun. Japon.* t. 15. ex *Japon.*
10. MUSCICAPA *gularis*, Temm. et Schleg. *Faun. Japon.* t. 16. ex *Japon.* *Vix hujus generis!*
11. MUSCICAPA *hylocharis*, Temm. et Schleg. *Faun. Japon.* t. 17. ex *Japon.* *Maxime aberrans!*

676. Erythrosterna, Bp. (Muscicapa, p. Gr.) Eur. or. As. Oc. 7.

1. MUSCICAPA *parva*, Bechst. (Erythrosterna parva, Bp.) Gould, Eur. t. 64. ex *Asia*, Eur. or.
2. MUSCICAPA *rubeocula*, Sw. (Rubecula tyleri, Jameson, *Mus. Edinb.* - *parva* ex *India*, *Auct.*) *Nat. Libr. Flycatch.* t. 27. ex *Asia centrali*, accident. Eur. or.
3. MUSCICAPA *leucura*, Gm. (*Synornis joulainus*, Hodgs. *Saxicola rubeculoides*, Sykes. - *Erythrosterna leucura*, Blyth.) *Pr. Zool. Soc.* 1845. p. 27. ex *India univ.*
4. E. *acornatus*, Blyth. (*Muscicapula acornatus* ex *Nepal*. Hodgs.) *Journ. As. Soc.* xvi. p. 127. ex *Nepal.*
5. E. *pusilla*, Blyth. (*Muscicapula acornatus* ex *Asia centrali*, Hodgs. - *M. poonensis*, Blyth.) *Journ. As. Soc.* xi. p. 458. et xvi. p. 127. ex *Asia centr.*

6. **MUSCICAPA solitaria**, Müll. *Tijdschr.* 1835. p. 351.
ex Sumatra.
7. **MUSCICAPA rufigula**, Kuhl.-Müll. *Tijdschr.* 1835. p. 351.
ex Java.
677. **DIMORPHA**, Hodgs. (*Siphia, Hodgs. 1837.*) Asia. Ocean. 4.
1. **SIPHIA strophiata**, Hodgs. *Ind. Rev.* 1837. p. 651. *ex Darjiling. Rufo-olivacea; gula, pectore, caudaque nigricantibus; jugulo ferrugineo; fronto, rectricumque basi lateralius candidis; abdomine albo-cinerascente.*
 2. **DIMORPHA superciliaris**, Bl. (*rubro-cyanæa, Hodgs. Muscicapa hyperithra et rubecula, Blyth.*) *Pr. Zool. Soc.* 1845. p. 26. *ex Darjiling.*
 3. **DIGENEA tricolor**, Hodgs. *Pr. Zool. Soc.* 1845. p. 46.
ex Himal. Masuri.
 4. **DIGENEA leucomelanura**, Hodgs. *Pr. Zool. Soc.* 1845. p. 26. *ex Nepal.*
678. **Anthipes**, Blyth. Asia centr. 1.
- DIMORPHA moniliger** et Niltava maegregoriae faem?
Hodgs. (Anthipes gularis, Blyth.) Pr. Zool. Soc. 1845.
p. 26. ex Himal. Darjiling. Arakan.
679. **Hyliota**, Sw. (*Muscicapa, p. Gr.*) Africa. 1.
- H. flavigaster**, Sw. *Nat. Libr. Flycatch. t. 23. Afr. occ.*
680. **Niltava**, Hodgs. (*Chaitaris, Hodgs. 1841.*) Asia centr. 3.
1. **CHAITRIS grandis**, Blyth. (*Bainopus irenoides, Hodgs.*) *Journ. As. Soc.* xi. p. 189. *ex Asia centr. Sikkim.*
Maxima: fusco-cyanæa; pileo, macula colli utrinque, humeris, uropygique caeruleis: alis, abdomineque fuscis: fronte, genis, gulaque nigerrimis.
Faem. Undique rufa; macula colli utrinque albo-caerulea.
 2. **N. sundava**, Hodgs. *Ind. Rev.* 1837. p. 650. *ex Himal.*
Major: nigra; fronte, genis, gulaque nigerrimis: pectore, abdomineque aurantio-ferrugineis: pileo, macula utrinque colli, humeris, uropygique cyanœis.
** Faem. cinerascente, canda griseo-ferruginea.*
 3. **PHAENICURA macgregoriae**, Burton. (*fuliginiventer, Hodgs. - Dimorpha auricularis, Hodgs. faem. - Leiotrichia signata, MacClell. faem.*) *Pr. Zool. Soc.* 1835. p. 152.
ex Himal. Assam.
681. **Ochromela**, Blyth. (*Saxicola et Muscicapa, Auct.*) Asia centr. 1.
- SAXICOLA nigro-rufa**, Jerd. (*Muscicapa rufula, Laf. Musc. nigro-rufa, Mus. Senkenb. Fr.*) *Journ. As. Soc.* xvi. p. 129. *ex Mont. Nilgh. Minor: rufa; pileo, cervice, aliquis nigris.*

682. **Cyornis**, Blyth 1843. (Niltava, p. Gr.) Pedes brevissimi! Asia.

5.

1. **Phaenicura rubeculoides**, Vig. (Niltava rubeculoides)

aut brevipes, Hodgs. - Muscicapa rubecula? Aliq. faem.)

Gould, Cent. Himal. B. t. 25. ex As. centr. Arakan.

Tenasserim. Minor: fusco-caeruleo; alis fuscis: gula nigricans; pectore ferrugineo; abdomine albido.

2. **C. unicolor**, Blyth, Journ. As. Soc. XII. p. 1007. et
xvi. p. 128. ex Sikkim.

3. **Muscicapa banyumas**, Horsf. (cantatrix, Temm. - Hypothymis cantatrix, Boie.) Zool. Res. in Java figura mala.
Pl. col. 226. 1. 2. ex Mala i Asia, Asia m. Obscure
cyanæa; subtus rufa: genis rufescens.

4. **Muscicapa elegans**, Strickl. ex Temm. (hyacintha,
Tickell. - Cyornis tickelliae him C. elegans, Blyth.)
Journ. As. Soc. XII. p. 941. ex Asia m.

5? **Muscicapa pallipes**, Jerd. Madr. Journ. XI. p. 15. Sikkim.

683. **Hypothymis**, Boie, nec Licht. (Cyanoptila, Blyth. - Sto-

parola, Blyth, nec Bp. - Niltava, p. Gr.) Asia, Ocean. 7.

1. **H. caerulea**, Boie. (Muscicapa caerulea? L. - Muscicapa
caelestina, Licht. - albicaudata, Rüpp.) Lev. Afr.
t. 153. 1. 2? ex India. Luvide caerulea; abdomine, rec-
triciumque lori albis; lori nigris; rostro uncinato.

2. **Muscicapa albicaudata**, Jerd. Ind. Ill. Orn. t. 14.
ex Mont. Nilgherris.

3. **Muscicapa cyanomelana**, Temm. (melanoleuca!
Schleg.) Pl. col. 470. - Faun. Jap. Av. t. 17. D.
mas. et faem. ex Japonia. Cyanæa, pileo vicio diore; lo-
ris, genis, gula, pectoreque nigri: lateribus fuscis: abdo-
mine, teatricibus caudae inferioribus, rectricibusque ad ba-
sin candidis.

4. **Muscicapa melanops**, Vig. (lapis, Lesson. - thalassina?
Siv. faem.) Gould, Cent. Himal. B. t. 6. ex India
univers. Glauco-caerulea criso pallidior, plumis allo-
marginatis: lori nigri: remigibus apice nigri, rectricibus
que interne fuscis.

*5. **Muscicapa thalassina**, Mus. Berol. ex Sumatra.
Similis praecedenti; sed rostro latiore: alis caudaque valde
brevioribus.

6. **Muscicapa indigo**, Horsf. (Hypothymis indigo, Boie.
Stoparola indigo, Blyth.) Cat. Calc. Mus. p. 174. sp. 1028.
ex Java.

7. **Muscicapa concreta**, Müll. Tijdschr. 1835. p. 351.
ex Sumatra.

684. **Myiagra**, Vig. 1825.

As. m. Ocean. 7.

a. Asiatica et Malaisiana.

1. **MUSCICAPA manadensis**, Quoy et Gaim. (occipitalis?)

Vig. - caerulea ex Java, Tém. Pl. enl. 666, 1. 2.
Lev. Afr. t. 153. - *Astrol. Voy. Ois.* t. 3. 3. faem.
ex Bengal. As. m. Malais. Java, Amboina.
Nitide cyanea: macula occipitali magna, et torque angusto
nigro-holosericea; abdomen albo.

2. **M. longicauda**, Sic. Nat. Libr. x. Flyc. 25.

3. **M. torquata**, Sic. Nat. Libr. Flyc. p. 208.

b. Australasianae.

4. **M. plumbea**, Vig. (caerulea ex Philippinis! Mus. Berol.)

Gould, Austr. II. t. 89. ex Australia. Caeruleo-
plumbea: abdomine latissime albo.

5. **M. concinna**, Gould, Austr. II. t. 90. ex Austr.

6. **M. nitida**, Gould, Austr. II. t. 91. ex Austr. Cora-
cino-nigra; abdomine latissime albo.

7. **M. latirostris**, Gould. (*Todus rubecula*, Lath. - *Myia-*

gra rubeculoides, Vig. - *Muscicapa rubecula*, Licht.
Platyrhynchus ruficollis et rubecula, Vieill.) Austr. II.
 t. 92. ex Australia. Chalybo-cyanea; gula pectoreque
rufo-castaneis; abdomine, tectricibusque alarum inferioribus
albis; rostro latissimo.

Quid Myiagra flavipes, Sic. Mus. Paris. ex Africæ?

685. **Miceræa**, Gould. (Myiagra, p. Gr.)

As. m. Ocean. 3.

a. Australasianae.

1. **LOXIA! fascinans**, Lath. (*Sylvia leucophaea*, Lath.

Myiagra macroptera, Vig. - *Miceræa leucophaea*, Blyth.
M. macroptera, Gould.) Austr. II. t. 93. ex Australia
orient. et mer.

2. **M. assimilis**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1839. p. 172.

Austr. Intr. sp. 142. fig. nulla. ex Austr. occ. Si-
millima praecedenti; sed minor, et rectricum utrinque extima
basi fusca.

3. **M. flavigaster**, Gould, Austr. II. t. 94. ex Austr.

686. **Hemichelidon**, Hodgs. 1845.

Asia centr. 3.

1. **H. fuliginosa**, Hodgs. Ann. N. Hist. 1845. p. 202.
ex Nepal.

2. **H. ferruginea**, Hodgs. Pr. Zool. Soc. 1845. p. 209.
ex Nepal.

3. **MUSCICAPA latirostris**, Raffles. (poonensis, Sykes.
Hemichelidon latirostris, Blyth.) Cat. Calc. Mus. p. 175.
 sp. 1033. ex Asia m. et or. Ceylon. Sumatra.

25. April. 1850.

41

687. **Platystira**, Jard. (Batis, Boie, nec Ichth.) Africa. 10.
1. **MUSCICAPA melanoptera**, Gm. (collaris, Lath. - fun-
lirata, Licht. - Platystira lobata, Sw. - collaris mas. et
desmaresti faem., Jard.) Pl. enl. 567. 3. - Ill. Orn.
t. 9. 1. mas. 2. faem. - Nat. Libr. x. Flyc. t. 22. ex Afr. occ.
 2. **MUSCICAPA pistrinaria**, Vieill. (molitor, Licht. - pul-
sator, Steph. - Platysteria pistrinasia, Gr.) Lev. Afr.
t. 160. ex Afr. m.
 3. **MUSCICAPA senegalensis**, Vieill. (Platyrhynchus ve-
latus, Vieill. - Platysteria senegalensis, Gr.) Pl. enl.
567. 1. et 2. ex Afr. occ.
 4. **MUSCICAPA pririt**, Vieill. (strepitans, Licht.) Lev. Afr.
t. 161. ex Afr. m.
 5. **MUSCICATA torquata**, L. (Platystira torquata, Gr.) Pl.
enl. 572. 2. ex Afr.
 6. **MUSCICAPA capensis**, L. (Platystira capensis, Gr.) Pl.
enl. 572. 1. ex Afr. m.
 7. **P. monacha**, Gr. ex Sw. - Lev. Afr. t. 159. ex Afr.
 8. **P. brevicauda**, Sw. Nat. Libr. x. Flycatch. p. 159.
ex Africa occ.
 9. **P. castanea**, Fraser, 1842. - Zool. Typ. figura. ex
Africa occ.
 10. **P. leucopygialis**, Fraser, 1842. - Zool. Typ. figura.
ex Africa occ.
- * 688. **Smithornis**, Bp. (Platyrhynchus, Smith.) Rostrum valde
depressum, culmine distincto, apice subaduncum! Africa. 1.
- PLATYRHYNCHUS **capensis**, Smith, Ill. S. Afr. Zool. Av.
t. 27. a. mas. b. faem. Rufo-olivacea, subtus albo-rufescens,
undique nigro-guttulata. Mas. pileo nuchaque nigris.
Faem. pileo murino (utri corpus) maculata.
689. **Chelidorynx**, Hodgs. (Rhipidura, p. Gr.) Asia. 1.
- RHIPIDURA **hypoxantha**, Blyth. (Chelidorynx chryso-
schistos, Hodgs.) Pr. Zool. Soc. 1845. p. 32. ex Ne-
pal. Siskim.
690. **Rhipidura**, Vig. (Muscylva, Less.) Ocean. 18.
- a. Malaiasianae.
 1. **MUSCIPETA melanoleuca**, Quoy et Gaim. Voy. Astrol.
Ois. t. 4. 4. Mus. Senk. ex Ocean. Nigro-sericea; alis
albo-variiis; cauda brevi valde cuneata; rectricibus laterali-
bus apice albis.
 2. **R. nigritorquis**, Vig. 1831. (Muscicapa bambusae,
Kittl.) Kupf. Vög. t. 9. 2. - Mem. Petersb. 1835.
p. 5. t. 6. ex Ocean.

3. *R. phoenicura*, Müll. *Nat. Verh. Ethnograph.* p. 185.
ex Java.
4. *R. threnothorax*, Müll. *Nat. Verh. Ethnograph.*
p. 185. ex Nova Guinea.
5. *R. rufiventris*, Müll. *Nat. Verh. Ethnograph.* p. 185.
ex Nova Guinea.
6. *R. gularis*, Müll. *Nat. Verh. Ethnograph.* p. 185.
ex Nova Guinea.
7. *R. ochrogaster*, Müll. *Nat. Verh. Ethnograph.*
p. 185. ex Timor.
8. *R. euryura*, Müll. *Nat. Verh. Ethnograph.* p. 185.
ex Java.
9. *R. perlata*, Müll. *Nat. Verh. Ethnograph.* p. 185.
ex Sumatra.
10. *R. semicollaris*, Müll. *Nat. Verh. Ethnograph.*
p. 184. ex Timor.
11. *R. squamata*, Müll. *Nat. Verh. Ethnograph.* p. 184.
ex Banda.
12. *MUSCICAPA flabellifera*, Gm. (*ventilabrum, Forst.*)
Lath. Syn. t. 49. - Voy. Pole Sud. Ois. t. 11. 4. ex Ocean.
- b. Australasianae.
13. *R. flabellifera*, Vig. et Horsf. nec Gm. (*nassata, Ill. albiscapa*, Gould.) *Sw. Nat. Libr. x. Flyc. t. 10.*
Austr. II. t. 83. ex Tasmania.
14. *R. rufifrons*, Vig. et H. - Lewin, *B. of N. Holl.* t. 13.
Gould, Austr. II. t. 84. ex Austr.
15. *R. dryas*, Gould, *Austr. Introd. sp. 131. fig. nulla.*
ex Austr. s. Simillima praecedenti; minor, et cauda ad basin magis rubra.
16. *R. isura*, Gould, *Austr. II. t. 85. ex Austr.*
17. *R. motacilloides*, Vig. et Horsf. - *Austr. II. t. 86.*
ex Austr.
18. *R. picata*, Gould, *Austr. Introd. sp. 134. fig. nulla.*
Simillima praecedenti, sed valde minor.
- Quid Rhipidura collaris et Rh. aureola, Less. Rev. Zool. 1839.*
p. 103. et Traité Orn. p. 390?
- Quid Rhipidura atricapilla, ex Lath. [(Lamb. Icon. ined. II. 52.)*
laticauda, ex Sw. (Nat. Libr. x. Flyc. t. II.) - perspicillata, ex
Vieill. (Lav. Afr. t. 152.) - setosa, ex Quoy et Gaim. (Voy.
Astrol. Ois. t. 4. 4.) Gr. Gen. B. p. 259. sp. 16, 18, 23, 34, 25 et 17?
691. *Leucocerca*, Sw. (*Rhipidura*, p. *Gr.* - *Leucocircus!* *Jerd.*) *Ocean.* 6.
1. *RHIPIDURA pectoralis*, *Jerd.* (*Leucocerca pectoralis,*
Blyth.) *Ill. Ind. Orn.* fig. nulla. *ex Mont. Nilgher.*

2. **Rhipidura albifrontata**, Franklin. (Leucocerca albifrontata, Blyth.) *Jerd. Ill. Ind. Orn. t. 2.* ex *Ind. univ.*
 3. **Musciceta fusciventris**, Vig. (Leucocerca fusciventris, Franklin.) - *Muscicapa sannio*, *Sunder.* - *Muscylva albigularis?* *Less.* jun. ex *Bengal. Mus. Senk.* *Plumbeo-nigricans; superciliis, stria utrinque mandibulari, gula, rectricibus utrinque tribus extimis apice, albis.*
 4. **Muscicapa javanica**, Lath. (Platyrhynchus perspicillatus, Vieill. - Leucocerca javanica, Blyth.) *Cat. Calc. Mus. sp. 1244.* ex *Java, Sumatra, Borneo.*
 5. **Rhipidura melanura**, Gr. *App. Dieffenb. Trav. II. p. 190.* - *Voy. Pole Sud, Ois. t. 11. 5.* ex *N. Zeland.*
 6. **Rhipidura lessonii**, Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud, Ois. t. 11. 2.* ex *Oceania.*
Quid Muscicapa fuliginosa - bicolor - ochracea - alba - superciliosa et javanica, Sparrm. Mus. Carls. t. 47. 46. 22. 76. 98. et 75?

692. **Seisura**, Vig. 1825. Australia. 1.
MUSCICAPA INQUIETA, *Turdus dubius et T. muscicula?* *Lath.* (*Seisura volitans, Vig.*) *Nat. Libr. x. Flycatch. t. 12.* - *Gould, Austr. n. t. 87.* ex *Austr.*
*Quid Muscicapa volitans, Lath. (*Seisura volitans, Gr.*) Lamb. Icon. ined. 1. t. 52?*
693. **Piezorhynchos**, Gould. (*Seisura, p. Gr.*) Australia. 1.
Piezorhynchos nitidus, Gould. (*Seisura nitida, Gr.*) *Austr. II. t. 88.* ex *Austr. sept. t.*
694. **Pycnosphrys**, Strickl. Asia. 1.
SYLVIA GRAMMICEPS, Verreaux. (*Pycnosphrys grammiceps, Strickl.*) *Contr. Orn. 1849. cum fig. ex Asia m.*
695. **Philentoma**, Eyton. (*Tchitre, p. Gr.*) Ocean. As. Afr. 4.
 1. **MUSCICAPA PYRRHOPTERA**, Temm. (*plumosa, Blyth.* *Philentoma castaneum, Eyton.* - *Tchitre pyrrhoptera, Gr.*) *Pl. col. 596. 2.* ex *Sumatra, Borneo.*
 2. **P. velatum**, Blyth. nec Temm. (*Muscicapa pectoralis, Hay, nec Sw.*) ex *Asia m.*
 3. **MUSCICAPA CYANOMELAS**, Vieill. (*Muscipeta scapularis, Steph.* - *Tchitre cyanomelas, Gr.*) *Lev. Afr. t. 151.* ex *Afr. m.*
 4. **MUSCICAPA CAERULEOCEPHALA**, Quoy et Gaim. (*Tchitre caeruleocephala, Gr.*) *Astrol. Voy. Ois. t. 5. 4.* *Voy. Pole Sud, Ois. t. 20. 2.* ex *Oceania.*

696. **Muscipeta**, Cuv. (Tchitreæ, Less.)

Afr. As. Oc. 17.

a. Asiatica e.

1. **MUSCIPETA paradisi**, L. (mutata ex India, *Lath.* - indica, *Stephens.* - *Muscipeta leucogastra, Sw.*) *Pl. enl.* 234. 1. 2.
Edw. B. t. 113. *et 325.* - *Lev. Afr. t.* 144. 145. 146?
Jerd. Ill. Ind. Orn. t. 7. ex India univers.
2. **TCHITREA affinis**, Hay. (*Muscipeta paradisi* ex *Malaisia*, *Auct.*) *Journ. As. Soc. xv. p. 292. et xvii. p. 1179.* *ex Arakan, Sumatra, Sumbawa.*
3. **TCHITREA atricaudata**, Eyton. 1839. (*Muscipeta atriceps, Blyth.*) *Journ. As. Soc. xv. p. 298. ex Penins. Malacca.*
4. **TCHITREA rufa**, Gr. (*Muscipeta rufa, Bp.*) *Ann. Nat. Hist. xi. 1843. p. 371.* - *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 64.*
ex Ins. Philippinis. Ommino rufa, plumis basi pallidioribus: remigibus interne fusca.
5. **M. leucogastra**, Sw. (*Tchitreæ leucogaster, Gr.*)
Nat. Libr. Flyc. p. 205. t. 24. ex India.
6. **TCHITREA gaimardi**; Less. *Tr. Orn. p. 386. sp. 33.*
ex Nova Guinea.
7. **M. principalis**, Temm. (*Tchitreæ princeps, Gr.*) *Pl. col. 584. - Faun. Japon. t. 17. E. mas et faem. ex Jap.*
b. Africana e.
8. **MUSCIPETA cristata**, Gm. (*M. cristata ex Capite bonae spei, Br.* - *Upupa paradisea? Lath.* - *Muscipeta castanea, Temm.* - *perspicillata, Sw.* - *Tchitreæ cristata et Platystiræ perspicillata, Gr.*) *Pl. enl.* 573. 2. - *Lev. Afr. t. 142.* *mas. et faem. 143. nidum. ex Afr. m.*
9. **MUSCIPETA mutata**, Gm. (*Muscipeta bicolor, Sw.* - *Tchitreæ mutata, Gr.*) *Pl. enl.* 248. 2. - *Lev. Afr. t. 148.*
ex Madag.
10. **MUSCIPETA MUTATA** var. *Lath.* (*viridescens, Bodd.* - **holosericea**, Temm. - *Muscipeta rufa, Sw.* - *Tchitreæ viridescens, Gr.*) *Pl. enl.* 248. 1. - *Lev. Afr. t. 147. Afr. m.*
11. **MUSCIPETA borbonica**, Gm. (*Tchitreæ borbonica, Blyth*)
Pl. enl. 573. 1. - *Lev. Afr. t. 143. ex Insula Mauritius, Madagassar. Minor.*
12. **M. rufiventris**, Sw. (*Tchitreæ casamansæ, Less.*
T. rufiventris, Gr.) *B. of west Afr. t. 4. ex Afr. occ.*
13. **M. melanogastra**, Sw. (*Tchitreæ melanogaster, Gr.*) *B. of west Afr. n. p. 55. ex Afr. occ.*
14. **MUSCIPETA nebulosa**, Vieill. (*Muscipeta fluvicola, Sw.*
Tchitreæ nebulosa, Gr.) *Lev. Afr. t. 149. ex Afr. m.*

15. MUSCICAPA *torquata*, Gm. (capensis, Kuhl. - Sylvia melanoleuca, Vieill. - Muscipeta pectoralis, Sw.) Lev. Afr. t. 150. ex Africa mer.

16. TCHITREA *tricolor*, Fraser, Proc. Zool. Soc. 1843. p. 4.
ex Africa occ.

17. TCHITREA *ferrezi*, Guérin, Rev. Zool. 1843. p. 162.
ex Africa or.

Quid Tchitreia pretiosa et Tch. senegalensis, Lesson?

Quid Tchitreia pectoralis, ex Hay. et Tch. pistrinaria, ex Temm. Gr?

697. Monarcha, Vig. 1825. (Drymophila, Temm. nec Sw.) Oceania. 6.

1. *M. carinata*, Vig. et H. (Muscipeta carinata, Sw. - inornata, Garn. et Less.) Pl. col. 418. 2. - Zool. Ill. t. 147. Voy. Coq. Ois. t. 16. 1. - Gould, Austr. II. t. 95. ex Austr. Timor.

2. DRYMOPHILA *trivirgata*, Temm. (Monarcha trivirgata, Gould.) Pl. col. 418. 1. - Gould, Austr. II. t. 96. ex Austr. Timor.

3. DRYMOPHILA *cinerascens*, Temm. (Monarcha cinerascens, Gr.) Pl. col. 430. 2. ex Timor.

4. DRYMOPHILA *alecto*, Temm. (Monarcha alecto, Gr.) Pl. col. 430. 1. ex Oceania. Celebes.

5. DRYMOPHILA *velata*, Temm. (nimbuta, Mus. Berol! ex Temm! - Monarcha velata, Gr.) Pl. col. 334. Sumatr.

6. MUSCICAPA *nigra*, Sparrm. (atra, Forst. - lutea, Gm. pomarea, Less. - marpitensis, Garn.) Mus. Carls. I. t. 23. - Voy. Coq. t. 17. a. b. c. ex Ocean.

7. ARSES *guttula*, Less. et Garn. (Monarcha guttula, Gr.) Voy. Coq. t. 16. 2. ex Nova-Guinea.

8. *M. caesia*, Less. Rev. Zool. 1839. p. 167. ex Sumatr.
Quid Monarcha, sp. 8. Gr. - Voy. Pole Sud, Ois. t. 13. ex Ocean?
Quid Myiothera cucullata, Mus. Berol?

698. Arses, Less. (Monarcha, p. Vig. - Monacha, Sw.) Oceania. 2.

1. *A. telescopthalmia*, Garn. et Less. (Monarcha telescopthalmia, Gr.) Voy. Coq. Ois. t. 18. 1. ex N. Guin.

2. *A. chrysomela*, Garn. et Less. (Monarcha chrysomela, Sw.) Voy. Coq. t. 18. 2. - Nat. Libr. x. Flycatch. t. 14. ex Nova Hibernia.

699. XANTHOPYGIA, Blyth. (Muscicapa, p. Gr.) Asia orient. 3.

1. MUSCICAPA XANTHOPYGIA, Hay. (*Xanthopygia leucophrys*, Blyth, Cat. 802.) Madr. Journ. xi. p. 162. fam. - Journ. As. Soc. XVI. p. 123, mas. Penins. Malacc.

2. MUSCICAPA *mugimaki*, Temm. Pl. col. 577. 2. - Faun.
Jap. t. 17. B. mas et faem. ex Japon. Ad veras Musei-
ca pas accedit.

3. MUSCICAPA *narcissina*, Temm. (Z. chrysophrys, Bl.
Xanthopygia narcissina, Blyth, Cat. 893.) Pl. col. 577. 1.
Schleg. Faun. Japon. t. 17. C. mas et faem. ex China,
Japonia.

700. **Cryptolopha**, Sw. (Rhipidura, p. Gr.) Asia mer. 1.

1. MUSCICAPA *cinereocapilla*, Vieill. (nitida var. a. Lath.
Platyrhynchus ceylonensis et Cryptolopha poicephala,
Sw. - Cr. cinereo-capilla, Blyth.) Zool. Ill. t. 13. - Nat.
Libr. x. Flyc. t. 23. ex India univers.

701. **Ulicipeta**, Blyth. (Cryptolopha, p. Sw. - Rhipidura, p. Gr.) Asia centr. 1,

SYLVIA burkii, Burton, 1835. (Cryptolopha auricapilla,
Sw. - Muscicapa bilineata, Less. - arrogans? Sunder.
Abrornis! burkii, Blyth, Cat. 1095.) Rev. Zool. 1839.
p. 104. ex Ind. sept.

702. **Chasiempsis**, Cabanis 1847. Rostrum elongatum, pa-
rum depresso, vibrissis longis, rigidis: pedes valde
elongati! Oceania. 1.

MUSCICAPA *sandwichensis*, Lath. (Chasiempsis sand-
wichensis, Cab.) Fig. nulla. Mus. Berol. ex Ins. Sandw.
Mas rufus; subtus albus, torque rufo inconspicuo; plumis omni-
bus mollissinibus, disjunctis, basi late plumbeis; alis, caudaeque
fuscis; humeris albo-maculatis; tectricibus alarum majoribus,
scapularibus, rectricibusque lateralibus apice albis.
Faem. subtus rufescens: maculis rectricum tantum albis, cae-
teris rufis.

SUBFAM. 98. VIREONINAE.

A. Oceanicae. Pachycephalinae, Caban.

703. **Eopsaltria**, Sw. Australia. 3.

1. MUSCICAPA *australis* et Sylvia flavigaster? Latham.
(Todus flavigaster, Lath. - Lanius australis, Licht.
Eopsaltria flavicollis, Sw. - E. flavigaster, Gr. - E. pac-
vula? Gould, faem. - E. australis, Blyth. - Pachycephala
australis, Vig. et Horsf.) White, Voy. t.p. 239. - Lewin,
B. of N. Holl. t. 23. - Gould, Austr. III. t. 11. ex
Austr. m. Fusco-cinerea, dorso virescente; uropygia, cor-
poreque subtus viridi-flavis: mento, tectricibusque alarum
inferioribus albicantibus.

2. *E. griseo-gularis*, Gould 1836. (Muscicapa georgiana, Quoy et Gaim.) Austr. III. t. 12. - Voy. Astrol. Ois. t. 3. 4. ex Austr. occ.

3. *E. leucogastra*, Gould 1846. (Muscicapa gularis, Quoy et Gaim.) Austr. III. t. 13. - Voy. Astrol. Ois. t. 4. 1. ex Austr. occ.

704. **Drymodes**, Gould. Huc pertinet nisi potius ad Saxonias!

Australia 1.

D. brunneopygia, Gould, Austr. III. t. 10. Austr. univ.

705. **Pachycephala**, Sw. 1825.

Oceania. 13.

1. *Muscicapa pectoralis* et *Turdus gutturalis?* Lath. (T. lunularis, Steph. - Motacilla dubia, Shaw. - Laniarius albicollis, Vieill. - Pachycephala fusca et fuliginosa, Vig. et H. - P. gutturalis, Gr. - P. pectoralis, Blyth.) Lev. Afr. t. 115. - Lewin, B. of New-Holl. t. 10. Nat. Misc. t. 949. - Gould, Austr. II. t. 64. ex Austr. m. et or. Viridi-olivacea; subtus cum cervicali flava: gula alba: pileo et torque pectorali nigro: cauda cinerea, apice nigrante.

2. *P. melanura*, Gould. (albicollis, Mus. Lugd. - Turdus armillaris, Temm. - Lanius cucullatus, Licht.) Austr. II. t. 66. ex Austr. Molucc. Virens: subtus cum cervicali flava: gula alba: pileo et torque pectorali late nigro: cauda ex toto nigra.

3. *P. glaucura*, Gould, Austr. II. t. 65. Similis praecedentibus; sed cauda ex toto cinerea.

* 4. *P. calliope*, Müll. Mus. Lugd. ex Timor. Simillima praecedentibus; sed minor, et cauda ex toto viridi.

5. *Sylvia rufiventris* et *Turdus prasinus?* Lath. (Laniarius rubrigaster? Vieill. - Lanius macularius, Quoy et Gaim. - Pachycephala pectoralis, Gould, nec Lath. - P. striata, Vig. et H. faem. - P. rufiventris, Blyth.) Gould, Austr. II. p. 67. - Voy. Austr. t. 13. 1. ex Austr. m. Plumbea; subtus rufa; gula alba; genis et torque pectorali nigro.

6. *P. falcata*, Gould, 1842. - Austr. II. t. 68. ex Austr.

7. *P. laniooides*, Gould, 1839. - Austr. II. t. 69. Austr.

8. *P. rufigularis*, Gould, 1840. - Austr. II. t. 70. Austr.

9. *P. inornata*, Gould, 1840. jun. (gilberti, Gould, 1844. adult.) Austr. II. t. 71. ex Austr.

10. *P. simplex*, Gould, 1842. - Austr. II. t. 72. ex Austr. Minor; olivacea; subtus albida.

11. **P. olivacea**, Vig. et H. (Timixos meruloides, Blyth.)

Gould, Austr. II. t. 73. ex Tasmania, Austr. m.

12? **P. xanthoprocta**, Gould, 1837. - Syn. B. Austr.

cum fig. 2. ex Ins. Norfolk. junior.

13? **P. longirostris**, Gould, 1837. - Syn. Austr. B.

cum fig. ex Ins. Norfolk. junior.

Quid Pachycephala species, Hombr. et Jacq. Foy. Pale-

Sud. Ois. t. 5. 1. 2. 3. et t. 6. 1. 2. 3. ex Ins. Oceaniae,

nominibus P. hombroni, P. jacquinoti, P. astro-
labi, etc. designandae?

706. **Hyloterpe**, Caban. 1847. (Hylocharis, Boie, 1827. nec Auct.) Ocean.

2.

1. **H. philomela**, Boie. (Muscicapa philomela, Temm.

Mus. Berol. - Hyloterpe philomela, Caban.) ex Java.

2. **H. orpheus**, Verreaux. (Pachycephala orpheus, Jard.)

Contr. Orn. 1849. viii. cum fig. ex Timor.

B. Americanae. Vireoninae et Parinae, p. Caban.

707. **Hylophilus**, Caban. ex Temm.

America m. 9.

1. **H. poicilotis**, Temm. (Sylvia poicilotis, Wied. - S.

ruficeps, Licht.) Pl. col. 173, 2. ex Brasil.

2. **H. thoracicus**, Temm. (Sylvia thoracica, Wied.)

Pl. col. 173. 1. ex Brasil.

3. **SYLVIA flaveola**, Wied. (Hylophilus flaveolus, Gr.)

Beitr. Nat. Bras. III. p. 719. ex Brasil.

4. **H. cinerascens**, Wied. Beitr. Nat. Bras. III. p. 723.

ex Brasil.

5. **H. semirufus**, Laf. R. Z. 1845. p. 341. Am. m.

6. **H. flavipes**, Laf. Rev. Zool. 1845. p. 342. Amer. m.

7. **H. leucophrys**, Laf. Rev. Zool. 1844. p. 81. Am. m.

8. **H. olivaceus**, Tschudi, Faun. Per. p. 24. Am. m. occ.

9. **H. frontalis**, Tschudi, Faun. Peruan. p. 25. t. 13. I.

ex Amer. mer. occ.

708. **Vireosylvia**, Bp. 1828. (Phyllomanes! Caban. 1847. - Vi-

reo p. Gr.) Remige prima nulla!

Amer. 4.

1. **MUSCICAPA olivacea**, L. (Lanius olivaceus, Licht. - Vi-

reo olivaceus, Vieill. - Vireosylva olivacea, Bp. - Phyl-

lomanes olivaceus, Caban.) Cat. Carol. t. 54. - Wils.

Am. Orn. t. 12. 3. - Aud. Am. t. 150. ex Am. s. univ.

2. **LANIUS agilis**, Licht. (Sylvia chico? Vieill. - Vireo agi-

lis, Hartl. - Weid. Beitr. III. p. 796. - Phyllomanes agi-

lis, Caban.) Spix, Av. Bras. t. 34. 1. ex Brasil.

A praecedenti eis distinctus? minor; alis brevioribus.

42

3. **VIREO virescens**, Vieill. (bartramii, Sw. - Vireosylvia bartramii, Bp.) Ois. Am. s. t. 53. - Aud. Am. t. 415.

Gr. et Mitch. Gen. B. t. 65. ex Amer. s. occ.

4. **VIREO altiloquus**, Gr. ex Vieill. (longirostris, Sw. - olivaceus, Gosse, nec Aut. - Phyllosmanes mystacalis? Caban. 1847.) Edw. B. t. 253. - Ois. Am. s. t. 38. ex Antill.

Quid Vireo vires ex Bodd. et Vireo sp. 9. Gr. (Turdus hispaniolensis; Gr. et T. hispaniolensis var. β. Lath.) Pl. enl. 273. t. et 558. 2. ex Antillis?

709. **Vireo**, Vieill. 1807. Remige prima plus minus explicata! America. 5.

1. **MUSCICAPA noveboracensis**, Gm. (Vireo musicus, Vieill. - Muscicapa cantatrix, Wils.) Ois. Am. s. t. 52. Wils. Am. Orn. t. 18. 6. - Aud. Am. t. 63. ex Amer. s. univers.

2. **V. flavigrons**, Vieill. (Muscicapa sylvicola, Wils.) Ois. Am. s. t. 54. - Am. Orn. t. 7. 3. - Aud. Am. t. 119. ex Amer. s. univers.

3. **V. solitarius**, Vieill. (Muscicapa solitaria, Wils.) Am. Orn. t. 17. 6. - Aud. Am. t. 28. ex Am. s. m. et med.

4. **V. bellii**, Audub. Am. 2^{da} ed. Suppl. t. 485. ex Am. s. occ. Missouri.

5. **MUSCICAPA gilva**, Vieill. (melodia, Wils. - Vireo gilvus, Bp.) Aud. Am. t. 118. ex Am. s. univers.

*710. **Vireolanius**, Dubus. (Cycloris, p. Caban.) Mexico. 1.

* **V. melitophrys**, Dubus. (Lanius chrysophrys, Licht.)

Esq. Orn. 1850. t. 26. Mus. Brux. et Berol. ex Mexico.

Viridis; subtus albus: pilo, cerviceque cinereis; superciliis late flavo-mellinis: vitta postoculari, lineaque utrinque gulari nigris: vitta pectorali, lateribusque rufo-ferrugineis.

711. **Cycloris**, Sw. 1824. (Laniagra! Orb. 1837.) Amer. calid. 4.

1. **C. flaviventris**, Laf. (amaurophrys, Licht. - ochrocephala! Tschudi, 1846.) Rev. Zool. 1842. p. 133. ex Mexico, Xalapa. *Viridis; subtus flava: pilo flavescente; genis cerviceque canis; fronte et superciliis rufis.*

2. **C. nigrirostris**, Laf. 1842. - Guérin, Mag. Zool. 1843. t. 33. ex Columbia. *Viridis, pilo concolore, fronte tantum cinerea; loris fuscocastaneis; subtus fulvescens, gula guttureque cinereis, somicollare virescente: rostro nigro, mandibula basi albida.*

3. **C. poliocephala**, Tschudi, Faun. Peruan. ex Amer. mer. occ.

4. TANAGRA *guianensis*, Gm. (Saltator viridis, Vieill. ex Azara 89. - Laniagra guianensis, Orb. - Cycloris guianensis, Sw.) Lev. Afr. t. 70. 2. - Spix, Av. Bras. t. 50. ex Brasil, Cayenna, Parag. Rostro carneo, mandibula basi nigricante.
712. **Dulus**, Vieill. (Arremon, p. Gr.) America calid. 1.
TURDUS *palmarum* et Tanagra dominica, L. (Dulus palmarum, Vieill. - D. dominicus, Steph. - Arremon palmarum, Gr.) Pl. enl. 539. 1. et 153. 2. ex Antill. Veridi-olivaceus; subtus cum corvice cano-ardesiacus; pilo, genitque nigris; maculis ocularibus utriusque tribus, gulaque albis.
713. **Icteria**, Vieill. (Pipra, Wils. - Tanagra, p. Auct.) America s. 3.
1. MUSCICAPA *viridis*, Gm. (Ampelis luteus, Sparre. - Merula viridis carolinensis, Br. - Tanagra viridis, Desm. Pipra polyglotta, Wils. - Vireo viridis, Boie. - Icteria domincola, Vieill. - Icteria viridis, Bp.) Mus. Carls. t. 70. Ois. Am. s. t. 85. - Wils. Am. Orn. t. 6. 2. - Aud. Am. t. 137. ex Amer. sept. Fusco-virens; gula pectoreaque aureo-flavis; abdomine albo: rostro nigerrimo.
*2? TANAGRA *auricollis*, Licht. Mus. Berol. ex Mexico. Fusco-viridis; macula utrinque frontali et gulari alba: gula pectoreaque viride aureis; abdomine albo: rostro adulti nigro: juvenis albicans!
3. **I. velasquezi**, Bp.-Pr. Zool. Soc. 1837. p. 117. sp. 25. Fig. nulla ex Mexico. Fusco-viridis; gula, pectoreaque flavo-aurantis: abdomine albo: rostro nigricante, mandibula albida.
714. **Orthogonyx**, Strickl. (Pyranga, p. Gr.) Vix hujus Familiae! Medium inter Pyrangas et Lamprotes. America m. 1.
TANAGRA *viridis*, Spix, nec Gm. (Orthogonyx viridis, Strickl.) Mus. Dubus. Bruxell. ex Brasil. Laete viridis; subtus flavissime viridis: rostro nigro: pedibus carneis.
- Huc forsan Crateropus et genera affinia praesertim
558. **ANDROPUS**, Swainson cuius species typica: *viridi-olivea*; subtus sordide albido-virens: rostro pedibusque nigerrimis, etiam coloribus ad Ieteriam accedit. Rostrum Ieteriae, sed gracilis et apicem versus dentatus quatuor serratum: pedes breves, digitis brevissimis: alae breves; remigibus sexta et septima omnium longissimas; prima brevissima, secunda, brevi, duplo breviore: cauda lata, longa, truncata.

FAMILIA 46. AMPЕLIDAE.

SUBFAM. 99. LIOTRICHINAE.

715. **Stachyris**, Hodgs. (olim Cilathora - Timalia, p. Gr.) As. centr. et m. 4.

1. **St. nigriceps**, Hodgs. Pr. Zool. Soc. 1845. p. 22. ex
Himalay. orient. mer.

2. **St. pyrops**, Hodgs. Pr. Zool. Soc. 1845. p. 23. ex Nepal.

3. **St. ruficeps**, Blyth, As. Soc. XVI. p. 452. ex Sikim.

4. **St. chrysaeus**, Hodgs. Pr. Z. Soc. 1845. p. 23. ex Arakan.

*716. **Lioptilus**, Caban. 1850. (Turdus, p. Gr.) Rostrum Pti-

logenidisi marginibus tenuibus, diaphanis. Africa. 1.

TURDUS nigricapillus, Vieill. (T. cucullatus, Ill. - Gra-
cula cucullata, Licht. - Lioptilus cucullatus, Caban.)
Lev. Afr. t. 103. ex Afr. m. Fusco-olivaceus; subtus
cinerascens; pileo cerviceque nigris; rostro pedibusque flavis.

717. **Leiothrix**, Sw. 1831. (Fureuria, Less. 1831. - Certhiparus,

Hodgs. nec Lafr. - Bahila hinc Callipyga, Hodgs. - Minla
hinc Proparus, Hodgs. - Hemiparus, hinc Siva, hinc Jo-
ropus! Hodgs. - Fringilloparus, hinc Mesia hinc Philoca-
lyx, Hodgs.)

Asia Centr. 8.

a. *Fureuria*, Less.

1. **TANAGRA sinensis**, Gm. (Sylvia lutea? Scopoli. - Pa-
rus furcatus, Temm. - Bahila callipyga, Hodgs. - Leio-
thrix lutea, Blyth. - L. sinensis, Gr.) Pl. col. 287. 1.
ex Himal. China.

b. *Fringilloparus*.

2. **MESIA argentaurois**, Hodgs. (Fringilloparus sive Me-
sia sive Philocalyx argentaurois, Hodgs. - Leiothrix ar-
gentauris, Blyth, Cat. 508.) Ind. Rev. 1838. p. 88. ex
Darjiling. Cinerea; fronte, gula, cerviceque fulvis; pi-
leo nigrocrisso, uropygique rubris.

c. *Hemiparus*.

3. **SIVA cyanouroptera**, Hodgs. (Leiothrix lepida, Mac-
Clell. - L. cyanouroptera, Blyth, Cat. 511.) Pr. Zool.
Soc. 1839. p. 162. ex Himal. Darjiling, Assam.
Rufescens; subtus griseo-vinaceous; pileo cinereo, nigro-stria-
to; remigibus, rectricibusque cyanis, apice albis.

4. **SIVA strigula**, Hodgs. (*Muscicapa variegata*, Deless. *Garrulax feliciae?* Less. - *Leiothrix chrysoccephala*, *Jamesson*. - *L. strigula*, Blyth, Cat. 510.) *Souven. Voy. Deless.* II. t. 8. - *Mag. Zool.* 1840. *Ois. t. 20. ex Himal. Darjiling. Maseri. Virens; sulitus fulvescens; mento, pileoque rufis; gula albo nigroque tamquam squamulata; remigibus, rectricibusque externe flavo-aurantiis.*

d. Certhiparus.

5. **MINLA ignitincta**, Hodgs. (*Leiothrix ornata*, MacClell. *L. ignitincta*, Bl. Cat. 512. - *Certhiparus ignitinctus*, Hodgs.) *Pr. Zool. Soc.* 1839. p. 162. *ex Himal. Assam, Darjiling. Minor: nigra, dorso rufa; subtus cum fronte et superciliis albis: remigibus, rectricibusque externe rubris.*
6. **MINLA castaneiceps**, Hodgs. (*Certhiparus castaneiceps*, Hodgs. - *Leiothrix castaneiceps*, Blyth, Cat. 513.) *Ind. Rev.* 1838. p. 33. *ex Nepal, Darjiling. Minima: olivacea; pilo castaneo, fulvo striato: superciliis, pectoreque albis: remigibus externe ad basin fulvo-castaneis.*

e. Proparus.

7. **PROPARUS vinipectus**, Hodgs. *ne Parus hujus Conspic. ob err. Mus. Lugd!* *Minima, rufo-virens; capite atque rufescensibus: superciliis, gula, pectoreque albis: remigibus nigricantibus, externe griseo-limbatis.*
8. **PROPARUS chrysotis**, Hodgs. (*Leiothrix chrysotis*, chrysopterus? seu leucotis, Blyth, Cat. 516.) *Journ. As. Soc.* VIII. p. 938. et XVI. p. 448. *ex Darjiling.*

718. **Melanochlora**, Less. 1839. (*Crataionyx*, Eyt. - *Parus*? p. Gr.)

Asia. Ocean. 2.

1. **PARUS flavo-cristatus**, Laf. (*sumatrana!* Gr. - *sulcaneus*, Mus. Berol. *ex Hodgs!* - *Crataionix atra et flava*, Eyt. - *Melanochlora flavo-cristata et sumatrana*, Less.) *Mag. Zool.* 1837. *Ois. t. 80. ex Sumatra? Malacca, Assam, Himal. Major: (Long. 7-pollic.) nigerrima; cristafrontali elongata, ab domineque flavissimis.*
- 2? **PARUS sultaneus**, Hodgs. *Mus. Lugd.* (*flavocristatus?* Blyth?) *Ind. Rev.* 1837. p. 81. *ex Asia Centr. Nepal. Minor.*

719. **Sylviparus**, Burton.

Asia centr. 1.

- SYLVIOPARUS modestus**, Burt. (*Parus sericophrys*, Hodgs.) *Pr. Zool. Soc.* 1835. p. 154. *ex Nepal.*

720. **Suthora**, Hodgs. (Temnoris 1841. et Hemirhynebus 1843.

Ad Paridas Accedit!

As. centr. 3.

1. **CHEVASICUS ruficeps**, Blyth (*hinc Suthora ruficeps, Cat. 520.*) *Journ. As. Soc. xiv. p. 578. ex Sikkim. Darjil.*
2. **S. nepalensis**, Hodgs. - *Ind. Rev. 1838. p. 32.* - *Journ. As. Soc. Beng. t. p. 450. ex Himal. m. or. Darjil. Nepal. Minima; cinereo-cinnamomea; subtus magis rufescens: fronte, remigibus, rectricibusque externe, rufis.*
3. **S. fulvifrons**, Hodgs. (Temnoris fulvifrons et albitrons? Hodgs.) *Journ. As. Soc. xiv. p. 579. ex Nepal.*

SUBFAM. 100. PARDALOTINAE.

721. **Pardalotus**, Vieill. 1816.

Ocean. 10.

Medium quasi inter Pipras, Ampelides, Paros, Tanageridas: vix autem Nectariniis cum Cabaniso conjugendum!

a. Australasiani.

1. **PIRA punctata**, Lath. (*australis?* Steph. - *Pardalotus punctatus*, Vieill.) *Pl. col. 78.* - *Shaw, Nat. Misc. t. III. - Gould, Austr. II. t. 35. ex Austr. m. Tasman.*
2. **P. rubricatus**, Gould, 1837. - *Austr. II. t. 36. Austr.*
3. **P. quadragintus**, Gould, 1837. - *Austr. II. t. 37. ex Australia.*
4. **PIRA striata**, Lath. (*Pardalotus ornatus, Temm.*) *Shaw, Nat. Misc. t. 174. - Pl. col. 394. I. - Gould, Austr. II. t. 38. ex Austr. m. or. et occ.*
5. **P. affinis**, Gould, *Austr. II. t. 39.* - *Lath, Syn. t. 54. ex Tasmania.*
6. **P. melanocephalus**, Gould, 1837. - *Austr. II. t. 40. ex Australia.*
7. **P. uropygialis**, Gould, 1837. - *Austr. II. t. 41. - Voy. Pole Sud, Ois. t. 9. 2. ex Australia.*

b. Malaiasiani.

8. **PIRA superciliosa**, Lath. (*Pardalotus superciliosus, Gr.*) *Lamb, Icon. ined. III. t. 4. ex Ocean.*
9. **PIRA caerulescens**, Lath. (*P. caerulea, Vieill.* - *Pardalotus caerulescens, Gr.*) *Lamb, Icon. ined. III. t. 40. ex Ocean.*
10. **P. obsoletus**, Müll. *Verh. N. Ethnogr. p. 174. Timor.*

722. **Prionochilus**, Strickl. (Pardalotus, p. Temm.) For-
san cum *Myzanthis* DICAENARUM conjunctum! Ocean. 2.

1. **Pipra percussa**, Temm. (Dicæum ignicapillum, Eyton.

1839. - Pardalotus percussus, Temm. - Prionochilus per-
cussus, Strickl.) *Pl. col.* 394. 2. *ex Malacc. Sumatr.
Java. Cyaneo-nigricans; subtus flavus: vertice, macula-
que pectorali rubris.*

2. **Pipra thoracica**, Temm. (maculata? Temm. faem.

Prionochilus thoracicus, Blyth.) *Cat. Calc. Mus. sp.*
1378. *ex Penins. Malacc. a.*

723. **Piprisoma**, Blyth. Affinis generi Parino Psaltriae?
a cauda brevi, aequali, valde autem distinctum. As. centr. 1;

FRINGILLA agilis, Tickell. (Piprisoma agilis, Blyth. - Pa-
risoma vireoides, Jerd. - Pipra squalida, Burton, 1836.)
*ex India. Cinerea; subtus albida, striis pectoralibus
avanidis: rectricibus extimis macula apicali alba.*

SUBFAM. 101. AMPELINAE.

724. **Ptilogonyx**, Sw. 1837. (Hypothymis, Licht. nec Boie. - Lep-
turus! Less. 1839.) America s. 2.

1. **P. cinereus**, Sw. (Hypothymis chrysorrhæa, Temm. mas.
II. mexicana, Licht. faem.) *Zool. Ill. n. s. t. 62.* 120.

Pl. col. 452. *ex Mexico.* Sericea, cyaneo-grisea; ven-
tre medio albo; criso aureo: alis, caudaque truncata, nigris:
rectricibus lateralis macula elongata centrali alba.
Mas ventris lateribus flavo-olivaceo: genis, et regionibus pa-
rotidis a fascia nuchali conjunctis, nigricantibus.

2. **P. nitens**, Sw. 1837. (Lepturus galeatus, Less. 1838.
Hypothymis nitens, Lafr.) *Two Cent and a Quarter,*
p. 285. ex Mexico. Mas cristatus: nigro-chalybeus; re-
migibus interne candidis. Faem. cinerea; crista, alis, cau-
daque nigricantibus: tectricibus alarum, remigibus, rectri-
cumque utrinque extima, albo-marginatis.

725. **Myiadestes**, Sw. 1838. (Ptilogonyx, p. Gr.) America s. 4.

1. **Muscicapa armillata**, Vieill. (genibarbis, Sic. - Myia-
destes armillatus, Lafr. - Ptilogonyx armillatus, Gr.)
Am. s. t. 42. - Nat. Libr. x. Flycatch. t. 13. - Gr. et
Mitch. Gen. B. t. 69. ex Amer. centr. Antill.
nec Africa quamquam Swainsonus dicat et dicto theoriam
*saperstruit. Cinereo-ardesiaco; regione parotica nigra, allo-
striata; jugulo, ventre, crissoque rufo-castaneo.*

2. *Ptilogonyx griseiventer*, Tschudi. (Myiastes griseiventer, Caban.) Faun. Per. p. 140. ex Am. m. occ.
3. *Ptilogonyx leucotis*, Tschudi. (Myiastes leucotis, Caban. - Hypothymis leucogenys, Licht.) Faun. Per. p. 139. ex Am. m. occ. Fusco-rufa; abdomine canescens.
4. *Ptilogonyx obscurus*, Lafr. 1839. (townsendi, Audub. Muscicapae intrepida, Licht. - Hypothymis caesia, Mus. Berol. - Myiastes townsendi, Caban.) Orn. Biogr. v. p. 206. - Id. Synon. sp. 69. fig. in B. of Am. 2.^{da} ed. Mexico, Amer. s. ad occ. Oregon. ad rip. flum. Columb. Mus. Berol. nec Lugdun. Cinerea; alis rufescens; annulo oculari albo; cauda divaricata, nigricante, rectricibus extimis griseis, apice albo.

* 726. *Hypocolius*, Bp. (Ptilogonyx, p. Auct.) Genus forsitan ad Volucres spectans: medium quasi inter Colios et Cotingas! Americas s. 1.

* *H. ampelinus*, Bp. Mus. Lugdun. ex California. Mas adult. argento-griseus; subtus roseo-indutus; píleo albicans: genis a fascia nuchali conjunctis nigris: remigibus nigris, ad apicem late albis: rectricibus apice lato nigris. Faem. ex toto griseo-cinnamomea; alis caudaque subtus argenteis: rectricibus, sicut et remigibus, ad apicem nigricantibus, primariis apice ipso eleganter albo-tamquam-squamatis (ut in Actinodura!) Juv. remigibus subunicoloribus (vix apice nigricantibus et sine albo.)

727. *Ampelis*, L. p. (Bombycilla, Vieill. 1807. ex Br. - Bombyciphora, Mey. 1810. - Bombycivora, Temm. 1820.) Eur. As. Am. s. 3.

1. *A. garrulus*, L. (Bombycilla bohemica, Br. - Bombyciphora poliocephala, Mey. - japonicus? Siebold, nec Gr.) Pl. enl. 261. - Lev. Parad. t. 49. - Bp. Am. Orn. t. 16. 2. - Aud. Am. t. 363. - Gould, Eur. t. 160. ex Eur. As. Am. s.
2. *A. carolinensis*, Br. (cedrorum, Gr. - Bombycilla americana, Sw. et Rich. - Bombycilla cedrorum, Vieill.) Ois. Am. s. t. 57. - Gal. Ois. t. 118. - Edw. B. t. 242. Wils. Am. Orn. t. 7. 1. - Aud. Am. t. 43. - Lev. Ois. Parad. t. 50. ex Amer. s.
3. BOMBYCIVORA *phaenicoptera*, Temm. (Ampelis japonicus, Gr. ex Siebold.) Pl. col. 450. ex Japonia.

FAMILIA 47. HIRUNDINIDAE.

SUBFAM. 102. HIRUNDININAE.

728. **Progne**, Boie. (Cecropis, Less.) America. 7.

1. **Hirundo purpurea** et subis, L. (violacea, Gm. - caerulea et versicolor, Vieill. - ludoviciana, Cuv. - II. apus carolinensis, Br.) Pl. enl. 722. - Catesb. Carol. t. 51. Edw. B. t. 120. - Wils. Am. Orn. t. 39. 1. 2. - Aud. Am. t. 22. ex Am. sept. univers.
2. **Hirundo concolor**, Gould 1837. (**Progne modesta**, Gould) Beagle Voy. Av. t. 5. ex Am. m. Chili.
3. **Hirundo domestica**, Vieill. ex Azara 300. (Progne domestica, Gr.) N. Dict. H. Nat. XIV. p. 520. ex Am. m. Bolivia.
4. **Hirundo dominicensis**, Gm. (albiventris, Vieill. Progne dominicensis, Boie 1844.) Pl. enl. 545. 1. - Ois. Am. s. t. 28. 29. ex Mexico m. Antill. Brasil.
5. **Hirundo chalybea**, Gm. (cayanensis, Br. - Cecropis chalybea, Less. - Progne chalybea, Boie.) Pl. enl. 545. 2. ex Amer. m. Cayenna, Brasil.
6. **Hirundo fusca**, Vieill. ex Azara 301. (Progne fusca, Gr.) N. Dict. H. Nat. XIV. p. 510. ex Amer. m. Brasil.
7. **Hirundo pascuum**, Wied. (Progne pascuum, Boie) Beitr. Nat. Br. III. p. 360. ex Brasil.

729. **Atticora**, Boie. Afr. Am. m. Oc. 5.

1. **Hirundo fasciata**, Gm. (Cecropis fasciata, Less. - Atticora fasciata, Boie.) Pl. enl. 724. 2. - Sic. Zool. Ill. n. s. fig. bona. ex Amer. m. Guiana.
2. **CHELIDON pristoptera**, Rüpp. (Atticora albiscapulata, Boie, 1844. ex Rüpp. - A. pristoptera, Gr.) Faun. Abyss. t. 39. 2. ex Abyssinia.
3. **Hirundo leucosterna**, Gould, 1840. (Atticora leucosterna, Gould.) Austr. II. t. 12. ex Australia.
4. **Hirundo nigrita**, Gr. et Mitch. Gen. B. t. 20. ex Afr. occ.
5. **Hirundo velox**, Vieill. (velocifera, Aliq.) Lev. Afr. t. 244. 2. ex Afr. m.

730. **Hirundo**, L. (Cecropis, Boie. - Herse, p. Less.)

Cosmopol. 18.

A. Hirundo. Rusticae.

Capite, cervice et uropygio concoloribus: subtus immaculatae,
torque pectorali nigro: ungue postico graciliore. Utriusque continentis.

a. *Orbis antiqui.*1. **H. rustica**, L. (domestica, Br. Pall.-albifrons, Rüpp.

*Mus. Francof. jun. ex Abyssinia. - Cecropis rustica et paragorum, Brehm.) Pl. enl. 543. l. - Gould, Eur. t. 54.
Susemihl, Eur. Vög. vi. t. 2. 1. ex Eur. Afr. s.*

2. **H. cahirica**, Licht. (savignyi, Leach. - castanea, Less.

*ex Saign. - riocouri, Audouin. - boissonneau, Temm.
rustica orientalis, Schlegel) Exp. Eg. Ois. t. 4. 4. - Sussemihl, Vög. Eur. vi. t. 2. 2. ex As. occ. Afr. s.
Eur. m. accidental. Obscura; torque nigra, lato: subtus omnino castanea.*

3. **H. javanica**, Sparrm. (gutturalis, Scopoli, Gr. List

*Br. Mus. - panayana? Gm. - jewan, Sykes, 1832. Gr. Gen.
rusticoides, Kuhl. - rustica, Meyen, Blyth. - rustica
ex Java et Japonia, Schleg.) Mus. Carls. t. 100. - Sonn.
Voy. t. 76. - Pl. col. 83. 2. - Nov. Act. Nat. Cur. Bonn.
1834. tab. 10. 1. Suppl. ex India, China, Malaisia,
Ins. Philipp. Rostro longiore, acuto!
Quid Hirundo domicola, Jord. Blyth, Cat. 1106. ex Java et
As. centrali?*

4. **H. javanica**, Vig. et H. nec Sparrm. (pacificus, Lath? Griff.

*frontalis, Quoy et Gaim. nec Say. - neoxena, Gould.
Cecropis frontalis, Boie. - Hersel frontalis, Less.) Griff.
An. Kingd. II. t. in p. 95. - Voy. Astrol. Ois. t. 12. l.
Gould, Austr. Bp. t. 13. ex Austr. Tasman.*

5. **H. albifrons**, Bp. (albicularis, Strickl. 1848. - Hir. ru-

*fifrons, Less. nec Shaw. nec Vieill.) Contrib. Orn. 1849.
t. 17. ex Afric. m. Long 61-poll. fronte castanea: dorso
chalybeo: subtus alba, fascia pectorali nigra: cauda alas vix
excedente; rectricibus pogonio interno macula quadrangulare alba.*

6. **H. rufifrons**, Shaw. nec Vieill. (Cecropis rufifrons, Boie.)

*Lev. Afr. t. 245. 2. Similis praeceps. fronte rufa; at gula
et jugulo nigra.*

7. **H. filifera**, Stephens. 1831. (filicauda, Franklin. - rufi-

*ceps, Licht. - Chelidon! ruficeps, Boie.) Lath. Gen.
Hist. t. 113. ex India univers. Abyssinia.
Nigra; subtus alba, macula utriusque pectorali nigra: pilo-
castaneo: rectrice utrinque extima in filo producta.*

8. **H. leucosoma**, Sw. (Chelidon! leucosoma, Boie, 1844.)

B. of west. Afr. n. p. 74. ex Afr. occ. Minor: nigro-cyanæa: subtus candida: alis longissimis albo-variis: rectricibus lateralibus macula transversa alba.

Quid H. Smithii, Leach, Tuckey, Voy. Congo, p. 407. ex Afr. occ?

b. Americanæ.

9. **H. rufa**, Gm. (americanæ, Wils. nec Gm. - rustica ex Amer.

Aud. - rufa, et erythrogaster ex Bodd. Gr. - Cecropis americana, Boie.) Vieill. Ois. Am. s. t. 60. - Wils. Am. Orn. t. 38. 1. 2. - Aud. Am. t. 173. ex Amer. s. Similis H. rustica; sed abdomine rufo.

10. **H. americana**, Gu. Gr. nec Wils. (platensis? Steph.

Cecropis rufa, Boie.) Pl. enl. 724. 1. ex Am. m. Cayenna.

Quid H. ruficollis et H. americana, Vieill. ex Am. m?

B. CECROPIA. Alpestres.

Capite, cervice, vel uropygio plus minus rufis: subtus saepius striatae, torque pectorali nullo: ungue postico robusto. Orbis antiqui.

11. **H. senegalensis**, L. (rufula, Gould, err. nec Temm.

Cecropis senegalensis, Boie.) Pl. enl. 310. - Briss. Orn. t. 45. 1. - Gould, Eur. t. 55. minime Europ. - Sw. B. of west. Afr. t. 6. ex Afr. occ. Major: collare, uropygio, abdomenque rufis: subtus immaculata: cauda unicolo.

12. **H. rufula**, Temm. (daurica, Savi. - alpestris, Bp.

Cecropis melanocrissus, Rüpp.) Syst. Uebers. N. Ost. Afr. Vög. t. 5. - Susemihl, Eur. Vög. vi. t. 1. ex Afr. s. or. accid. Eur. m. Simillima H. Senegalensi, cælular ornata; sed valde minor, et subtus substriolata.

13. **H. capensis**, Gm. (cucullata, Gr. ex Bodd. - rufifrons?

Vieill. nec Auct. - Cecropis capensis, Boie.) Pl. enl. 723. 2. Lev. Afr. t. 245. 1. ex Afr. m. Media: capite rufa; subtus subrufescens, striis longitudinalibus angustis: rectricibus macula alba.

14. **H. daurica**, L. (alpestris, Pall. - erythropygia?

Sykes. - nepalensis? Hodgs.) Zoogr. Rosso-Asiatica t. 30. 2. Mus. Selys. Longch. ex Mont. Sibiriae Norim. Asia s. et or. Long. 6½ poll. - Al. 5. - Cauda 4. Rostr. ½. - Tars. ½. Ex chalybeo violaceo-nigra; uro-pygioque (minimo vero tectricibus caudæ) rufo-cinnamomeis: subtus, cum genis et tectricibus alarum inferioribus, omnino albo-rufescens, plumis singulis striolis media longitudinaliter nigra; crasso albidiore: tectricibus caudæ inferioribus apice nigris: remigibus, tectricibusque immaculatis, nigrescentibus; rachide remigis primæ subtus alba.

15. **H. japonica**, Bp. (H. alpestris japonica, Temm. et Schleg.) Faun. Jap. Ar. t. 11. ex Japonia. Media: collaris nullo; cauda unicolor; rostro exili; pedibus gracilibus.
16. **H. striolata**, Temm. et Schlegel, nec Rüpp. (Cecropis striolata, Boie 1844.) Faun. Jap. et Rev. crit. Ois. Eur. p. 42. ex Java. Media: collaris nullo; subtus valde striata, striis longitudinalibus latiusculis: cauda unicolor: rostro, pedibusque robustis.
17. **H. abyssinica**, Guérin 1843. (striolata! Rüpp. nec Temm. - capensis! Mus. Senkenb. capite etiam dilatiore, puella, Temm. ex Afr. occ.) Rüpp. Syst. Verz. Vög. N.-Ost. Afr. t. 6. ex Abyssinia et Afr. occ. Similis H. capensi; sed minor: capite pulchro rufo: striolis abdominalibus densioribus et obscurioribus.
- * 18. **H. korthalsi**, Bp. Rev. Crit. Orn. Eur. Degland. Fig. nulla. Mus. Lugd. Patria incerta. Minima: remigibus secundariis apice rufis! rectricibus macula alba ut in H. capensi; abdomen dense striato ut in H. striolata et japonica: collaris et capite obscuro H. rufulae.
Amicitiae, Polymathiae, Constantiae,
P. G. Korthalso dicata!

731. **Herse**, Less. p. (Chelidon, Boie, p. - Hirundo, p. Gr. - Cercopis, Chelidon et Herse, p. Less.) Am. As. Afr. Oc. 15.

a. Orbis antiqui.

1. **HIRUNDO nigricans**, Vieill. (pyrrhonotus, Vig. et H. nec Vieill. - pygialis, Temm. - Cecropis! pyrrhonota et C. nigricans, Boie. - Collocalia! arborea, hisc Chelidon arborea, Gould.) Voy. Astrol. t. 12. 2. - Austr. II. t. 14. ex Australis, N. Guinea.
2. **COLLOCALIA ariel**, Gould. (Chelidon ariel, Gould. - Hirundo ariel, Gr.) Austr. II. t. 15. ex Austr. Minima: pilo rufo: uropygio albo.
3. **HIRUNDO erythrocephala** et indica, Gm. (Chelidon erythrocephala, Boie.) Lath. Gen. Syn. t. 56. ex India, Nepal. Similis praecedenti, sed uropygio fusco-cinereo.
4. **HIRUNDO tahitica**, Gm. (pirrholaema, Forst. - tahitensis, Less. - Cecropis tahitensis, Boie.) Lath. Gen. Syn. t. in frontisp. ex Polynesia.
5. **HIRUNDO hyperythra**, Blyth, Journ. As. Soc. XVIII. ex Ceylon. nec migratoria!

b. Americanae.

6. HIRUNDO *fulta*, Vieill. (lunifrons, Say. - respublicana, Clyton. - paeciloma? Gosse. - melanogastra? Sw. - Cecropis! fulva, Boie.) Ois. Am. s. t. 32. - Bp. Am. Orn. t. 7. 1. - Aud. Am. t. 68. ex Am. s. Antill.
7. HIRUNDO *cyanoleuca*, Vieill. ex Azara 303. (melanopyga, Licht. - minuta, Wied. - Chelidon cyanoleuca, Boie.) Pl. col. 209. 1. ex Am. m. Parag. Brasil. Bolivia.
8. HIRUNDO *bicolor*, Vieill. (viridis, Wils. - leucogastra, Steph. - Chelidon bicolor, Less. - Ch. viridis, Boie, 1820. Ch. leucogastra, Boie, 1844.) Ois. Am. s. t. 31. - Wils. Am. Orn. t. 38. 3. - Aud. Am. t. 98. ex Am. sept.
9. HIRUNDO *thalassina*, Sw. 1827. (viridis? Licht. - Chelidon thalassina, Boie. - Cecropis thalassina, Less.) Audub. Am. t. 385. 4. 5. ex Mexico.
10. HIRUNDO *euchrisea*, Gosse, Ill. B. Jamaic. t. 12. ex Ins. Jamaica.
11. HIRUNDO *melanoleuca*, Wied. (Cecropis melanoleuca, Less. - Chelidon melanoleuca, Boie.) Pl. col. 209. 2. ex Brasil.
12. HIRUNDO *leucoptera*, Gm. (albiventer, Bodd. - Chelidon leucoptera, Boie.) Pl. ent. 546. 2. ex Bras. Guian.
13. HIRUNDO LEUCOPTERA var. β . Lath. (*maculosa*, Kuhl. maculata, Gr., ex Bodd.) Pl. ent. 546. 1. ex Am. m.
14. HIRUNDO *patagonica*, Orb. et Lafr. Syn. Av. p. 76. ex Chili, Patagon.
15. HIRUNDO *leucorrhoa*, Vieill. ex Azara 304. (leucopyga, Licht.) Meyen, Nova Acta Nat. Cur. 1843. p. 73. t. Suppl. 10. ex Am. m. Chili, Parag.
- Quid Hirundo unalaschkensis. - H. cinerea (peruviana, Br. Forst. Descr. Anim. p. 240. Icon. ined, 168) - et H. peruviana (peruviana major, Br.) Gmelin?
- Quid Hirundo cristata, Steph. ex Lev. Afr. t. 247?
- Quid Hirundo cyanopyrrha, Vieill. ex Azara 302?

732. **Cotyle**, Boie. (Biblis et Herse, p. Less.)

Cosmop. 12,

a. Orbis antiqui.

1. HIRUNDO *rupestris*, Scopoli. (montana, Gm. - rupestris, Hods. - ornata, Jerd. - Chelidon rupestris, Boie, 1822. - Biblio rupestris, Less. - Cotyle rupestris, Boie, 1826.) Roux, Orn. Prov. t. 142. adult. - Gould, Eur. t. 56. ex Eur. As. Afr.

2. **HIRUNDO fuligula**, *Licht.* (rupestris jun., *Temm.* 1820.
fulva, *Mus. Lugd.* - *Cecropis torquata*, *Steph. ex Auct.*
Cotyle fuligula, *Gr.*) *Lev. Ois. Afr.* t. 246, 1. *ex Afr. m.*
Fulvo-cinerea, *subtus cinnamomea*; *tectricibus alarum infe-*
rioribus fulvis, *caudae nigricantibus*; *rectricibus*, *mediis*
et ultimis exceptis, *macula magna alba sub-apicali*.
3. **HIRUNDO torquata**, *Gm.* (*Cotyle torquata*, *Boie.* - *C.*
cincta, *Gr. ex Bodd.*) *Pl. enl.* 723, 1. *ex Afr. m. Abyss.*
4. **HIRUNDO concolor**, *Sykes.* (*Biblis concolor*, *Less.* - *Co-*
tyle concolor, *Boie, 1844.*) *Pr. Zool. Soc.* 1831, p. 83.
ex India mer.
5. **HIRUNDO sinensis**, *Hardw.* (*brevicaudata*, *MacClell.*
1839. - *subsoccata*, *Hodgs.* - *Cotyle brevicaudata*, *Mac-*
Clell. - *C. sinensis*, *Gr.*) *J. Gr. Ill. Ind. Zool.* t. 35, 3.
fig. pessima. ex Asia m. et or.
6. **HIRUNDO borbonica**, *Gm.* (*francica?* *Cuv.* - *virescens?*
Vieill.) *Pl. enl.* 544, 2. *ex Ins. Mauritius. Nigrí-*
cans, *subtus vix dilutior*; *gula strigata*.
7. **HIRUNDO palustris**, *Steph.* (*paludicola*, *Vieill.* - *Co-*
tyla bita? *Boie. ex Mus. Par.*! - *C. paludihula*, *Rüpp.*
C. palustris et minutus, *Gr.*) *Lev. Afr.* t. 246, 2. *ex*
Africa mer. Abyssinia.
8. **HIRUNDO riparia**, *L.* (*cinerea*, *Vieill.* - *Cotyle fluvia-*
tilis et microrhynchus, *Brehm.*) *Pl. enl.* 543, 2. - *Gould,*
Eur. t. 58. *ex Eur. Asia, Africa.*
- b. Americanae.*
9. **HIRUNDO serripennis**, *Aud.* (*Cotyle serripennis*, *Bp.*)
Wils. Am. Orn. t. 38, 4. - *Aud. Amer.* t. 385, 1, 2, 3.
ex Amer. sept.
10. **HIRUNDO tapera**, *L.* (*H. americana*, *Briss.* - *Cotyle*
tapera, *Boie.*) *Orn.* II, p. 502. *sp. 10. t. 45. 3.* - *Sloane,*
Jam. II, t. 51. ex Antill. Brasil. Cayenna.
11. **HIRUNDO fucata**, *Temm.* (*pyrrhonota*, *Vieill. ex Azara*
305 nec Vig. - *Herse fucata*, *Less.* - *Cotyle fucata*, *Boie.*)
Pl. col. 161, 1. *ex Am. m. Bras.*
12. **HIRUNDO flavigastra**, *Vieill. ex Azara* 306. (*jungularis*,
Wied. - *hortensis*, *Licht.* - *Cotyle flavigastra*, *Boie.*
C. jugularis, *Gr.*) *Pl. col.* 161, 2. *ex Amer. m. Bras.*

733. **Chelidon**, Boie, 1822. p.

Eur. Afr. Oc. 2.

*1. **Hirundo dasypus**, Temm. Mus. Lugd. ex Borneo.

Media quasi inter *Cotyles* et *Chelidonem*, cuius autem
altera species *pedibus dense plumosis*: minor; cau-
da multo breviore, minus emarginata: coloribus similibus,
subtus autem sordidior, collaris adumbrato.

2. **Hirundo turbica**, L. (minor seu rustica, Br. - lagopoda,
Pall. - *Chelidon rupestris et fenestrarum*, Brehm.) Pl.
enl. 542. 2. - Gould, Eur. t. 57. ex Eur. As. Afr. s.734. **Collocalia**, Gr. Potius Cypselidis adjungendum!

Decidat Anatomia!

As. m. Ocean. 4.

1. **Hirundo esculenta**, L. - Br. Orn. t. 46. 2. ex Malaias.2. **Hirundo nidifica**, Lath. (*esculenta*, Horsf. - *fuciphaga*,*Shaw*. - *brevirostris*, MacClell. 1839. - *unicolor*, Jard.*Cypselus concolor*, Jerd.) Gen. Syn. Suppl. II. t. 113.

Thunb. Act. Holm. XXXIII. t. 4. ex As. m. Ceylon,

Assam. Malacca, Ins. Nicobar, Java, Su-
matra, Borneo.3. **Collocalia troglodytes**, Gr. et Mitch. Gen. B.

t. 19. ex Malacca, Ins. Philipp.

4. **Hirundo francica**, Gm. Syst. Nat. p. 1017. sp. 15.
ex Ins. Mauritius. Nigricans.

FAMILIA 48. ARTAMIDAE.

SUBFAM. 103. ARTAMINAE.

735. **Artamus**, Vieill. 1816. (*Ocypterus*, Cuv. 1817. - *Lepto-**pteryx*, Horsf.) Medium inter Hirundininas et
Oriolinas!

Asia, Ocean. 14.

a. Oceanici.

*1. **Ocypterus monachus**, Temm. Mus. Lugd. ex Celebes.*Maximus*: albus; capite, alis, caudaque nigris.2. **Lanius leucorhynchus** et dominicanus, Gm. (Loxia*melaleuca*, Forst. - *Artamus leucorhynchus*, Vieill.)Pl. enl. 9. 1. - Kittl. Kupf. Vög. t. 30. 1. ex Celebes,
Ins. Phil. Nigricans; uropygio, pectore, abdomineque al-
bis. Major.3. **Lanius leucogaster**, Val. (Leptopteryx leucorhyn-
chus, Horsf. - *Artamus leucogaster*, Gr.) Ann. Mus.
H. Nat. IV. t. 7. 2. ex Java, Sumatra. Medius.

- * 4. OCYPTERUS *papuensis*, Temm. Mus. Lugd. ex Nova
Guinea, Timor. Nigricans; uropygio, pectore, abdo-
mineque albis. Minor.
- * 5. OCYPTERUS *perspicillatus*, Temm. Mus. Lugd.
ex Timor. Cinereus: dorso, aliquo fusco-
nigro apice albo. Macrouris latissime nigris.
- b. Australasiani.
6. *A. cinereus*, Vieill. (Ocypterus cinereus, Valenc.)
Ann. Mus. t. 9. 2. Gould, Austr. II. t. 29. ex Austr.
occ. Similis A. perspicillato, sed rectricibus mediis ex toto
nigris.
7. *A. albiventris*, Gould, 1849. Austr. II. t. 30. Austr. occ.
8. *A. personatus*, Gould, 1840. Austr. II. t. 31. Austr. occ.
Plumbeus; subtus alboides; facio gulaque nigris; cauda apice
alba.
9. *A. leucopygialis*, Gould, 1842. Austr. II. t. 33.
ex Austr. occ. Tasmaniae.
10. *A. superciliosus*, Gould, 1836. Austr. II. t. 32.
ex Austr. m. Plumbeus; abdomine castaneo; superciliis,
et caudae apice albo.
11. *A. minor*, Vieill. (Ocypterus fuscus, Valenc.) Ann.
Mus. IV. t. 9. 1. - Gould, Austr. II. t. 28. ex Austr.
Minimus: fuso-castaneus; alis, caudae apice albo, nigris.
12. TURDUS *sordidus* et *tenebrosus*, Lath. (Ocypterus albi-
vittatus, Cuv. - Artamus lineatus, Vieill. - A. sordidus,
Gould.) Valenc. Ann. Mus. IV. t. 8. 2. - Less. Tr. Orn.
t. 44. 2. - Kittl. Kupf. Vog. t. 30. 2. - Austr. II. t. 27.
ex Austr. m. Tasmaniae. Fuscus; alis, caudae apice nigris; re-
migibus primariis externe, rectricibus lateraliibus apice, albis.
- c. Asiatici.
13. *A. fuscus*, Vieill. (leucorhynchos! MacClell. 1839.
nec L. - Ocypterus rufiventer, Valenc.) Mem. Mus. VI.
figura. ex India universa.
14. *A. mentalis*, Jard. Ann. et Mag. N. H. XVI. 1845.
p. 174. t. 8. Dorsu, uti caput, alae, et cauda, nigricante;
subtus albus, gula tantum nigra.
736. *Artamia*, Lafr. (Artamus, p. Gr.) Asia. 1.
LANIUS *leucocephalus*, Gm. (Artamus leucocephalus,
Gr.) Pl. enl. 374. ex Asia m. Viridis: capite, collo,
corpoque subtus, albis.
Quid Artamus rufus, Gr. ex L. - Br. Orn. II. t. 18. 4. - Pl. enl. 298. 2?
Quid Artamus viridis, Vieill. ex Gm. - Pl. enl. 32. 2?

FAMILIA 49. ORIOLIDAE.

SUBFAM. 104. ORIOLINAE.

737. **Analcipus**, Sw. 1831. (Artamia, Geoffr. - Philocarpus, Müll. - Erythrolanius, Less. - Leptopteryx, Wagl.) Asia. 1.
OCTYPTERUS sanguinolentus, Temm. (Leptopteryx erœnta, Wagl. - Erythrolanius rubripectus, Less. - Oriolus sanguinolentus, Gr.) Pl. col. 499. ex Java, Sumatra.
Mas nigerimus; macula alari parva, abdominisque maxima, sanguinea. Faem. ex teto nigricans.
Quid Analcipus hirundinaceus, Sw. Two Cent. and a Quarter ex India. Purpureo-virens; ureppigio, corporeque subtus, albis: remigibus tertia et quarta omnium longissimis?
738. **Psaropholus**, Jard. 1839. (Pastor, p. Vig. - Oriolus, p. Gr.) As. centr. 1.
PASTOR! **trailli**, Vig. (Oriolus trailli, Gr. - Psaropholus, Jard.) Gould, Cont. Himal. B. t. 35. - Jard. et Selb.
Ill. Orn. 2. da ser. t. 26. ex As. centr. Darjiling.
Purpureo-badius, plumis basi candidis; capite, jugulo, alis, tibiisque atro-purpureis.
739. **Sphcothera**, Vieill. (Sphecotheres, Gr. ex Vieill. err.) Australia. 3.
1. **TURDUS maxillaris**, Lath. (Sphecotheres virescens, Vieill. - vieilloti, Vig. - australis et canicollis, Sw.)
Gol. Ois. t. 147. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 79. - Gould, Austr. iv. t. 15. ex Austr. *Viridi-oliveaceus: pilo, alis, caudaque nigris: gula, colloque undique plumbeis; ab domine, crissso, rectricumque trium utrinque extimarum opicibus, albis.*
Faem. fusco-cinerea, coda virescente: subtus alba, maculis elongatis, densis, nigricantibus.
2. **S. flaviventris**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1850. ex Austr.
3. **GRACULAS viridis**, Quoy et Gaim. (Sphecotheres viridis, Müll.) Voy. Uran. Ois. t. 21. mas. ex Timor. *Similis Sph. virescenti; sed minor.*
Quid Sphecotheres grisea, Less. (Lanius asturinus? Mus. Paris.) Traité Orn. p. 351?

740. **Mimeta**, Vig. (Oriolus, p. Gr.)

Oceania. 4.

1. **GRACULA viridis** et Coracias sagittata, Lath. (Oriolus variatus, Vieill. - O. viridis, Wagl. - Mimeta viridis, King. - M. meruloides, Vig. et H.) Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 61. - Gould, Austr. iv. t. 13. ex Austr. m. or. Viridis, dorso nigro-striato; pectore abdomineque albis, nigromaculatis; criso albo, vix striato: remigibus, rectricibusque olivaceo-cinereis, apice albis.
2. **Oriolus affinis**, Gould, nec Sw. (Mimeta affinis, Bp.) Intr. B. of Austr. p. 57. sp. 264. fig. nulla. ex Austr. s. Similissime praecedenti, sed minor: rostro valde robustiore: alis brevioribus: rectricum maculis albis minoribus.
3. **M. flavicincta**, Vig. 1830. (Oriolus flavicinctus, Gr.) Gould, Austr. iv. t. 14. ex Austr.
4. **Oriolus virescens**, Gr. ex Temm. (chloris, Müll.) Mus. Lugd. ex Timor. Minor: speculo alari nullo.
- * 5. **M. mülleri**, Bp. Mus. Lugd. ex N. Guinea. Minor: speculo alari albidio.
- * 6. **Oriolus melanotis**, Müll. (striatus? Quoy et Gaim.) Voy. Astrol. t. 9. 2. faem. et jun. ex Nova Guinea. Medius: genis nigris: speculo alari nullo.
- * 7. **M. forsteni**, Bp. Mus. Lugd. ex Ceram. Major: cauda elongata, fere unicolor; rectricum apicibus vix pallidioribus.

741. **Oriolus**, L. (Turdus, Moehr. - Galbula, Scopoli.)

Eur. As. Afr. Oc. 16.

a. *Melanocephali*. Capite nigro,

† Asiatici.

1. **O. xanthonotus**, Horsf. (leucogaster, Reinw. - castanopterus, Blyth, 1843. jun.) Zool. Research. in Java figura. - Pl. col. 214. 1. ex Malaisia. Minimus! niger: dorso, uropygio, criso, rectricibusque epice flavis: abdome albo, nigro-striato.
2. **O. philippensis**, J. Gr. Zool. Misc. p. 4. ex Ins. Philipp. Long. 7½-poll. auro-flavus; dorso, jugulo, epigastro, caudaque, uti caput, nigerimis.
3. **O. melanocephalus**, L. (bengalensis, Br. - maderaspanus, Frankl. jun. - maccoshi, Tickell, jun. Hodgsoni? Sw. jun. - Sturnus flaveolus, L. Syst. Nat. ed. 10.) Edw. B. t. 77. 186. - Pl. enl. 79. - Lev. Afr. t. 263. ex Bengal, Nepal, Arakan, China? nec Africa. Flavus; capite, jugulo, alis, maculaque rectricum medianum magna subapicali, nigris: speculo alari, scopulariumque marginibus externis, flavis: cauda brevi. Jun. Minor: remigibus albo-marginatis: rectricibus omnibus nigro-fasciatis, apice marginibusque albis.

*4. *O. ceylonensis*, Bp. (melanocephalus ex Ceylon et Malabar, Blyth.) Cat. Calc. Mus. p. 215. sp. 1297. ex Ind. m. Ceylon. Simillimus praecedenti, sed scapularibus fere unicoloribus (apicibus valde minus flavis).

Quid Oriolus macrourus, ex Ind. Nicobar, et O. tenuirostris, Patras incertae, Blyth, Journ. As. Soc. xv. p. 46, et 48?

†† Africani.

5. *O. larvatus*, Licht. (radius? Gm. - melanocephalus var. Vieill. - condougnan, Temm. - capensis, Sw. - monachus, Wagl. nec Gm. - chloris, Cue.) Lev. Afr. t. 261. adult. 262. jun. ex Afr. m. et o.c.c. Major: luteus; dorso, uropygio, rectricibusque olivaceis: capite, pectore, alis, rectricibusque lateralibus omnibus basi, nigris; mediis duabus tantum viridibus, apice nigris: speculo alari alto: scapularibus interne nigris, externo olivaceis, alto-marginatis: rostro elongato, rectiusculo.

Jun. rostro nigro: cervice, pectore, lateribusque nigro-striatis.

6. *O. brachyrhynchus*, Sw. B. of west. Afr. II. p. 35. ex Afr. o.c.c. Minor: viridi-luteus; subtus flavus: capite juguloque nigris: speculo alari alto: rectricibus quatuor medianis omnino viridis: rostro brevi, curvo.

7. *O. moloxita*, Rüpp. ex Buff. (Turdus monacha? Gm. nec Oriolus monachus! Wagl.) Faun. Abyss. t. 12. 1. ex Afr. or. Medius: flavus; dorso, alis, rectricibusque modiis olivaceentibus: capite, juguloque nigerrimis: remigibus nigricantibus, margine externo pulchre canis.

*8. *O. baruffii*, Bp. Mus. Lugd. et Taurinens. ex Afr. o.c.c. A shantea. Flavo-viridis; corrice, corporeque subtus, flavis: capite, nuchaque nigerrimis: alis, caudaque nigris; speculo alari alto parvo: rectricibus lateralibus apice coeruleo quo sunt remotiores.

Avis statuta et coloribus Or. moloxitae satis similis; sed caudae picture valde distincta, dicitur Fr. Baruffo Physico insigni, periodico scientia in gratiam Peregrinatori, Sacerdoti absque simulatione (o res mirabilis!) liberalissimo.

b. Galbulae. Capite flavo.

9. *O. galbula*, L. (Coracias oriolus, Scopoli. - Turdas oriolus, Br.) Pl. enl. 26. fig. mala. - Edw. B. t. 185. Roux, Orn. Prov. t. 125. mas. 126. faem. 127. jun. Gould, Eur. t. 71. - Naum. Vög. Deutschl. t. 40. ex Eur. As. o.c.c. Afr. s. Minor: luteus; vitta angusta anteculari, alis, caudaque nigris: speculo alari, rectricumque lateralium apice, flavis.

10. *O. auratus*, Vieill. (bicolor, Temm. - *Turdus flavus*?
Gm.) Levaill. Afr. t. 260. - Sw. B. of west. Afr. II.
t. 1. ex Afr. m. et o.c.c. *Aureo-flavus*; *vitta lata trans-*
oculari nigra: tectricibus alarum, marginibusque remigum
secundariarum late flavis: plumis uropygii densissimis: ros-
tro rubro.
11. *O. kundoo*, jun. et galbula adult. Sykes. (galbula,
Franklin, nec L. - *aureus*, Jerd. nec Auct. - *galbuloides*,
Gould.) Blyth. Cat. Calc. Mus. sp. 1304. Ind. m. et o.c.c.
- c. Hippocrepides. Capite coronato.
- *12. *O. galbula*, Horst. (chinensis? *L.* nec Lath. - *javanicus?*
Aliq. - horsfieldi, Bp.) Mus. Lugd. ex *Malaisia*.
Minor. *flavo-virescens: speculo alari parvus conspicuo.*
13. *O. acrorhynchos*, Vig. 1831. Gr. and Mitch. Gen.
B. t. 58. ex *Mannilla*. *Luteus; vertice latissime, remi-*
gibus omnino, rectricibusque maxima ex parte, nigermissis.
14. *O. indicus*, Br. (chinensis et cochinchinensis ex India,
Auct. - *coronatus*, Sw.) Jerd. Ill. Ind. Orn. t. 15. Mus.
Senckenb. Francof. ex As. m. *India*. *Luteus; corona*
occipitali, aliis, rectricibusque ad basin, mediis ex toto, ni-
gris: speculo alari flavo: scopularibus latissime flavo-margi-
natis: remigibus alto-limbatis.
15. *O. cochinchinensis*, Br. (hippocrepis, Wagl.
maculatus? Vieill. juv.) Pl. ent. 570. - Orn. II. t. 33. 1.
ex As. or. m. *Luteus; corona occipitali, aliis, rectricibus-*
que ad basin, mediis ex toto, nigris: speculo alari nullo: ros-
tro longo, robusto.
- *16. *O. broderipi*, Bp. (Oriolus ex Ins. Sumbawa, Mus. Lugd.)
Rev. Orn. Eur. Degland. 1849. - Proc. Zool. Soc. 1850.
Mus. Lugd. ex *Sumbawa*. *Vivide flavo-aurontius; co-*
rona occipitali, aliis, rectricibusque ad basin, mediis fere om-
nino, nigris: speculo alari flavo: rostro longo, crasso, robu-
tissimo.

Magistrati illustri, litium Conciliaatori, qui in-
timas Doctrinae naturalis recessus Populo humanissime pa-
tescit!

Duos Oriolos dedicavi duabus naturae Investigatoribus, al-
teri Anglo, alteri Italo, qui interque scientiam accomodant
captui Populi, quique, secundum Plautum, nucem frangunt,
non ut ipsi, sed ut *Populus* nucleus edat.

742. **Sericulus**, Sw. 1825. (*Oriolus*, p. Gr. - *Anais?* Less.) Australia. 2.

1. **Oriolus aureus**, L. (*Paradisea aurea*, *Edw. ne Gm.* - P. flavo-fulva, *L. Mus. Ad. Fed.* - aurantiaca, *Shaw.*) *Edw.* B. t. 112. - *Vicill. Ois. dor.* t. 11. adult. t. 10. jun. *Lev. Parad. t. 18.* adult. t. 19. jun. ex *In s. Moluccis*, N. *Guinea*. *Aurantio-ruber*, *capitis collique plumis elongatis*, *holosericeis*; *gula nigerrima*; *alis flavo nigroque variiis*; *cauda fore omnino nigra*.
2. **Terpsiphone mellini** et Motacilla atricapilla? *Lath.* (*Meliphaga chryscephala*, *Lewin.* - *Oriolus regius*, *Temm.* O. regens, *Quoy et Gaim.* - *Sericulus magnirostris*, *Gould*, 1837. jun. - S. *chryscephalus*, *Blyth.* - S. *mellinus*, *Gr.*) *Birds of N. Holland*, t. 1. - *Voy. Uran. Ois. t. 22.* - *Pl. col. 320.* - *Less. Ois. Parad. t. 26. 27. Voy. Coquill. Ois. t. 20.* - *Gould, Austr. iv. t. 12. ex Austr. or.* *Niger*, *holosericeus*; *striola utrinque oculare*, *capitis plumis subtomentosis*, *collи truncatis*, *remigibus quo secundariis*, *splendide aurantio-aureis*. Jun. *Fusco-cinereus*, *albo-variegatus*; *remigibus, rectricibus que immaculatis*; *capite albicante*; *occipite nigricante*. *Quid Sericus analis*, *Less.* (*Anais clemenciae?* *Less.*) *Rev. Zool.* 1839. p. 44. ex *N. Guinea*; *capite ex toto nigro*; *abdomine fulvo-rubro*; *nistro parvo*; *pedibus gracilibus?*

FAMILIA 50. EDOLIIDAE.

SUBFAM. 106. EDOLIINAE.

743. **Irena**, Horsf. 1820. As. m. Ocean. 3.

1. **Coracias puella**, Lath. (*Irena puella*, *Horsf.* - *Edolius puellus*, *Reinw.*) *Zool. Res. Java*, figura mala. - *Pl. col. 70.* mas. 225. faem. 426. m. jun. ex *Malacea et Insulis Sondaicis*. *Nigra*; *pileo, dorso, caudaeque tectricibus argenteo-caeruleis*; *tectricibus caudae inferioribus elongatis*.
2. **I. indica**, Hay. (*puella* var. *Blyth.*) *Madr. Journ. Litt. et Sc. e India*. *Similis præsed. sed tectricibus caudae inferioribus haud elongatis*.
3. **I. cyanogastra**, Vig. *Pr. Zool. Soc. 1831. p. 97.* *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 70. ex A. s. or.* *Nigra*, *pileo, humeris, uropygio, abdomeque cyaneis*.

744. **Prosorinia**, Hodgs. (olim Cochon, 1836.) Asia centr. 2.
 1. **Cochon viridis**, Hodgs. Journ. As. Soc. Beng. 1836.
Gr. et Mitch. Gen. B. t. 68. - Gould, B. of Asia. 1.
t. 12. ex Nepal.
 2. **Cochon purpurea**, Hodgs. (hodgsoni, Blyth.) Journ.
As. Soc. Beng. 1836. - Gould, B. of Asia. 1. t. 13. ex Nepal.
745. **Oreas**, Temm. (Cochon, p. Gr.) Oceania. 1.
TURDUS azureus, Temm. (Cochon! azurea, Gr.) Pl. col. 274.
ex Java. Cyaneus; pileo dilutiore; gula, pectoraque olivaceo-fuscis.
746. **Melanornis**, Gr. (Melasoma, Sw. - Melanosoma, Sundev.) Africa. 4.
 1. **MELASOMA edolioides**, Sw. (Melaenornis edolioides, Gr.)
B. of west. Afr. t. 29. ex Afr. occ. Niger.
 * 2. **MELANOSOMA atra**, Sundev. Mus. Holm. ex Caffr.
Nigricans.
 * 3. **MELANOSOMA taenioptera**, Sund. Mus. Holm. Caffr.
Grisea et alba.
 * 4. **MELANOSOMA simplex**, Sund. Mus. Holm. ex Caffr.
Grisea.
747. **Chaptia**, Hodgs. Asia. 2.
 1. **DICROURUS aeneus**, Vieill. (aeratus, Steph. - Chaptia muscipetoides, Hodgs. - Ch. aenea, Blyth.) Lev. Afr. t. 176.
ex Nepal. Bengal. Assam.
 2. **C. malayensis**, Hay, Journ. As. Soc. xv. p. 294.
ex Penins. Malacc.
748. **Bhringa**, Hodgs. Asia. 1.
EDOLIUS remifer, Temm. (rangonensis, Horsf. nec Blyth.)
Bhringa tectirostris, Hodgs. - Bhringa remifer, Blyth.)
[Pl. col. 178. ex Him. Assam, Sumatra, Java.
749. **Chibia**, Hodgs. (Cometes, Hodgs. nec Gould. - Criniger,
Tickell, nec Temm.) Asia. 1.
CORYS hottentotus, L. (Edolius barbatus, Gr. - crishna,
Gould, 1836. - Criniger splendens, Tick. - Chibia caesia,
Hodgs. - Ch. hottentota, Blyth.) Pr. Zool. Soc. 1836.
p. 5. ex Bengal. Nepal. Assam.

750. **Edolius**, Cuv. 1817. (*Dicrurus*, Vieill. 1816. - Buchanga, Hodgs.) Asia mer. 5.

1. **CUCULUS paradiseus**, L. (*Edolius retifer*, Temm. - intermedius, Less. - rangonensis, Gould. - cristatellus, Blyth. E. paradiseus var. C. Blyth.) *Pr. Zool. Soc.* 1836. p. 5. *Lev. Afr. t. 175? ex Malacca et Ins. Sond.*
2. **E. grandis**, Gould. (*dentirostris et orissae?* Jerd. *Dicrurus platurus*, Vieill. - *Edolius paradiseus* var. B. Blyth.) *Pr. Zool. Soc.* 1836. p. 5. *ex India, Assam, Arakan, Tenasserim.*
3. **LANIUS MALABARICUS**, Shaw, nec Lath. (*grandis*, Blyth, nec Gould. - *Chibia malabaroides*, Hodgs. - *Edolius paradiseus* var. A. Blyth, Cat. 1215.) *Gen. Hist. t. 108. fig. tantum. ex Nepal. Tenasserim. Plumis cristae longe fluentibus.*
4. **LANIUS malabaricus**, Lath. ex Sonn. (*Dicrurus retifer?* Jerd.) *Voy. Ind. II. t. 3. ex India m. Capite laevi!*
- * 5. **E. brachyphorus**, Temm. *Mus. Lugd. ex Borneo. Minor: capite laevi.*

751. **Dicerourus**, Vieill. (*Edolius*, p. *Cuv. Gr.*) As. Afr. Oc. 25. a. Asiatici.

1. **D. edoliformis**, Blyth, *Journ. As. Soc.* xv. p. 297. *ex Ceylon.*
2. **D. viridescens**, Gould, 1836. - Blyth, *Journ. As. Soc.* xi. fig. 10. et 11. *ex Burmah.*
3. **CORVUS balicassius**, L. (*afer*, Licht. - *assimilis*, Bechst. *Oriolus furcatus*, Gm. - Bhuehang annexens, Hodgs. *Dicrurus affinis*, Blyth. - *D. balicassius*, Gr.) *Pl. entl. 603. ex Penins. Malacc. Nepal.*
4. **D. macrocercus**, Vieill. (*indicus*, Steph. - *Muscicapa biloba*, Licht. - *Buchanga albirictus*, Hodgs. 1837. - *Edolius forficatus*, Aliquorom.) *As. Res. xviii. II. figura. ex India univers. Bengal.*
5. **D. MACROCERCUS**, Jerd. (*cineraceus!* Gr. - **longicauda-tus**, Hay.) *Ann. et Mag. N. H.* 1844. p. 46. *ex India univ. Ceylon.*
6. **D. intermedius**, Blyth, *Journ. As. Soc.* xv. p. 298. *ex Tenasser.*
7. **LANIUS caerulescens**, L. (*tingah*, Shaw. - *Dicerurus caerulescens*, Blyth.) *Edu. B. t. 56. - Lev. Afr. t. 172. ex India univers. Bengal.*
Quid D. lophorinus et D. leucogaster, Vieill. (albiventer, Steph.) ex Lee. Afr. t. 171. 173?

8. **D. leucopygiotis**, Blyth, Journ. As. Soc. xv. p. 298.
ex Ceylon.

9. **D. leucophaeus**, Vieill. (ceylonensis Steph. - D. cineraceus, Blyth.) Lev. Afr. t. 170. ex Ceylon, Himal.

b. Oceanici.

10. EDOLIUS **cineraceus**, Horsf. Linn. Trans. xiii. p. 145.
ex Java, Sumatra.

* 11. EDOLIUS **picinus**, Mull. Mus. Lugd. Sumatr. Minimus.

* 12. EDOLIUS **carbonarius**, Mull. Mus. Lugd. ex Nov. Guineae. Medius.

* 13. EDOLIUS **densus**, Temm. Mus. Lugd. ex Timor. Major.

14. EDOLIUS **forticatus**, Horsf. nec L. (**longus**, Temm.)
Lev. Afr. t. 174. ex Java.

* 15. EDOLIUS **bimaensis**, Temm. Mus. Lugd. Sumbava.

16. **E. megarhynchus**, Quoy et Gaim. (Dicurus megarhynchus, Gr.) Voy. Astrol. Zool. 1. p. 184. Ois. t. 6. ex Nova Guinea.

17. **D. balicassius**, Vig. et H. nec L. (**bracteatus**, Gould)
Austr. t. 82. ex Australia.

c. Africani.

18. LANIUS **forficatus**, L. (drongo, Shaw. - Muscicapa galeata, Bodd. - Dicurus cristatus, Vieill.) Pl. enl. 189.
Lev. Afr. t. 166. ex Madagascar.

19. **D. mystaceus**, Vieill. (Muscicapa divaricata, Licht.)
Lev. Afr. t. 169. ex Afr. m.

20. **D. ludwigii**, Smith. 1834. - Ill. S. Afr. Zool. t. 34.
mas. ex Afr. m.

21. **D. musicus**, Vieill. - Lev. Afr. t. 167. 168. nidum.
ex Africa mer.

* 22. MUSCICAPA **emarginata**, Licht. (Edolius emarginatus, Temm. - Dicurus emarginatus, Sundev.) Mus. Lugd.
ex Nubia. Similis praeced. sed minor.

23. EDOLIUS **lugubris**, Ehrenb. Symb. Phys. t. 8. 3.
ex Afr. or.

24. **D. canipennis**, Sw. B. of west. Afr. 1. p. 254. ex
Afr. occ.

25. **D. atripennis**, Sw. B. of west. Afr. 1. p. 256. ex
Afr. occ.

SUBFAM. 107. CEBLEPYRINAE.

752. **Ceblepyris**, Cu v. 1817. (Campephaga, Vieill. 1816.) Mi-
nores. Sexus dissimiles. Arboreae. Africa. Ocean. 5.
 1. **CAMPPEHAGA nigra** mas et flava faem. Vieill. (atrata, Sw.
Ceblepyrisater, Less.) Lev. Afr. t. 165. ex Afr. m.
 2. **TERDUS phoeniceus**, Lath. (phaenicopterus, Temm. mas.
Tanagra dubia, Sparre. - Ceblepyris melanoxantha,
Licht. faem. - C. flava, Temm. faem. - Campephaga phae-
nicia, Sw.) Nat. Misc. t. 252. - Pl. col. 71. - Lev. Afr.
t. 164. faem. - Sw. B. of west. Afr. t. 27. mas. 28. faem.
ex Afr. occ.
 3. **C. caerulescens**, Blyth, Journ. As. Soc. xi. p. 463.
et xv. p. 308. ex Ins. Philipp.
 * 4. **C. cinerascens**, Temm. Mus. Lugd. ex Afr. occ.
Guinea.
 5. **C. caesia**, Licht. (cana, Cuv. - levaillantii, Temm.
Campephaga caesia, Gr.) Lev. Afr. t. 162. 163. - Vieill.
Gal. Ois. t. 130? ex Caffr. r.
Quid Camp. cana, Gr. ex L. (Musc. kinki, Bodd.) Pl. ent. 541?
Quid Ceblepyris ardosiae, Lesson, Tr. Ornitholog. p. 369?
753. **Campephaga**, Vieill. p. (Ceblepyris, p. Cuv.) Ocean. 5.
 1. **CEBLEPYRIS melas**, Müll. (Camppehaga melas, Gr.) Nat.
Verh. Ethnogr. p. 189. ex Nova Guinea.
 2. **CEBLEPYRIS cinnamomea**, Müll. (Camppehaga cinnamomea, Gr.) Nat. Verh. Ethnogr. p. 189. N. Guinea.
 3. **CEBLEPYRIS plumbea**, Müll. (Camppehaga plumbea, Gr.)
Nat. Verh. Ethnogr. p. 189. ex N. Guinea, Timor.
 4. **CEBLEPYRIS morio**, Müll. (Camppehaga morio, Gr.) Nat.
Verh. Ethnogr. p. 189. ex Celebes.
 5. **CAMPPEHAGA jardini**, Gould, Austr. II. t. 60. ex Austr.
754. **Graucalus**, Cuv. 1817. nec Gr. ex L. (Ceblepyris, p. Gr.) Ma-
iores. Sexus inter se haud dissimiles. Arboreae. Asia. Ocean. 18.
 a. Australasian.
1. **CORVUS melanops**, Lath. (Ceblepyris melanops, Müll.
Graucalus melanotis, Gould. 1837. - Gr. melanops,
Blyth.) Lev. Parad. t. 30. mas. - Austr. II. t. 30. ex
Austr. univ. N. Guinea, Timor.
3. Mai 1850.

2. *Gr. parvirostris*, Gould, 1837. *Introd. B. of Austr.*
sp. 100, fig. nulla. ex Tasmania.
 3. *Gr. mentalis*, Vig. et Horsf. (Lanius robustus? Lath.)
Campephaga robusta? Gr.) Gould, *Austr.* II. t. 56.
ex Austr. or.
 4. *G. hypoleucus*, Gould, *Austr.* II. t. 57. ex Austr.
 5. *CEBLEPYRIS LINEATA*, Sw. nec Less. (Graucalus *swainsoni*,
Gould. - Campephaga lineata, Gr.) *Austr.* II. t. 58.
ex Australia.

b. *Asiaticus.*

6. *Gr. macei*, Less. (papuensis ex India, *Auct.* - nepalen-
sis, Hodgs.) *Ind. Rev.* 1837. p. 327. ex India univ.
c. Malaiasian.

7. *CEBLEPYRIS atriceps*, Müll. (Campephaga atriceps, Gr.)
Nat. Verh. Ethnogr. p. 190. ex Celebes, Ceram,
Sumbawa.

- *8. *G. magnirostris*, Forssten, *Mus. Lugd.* ex Gilolo.
Similis Gr. atricipiti, sed major, et rostro robusto, curvo
uti in Gr. personata!

9. *CEBLEPYRIS personata*, Müll. (Campephaga personata,
Gr.) *Nat. Verh. Ethnogr.* p. 190. ex Timor, Samoa.

10. *CEBLEPYRIS larvata*, Müll. (Campephaga larvata, Gr.)
Nat. Verh. Ethnogr. p. 190. ex Java.

11. *CORVUS NOVAE-GUINEAE*! Lath. (Coracina *fasciata*,
Vieill. - Graucalus lineatus et dussumieri, Less. - Ceb-
lepyris plumbea, Wagl. - Campephaga striata, Gr.
ex Bodd. - Ceblepyris novae-guineae, Müll.) *Pl. enl.* 629.
Voy. Pole Sud. Ois. t. 8. 1. ex Sumatra.

- *12. *G. leucopygius*, Ep. *Mus. Lugd.* ex Celebes.
Similis praecedenti; sed minor, et abdominis uropygique
albis.

13. *CEBLEPYRIS JAVENSIS*, Horsf. (papuensis, Rüpp. nec
Gm. faem.) Müll. *Nat. Verh. Ethn.* p. 191. ex Java.

14. *CORVUS PAPUENSIS*, Gm. (Graucalus caledonicus,
Less. - caesius, Cuv. - Ceblepyris albiventris, Wagl.
affinis, Rüpp. 1839. - papuensis, Müll.) *Pl. enl.* 630. mas.
ex Banda, Celebes, N. Guinea.

15. *CEBLEPYRIS TEMMINCKII*, Müll. (Campephaga tem-
mincki, Gr.) *Nat. Verh. Ethnogr.* p. 190. ex Celebes.

16. *CEBLEPYRIS bicolor*, Temm. (Campephaga bicolor, Gr.)
Pl. col. 278. mas. ex Celeb. Ad Artamus accedit?

17. CAMPEPHAGA *desgrazii*, Gr. ex Hombr; et Jacq. Voy.
Pole Sud, Ois. t. 7. l. ex Oceania.

* 18. *G. ceramensis*, Bp. Mus. Lugd. ex Ceram. Minor: dilutior; subtus unicolor: remigibus primariis margine ipso nigerrimo!

Quid C. tenuirostris, Jard. et Selb. (Cublepyris jardinii, Rüpp.)
Ill. Orn. t. 114?

Quid Cublepyris pectoralis, Sw. (Picnonotus niveiventer, Less.)
B. of west. Afr. I. p. 249. (Grauculus pectoralis, Jard. et Selb.)
Ill. Orn. t. 57?

Quid Grauculus Hombr. et Jacq. Voy. Pole Sud. t. 9. 3. t. 8. 2.
t. 10. 1. t. 10. 2. (Campephaga boyeri, C. & C., C. schisticeps,
C. Marescoti, Gr. sp. 24. 26. 27. et 28.) ex Oceania?

755. PTEROPODOCY'S, Gould. Rostrum minimum! cauda, alae;
pedes elongati. Terrestres. Australia. 1.

CAMPEPHAGA *phasianellus*, Gould. 1839. (Cublepyris
maxima, Rüpp. - Pteropodocys phasianellus, Gould.)
Orn. Misc. 1839. t. 3. - Austr. II. t. 59. ex Austr. m.

756. LALAGE, Boie. 1828. nec Sundevall! (Erucivora, Sw. - Cam-
pephaga, p. Gr.) Asia m. Ocean. 7.

1. TURDUS *orientalis*, Gm. (Picnonotus humeraloides, Less.)
Campephaga terat, Gr. ex Bodd. - striga, Raffles. - Syl-
via leucophaea, Vieill. nec Lath. - Lanius orientalis, Auct.
Lalage orientalis, Boie. - Cublepyris orientalis, Temm.)
Pl. enl. 273. 3. ex Penins. Malacc. Malaiasia:
Java, Borneo, Sumatra, Celebes et Timor.

2. CAMPEPHAGA *humeralis*, Gould. 1837. (Lanius humera-
lis, Blyth.) Austr. II. t. 63. ex Austr. univers.

3. CUBLEPYRIS *aurea*, Temm. Pl. col. 382. 2. - Voy. Pole
Sud, Ois. t. 10. 3. ex Celebes.

4. CUBLEPYRIS *timorensis*, Müller, Nat. Verh. Ethnogr.
p. 190. ex Timor.

* 5. SYLVIA *nycthemera*, Temm. (Lalage nycthemera, Bp.)
Mus. Lugd. ex Timor. Minima: nigra; subtus, cum
supercilii, fascia alari, caudaque basi, alba.

6. LANIUS *karu*, Less. (Campephaga karu, Gould.) Voy.
Coq. Ois. t. 12. - Austr. III. t. 61. ex Australia,
N. Hibernia.

7. CAMPEPHAGA *leucomela*, Vig. et Horsf. - Gould, Austr.
II. t. 62. ex Australia.

757. **Volvocivora**, Hodgs. 1837. (Campephaga, p. Gr.) Asia m. Ocean. 3.

1. **CEBLEPYRIS fimbriatus**, Temm. (logubris, Sunder.
Volvocivora melachistos, Hodgs. 1839. - Graucalus ma-
culesus, MacClell. 1839. - Picnonotus carbonarius, Less.
Lanius silens, Tickell, nec Auct. - Campephaga fimbria-
ta, Strickl.) Pl. col. 249. mas. 250. faem. ex Asia m.
Malaiasia.
2. **CEBLEPYRIS FIMBRIATUS**, Jerd, nec Temm. (cana, Sykes. jun.
Campephaga sykesi, Strickl.) Ann. et Mag. N. Hist.
1844. p. 36. ex India, Ceylon.
3. **CAMPEPHAGA melanoptera**, Blyth, Journ. As. Soc. xv.
p. 307. ex Arakan.

758. **Lanieterus**, Less. (Campephaga, p. Gr.) Africa. 3.

1. **L. xanthornoides**, Less. (Campephaga xanthornoi-
des, Gr.) Ann. Sc. Nat. 1838. p. 169. ex Afr. occ.
2. **EDOLUS labrosus**, Sw. (Lanieterus swainsoni, Less.
Campephaga labrosa, Gr.) Zool. Ill. t. 179. ex Afr. occ.
3. **CEBLEPYRIS lobatus**, Temm. (Campephaga lobata, Gr.)
Pl. col. 279. 280. Afr. occ. Nonne genus distinctum?

759. **Symmorphus**, Gould. (Campephaga, p. Gr.) Oceania. 1.

- S. leucopygia**, Gould. (Campephaga leucopygia, Gr.)
Pr. Zool. Soc. 1837. p. 145. ex N. Cambria australi?

760. **Pericrocotus**, F. Boie 1826. (Phaenicornis, H. Boie 1827.

Acis, Less.) Asia. Oceania. 12.

1. **PARS peregrinus** et Motacilla cinnamomea, L. (P. coc-
cineus et Muscicapa malabarica, Gm.-P. indicus, Sparrm.
P. malabaricus, Lath. - Pericrocotus peregrinus, Blyth.)
Mus. Carls. t. 48 et 50. - Lev. Afr. t. 155. 1. mas. 2. faem.
Gould, Cent. Him. B. t. 9. ex India univers.
Ceylon, Java, Borneo.
2. **MUSCICAPA erythropygia**, Jerd. (Turdus speciosus
var. ♂. Lath. - Pericrocotus erythropygus, Blyth.) Gen.
Hist. vi. t. 98. - Jard. et Selb. Contr. Orn. t. 1. - Gould,
B. of Asia. I. t. 5. ex India m.
3. **MUSCICAPA rosea**, Vieill. (Phaenicornis affinis, MacClell.
Pericrocotus roseus, Blyth.) Pr. Zool. Soc. 1839. p. 157.
ex India univers.
4. **P. solaris**, Blyth, 1837. - Gould, B. of Asia I. t. 4.
m. et f. ex Darjiling, Sikim, Bootan.
5. **P. igneus**, Blyth. (flameus ex Malacca, Auct.) Journ.
As. Soc. xv. p. 309. ex Penins. Malacc.

6. **MUSCIPETA brevirostris**, Vig. 1831. (*Phaenicornis miniatus*, Sw. nec Temm. - *Pericrocotus brevirostris*, Blyth.)
Gould, Cent. Himal. B. t. 8. ex Hym. Assam, Arakan.
7. **MUSCICAPA miniatia**, Temm. (*Phaenicornis miniatus*, Boie.) *Pl. col. 156. 1. mas. 2. faem. ex Java.*
- *8. **PHAEONICORNIS flagrans**, Boie. (*minuta*, Temm.) *Mus. Lugg. ex Sumatra, Borneo. Similis P. peregrino; sed colore nigerrimo loco plumbei, et igneo loco aurantii.*
- *9. **PHAEONICORNIS ardens**, Boie, Mus. Lugg. *ex Sumatr. Similis P. flammæae sed minor.*
10. **MUSCICAPA flammea**, Forst. (*subflava*, Vieill. - *Phaenicornis elegans*, MacClell. 1839. - *Ph. flammeus*, Sw. - *Pericrocotus flammeus*, Blyth.) *Pl. col. 263. 1. mas. 2. faem. Zool. Ind. t. 15. - Sw. Zool. Ill. 2. ser. t. 52. - Jerd. Ill. Ind. Orn. t. 11. ex India m. Ceylon, Sumatr.*
11. **TURDUS speciosus**, Lath. (*Muscipeta princeps*, Vig. *Haematornis princeps*, Gould. - *Pericrocotus speciosus*, Strickl.) *Gould, Cent. Himal. B. t. 7. ex Asia contr. m. et or. Maximus.*
- *12. **PHAEONICORNIS modesta**, Boie, Mus. Lugg. *ex Sumatr. Major: cinerous: subtus, ut in fronte, rectricumque lateralium in apicibus, albus.*
Quid Pericrocotus aureopygus, Hay. et Per. rubricinctus, Blyth?
Quid Per. modestus, Strickl. Ann. Nat. Hist. 1817. p. 131?
Quid Per. cinereus, Laf. Rev. Zool. 1845. p. 94?

FAMILIA 51. LANIIDÆ.

SUBFAM. 103. LANINÆ.

761. **Tephrodornis**, Sw. (Keroula, Gr. - *Teuthaca hinc Creurgus*, Hodgs.) As. Oceania. 8.
1. **MUSCICAPA hirundinacea**, Temm. *ex Reinw. (obscura, Horsf. - Tephrodornis hirundinacea, Sw. - Hemipus obscurus, Blyth ex Hodgson.) Pl. col. 119. - Zool. Res. Java. fig. mala. ex Java, Sumatr. Malacca.*
An hujus generis?
2. **T. syrticola**, Jerd. *Journ. Madr. x. p. 236. ex India m.*
3. **TEUTHACA petreica**, Hodgs. (*Tephrodornis pelvica*, Blyth.) *Ind. Rev. 1837. p. 447. ex Nepal, Arakan.*
4. **LANIUS gularis**, Raffles. (*virgatus*, Temm. - *Tephrodornis virgata*, Sw. - *gularis*, Gr.) *Pl. col. 256. 1. ex Java.*
5. **LANIUS silens**, Shaw. nec Rüpp. (*Laniarius silens*, Gr.) *Lev. Afr. t. 74. 1. mas 2. faem. ex Afr. m.*

6. **MUSCICAPA pondiceriana**, Gm. (*philippensis ex India*,
Lath. - *Lanius keroula*, J. Gr. - *muscipetoides*, *Frankl.*
griseus, *Tickell.* - *sordidus*, *Less.* - *Teuthaca leucurus*,
Hodgs. 1837. - *Tephrodornis superciliosus*, *Sw.* - *T. pon-*
diceriana, *Blyth.*) *Hardw.* *Ill. Ind. Zool.* figura. ex
India univ.

7. **T. affinis**, *Blyth*, *Journ. As. Soc.* xvi. p. 473. ex *Ceylon*.

8. **T. grisola**, *Blyth*, *Journ. As. Soc.* xii. p. 180. ex *Beng-*
gal, *Arakan*.

Quid Tephrodornis concolor ex Blyth, et T. erythropygia ex Jerd.
Gr. Gen. B. p. 290. sp. 3. et 5. ex Asia m?

Quid Tephrodornis ochracea, Strickl. - Fraser, Zool. Typica
figura. ex Ins. Fernando Po. Cauda rotundata et
acrotarsis integris?

762. **Gampsorhynchus**, *Blyth*. (*Garrulax*, p. *Gr.*) Ad Ca-

lamoherpinas proxime accedens. Asia.

1.

G. rufulus, *Blyth*. (*Malurus chinensis*, *Mus. Lugd.*
Garrulax rufulus, *Gr.*) *Journ. As. Soc.* xiii. p. 370. ex
As. or. Arakan. *Rufo-nigricans*; *subtus rufus*: *gula*
striata: *superciliis albis*,

*763. **Myiolestes**, *Müll.* (*Napothena*, *Temm.* nec *Boie*). Oceania. 5.

1. **MUSCICAPA megarhyncha**, *Quoy et Gaim.* (*Napothena*
elaeoides, *Mus. Lugd.*) *Astrol. Zool.* t. 3. 1. ex *N. Guinea*.

* 2. **NAPOTHENA pyrrhonota**, *Temm.* *Mus. Lugd.* ex
Borneo. *Nigricans*; *tergo, cauda, abdomineque rufis: rec-*
tricibus apice nigris.

* 3. **M. pulverulentus**, *Müll.* *Mus. Lugd.* ex *N. Guinea*.
Griseus; subtus alba.

* 4. **M. phaionotus**, *Müll.* *Mus. Lugd.* ex *Banda*. *Flavo-*
fusca; subtus alba.

5. **HYPOTHYNIS concreta**, *hujus Consp.* p. 320. sp. 7.

Huc transferatur, cuius in locum substitutatur, tanquam *Cyori-*
nithis species sexta: **MUSCICAPA hyacinthina**,
Temm. (*Cyornis hyacinthina*, *Bp.*) *Pl. col.* 30. t. mas.
 2. faem. ex *Timor*. *Supra et inpectore caerulea: abdo-*
mine rufa.

764. **Napothena**, *Boie*, nec *Malacopteron*, p. *Gr.* Asia. Ocean. 6.

* 1. **N. pyrrhoptera**, *Boie*, *Mus. Lugd.* ex *Java*. *Capite,*
collo, dorsoque brunneis; uropygia, caudoque castaneis: subtus
ferrugineo-alba. Minima. Species typica.

* 2. **N. coronata**, *Müll.* *Mus. Lugd.* ex *Sumatra*, *Bor-*
neo. *Olivaceo-cinerea; subtus albicans: fronte castanea;*
occipite nigro.

*3. *N. pileata*, Müll. Mus. Lugd. ex Sumatra, Borneo.
Similis N. coronata, sed major.

*4. *N. atricapilla*, Müll. Mus. Lugd. ex Malacca,
Sumatra, Borneo. Simillima praecedentibus, sed pi-
leo fuliginosus.

*5. *N. rubicunda*, Müll. Mus. Lugd. ex Sumatra,
Borneo. Ferruginea; abdomine dilutiore.

*6. *N. livittata*, Müll. Mus. Lugd. ex Timor. Oliva-
ceo-brunnea; subtus cum superciliis albo-ochracea; pileo
castanea.

765. **Prionops**, Vieill. 1816. Africa. 3.

1. *Lanius plumatus*, Shaw. (Prionops geoffroyi, Vieill.)
plumatus, Sw.) Lev. Afr. t. 80. 81. - Gal. Ois. t. 142.
B. of west. Afr. t. 26. ex Afr. occ. Capite cristato.

2. *Lanius poliocephalus*, Stanley. (Prionops cristatus,
Rupp. - P. poliocephalus, Gr.) Salt's Trav. App. p. 50.
Faun. Abyss. t. 12. 2. ex Afr. or. s. Capite cristato.

3. *P. thalacoma*, Smith, 1836. - Ill. S. Afr. Zool. Av.
t. 5. ex Afr. m. Capite laevi.

766. **Laniarius**, Vieill. 1816. (Malaconotus, Sw. 1824. - Pelici-
nius, Boie.) Africa. 18.

1. *Lanius barbarus*, L. (Malaconotus barbarus, Sw. - La-
niarius barbarus, Vieill.) Pl. enl. 56. - Lev. Afr. t. 69.
Sw. Zool. Ill. n. s. t. 71. ex Afr. s. occ. et m.

2. *Lanius atricoccineus*, Burch. (Laniarius atrocoxi-
neus, Gr.) Zool. Journ. i. t. 28. - Sw. Ill. n. s. t. 72.
ex Afr. m.

3. *Lanius cruentatus*, Rupp. (Malaconotus roseus, Jard.
M. erythrogaster, Sw. - Laniarius cruentatus, Gr.) Zool.
Atl. t. 29. - Ill. Orn. n. s. t. 30. - Ehrenb. Symb. Ph.
Av. t. 3. ex Afr. or.

4. *Lanius olivaceus*, Shaw. (oleaginus, Vieill. - Malaco-
notus olivaceus, Sw. - superciliaris? Vieill. - Laniarius
olivaceus, Blyth.) Lev. Afr. t. 75. 1. mas 76. 1. faem.
ex Afr. m.

*5. *MALACONOTUS rubiginosus*, Sundev. (Oliva jun. Lev.)
Afr. t. 75. 2. mas adult! ex Afr. m.

6. *MALACONOTUS similis*, Smith. 1836. jun. (chrysogaster,
Sw. 1837. mas. ad. - aurantiopectus, Less. - Laniarius
similis, Gr.) Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 46. fem. - B. of
west. Afr. t. 25. mas. ex Afr. m. et occ.

7. **MALACONOTUS leucotis**, Sw. (Laniarius leucotis, Gr.) *Two Cent. et a Quart.* p. 341. ex Africa.
8. **MALACONOTUS superciliosus**, Sw. (Laniarius superciliosus, Gr.) *B. of west. Afr.* t. 1. p. 239. ex Afr. occ.
9. **LANIUS gutturalis**, Daud. (perini, Mus. Lugg.) Malaconotus torquatus, Sw. - Laniarius viridis, Vieill. - L. gutturalis, Gr.) *Zool. Misc.* t. 687. - *Gal. Ois.* t. 143. ex Afr. m. Minor: viridis; gula crisoque rubris. Mas fascia latissima pectorali nigra.
10. **TURDUS chrysogaster**, Gr. (Laniarius erythrogaster, Gr. ex Bodd. - Laniarius chrysogaster, Bp.) *Pl. enl.* 358. Rüpp. t. 29. ex Afr. or.
11. **LANIUS icterus**, Cuv. (olivaceus, Vieill. nec Shaw. - poliocephalus, Licht. - Malaconotus blanchoti, Steph. - Laniarius icterus, Gr.) *Lev. Afr.* t. 285. - *Gal. Ois.* t. 139. Sw. *B. of west. Afr.* t. 22. ex Afr. occ. Maximus: olivaceus, albo-maculatus; subtus flavus: pileo genis, cereo que canis.
12. **L. rubrigaster**, Vieill. *Dict. H. Nat.* xiii. p. 300. Afr.
13. **LANIUS cruentus**, Less. (Laniarius, sp. II. Gr.) *Cent. Zool.* t. 65. ex Afr. m.
14. **LANIUS mystaceus**, Lath. (Laniarius mystaceus, Gr.) *Lev. Afr.* t. 65. ex Afr. m.
15. **L. multicolor**, Gr. et Mitch. *Gen. B.* t. 72. Afr. m.
16. **MALACONOTUS hypopyrrhus**, Hartl. (Laniarius hypopyrrhus, Gr.) *Syst. Verz. Mus. Brehm.* p. 61. ex Afr.
- * 17. **MALACONOTUS peti**, Bp. *Mus. Lugd.* ex Afr. occ. Ashanta. Fusco-viridis, alarum maculis albis magnis; subtus albus, pectore cinerascente, criso flavicante.
18. **TURDUS ZEYLONS!** L. (Lanius *bachakiri*, Shaw. - australis, Licht. - Tel. collaris, Gr. an Sw? - Tel. bachakiri, Blyth.) *Edw. Av.* t. 321. - *Pl. enl.* 372? - *Lev. Afr.* t. 67? ex Afr. m.
Quid Pitohui kirrhocephalus, Less. *Voy. Coq.* t. II?

767. **Dryoscopus**, Boie, nec Wied. (*Hopalophus* hinc Laniarius, p. Gr.)

1. **LANIUS cubla**, Shaw. (Laniarius cubla, Gr. - Malaconotus cubla, Sundev. - Dryoscopus cubla, Boie.) *Lev. Afr.* t. 72. 1. mas. 2. faem. ex Afr. m.
2. **LANIUS gambensis**, Licht. (Malaconotus mollissimus, Sw. - Laniarius gambensis, Gr.) *B. of west. Afr.* t. 23. ex Afr. occ.

Africa.

8.

3. **LANIARIUS affinis**, Gr. Ann. Nat. Hist. 1837. p. 489.
4. **MALACONOTUS orientalis** et similis, Sw. (Laniarius orientalis, Gr.) Two Cent. et a Quart. p. 342. ex Africa.
5. **LANIUS boulboul**, Lath. (cafer, Forst. - aethiopicus! Mus. Lugd. - Malaconotus rufiventris, Sw. - ferrugineus? Sundev.) Lev. Afr. t. 68. ex Afr. m.
6. **LANIUS SILENS**, Rüpp. nec Auct. (**aethiopicus**, Laf. ex Buff.) Rüpp. Uebers. N. Ost. Afr. Vög. t. 23. ex Afr. or. Minor: subtus minus rufescens.
7. **LANIUS madagascariensis**, L. (L. madagascariensis minor, Br. - Laniarius madagascariensis, Gr.) Pl. enl. 290. 1. 2. - Lev. Afr. t. 73. ex Madag. (nec Temm. Pl. enl. 296. 2. qui L. rufus, Gm. - madagascariensis rufus, Br. Artamus rufus, Gr.)
8. **LANIUS bicolor**, L. (L. madagascariensis caeruleus, Br. Laniarius bicolor, Gr.) Pl. enl. 298. 1. - Lev. Afr. t. 73. 1. mas 2. faem. 3. jun. ex Madagassar.

768. **Telephonus**, Sw. 1831. (Telophorus, Gr. - Pomatorhynchus Boie!! nec Horsf!!!)

Afr. As. Eur. m. 7.

1. **LANIUS senegalus**, L. (Tel. senegalus, Gr. - Lanius senegalensis, Br.) Br. Orn. II. t. 17. 1. - Pl. enl. 297. 1? ex Afr. occ. Senegal. Minor.
2. **LANIUS cucullatus**, Temm. (senegalus var. Lath. - Tel. cucullatus, Gr. - L. senegalus, Licht. nec L.) Susemihl, Eur. Vög. II. t. 17. 2. ex Eur. m. Afric. sept.
3. **LANIUS erythropterus**, Shaw, nec Gould. (melanocephalus, Temm. - Thamnophilus tschagra, Vieill. - Tel. erythropterus, Sw.) Pl. enl. 470. 1. - Lev. Afr. t. 70. 1. mas 2. faem. ex Afric. occid. Senegal.
4. **T. major**, Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 108. ex Afr. occ.
5. **T. longirostris**, Sw. (Lanius tschagra, Rupp.) Two Cent. and a Quart. p. 282. ex Afr. or.
6. **T. trivirgatus**, Smith, Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 94. faem. ex Africa m.
7. **T. leucorhynchus**, Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 108. ex Africa occ.

769. **Laniellus**, Sw. 1831. (Crocias, Temm. - Telephonus, p. Gr.) Ocean.

1.

- LANIUS leucogrammicus** et Crociss guttatus, Temm.
(Lanius albinoatus, Less. - Telephonus leucogrammicus, Sw.) Pl. col. 592. ex Ocean.

770. **Nilaus**, Sw. 1827. Africa. 1.
Lanius capensis, Shaw. (brubru, *Lath.* - frontalis,
Forst.) *Lev. Afr. t. 71.* ex Afr. m.
771. **Pteruthius**, Sw. 1831. (*Allotrius*, Müll. 1827. - *Ptery-*
thrius, Caban. 1847.) As. Ocean. 5.
1. **Lanius erythropterus**, Vig. (*Pteruthius erythropterus*,
Sie.) Gould, *Cent. Himal. B. t. II.* ex *Himal.*
2. **Allotrius flaviscapis**, Temm. (*Lanius flavigennis*,
Kuhl. - *Pteruthius flaviscapis*, *Gr.*) *Pl. col. 589.* 1.
ex *Java.*
3. **Allotrius aerobarbus**, Müll. (*Pteruthius aerobarbus*,
Gr.) *Pl. col. 589.* 2. ex *Java.*
4. **P. xanthochloris** et *melanotis*, *Hodgs. List Nepal.*
et Ind. Journ. 1847. ex *Nepal.*
5. **P. rufiventris**, Blyth. *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 66.*
772. **Emmeoctonus**, Boie. (*Lanius*, *Vig.* - *Phonens*, *Kaup.*) Eur. As. Afr. Oc. 9.
1. **Lanius collaris**, L. (*aeruginosus*, *Klein.* - *spinitorques*,
Bechst.) *Pl. enl. 31.* 2. - *Lev. Afr. t. 64.* - *Gould,*
Eur. t. 69. ex *Eur.*
2. **Lanius rufus**, Br. nec *Gm.* (*L. collurio* var. γ . *rufus*, *Gm.*
L. rutilus, *Lath.* - *ruficeps*, *Bechst.* - *pomeranus*, *Sparrm.*
castaneus, *Hahn.* *Risso?* - *ruficollis?* *Shaw.*) *Pl. enl. 9.* 2.
et 31. 1. - *Mus. Carls. t. 1.* - *Gould*, *Eur. t. 70.* ex
Eur. As. Afr.
3. **Lanius rutilans**, Temm. (*superciliosus!* *Licht.* nec *Lath.*
erythropterus! *Rupp.* - *L. collurio* var. δ . *senegalensis*,
Gm. - *rutilus* var. *Lath.* - *L. rufus* var. *Schlegel.*) *Pl.*
enl. 477. 1. - *Lev. Afr. t. 63.* 1. mas 2. faem. ex *Afr.*
occ. *Simillimus* praecedenti, *sed coloribus dilutioribus*, *et*
tectricibus alarum scopularibusque allido-marginaliis.
4. **Lanius phoenicurus**, Gm. ex *Pall. Zoogr. Ross.-As.*
t. p. 405. - *Sundevall*, *Phys. Sellsk. Tidskr.* 1837.
p. 36. 1838. *p. 64.* - *Anteckn.* till *Skandinav. Orn. in*
Feten. Acad. Handl. 1840. ex *As. s. accident.* *Eur. or?*
Cauda et uropygio intenso rufis.
5. **Lanius cristatus** et *ucionensis?* *L.* (*melanotis*, *Valenc.*
ferrugiceps, *Hodgs.* 1837. - *arenarius?* *Blyth.* - *rutilus*
ex India, *superciliosus!* *et phoenicurus!! Aliquot.*) *Edw.*
B. t. 54. ex *Asia centr. Bengal.*
6. **Lanius crassirostris**, Kuhl, *Mus. Lugd.* ex *Java.*

*7. *E. schicanneri*, Ep. Mus. Lugd. ex Borneo. Similis L. superciliosus, sed vix rufescens; vitta oculari latiore; superciliis nullis.

8. *Lanius superciliosus*, Lath. (colluriooides? Less. - tigrinus? Drapiez. - strigatus? Eyton. - crassirostris, Licht. faem.) Lev. Afr. t. 66. 2. ex Java. Remigum tertia omnium longissima ut in praecedentibus.
Mas dorso caudaque rufis; speculo alari nullo.
Faem. pallidior; vitta auriculari fusca.

9. *Lanius bucephalus*, Temm. (Enneocotonus bucephalus, Gr.) Schlegel, Faun. Jap. Av. t. 14. mas et faem. ex Japon. Aliis rotundatis; remigibus tercia, quarta, et quinta subaequalibus; digitis elongatis, robustis!
Mas dorso, caudaque cinereis; speculo alari albo.
Faem. obscurior; vitta auriculari nulla.

773. *Lanius*, L. (Collyrio, p. Moehr. - Collurio, Vig.) Eur. As. Afr. Am. s. 18.
a. Europei.

1. *L. excubitor*, L. (cinereus, Br. - major? Pall.) Pl. enl. 445. - Roux, Orn. Prov. t. 152. - Gould, Eur. t. 66. ex Eur. s. et media.

2. *L. meridionalis*, Temm. Pl. col. 143. - Roux, Orn. Prov. t. 153. mas. - Gould, Eur. t. 67. - Susemihl, Vög. Eur. II. t. 15. ex Eur. mer. occ.

3. *L. minor*, Gm. (italicus, Lath. - vigil, Pall. - longipennis, Blyth.) Pl. enl. 32. 1. - Roux, Orn. Prov. t. 51. 1. mas. ad. 2. hornot. - Gould, Eur. t. 68. ex Eur. m.

4. *L. nubicus*, Licht. (brabru, Sibthorp. - deserti? Hempr. personatus, Temm. - leucometopon, v. d. Muhle.) Pl. col. 216. 2. - Susemihl, Eur. Vög. t. II. t. 17. 1. ex Afr. or. As. occ. Eur. m. or.

b. Americani septentrionales.

5. *L. septentrionalis*, Gm. (excubitor, Wils. - borealis, Vieill.) Ois. Am. s. t. 50. - Wils. Am. Orn. t. 5. 1. Aud. Am. t. 192. ex Amer. bor.

6. *L. ludovicianus*, L. (ardosiaceus, Vieill. - carolinensis, Wils. - excubitorides et elegans? Sw.) Ois. Am. s. t. 51. - Wils. Am. Orn. t. 22. 5. - Faun. Bor. Am. II. t. 34. - Aud. Am. t. 57. ex Am. s. m.

c. Africani.

7. *L. algeriensis*, Less. Rev. Zool. 1839. p. 134. ex Afr. s.

8. *L. collaris*, L. - Pl. enl. 477. 1. - Lev. Afr. t. 61. adult. 62. jun. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 52. 53. ex Afr. m.

9. *L. subcoronatus*, Smith, Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 68.
ex Afr. m. Minor L. collaris, cui similis: albo nigroque
 varius; sed rostro minore, basi triquetro: fronte, superciliis-
 que albis, nec nigris.
10. *L. afer*, Lath. (signatus, Shaw.) Gr. Gen. B. p. 291.
sp. 20. ex Afr. m.
11. *COLLURIO smithi*, Fraser. (Lanius smithi, Gr.) Pr. Zool.
 Soc. 1843. p. 16. *ex Afr. occ. Guinea.*
12. *L. melanurus*, Licht. Verz. 1842. p. 12. *ex Afr. m.*
d. Asiatici.
13. *L. pendens*, Lath. - Lev. Afr. t. 66. 1. *Patriae*
incertae.
14. *COLLURIO lathora*, Sykes. (burra, J. Gr. - L. excubi-
 tor, var. C. Lath. - excubitor, Franklin. - magnirostris,
 Less. - Lanius lathora, Blyth.) Hardw. Ill. Ind. Zool.
 t. 32. 1. 2. et t. 33. 3. *ex India univ. exclus. Bengal. infer.*
15. *L. schah*, L. (bentet, Horsf. - chinensis, Gr. - pyrrho-
 notus? Vieill.) Gal. Ois. t. 135. - Less. Cent. Zool. t. 72.
ex China, Malaisia, Ins. Philipp.
16. *COLLURIO erythronotus*, Vig. (Lanius superciliosus!
Sv. nec Lath. - jounotus? Hodgs. - erythronotus, Gr.)
Gould, Cent. Him. B. t. 12. 2. ex Himal. s. occ.
Maximus.
17. *L. caniceps*, Blyth. (Collurio erythronotus ex India m.
Auct.) Journ. As. Soc. xv. p. 302. *ex India univ.*
Sindh. Bengal. sup. Valde minor.
18. *COLLURIO nigriceps*, Frankl. (tricolor, Hodgs. 1837.
 pileatus? Temm. - Lanius nasutus? Scopoli. - antiguanus?
 Lath. - Lanius nigriceps, Gr.) Mitch. Gen. B. t. 71.
 Jerd. Ill. Ind. Zool. t. 17. *ex Beng. Nepal, Arak.*
19. *COLLURIO tephronotus*, Vig. (Lanius nepalensis et
 obscurior? Hodgs. - L. tephronotus, Blyth.) Pr. Zool.
 Soc. 1831. p. 43. *ex Bengal, Nepal, Arakan.*
20. *L. hardwickii*, Vig. (Lanius hardwickii, Gr. - L.
 margaritaceus? Less.) Gould, Cent. Him. B. t. 12. 1.
ex Ind. univers. excl. Bengal. inf.
21. *L. hypoleucus*, Blyth, Journ. As. Soc. XVII. p. 249.
ex Tenasserim.
Quid Lanius acuticaudatus, Vieillot?
Quid Lanius albus et L. ruber (payananensis, Gm.) Scopoli ex Sonn.
Voy. t. 71?
Quid Lanius pacificus, L. tabuensis et L. striatus (Lath. Syn. t. 16.)
Gmelin?
Quid Lanius humeralis, Stanley in Salt's Trav. Append. p. 51?
Quid Lanius gamberianus, L. fuscatus et L. sulphureippectus, Less?
Quid Lanius niger, Horsf. (melas, Garnot.) Vey. Voy. t. 128?

774. **Oxynotus**, Sw. (antea Acanthinotus, Sw. - Scheiba, p. Less. - Lanius, p. Gr.) Africa. 1.
LANIUS ferrugineus, Gm. (Oxynotus ferrugineus, Sw.)
Voy. Uranie, t. 17. ex Ins. Mauritius.
775. **Corvinella**, Less. 1831. (Basanistes, Licht. 1842. nec Avct.)
Lanius, p. Gr.) Africa. 2.
1. **LANIUS corvinus**, Shaw. (cissoides, Vieill. nec Licht. mellivorus, Licht.) *Lev. Afr.* t. 78. ex Sonag. Rufus.
2. **LANIUS cissoides**, Licht. nec Vieill. (melanoleucus, Smith.) *Jard. et Selb. Ill. Orn.* t. 117. - *Mag. Zool.* 1837. *Ois.* t. 61. ex Caffr. Niger.
- *776. **Sigmodus**, Temm. Africa. 1.
* **SIGMODUS caniceps**, Temm. *Mus. Lugd.* ex Afr. occ. Niger: pectore, abdomine que albis: pileo cano: rostro, pedibus que rubris.
777. **Eurocephalus**, Smith. (Chaetoblemma, Sw.) Africa. 1.
E. anguitimens, Smith. (Chaetoblemma leucocephala, Sw.) *Ill. Zool. S. Afr.* fig. bona. - Rüpp. *Syst. Uebers. Vög.* t. 27. ex Afr. mer. et or. Schoa. Major: fuscocinereus: macula utrinque auriculari, caudaque nigricantis: pileo, uropygio, corpore que subtus, albis.
778. **Falcunculus**, Vieill. 1816. Australia m. 3.
1. **LANIUS frontatus**, Lath. (Falcunculus frontatus, Vieill. T. flavigulus? Gould 1837. jun.) *Pl. col. 77.* - *Gal. Ois.* t. 137. - Lewin. *B. N. Holl.* t. 26. ex Austr. m. or.
* 2. **F. gouldi**, Caban. (frontatus, Gould.) *Austr. II.* t. 79. ex Austr. m. or. Minor: crista recumbente; genis anguste nigris: scapularibus, rectricibusque alto-marginatis: cauda magis rotundata.
3. **F. leucogaster**, Gould, *Austr. II.* t. 80. *Austr. m. occ.*
779. **Oreolea**, Gould, 1837. (Falcunculus, p. Gr.) Australia. 1.
TURDUS cristatus, Lewin. (Falcunculus gutturalis, Horsf. *Oreोica gutturalis*, Gould.) *B. of New-Holl.* t. 9. - Gould, *Austr. II.* t. 81. ex Austr.

780. **Colluricincla**, Vig. 1825. (Colluricisoma, Sie.) Australia. 7.

1. **TURDUS harmonicus**, badius et dilutus, Lath. (Certhia canescens, Lath. - Turdus dilutus, Lath. - Lanius saturninus, Nordmann. - Colluricincla cinerea, Vig. C. strigata, Sie. jun. - C. harmonica, Gr.) Jard. et Selb. Ill. Orn. t.71. - Gould, Austr. II. t.75. ex Austr. occ.
2. **C. rufiventris**, Gould, Austr. II. t.75. ex Austr. occ.
3. **C. brunnea**, Gould, Austr. II. t. 76. ex Austr. s.
4. **C. selbyi**, Gould, (rectirostris? Jard. et Selb.) Ill. Orn. n. s. t. 32 - Austr. II. t. 77. ex Tasmania.
5. **C. parvula**, Gould, Austr. II. t. 78. ex Austr. s.
6. **C. rufigaster**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1844. p. 80; ex Austr. or.
7. **C. fusca**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1835. p. 6. Patr. incert.

*781. **Chaunonotus**, Gr. Africa. 1.

- C. sabini**, Gr. Mag. Nat. Hist. IX. p. 489. cum fig. capit. Jard. et Selb. Ill. Orn. n. s. t. 27. ex Afr. occ.

*782. **Xenopirostris**, Bp. ex Lafr. (Vanga, p. Lafr.) Madagascar. 1.

- * **VANGA XENOPIROSTRIS**, Lafr. (**Xenopirostris lafresnayi**, Bp.) Rev. et Mag. Zool. 1850. p. 107. t. 1. 1. 2. ex Madagascar. Cinereus; subitus, cum semicollare, albus: capite, remigibusque coracino-nigris.

783. **Vanga**, Vieill. 1816. Afr.m.Madag. 3.

1. **LANIUS curvirostris**, L. (Thamnophilus leucocephalus, Vieill.) Pl. enl. 328. ex Madagascar.
2. **LANIUS olivaceus**, Vieill. (Laniarius olivaceus, Gr. Vanga olivaceus, Lafr.) Vieill. Gal. Ois. t. 139. Mad.
- 3? **V. cruenta**, Less. Cent. Zool. t. 65. ex Madag.

784. **Pityriasis**, Less. (Cracticus, p. Gr.) Oceania. 1.

- BARITA gymnocephala**, Temm. Pl. col. 572. ex Borneo.
Niger: capite nudo: collo undique, tibiisque coccineis.

785. **Cracticus**, Vieill. (Barita, Cuv. - Vanga? Temm.) Oceania. 6.

1. **CORACIAS varia**, Gm. (Barita sonneratii, Less. - Cracticus cassicus! Gr. ex Bodd. - Barita varia, Temm.) Pl. enl. 628. Shaw, Nat. Misc. t. 781. ex Nova Guinea. Niger; uropygio, abdomineque latissime, albis; alis; caudaque albo nigro variis.

2. **LANIUS robustus**, Lath. (*Vanga nigrigularis*, Gould.
Cracticus varius, Vig. - *Cr. nigrigularis*, Blyth.) *Gould*,
Austr. II. t. 49. *ex Austr.* m.
3. **C. picatus**, Gould, 1845. *Austr.* II. t. 50. *ex Austr.*
4. **C. argenteus**, Gould, 1840. *Austr.* II. t. 51. *ex Austr.*
5. **LANIUS torquatus** et curvirostris, Lath. (*Vanga des-
tructor*, Temm. - *australis*, Steph. - Cracticus torquatus,
Blyth.) *Gould*, *Austr.* II. t. 52. *ex Austr.* or. et m.
6. **VANGA cinerea**, Gould, 1835. (Cracticus cinereus, Gould.)
Austr. *Intr.* p. 35. sp. 95. *ex Tasmania*. *Similis*
praeceps, *sed rostro valde longiore*, *et dorso adulti cinereo!*
7. **C. leucopterus**, Gould, *Intr.* p. 35. sp. 96. *ex Austr.*
o.c. *Similis* Cr. destructor; *sed litura alba alarum latiore*
et magis definita.
8. **C. quoyi**, Gould *ex Less. Coq.* t. 14. - *Austr.* II. t. 53.
Quid Cracticus melanoleucus, Vieill. *ex Lath. Icon. ined.* II. t. 83?

FAMILIA 52. GARRULIDAE.

SUBFAM. 109. BARITINAE.

786. **Barita**, Cuv. 1817. p. (Cracticus, Vieill. 1816. - *Gymnorhina*, Gr. 1840.) Australia. 3.
1. **CORACIAS tibicen**, Lath. (*Gymnorhina tibicen*, Gr.) *Gould*, *Austr.* II. t. 46. *ex Austr.* o.c.
 2. **B. tibicen**, Quoy et Gaim. (*Gymnorhina leuconota*, Gould.) *Voy. Coq.* t. 20. - *Austr.* II. t. 47. - *Gr. et Mitch.* Gen. B. t. 73. *ex Austr.* m.
 3. **GYNNORHINA organicum** et Cracticus hypoleucus, Gould. (*Gymnochina organica*, Gr.) *Austr.* II. t. 48. *ex Tasmania*.
787. **Strepera**, Less. 1831. (*Coronica*, Gould. 1837.) Australia. 5.
1. **CORACIAS strepera**, Lath. (*Corvus strepera*, Leach. - *C. graculinus*, Shaw. - *Barita strepens*, Merr. - *Strepera graculina*, Gr.) *White*, *Botany Bay.* t. p. 251. *Leach*, *Zool. Misc.* t. 86. - *Lev. Parad.* t. 24. - *Gould*, *Austr.* II. t. 42. *ex Austr.* or. m.
 2. **S. fuliginosa**, Gould. 1836. - *Austr.* II. t. 43. *Austr.*
 3. **S. arguta**, Gould. 1840. - *Austr.* II. t. 44. *ex Austr.*

4. *S. anaphonensis*, Temm. (*Corvus versicolor?* Lath.)

C. fuliginosus, Brehm. - *Strepera cinerea tel plumbea*, Gould. - *Cracticus cuneicaudatus*, Vieill. - *Gymnorhina anaphonensis et Strepera versicolor*, Gr.) Less. Compl. Buff. t. 47. 1. - Austr. ii. t. 45. ex Austr.

5. *S. melanoptera*, Gould, Pr. Zool. Soc. 1848, p. 20.
Introd. Austr. p. 34. sp. 87. ex Austr. m. *Simillima* Str. argutae; sed alis omnino albo destitutis.

788. **Phonygama**, Less. (*Chalybaeus*, Cuv.) N. Guinea. 3.

1. *PARADISEA viridis*, L. (*Cracticus chalybaeus*, Vieill.-Chalybaeus paradiseus, Cuv. - *Manucodia chalybaea*, Bodd.) Pl. enl. 634. - Lev. Parad. t. 23. ex N. Guinea.

2. *Ph. kerawrensi*, Less. (*Chalybaeus coronatus*, Cuv. *Phonygama lessonia*, Sw.) Voy. Coq. Ois. t. 13. - Compl. Buff. t. 7. ex N. Guinea.

3. *Ph. atra*, Less. (*Cracticus versicolor?* Vieill.) Voy. Coq. Zool. i. p. 638. ex N. Guinea.

SUBFAM. 110. GLAUCOPINAE.

789. **Glaucopis**, Gm. 1788. (*Callaeas*, Gr. ex Forst.) N. Zelandia. 2.

1. *Gl. cinerea*, Gm. (*Callaeas cinerea*, Forst. - *Cryptorhina callaeas*, Wagl.) Daud. Orn. t. 21. - Vieill. Gal. Ois. t. 93. - Voy. Astral. Ois. t. 15. ex N. Zeland.

* 2. *Gl. wilsoni*, Bp. (*Glaucopis nova species*, Wils. in litt.) Mus. Wils. Philad. Minor: *carunculis cyaneis*.

790. **Conostoma**, Hodg. 1842. (*Parus!* p. *Hodgs.* 1844.) Asia centr. 1.

C. aemodium, Hodg. Journ. As. Soc. Bengal. 1842. p. 857. cum fig. ex *Nepal*. *Rufo-griseum, subtus griseo-cinereum: rostro flavo: pedibus nigricantibus*.

791. **Struthidea**, Gould. (*Brachystoma*, Sw.) Affinis Cor-

coraci et Grallinae! sed rostrum validum, bre-

vissimum.

Australia. 1.

Str. cinerea, Gould, Austr. iv. t. 17. Austr. m. et or.

792. **Cryptorhina**, Vieill. (*Temia, Cur.* - *Phrenotrix, Horsf.*) Asia m. Oc. 3.

1. **Corvus varians**, Lath. (*temia, Daud.* - *Corvus caudatus*,

Shaw. - *Cryptorhina varians, Vieill.* - *Glaucopis varians, Temm.* - *Cryptorhina varians, Wagl.* - *Phrenotrix temia, Horsf.* - *Temin lévaillantii, Less.*) *Zool. Res. Java, t. 7.* - *Nat. Misc. t. 561.* - *Lev. Afr. t. 56.* *Vieill. Gal. Ois. t. 100.* ex *As. m. Malaisia.*

2. **Glaucopis leucoptera**, Temm. (*Cryptorhina leucoptera*,

Wagl. - *Temnurus leucopterus, Blyth.*) *Pl. col. t. 265.* ex *Penins. Malacca, Sumatra.*

3. **Glaucopis aterrima**, Temm. (*concolor, Müll.*) *Pl. col. fig. nulla.* ex *Borneo.*

793. **Temnurus**, Less., nec Sw.

As. m. Malaisia. 1.

Glaucopis temnurus, Temm. (*Cryptorhina temnura, Wagl.*

T. truncatus, Less.) *Pl. col. 337.* ex *Asia m.*

794. **Ptilostomus**, Sw. 1837. (*Cryptorhina, Wagl.*) Africa. 2.

1. **Corvus senegalensis** et ater, L. (*piaiae, Daud.* - *Co-*

racias nigra, Lath. - *Pica nigra, Sundev.* - *Ptilostomus senegaleensis, Sw.* - *Cryptorhina piaiae, Wagl.*) *Pl. ent. 538.* - *Lev. Afr. t. 54.* ex *Afr. occ. et Sennar.*

2. **Cryptorhina poecilorynchos**, Wagl. *Syst. Av. sp.*

2. ex *Afr. occ. Senegambia.* *Rostroflavido, apice tantum nigro.*

795. **Dendrocitta**, Gould. 1833.

As. m. Oc. 6.

1. **Coracias vagabunda**, Lath. (*Pica vagabunda, Wagl.*

P. rufiventris, Vieill. - *Corvus rufus, Scopoli.* - *Dendrocitta rufa, Blyth, Cat. sp. 463.)* *Lev. Afr. t. 59.* - *Gould, Cent. Himal. B. t. 42.* ex *India univers.*

2. **D. leucogastra**, Gould, *Proc. Zool. Soc. 1833. p. 37.* *Trans. Zool. Soc. 1. t. 12.* ex *Niigheris.*

3. **CORVUS SINENSIS**, Lath. nec Bodd. (*Dendrocitta sinensis, Blyth, Cat. sp. 446.)* *J. Gr. Ill. Ind. Zool. fig.* - *Gould, Cent. Himal. B. t. 43.* ex *Asia centr. et or.*

4. **Cryptorhina altirostris**, Blyth, 1839. (*Dendrocitta frontalis? MacClell. 1839.* - *Dendr. altirostris, Blyth, 1843.)* *Journ. As. Soc. XII. p. 932.* ex *Asia m. Si-kim, Assam.*

5. **D. frontalis**, MacClell. *Pr. Zool. Soc. 1839. p. 163.* *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 75.* ex *As. centr.*

6. **Glaucopis occipitalis**, Müll. *Tijdschrift voor Nat. 1835. p. 343. t. 5. 1.* ex *Sumatra.*

5. Maii. 1850.

SUBFAM. III. PTILORHYNCHINAE.

796. **Chlamydera**, Gould. (antea Calodera, Gould.) Australia. 2.

1. **C. nuchalis**, Jerd. (Chlamydera nuchalis, Gould.)

Ill. Orn. t. 103. - Gould, Austr. iv. t. 9. ex Austr. s.

2. **C. maculata**, Gould, B. of Austr. iv. t. 8. ex Austr.
praeceps m. et or.

797. **Ptilorhynchus**, Kuhl, nec Less. (Kitta, Less. vix Temm.

nec Kuhl-Kitta.p. Temm.nec Corapica vel Chlorosoma, Auct.) Australia. 3.

1. **Pt. holosericeus**, Kuhl (macleayi, Vig. et Horsf.

*Corvus squamulosus, Illig. jun. - Pyrrhocorax violaceus,
Vieill. - Kitta holosericea, Temm. Less.) Pl. col. 395.*

- mas. 422. faem. - Gould, Austr. iv. t. 10. ex Austr. or. m.

2. **Pt. smithi**, Vig. et H. (Kitta virescens? Temm.) Pl.
col. 396? mas. Gould, Austr. iv. t. 11. ex Austr. or. m.

3. **Kitta buccoides**, Müll. Pl. col. 575. ex N. Guinea.

798. **Kitta**, Kuhl. Genus 316. *hujus Conspectus p. 166.* mi-

nime inter Volucres numerandum! cuius secundae

speciei, **Kitta speciosa**, inter synonyma adde:

*Cissa! pyrrhocyanæ! Gould!!! ex Licht!!!! Birds of Asia.
fig. bona.*

799. **Garrulax**, Less. (Garrulaxis, Lafr. - Janthocinela, p.

Gould.) Alæ elongatae; cauda modica.

Asia, Ocean. 10.

1? **G. belangeri**, Less. Zool. Voy. Belanger. t. 4. ex

*Tenasserim, Pegu. Simillimus sequenti; sed colore
rufo dorsum abdominemque tingente.*

2. **Corvus leucolophus**, Hardw. (Garrulax leucolophus,

Blyth, Cat. 482.) Gould, Cent. Him. B. t. 18. ex As-
sam, Arak. Major: rufo-olivaceus; capite cristato, collo,
juguloque albis, rufo-cinetis; vitta utrinque oculari lata nigra.

* 3. **G. bicolor**, Müll. (Cinclosoma bicolor, Temm.) Mus.

Lugd. ex Sumatra. Similis praeced. sed minor, et co-
lore nigricante loco rufi distinctus: fronte nigra.

4. **Lanius chinensis**, Scopoli. (Turdus shanhu et melano-

pis, Gmel. - Corvus auritus, Daud. - Crateropus leuco-

genys, Blyth. - Garrulax shanhu, Gr. - chinensis, Blyth.)

Sonn. Voy. t. 107. - Lev. H. N. Roll. t. 43. ex As. or.

5. **Turdus perspicillatus**, Gm. (Garrulax perspicillatus,

Gr.) Pl. ent. 604. Mus. Lugd. et Berol. ex China,

Wam poa. Plumbeo-olivaceus, subtus dilutior; abdomine
albido; criso rufescente: fronte, superciliis, genisque nigris.

6. **TURDUS PERSPICILLATUS**, Temm. nec Gm. (Crateropus *rufifrons*, Sw. - Garrulax *rufifrons*, Less.) Zool. Voy. Belanger, fig. ex Jav. a. *Rufo-olivaceus; subtus dilutior, abdomine, crissosque concoloribus; fronto, et loris latissimis, nigris.*
7. **JANTHOCINCLA albicularis**, Gould. (Cinclosoma albicula, Hodgs. - Garrulax albicularis, Blyth, Cat. 481.) ex Himal. Simla. Major: *rufo-olivaceus; fronte rufescente; gula candida; abdomine a pectori olivaceo ad flavo-ferrugineum deveniente; rectricibus lateralibus albo-terminatis.*
8. **JANTHOCINCLA pectoralis**, Gould. (Cinclosoma grisauris, Hodgs. - Garrulax pectoralis et melanotis var. Blyth.) Journ. As. Soc. XII. p. 149. ex Nepal, Arakan. Major: *rufo-olivaceus; cervice rufescente; subtus albus, torque pectorali nigro: auriculis argenteis: rectricibus lateralibus nigro alboque terminatis.*
- *9? **G. uropygialis**, Caban. in Ersch et Gruber, Enc. 1850. ex Assam. *Simillimus precedentem; sed alis obscurioribus, europygio rufescente, nec concolare.*
10. **CINCLOSOMA moniliger**, Hodgs. (Janthocinela pectoralis, MacClell. nec Gould. - Garrulax macclellandii, Blyth) Journ. As. Soc. XII. p. 949. ex Assam, Arakan. Minor: *rufo-olivaceus; subtus atbus, lateribus rufis, torque jugulari angusto, nigricante: auriculis nigris; superciliis albis; rectricibus lateralibus nigro alboque terminatis.*
800. **Janthocincla**, Gould. (Garrulax, p. Gr. Blyth. - Turdus et Cinclosoma, Temm.) Cauda elongata: alae breves. As. m. Malajas. 7.
1. **CINCLOSOMA ocellatum**, Vig. (Garrulax ocellatus, Blyth, Cat. 488.) Gould, Cent. Himal. B. t. 15. ex Darjil.
 2. **CINCLOSOMA caeruleatum**, Hodgs. (Garrulax caeruleatus, Blyth, Cat. 487.) As. Res. xix. p. 147. ex Darjiling.
 3. **J. rufigularis**, Gould. (Cinclosoma rufimenta, Hodgs. Garrulax rufigularis, Blyth, Cat. 489) Pr. Zool. Soc. 1845. p. 187. ex Nepal, Darjiling.
 4. **J. ruficollis**, Jard. (lunaris, MacClell. - Garrulax ruficollis, Blyth, Cat. 496.) Selb. Ill. Orn. 2. ser. t. 21. ex Assam. Darjiling.
 - *5. **TIMALIA palliata**, Müll. (Cinclosoma palliata, Temm.) Mus. Lugd. ex Sumatra. *Fusco-phambea; dorso, aliisque olivaceo-rufis; crissosque fusco-olivaceis.*
 6. **TIMALIA mitrata**, Müll. (Garrulax mitratus, Gr.) Tüd. schr. voor Nat. 1835. p. 345. tab. 5. 3. ex Sumatra. *Fusco-grisea; pileo, crissosque rufis; alarum litura alba: rostro, pedibusque flavis.*

7. **TIMALIA lugubris**, Müll. (Garrulax lugubris, Gr.) *Tijdschr. voor Nat.* 1835. p. 344, tab. 5. 2. *ex Sumatra.*
Nigro-olivacea; facie nigerrima: spatio postocularre denuo dato: restro flavo: pedibus nigris.

801. **Trochalopteron**, Hodgs. 1844. Alae brevissimae, rotundatae.

Asia centr. 3.

1. **IANTHOCINCLA squamata**, Gould, 1835. (Cinclosoma melanura, Hodgs. - Garrulax squamatus, Blyth, Cat. 490.) *Jerd. et Selb. Ill. Orn.* 2. ser. t. 4. *ex Darjil.*
2. **IANTHOCINCLA phaenicea**, Gould. (Craterops paniceps, Blyth. - Trochalopteron phaeniceum, Gr. - Garrulax phaeniceus, Blyth, Cat. 497.) *Icon. Av.* fig. bona. *ex As. centr.* *Castaneo-olivaceus; genis, crissu, remigibus marginis externo, rectricibusque apice, rubris.*
3. **T. subunicolor**, Hodgs. *Journ. As. Soc. Beng.* 1843. p. 952. *ex Asia centr. Darjiling.*

802. **Pteroccyclus**, Gr. 1840. (Garrulax, p. Blyth.)

Asia centr. 7.

1. **CINCLOSOA erythrocephalus**, Vig. (Crateropus erythrocephalus, Hodgs. - Garrulax erythrocephalus, Blyth. Pteroccyclus erythrocephalus, Gr. ex Vig.) *Pr. Zool. Soc.* 1831. p. 171. - *Gould, Cent. Him. B.* t. 17. *ex Nepal. Maseri.* *Olivaceous; pileo, cerviceque rufis; pectore et interscapulo nigro-maculatis; gula nigra: remigibus canis, externe, ut rectrices, virescentibus.*
2. **CINCLOSOA lineatum**, Vig. (Trochalopteron setiferum, Hodgs. - Garrulax lineatus, Blyth, Cat. 590. - Pteroccyclus setifer, Gr.) *As. Res.* xix. p. 148. *Mus. Berol.* *ex Himal. Minor:* *viridi-cinereus, nigro rufoque varius: rectricibus apice canis: rostro setis rigidis instructo.*
3. **GARRULAX imbricatus**, Blyth, *Journ. As. Soc.* xii. p. 951. *ex Bootan.*
4. **CRATEROPUS cachinnans**, Jerdon. (lafresnayii, Delessert, Lafr. nec Jerd.) *Madr. Journ.* x. p. 255. t. 7. *ex Mont. Nilgheris.* *Fusco-rufus, subtus minus obscurus; sincipite, gulaque nigricantibus: superciliis latiss., antice albis.*
5. **CINCLOSOA variegatum**, Vig. (Garrulax abeillii, Less. G. variegatus, Gould.) *Cent. Him. B.* t. 16. *ex Simla,* *Nepal. Cinereus; alis, caudaque ferrugineis, nigro-variis; gula alba, medio nigra.*
6. **IANTHOCINCLA chrysoptera**, Gould. (Garrulax chrysopterus, Blyth. - Pteroccyclus, Gr.) *Pr. Zool. Soc.* 1835. p. 48. *ex Darjiling, Nepal.*

7. **GARRULAX affinis**, Hodgs. (Pterocyclos affinis, Gr.)
Journ. As. Soc. xii. p. 950. ex Nepal, Darjil.

803. **Cutia**, Hodgs. Asia centr. 1.

C. nepalensis, Hodgs. *Journ. As. Soc.* xv. p. 772. et
xvi. p. 110. ex Darjiling.

804. **Malacocercus**, Sw. (Timalia et Garrulax, p. Gr). Asia centr. 9.

1. **TIMALIA nepalensis** vel leucotis et T. pelliotis, Hodgs.
(Malacocercus nepalensis, Blyth.) *As. Research.* xix.
p. 182. ex Nepal.

2. **TURDUS canorus**, L. (Merula bengalensis, Br. - Pastor
terrificolor, Hodgs. - Malacocercus bengalensis, Blyth, Cat. sp. 789. - M. orissae? Jerd. - M. striatus? Sw.) *Zool.*
Ill. 2. ser. t. 127. nisi griseus? - *Edw. B. t. 184. fig. mala.*
ex Asia centr. et mer.

3. **M. malabaricus** et somervillii, Jerdon, *Ill. Ind. Orn.*
fig. nulla. ex Malabar.

4. **TURDUS griseus**, Lath. (Malacocercus griseus, Blyth, Cat.
sp. 792.) *Jerd. Ill. Ind. Orn. t. 19. ex Carnatic. Region.*

5. **M. rufescens**, Blyth, *Journ. As. Soc.* xvi. p. 453.
ex Ceylon.

6. **TIMALIA malcolmi**, Sykes. (Garrulus albifrons, Hardw.
Malacocercus malcolmi, Blyth, Cat. sp. 794.) *Ill. Ind.*
Zool. II. t. 12. - Fraser, Zool. typ. fig. ex India m.
Cinereus, fronte albida; alis rufescensibus: rostro flavo.

7. **TIMALIA subrufa**, Jerdon. (paecilorrhyncha, Laf. - Ma-
lacocercus subrufus, Blyth, Cat. sp. 795.) ex India m.

8. **M. earlii**, Blyth. (geochrous, Hodgs.) *Journ. As. Soc.*
xiii. p. 369. ex Asia centr. et m.

9? **COSYPHUS caudatus**, Duméril, nec Megalurus isabellinus?
Sw. (Timalia chotortaea, Franklin, nec Bengalensis?
quae M. canorus. - Malacocercus caudatus, Blyth, Cat.
sp. 797.) ex Asia centr. et mer.

805. **Actinodura**, Gould. 1836. (Leiocinclia, Blyth. 1843.

Ixops, Hodgs. 1844.) As. centrali. 2.

1. **Act. egertonii**, Gould. (Leiocinela plumosa, Blyth.
Ixops rufifrons, Hodgs.) *Fraser*, Zool. typic. fig. bona.
ex Assam, Darjiling. Rufo-olivaceus; occipite crista-
tato, genisque cinereis: remigibus cinereis nigro-lineatis:
cauda brevis, valde gradata; rectricibus lateraliibus obsolete
nigro-lineatis, apice albo.

2. ***Act. nepalensis***, Gould. (Cinclosoma hinc Ixops nepalensis, Hodgs.) *As. Res.* xix. p. 145. ex *Darjiling*.
Rufo-olivaceus; pileo subcristato, fuscus, albido-striato: remigibus rufis, nigro-lineatis: cauda brevi, rotundata tantum; rectricibus nigris, rufo-striatis, apice albo.

806. ***Oriolita***, Is. Geoffr. St. Hilaire. Madagascar. 1.
O. bernieri, Geogr. Mag. Zool. 1839. Ois. t. 4. Madagasc.

807. ***Otagon***, Mus. Lugd. (Turnagra, Less? nec Blyth.) Ocean. 1.
Loxia turdus, Forst. (*Turdus crassirostris*, Gm. Lath.
Tanagra capensis, Sparrm. - T. macularia, Quoy et Gain. - Campephaga ferruginea? Vieill. - Ceblepyris! capensis, Blyth.) *Mus. Carls.* t. 45. - *Voy. Astrol. Ois. t. 7. 1. ex Nova Zeland.* Olivaceus, pileo fuscescens; tectricum alarum apicibus, rectricibusque lateralibus, rufis: subtus albus, plumis viridi-marginatis.

808. ***Keropia***, Gr. 1840. (Turnagra, Blyth, nec Less. - Garrulus, p. Vig.) Asia centr. 1.
GARRULUS striatus, Vig. (Turnagra! striata, Blyth, Cat. 490. - Gould, Cent. Himal. B.t. 37. ex *Darjiling*. Rufo-olivacea, pileo, alis, caudae magis rufescentibus; subtus cinereo-virens: plumis omnibus rachide alba.

SUBFAM. 112. GARRULINAE.

809. ***Lophocitta***, Gr. 1840. (Platylophus, Sw. 1837.) Malasia. 3.
1. ***CORVES galericulatus***, Cuv. (*Lanius capulatus*, Licht. coronatus? Raffles. faem. - Vanga cristata, Griff. - Pica galericulata, Wagl.) *Anim. Kingd.* i. t. p. 486. - *Levaill. Parad.* t. 42. ex *Java*. Major: nigra, collari nullo; macula utrinque in collo magna, supraoculari parva, alba.
* 2. ***GARRELUS histrionicus***, Müll. (rufulus, Temm. - Lophocitta histrionica, Bp.) Fig. nulla. *Mus. Lugd.* ex *Sumatara*, Bornéo. Minor: fuscо-ferruginea, collari nigro; macula utrinque in collo magna, supraoculari parva, alba.
* 3. ***L. ardesiaca***, Cabanis, Mus. Heine, Halberstadt. ex *Java*? Media: griseo-ardesiaca, capite caudoque nigrantibus, collari nullo: macula utrinque in collo magna, supraoculari parva, albis.

810. **Perisoreus**, Bp. (Dysornithia, Sw.) Eur. As. Am. s. 2.

1. **Lanius insfaustus**, L. (Corvus sibiricus, Bodd. - russicus, Gm. - mimus, Pall. - Garrulus ferrugineus? Bechst.

Pica infasta et ferruginea? Wagl.) Pl. enl. 608.

Sparrm. Mus. Carls. t. 76. - Lev. Parad. t. 47. et 48.

Gould, Eur. t. 215. - Susem. Eur. Vög. II. t. 6. a. 2.

ex Eur. bor. or. As. s.

2. **Corvus canadensis**, L. (Garrulus fuscus, Vieill. - brachyrhynchus, Sw. jun. - Coracias mexicanus? Temm.

Pica nuchalis, Wagl.) Pl. enl. 530. - Wils. Am. Orn.

t. 21. i. - Richards. Faun. Bor. Am. t. 55. jun. - Aud.

Am. t. 107. ex Amer. bor.

811. **Garrulus**, Br. (Pica, p. Wagl.) Eur. As. Afr. 8.

1. **Corvus glandarius**, L. (Pica glandaria, Gesn. - Garrulus, Br.) Pl. enl. 481. - Lev. Parad. t. 40. 41. - Gould,

Eur. t. 214. ex Europa occ. s. et m. ab Hispania ad

Graeciam. Cinereo-vinaceus, dorso orbitisque concoloribus:

pileo albo-cinereo, plumis elongatis medio nigris; genis
rufescitibus; gula juguloque albis; remigibus primariis extra
ad basim albis; secundariis obsolete caeruleo-fasciatis;
rectricibus nigris subfasciatis. Major: rostrum validum.

2. **G. japonicus**, Schlegel. (glandarius var. an nov. species?

Patrie ignotae, De Filippi, Cat. Mus. Mediolan. 1844.

sp. 18.) Faun. Japon. t. 43. ex Japon. Similis praecedenti; sed minor et obscurior, aitis caudaque brevioribus; pi-
leo albo-cinereo maculis nigris expansis: orbitis, toris, remi-
gibusque primariis extra ad basim, nigris; secundariis caeruleo
nigroque distincte fasciatis; rectricibus subunicoloribus.

3. **G. melanoccephalus**, Bonelli. (atricapillus, Geofr.

iliceti, Mus. Berol. - Pica stridens, Ehrenberg.) Gené,
Mem. Acad. Taur. xxxvii. t. 1. - Levaill. jun. Expl.

Alger. t. 6. ex Afr. s. Arabia, Syria. Cano-vi-
naceus, dorso orbitisque concoloribus: pileo nigro, plumis vix
elongatis: cervice rufo-castanea; gula, genisque albis: subtus
albido-cinereus: caeruleo alarum dilutiore, minus extenso:
rectricibus mediis omnino fasciatis. Minor (Long. 12½.
Alae 6½. Cauda 5' 8''): rostrum minus validum.

4. **G. krynickii**, Kalenichenko, 1839. (iliceti, Mus.

Lugd. - melanocephalus, Schlegel, nec Bonelli. - Garrulus
glandarius melanocephalus, Faun. Jap. - G. glandarius var.

pileo nigro, Hohenacker.) Susemihl, Eur. Vög. II. t. 6.
ex Asia occid. et Eur. axim. or. Regionibus

caucasicis, Persia bor. Ucrania, Daouria?

Cri mea! Cinereo-vinaceus, dorso orbitisque concoloribus:

pileo nigro, plumis elongatis: cervice unicolo: gula, genis,
juguloque rufo-cinereis: subtus albido-vinaceus: rectricibus

mediis ad basim tantum fasciatis. Major: rostrum validum.

5. *G. brandtii*, Eversm. - Hartlaub, Rev. Zool. 1845.

ex Sibiria, Altai. Vinaceo-rufus; dorso cano; orbitis nigris; abdomino cinnamomeo-canescens; pilo rufo-cinnamomeo, plumis elongatis, maculato; remigibus secundariis externe candidis; rectricibus ad basim tantum obsolete caeruleo-fasciolatis.

6. *G. bispecularis*, Vig. (ornatus, J. Gr.) Ill. Ind. Zool.

t. 10. - Gould, Cent. Himal. B. t. 38, ex As. centr. Himalaya, Nepal. Cinereo-cinnamomeus, dorso orbitisque concoloribus; pileo immaculato, plumis vix elongatis; remigibus secundariis (uti tectrices minores) nigro-caeruleoque fasciolatis.

7. *G. lanceolatus*, Vig. (gularis adult et vigorsi jun. J.

Gr.) Ill. Ind. Zool. t. 10, adult et ♀. jun. - Gould, Cent. Himalay. B. t. 39, 40, ex Asia centr. Himal. Nepal. Cane-vinaceus; pileo, genisque nigris; gula jugulo nigricantibus, plumis lanceolatis, rachidibus albis; tectoricum alarum minorum exterioribus candidis, corpori proximiioribus nigerrimis, absque fasciis; remigibus rectricibus alba. Rostrum breve, parum compressum.

*8. *G. lidthi*, Bp. Museum Lidth de Jeude, Utrecht.

ex Asia orientali. Rufo-vinaceus; capite colloque ex totis, aliis, rectricibusque, saturate azureis; fronte lorisque nigricantibus; plumis gulae lanceolatis, barbulis disjunctis, rachidibus albis; tectoriculus alarum nigro-fasciolaris; remigibus, rectricibusque apicem versus, nigricantibus, apice ipso albo; cauda elongata, aequali. Rostrum longum, altum, valde compressum.

Pulcherrimum **Garrulorum** dico libenter munificentissimo D. Lidth de Jeude, indefesso et illuminato Collectoris, qui vel Elephontorum et Hippopotamorum foetus in vitreis amphoris conservavit et exposuit!

*812. *Cyanogarrulus*, Bp. (Cyanocorax, p. Boie. - Cyanurus,

p. Sw.) Cristati: cauda brevi: rostro brevi, compresso.

Ad Garrulos *Orbis Antiqui* accedunt! America sept. 4.

1. *Corvus cristatus*, L. (Garrulus cristatus, Auct. - Pica

cristata, Wagl. - Cyanocorax cristatus, Boie. - Cyanurus cristatus, Sw. - Cyanocitta cristata, Strickl.) Pl. ent.

529. - Catesb. Carol. I. t. 15. - Edw. B. t. 239. I.

Lecaill. Parad. t. 45. - Wils. Am. Orn. t. I. I. - Aud.

Am. t. 102. ex Amer. s. or. Dilute caeruleus; subtus

albus, collaris nigricante: tectoriculus alarum majoribus, remigibus secundariis, rectricibusque lateribus, apice albis.

2. **GARRULUS coronatus**, Sw. (mexicanus, Licht. nec Gm.)

Jard. et Selb. Orn. Ill. t. 64. ex Mexico sept.
Longit. 11-pollic. - Al 5½-poll. - Caud. 5. Ex toto caeruleus, dorso tantum subcinerascens; capite obscuriore, sed cum crista caerulecente; litura frontali et superciliis albo-caeruleis; gula albicans: remigibus rectricibusque caeruleo-concoloribus obsolete fasciatis. Adult. capite nigricante. Jun. capite etiam caeruleo.

*3. **C. diadematus**, Bp. Mus. Darmstadt. ex Mexico mer. Zootecas. Long. 11-pollic. Al. 5½. - Caud. 5. Cinereus; uropygio abdomineque late caeruleis: pileo, crista elongata, nigerrimo, litura utrinque frontali caeruleo-argentea: remigibus secundariis, rectricibusque cyaneis nigro conspicue fasciatis.4. **CORVUS stelleri**, Pall. (Pica stelleri, Wagl. - Garrulus stelleri, Auct. - Cyanurus stelleri, Sw. - Cyanocorax stelleri, Boie.) Bp. Am. Orn. t. 13. 1. - Sw. et Richards. Faun. Bor. Am. t. 54. - Aud. Am. t. 362, 2. ex Am. bor. occ. Major (Long. ultra pedal. - Al. 6-poll. - Cauda 5½.) Rostrum longum, robustum. Nigrans, capite et crista utipectus et dorsum nigricantibus, fronte et superciliis concoloribus: uropygio, abdomineque latissime cinereo-caeruleis: remigibus, rectricibusque cyaneis rix fasciolatis.*813. **Cyanocitta**, Bp. ex Strickl. (Cyanocorax, p. Gr.) Capite laevi.

America. 12.

a. *Garrulinae.*1. **CORVUS floridanus**, Bartr. (Garrulus floridanus, Bp. caerulescens et cyanus? nec melanogaster! Vieill. - Pica caerulescens et cyanochlora? Wugl. - Cyanocorax floridanus, Auct.) Ler. Parad. t. 44? - Bp. Am. Orn. t. 1. 1. Aud. Am. t. 87. ex calidior. Am. s. or. Florida. Caerulea, dorso cinerascens; superciliis nullis; subtus albo-cinerascens: gula jugule quo allo caeruleaque varii, collaris und definito: remigum secunda elongata, quarta omnium longissima.2. **GARRULUS californicus**, Vig. (palliatus, Drapiez. ultramarinus, Aud. nec Bp. - Cyanocitta superciliosa, Strickl. - C. californica, Bp.) Zool. Beach. Voy. t. 5. Audub. Am. t. 362. 3. ex California. Similis praeced. sed superciliis allo-caeruleis! Cyaneus, dorso rufo-cinereo; subtus allo-rufescens; gula jugule quo ab his, collaris caeruleo satis definito; remigum secunda brevi; quinta omnium longissima. Jun. superciliis obsolete caeruleis jugulo cinereo.

3. GARRULUS *ultramarinus*, Bp. Pl.col.439. ex Mexico.

Caerulea, dorso r̄ix cinerascente: subtus alba; pectore griseo-
cente immaculato, collaris ne suspicione quidem; plumulis na-
rium caeruleis: loris nigricantibus: alis longiusculis: cauda
elongata, aequali. Longit. 11-poll. - Alt. 6 $\frac{1}{2}$.

4. PICA *sieberi*, Wagl. (*Corvus azureus*, Licht. nec Temm.
Mus. Berol. - *Garrulus sordidus*, Sw.) Zool.Ill.n.s.t.86.
ex Mexico. Simillima praecedenti; at major et cauda
rotundata.5. CYANOCORAX *unicolor*, Dubus 1847. (concolor, Cassin.
1848.) Esq. Orn.t.17. ex Mexico. Minor: intense et niti-
de cyanea infra supraque: remigibus nigris, externe cyaneis,
subtus obscure cinereis: cauda rotundata, inferne nigricante.6. CYANOCORAX *nanus*, Dubus 1848. Esq. Orn. t. 25. Mi-
nima: caerulea; fronte, superciliis, gulaque albo-caerules-
tibus; genis, et capistro nigris.7. CYANOCORAX *pumilio*, Strickl. Contr. Orn. 1849. cum fi-
gura. ex Guatimala. Minima: caerulea; superciliis
antice confluentibus caeruleo-argenteis; fronte, loris, gula-
que nigris.

b. Cyanocitta.

8. CYANOCORAX *armillatus*? Gr. (*Cyanurus* nigritorques?
Lafr.) Gr. et Mitch. Gen. B. t. 74. ex S.ta Fe de Bo-
gota. Azurea; capite et gula cyaneis; fronte, genis et col-
lari (minime armillis!) nigris: alis, caudaque brevi, valde cu-
neata, viridi-fuscentibus: remigibus, rectricibusque obso-
lete fasciolatis.9. GARRULUS *viridi-cyanus*, Orb. Voy. Am. m. Ois. t.
53. 1. ex Amer. m. Bolivia. Glauco-caerulea; capistro,
genis, juguloque nigris; vitta frontali, superciliis, et torque
pectoralis angusto, albis: cauda unicolor, elongata, rotundata.10. CYANOCORAX *melanocyaneus*, Hartl. (beachii! Mus.
Lugd.) Rev. Zool. 1844. p. 215. ex Guatimala. Mi-
nor: glauco-caerulea; subtus careruleo-violacea capite, collo,
juguloque nigris: cauda caerulea, subtus nigra: rostro, pedi-
busque nigris. Jun. rostro flavido.11. GARRULUS *beachii*, Vig. Zool. Beach. Voy. t.6. - Mag.
Zool. 1836. Ois. t. 72, ex Occid. Am. s. Califor-
nia. Montereale. Nigerrima; dorso, alisque glauco-
caeruleis: cauda cyanea: rostro pedibusque flavo-aurantii.
Jun. rostro capite, abdomen, rectricumque apicibus albis.
Forsitan a Cyanocorace azureo non disjungenda?*12? C. *crassirostris*, Bp. ex Mexico oriental i.
Similis praecedenti; sed rostro nigerrimo, multo robustiore;
dorsaque magis azureo, nec viridi-cyaneo.

13. **Pica ornata**, Less. (nuchalis, Aliq. - cyanicollis, Licht.)
Cyanocorax ornatus, Gr.) Rev. Zool. 1839. p. 41. ex
Mexico. Cyanea; capite colloque undique nigris; spatio
 magno nuchali albo-caeruleo elegantissime ornata.
- *813. **Cyanocorax**, Bp. ex Boie 1826. (*Cyanurus*, Sw. p. - Cyanocitta, p. Strickl.) America m. 3.
 1. **C. violaceus**, Dubus 1847. (*hyacinthinus*, Natter. Mus. Vienn. et Berol. - harrixi, Cassin. 1848.) Esq. Orn. t. 30.
 ex Peru, Venezuela. Laete azurro-violaceus; nucha
 sensim alboante: capite juguloque nigris: rostro pedibusque
 aterrimis.
 Nuchae colore affinitas cum *Uroleuca cayanensis* et *Cyanocitta ornata* demonstratur!
2. **Pica cyanomelas**, Vieill. (*cyanomelana*, Wagl. - Corvus oenas, Licht.) Azara 54. ex Parag. Bras. Cineoro-violaceus; capite pectoreque fuliginosis; plumulis frontis et tororum nigricante-holosericeis: rostro brevi, turgido.
3. **Corvus azureus**, Temm. (*Pica caerulea*, Vieill. ex Azara 55. - *P. azurea*, Wagl. - *cyanescens*, Licht. Mus. Berol.) Pl. col. 168. ex Brasil. Major: azureus; capite omnino, collo, pectoreque nigerrimis: remigibus, rectricibusque subtus nigricantibus.
- *814. **Uroleuca**, Bp. (*Cyanocorax*, p. Gr.) America m. 4.
 1. **Corvus cayanus**, L. (*Garrulus cayanensis*, Br. - mystacalis, G.S. - *Pica albicapilla*, Vieill. - *P. larvata*, Wagl. *Cyanocorax cayanus* et *C. mystacalis*, Gr.) Pl. enl. 373. Mag. Zool. 1845. t. 34. ex Brasil. Cayenna. Guayaquil. Cineoro-cyanea; capite, gula, pectoreque nigris: vitta utrinque suboculari (mystacali!), macula postoculari, nucha cum cervice, pectore, abdomine, rectricibusque lateralibus, alba.
2. **Corvus cyanoleucus**, Wied. (*splendidus*, Licht. - tricolor, Mikan. - cristatellus, Temm.) Pl. col. 193. - Delic. Faun. Bras. figura. ex Brasil. Fusco-caerulea: subtus alba: capite colloque ex totis fusco-brunneis: crista frontali e plurimis angustis, elongatis, recurvis: rectricibus ad medium usque caeruleis, ultra medium albis.
3. **Corvus cyanopogon**, Wied. (*Pica cyanopogon*, Wagl.) Pl. col. 169. ex Brasil. Brunea: loris, maculisque ocularibus cyaneis: subtus, cum nucha et cervice, rectricumque apicibus, alba; crista pileali e plurimis brevibus, latiusculis, rotundatis.

4. **Corvus pileatus**, Illig. Mus. Berol. (Pica chrysops,
Vieill. - P. pileata, Wagl. - Cyanocorax pileatus, Boie.)

Pl. col. 58. ex Parag. Brasil. Cyaneus; capite, colli
lateralibus pectoreque nigris: loris cyanis; maculis oculari-
bus, muchaque albo-cyanis: abdomine latissime, rectricum-
que apicibus albis; plumis occipitalibus nigris, holosericis.

* 815. **Xanthoura**, Bp. (Xanthocitta, Bp. in litt. - Cyanocorax, p. Gr.) Am. m. 3.

1. **Corvus peruvianus**, Gm. (yucas, Bodd. - Pica chloro-
notos, Wagl. 1827. - P. luteola, Less. 1831. - Cyanocorax
peruanus, Caban. - C. yucas, Gr.) Pl. enl. 625. - Lev.
Parad. t. 46. ex Peru, Bogota. Viridis; subtus fla-
vissima: pileo, cervice, maculaque utrinque oculari azureis:
vertice albo: superciliis, gula, juguloque nigris: cauda subcu-
ncta; rectricibus mediis caerulecentibus, lateralibus fla-
vissimis.

2. **GARRULUS luxuosus**, Less. (Cyanurus cyanocapillus,
Caban. p. - Pica chloronotos jun. Wagl. Isis 1839.
Cyanocorax luxosus, Dubus.) Faun. Peruan. p. 233.
Esq. Orn. t. 18. ex Mexico. Minor: viridissima; sub-
tus viridis: pileo cyaneo: crista fronte concolore: cauda mi-
nus gradata.

* 3. **X. guatimalensis**, Bp. (Cyanurus cyanocapillus,
Caban. p. - Pica chloronotos? Wagl. Isis 1829.) Mus.
Lugd. et Brux. ex Guatimala. Pileo cyaneo: abdo-
mine flavissimo.

* 816. **Cissiophaga**, Bp. (Cyanocorax, Gr. p.) Rostrum valde elon-
gatum: alae brevissimae: cauda mediocris, rotunda:
crista frontalis et plurim recurvis. Statura, rostro, mori-
bus, minime vero alis, ad Corvidas accedit! Mexico occ. 1.

GARRULUS sanblasianus, Lofr. (Geai de San Blas, Né-
boux. 1840. - Cyanocorax sanblasianus, Gr.) Mag. Zool.
1842. Ois. t. 28. ex California. Cyanea; capite cum
crista frontali recurva, collo, pectore, abdomineque nigris:
rostro albido, apice fuso.

817. **Cyanurus**, Bp. ex Sw. (Cyanocorax, p. Boie. - Calocitta hinc
Psilorhinus, p. Gr.) Rostrum nigrum: cauda longissima. Am. s. As. or. 4.

a. Americani.

1. **Pica bollocki**, Wagl. 1827. (miles, Licht. - formosa,
Sw. 1827. - gubernatrix, Temm. - Psilorhinus gubern-
atrix, Gr.) Pl. col. 436. ex Mexico or. Vera-Cruz.
Cinereo-cyanus; subtus cum genis albus, torque nigro: crista
frontali magna: rectricibus mediis modice elongatis; latera-
libus apice latissime albis.

2. **PICA collicei**, Vig. (*Garrulus ultramarinus*, Aud. nec Bp.

G. bullocki, Aud. nec Wagl. - *G. burnetti*, errore *burnetti*, *burnetti et bennetti*, J. Gr. - *Psilorhinus bullocki*, Gr.)
Zool. Beach. Voy. t. 7. - *Aud. Am. t. 96.* - *Quarto edit. t. 229.* ex *Mexico occ. California*. *Cyanescens*; *subtus albus*: *genis, gula, juguloque nigris: crista frontali magna: rectricibus mediis mirifice elongatis; lateralibus opice latissime albis.*

b. *Asiatici.*

*3. **C. dairi**, Bp. ex *Asia orientali*. *Cyaneus, subtus omnino albus: crista occipitali longissima: rectricibus mediis valde elongatis, omnibus apice nigris.*

*4. **C. cubo**, Bp. ex *Asia orientali*. *Cyaneus, subtus antice niger: crista nulla: rectricibus mediis valde elongatis, omnibus apice albis.*

818. **Biophorus**, Schlegel. (*Psilorhinus*, p. Gr.) Asia. 1.

B. paradisiacus, Schlegel. (*Psilorhinus paradisiacus*, Gr.) *Faun. Japon. Av. t. suppl. B.* ex *Asia or.*

819. **Calocitta**, Bp. ex Gr. 1841. (*Cissa*, Aliq. - *Calocitta hinc Psilorhinus!* p. Gr.) *Rostrum rubrum: cauda longissima. As. m. or.* 3.

1. **CUCULUS sinensis**, L. (*Corvus erythrorhynchus*, Gm. *Coracias melanoccephala*, Lath. - *Pica erythrorhyncha*, Vig. Gould. - *Psilorhinus occipitalis*, Blyth, Cat. 471. adult. - *Ps. albicapillus*, Blyth, jun.) *Pl. enl. 622.* - *Lev. Afr. t. 57.* - *Gould, Cent. Him. B. t. 41.* ex *Asia centrali. Mus. Berol.* ex Hoffmeister. *Caerulescens; subtus albida: capite, collo, pectoreque nigris: fascia occipitali alba: remigibus, rectricibusque caeruleis apice albis: his macula subapicali nigricante: rostro flavo.*

2. **PSILORHINUS magnirostris**, Blyth, *Journ. As. Soc. xv. p. 27.* - *Cat. Calo. Mus. 470.* ex *Montibus inter Arakan et Pegu.*

3. **PSILORHINUS flavirostris**, Blyth, *Journ. As. Soc. xv. p. 284.* - *Cat. Calc. Mus. 472.* ex *Cashmir.*

820. **Psilorhinus**, Rüpp. 1837. vix Gr! Mex. Am. m. 2.

1. **Corvus morio**, Licht. (*Pica fuliginosa*, Less. - *Psilorhinus mexicanus*, Rüpp. - *Ps. morio*, Gr.) *Mus. Senkenb. 1837. t. 4. 3.* ex *Mexico.*

*2. **P. chilensis**, Bp. *Mus. Luggd.* ex *Chili.* *Similis praecedenti, at valde minor, et rostro breviore, robustiore.*

* 821. **Gymnokitta**, Wied. 1850. (*Gymnorhinus*, Wied. 1840.

Cyanocephalus, Bp. 1842. - *Psilorhinus*! p. Gr.) Ros-trum rectum, subulatum!

Amer. s. occ. 1.

* **GYNORHINUS cyanocephalus**, Wied. (*Cyanocephalus wiedi*, Bp. - *Psilorhinus*! *cyanocephalus*, Gr. - *Gymnokitta cyanocephala*, Wied. 1850.) *Voy. Am. du Nord, Appendix*, fig. nulla, ex Am. s. occ. *Cinereo-caeruleus; pileo genisque cyanis.*

* 822. **Cyanopica**, Bp. (Pica, p. Gr. - *Garrulus*, p. Auct.) Eur.m.Afr.s.As.3.

1? **CORVUS CYANUS**, Lath. Vieill. nec Pall. (Pica **melanoc-phalus**, Wagl. - *Cyanopolius vaillantii*, Bp. in litt. *Cyanopica melanoccephala*, Bp.) *Levaill. Afr. t. 58.* ex *Chīna.* Capite subristato, ex toto cum gula nigro: dorso caerulescente: rectricibus omnibus albo-terminatis.

2. **CORVUS cyaneus**, Pall. (Pica cyanea, Wagl. Schleg. *Cyanopolius pallasi*, Bp. in litt. - *Cyanopica cyanea* *vel pallasi*, Bp.) *Faun. Japon. t. 42.* ex *Asia orientali* nec occidentali. Capite laevi, supra tantum nigro-chalybeo: dorso cinereo-vinaceo, nucha vix canescens: rectricibus lateralis apice tantum, mediis valde elongatis late, albo terminatis.

3. **PICA CYANEA**, Cook, nec Pall. (Pie bleue d'Europe, *Cyanopica europaea*, Schleg. - *Cyanopolius cooki*, Bp. Br. Ass. *Birmingh. 1849.* - *Cyanopica cooki*, Bp.) *Gould, Eur. t. 217.* - *Susemihl, Vog. Eur. II. t. 5.* ad. et jun. ex *Hispānia*, Afr. s. Capite laevi, supra tantum nigro-chalybeo: dorso cano-rubello, nucha allicante: rectricibus laterali bus albo-terminatis; mediis modice elongatis, vix spicis allis.

* 823. **Streptocitta**, Bp. (Pica, p. Gr. - *Garrula*, p. Temm.) Oceania. 1.

CORVUS caledonicus! Labillardière, nec Gm. (Pica al-bicollis, Vieill. - *Garrula torquata*, Wagl.) *Voy. En-tre-ecas. Atl. t. 39.* ex *Celbes.* Nigro-cyanea: collo undique, pectoreque late, albis.

824. **Pica**, Br. (*Garrula*, p. Temm.) Cosmopol. 8.

a. *Orbis antiqui.*

1. **CORVUS PICA**, L. (**P. caudata**, Ray. - *europaea*, Cuv. *melanoleuca et albiventer*, Vieill.) *Pl. enl. 488.* - *Gould, Eur. t. 216.* ex *Eur. As. occ. et s. Afr. s. ad or. Egypt. Nubia.* Specimina Kamschatkensis majora. Ni-gra; vertice, tectricibus clavrum, remigibus primariis, rectricibus aeneo-virescentibus: secundariis cyaneo-nitentibus: cauda apicem versus atro-purpurea: fascia urepygialis al-bo-canescens; scapularibus, ventre, lateribusque albis.

- *2. **P. bactriana**, Bp. (Pica caudata ex Afghanistan, Blyth.)
Cat. Calc. Mus. p. 91. sp. 461. E. ex Persia orientali. Simillima praecedenti, sed minus nitens, et uropygii fascia candida minus cinerascente!
- *3. **P. japonica**, Bp. (P. varia japonica, Schlegel.) *Fauna Jap.* p. 81. ex Japon. Simillima P. caudatae Europae, sed alis longioribus ($\frac{7}{8}$ pollici!)
4. **P. sericea**, Gould. (media? Blyth 1844. - chinensis, Schleg. ex Gr.) *Proc. Zool. Soc.* 1845. p. 5. ex Asia or. China. Fascia alba alarum ($\frac{1}{2}$ pollicis quam in P. europaea longiorum) vix ultra remiges secundarias protracta!
5. **P. butanensis**, Delessert. (megaloptera, Blyth 1839.)
Rev. Zool. 1840. ex Asia centr. Bootan.
6. **P. mauritanica**, Malherb. *Mém. Soc. II. Nat. Metz* 1843. - *Cat. Ois. Alger.* p. 7. - *Explor. Alger.* t. 35. ex Afr. s. Similis P. caudatae ex Europa; sed alis brevioribus: digitis longioribus, robustioribus; fascia alba abdominali valde angustiore: superciliis nudis! carucleo-fuscis.
- b. Americae septentrionalis.
7. **CORVUS PICA**, Wils. (*hudsonicus*, Sabine. - Pica hudsonica, Bp. - P. melanoleuca, Aud.) *Am. Orn.* t. 35. 2. ex Amer. s. Specimina borealia minorata.
8. **P. nuttalli**, Aud. *Am. t.* 362. 1. ex occidentalibus Am. s. Rostro flavo!
- *825. **Gazzola**, Bp. 1850. (Pica, p. Gr.) Oceania. 1.
- CORVUS caledonicus**, Gm. (cinereus, Forst. - Pica cinerea, Wag. - Gazzola caledonica, Bp.) *Icon. ined.* 58. ex Nova Caledonia.

FAMILIA 53. CORVIDAE.

SUBFAM. 113. CORVINÆ.

826. **Nucifraga**, Br. (Caryocatactes, Cuv. 1817.) Europa. Asia. 3.
1. **CORVUS caryocatactes**, L. (nucifraga, Nilss. - Caryocatactes nucifraga, Cuv. - Nucifraga guttata, Viell. - macrorhynchos et brachyrhynchos? Brehm.) *Pl. enl.* 50. Gould, *Eur. t.* 213. ex Eur. As. s. etiam or.
2. **N. hemispila**, Vig. - Gould, *Cent. Himal. B. t.* 36. ex Asia centr.
3. **N. multipunctata**, Gould, *B. of Asia i. t.* 15. ex Asia centr.

*827. **Picicorvus**, Bp. (Corvus, p. Gr.) America s. 1.

CORVUS columbianus, Wils. (megonyx, Wagl.- Nucifraga columbiana, Bp.) Am. Orn. t. 20. 2. - Aud. Am. t. 362. 4. 5. ex Am. s. occ.

828. **Lycos**, Boie. (Monedula, Brehm, 1828. - Colaeus, Kaup.) Eur. As. Afr. 3.

1. **CORVUS monedula**, L. (spermolegus, Vieill. - Monedula et Monedula nigra, Br. - M. turrium, Brehm.) Pl. enl. 522. 523. - Frisch, Av. t. 68. - Roux, Orn. Provenç. t. 133. - Gould, Eur. t. 223. ex Eur. As. occ. 2? **CORVUS collaris**, Drummond. - Strickl. - Gould, fig. nulla. ex Macedonia.

3. **CORVUS dauricus**, Pall. (capitalis, Wagl.- morio? Forst.) Lath. Syn. t. 15. - Faun. Jap. t. 41. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 76. ex As. or.

829. **CORVUS**, L. (Corone, Kaup. - Frugilegus, Less.) Cosmopol. 18.

a. Abnormes. Minus typici.

1. **C. splendens**, Vieill. - Pl. col. 425. ex As. m. Parvus: nitide griseus; píleo, gula, tibialis, alis, caudae nigris. Accedit ad Picicorvum!

*2. **C. violaceus**, Temm. Mus. Lugd. ex Ceram. Uniformiter purpureo-niger: alis longis: cauda valde rotundata fasciolas obscurioribus. Rostrum typice elongatum et curvatum. Magnitudine Monedulae. Ob Staturam saltem cum Lycis genus Corvus proprium conjungit.

*3. **C. pyrrhocoturus**, Temm. Mus. Lugd. ex Gilolo. Virescenti-niger: alis brevissimis, caudae nigrioris, rotundatae, subfasciatae, dimidiatae, partem non tangentibus, colore cinnamomeis, in scopularibus obscurioribus splendente, in remigibus primariis pallescente. Statura praecedentis. Rostrum modicum, rectiusculum. Non omnino typicus.

b. Frugilegi. (Trypanocorax, Kaup.) Ungle medio pectinato!

4. **C. frugilegus**, L. (corone? L.) Pl. enl. 484. et 483. Gould, Eur. t. 224. ex Eur. As. occ. Ex virescenti purpureo-niger: plumis jugulis rotundatis, subsericeis; gulae laceris, rigidulis: alis caudam subaequalem vix attingentibus: rostro capite paullo longiore, haud valido, rectiusculo.

5. **C. pastinator**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1845. ex Chusan. Ex chalibaeo purpureo-niger, cauda viridi splendente: scopularibus, tectricibusque superioribus caudae humerali apicali nigra. Longit. 18". Rostr. 2". Corvo frugilego peraffinis: rostro rectiori: facie minus denudata: pedibus et unguibus praesertim validioribus.

6. **C. capensis**, Licht. (segetum, Temm. - macropterus, Wagl. - levallantii, Less.) Rüpp. Faun. Abyss. t. 10. 3.
ex Africa mer. Similis C. frugilego, sed major: vires-
centi-niger, juguli plumis lanceolatis, excisulis; alis longis-
simis, caudam rotundatam excedentibus: rostro capite longiore,
valido.
- * 7. **C. validus**, Temm. Mus. Lugd. ex Ins. Ceram,
Giliola. Uniformiter purpureo-niger: alis caudam rotun-
datam subaequantibus: rostro, capite multo longiore, valido,
curvato. Typicus: magnitud. C. frugilegi.
8. **C. ossifragus**, Wils. (spermolegus) Mus. Paris. Am.
Orn. t. 37. 2. - Aud. Am. Orn. t. 145. Ex chalybeo
purpurascenti-niger; alis caudae rotundatae medium vix excen-
dentibus; rostro subitus basi calvo, apico subaduncu, tomis
medio contractis: pedibus validis, unguibus arcuatiss, acutis!
Piscivorus! sicuti interdum C. Corone apud nos!
9. **C. jamaicensis**, Gm. (nasicus, Temm.) Pl. col. 413.
ex Antillias.
Quid Corvus umbrinus, Hedenborg, ex Egypte, Nubia, Arabia?
c. Cornices.
10. **C. corone**, Wils. (americanus, Audub. - jama-
censis) Mus. Berol. Am. Orn. t. 35. 3. - Aud. Am. t. 150.
ex Amer. sept.
11. **C. affinis**, Rüpp. Faun. Abyssin. t. 10. 2. nec Brehm.
ex Africa or.
12. **C. culminatus**, Sykes. (orientalis? Eversm. - corone
var. Franklin. - enca? Wagl. nec Horsf. - macrorhyn-
chus? Blyth, ex Vieill. nec Temm.) J. Gr. Ill. Ind. Zool.
II. t. 36. 2. ex As. m. Ceylon, Assam, Malacca?
nec Sumatra.
13. **C. enca**, Horsf. (affinis? Brehm, nec Rüpp.) Transac-
tions Linnean Society, XIII. p. 164. ex Java, Suma-
tra. Niger, unicolor, vix purpureo nitens; gulae plumis
brevis subpilosis: spatio pene oculos triquetro, denudatae
alis ultra medium caudae rotundatae valde productis: rostro
valido, basi latu, apicem versus compresso. Longit. 18½-poll.
- * 14. **C. orru**, Müll. Mus. Lugd. ex N. Guinea. Simil-
limus C. australi, sed rostro minus robusto. Medius inter
C. australiem et C. enca m!
15. **C. australis**, Gm. (coronoides, Vig. et Horsf. - co-
roneoides, Wagl. - Gould, Austr. IV. t. 18. ex Timor,
Australia. Niger: unicolor, ex toto sed maiis superne
violaceo-purpurino splendens, plumis basi canescensibus: pla-
mis menti discretis, rigidisculis; vibrissis rigidis depen-
dentibus: rostro typico, robustissimo, quam in C. corone val-
de majore.

16. *C. corone*, L. - Pl. enl. 495! nec 483! - Gould, Eur.
t. 221. ex Europa, Asia. Niger, unicolor, chalybeo-nitens; plumis juguli lanceolatis: rostro robusto conico-sabulato.
17. *C. cornix*, L. - Pl. enl. 76. - Gould, Eur. t. 222.
ex Europa, Asia. Cinerous, capite, gula, alis, caudae rotundata nigris, splendidibus: juguli plumis lanceolatis: rostro C. coronis, inter quem et hunc existunt specimen intermedia!
18. *C. scapulatus*, Daud. - Pl. enl. 327. - Levailly.
Afr. t. 53. ex Afr. m. Splendide nigerrimus; cervice, jugulo, pectore, abdome, lateribusque candidis; rostro alto, robustissimo.
19. *C. curvirostris*, Gould, 1836. (leuconotus? Sie. 1837.)
B. of west. Afr. t. 5. - Jard. et Selb. Ill. Orn. n.s.t.33.
ex Afr. occid. Ex chalybeo purpureo-niger; macula dorsali et fascia ventrali late albis. Similis praecedenti, sed minor (Longit. 17-poll. - Rostr. 2½. - Alae 12½. - Caudae 7½ - Tarsi 2½), et rostro minus robusto, incurvo.
20. *C. pectoralis*, Gould, 1836. (dominicanus, Bp. Mus.
Lugd. in Lit.) Fig. nulla. ex Asia centr. et orient.
China. Caerulescenti-niger; macula nuchali expanso, fasciæ lunata pectorali albis. Similis praeced. etiam quoad stataram, sed alis valde brevioribus (11½ pollicis!)
Quid Corvus torquatus, Less. ex Austr. Tr. Orn. p. 328. sp. 3?
- d. Coraces. Corvi proprii. Majores.
21. *C. CORAX*, Raffles. (*macrorhynchus*, Temm. nec Vieill.) Wagler, Syst. Av. Gen. Corvus, sp. 3. fig. nulla.
ex Sumatra, Java. Medius quasi inter C. coronem et C. coraceum, sed rostro coracino, imo percrasso! Niger unicolor, vix nitens.
- *22. *C. japonensis*, Bp. (Corvus macrorhynchos, Schleg.
nec Temm.) Faun. Japon. Av. p. 79. t. 39. B. ex Japon.
Simillimus praecedenti; sed paulo major, capite, collo, corpore que subtilis, magis virescentibus.
23. *C. nobilis* vel splendens, Gould, 1837. nec Vieill. Fi-
gura nulla, ex Mexico. Chalybeo-niger; alis, pectoreque purpurascenb; juguli plumis elongatis, lanceolatis; cauda lata, gradatâ Longit. 25-poll. Rostr. 3½. Alae 18. Caudae 11. Tarsi 3. Similis sequenti, sed splendidior; rostro longiore, minus valido, remigibus magis productis, cauda magis rotundata, imo cuneata!

24. **C. CORAX**, Wils. (**cacalotl**) Wagl. Isis 1831. p. 527. ex
Hernandez. - vociferus? *Cabot?*) Am. Orn. t. 75. 3.
Aud. Am. t. 101. ex Amer. s. *Chalybeo-niger;* ju-
guli plumis elongatis; remigum secunda sextam vix aequan-
te; quarta omnium longissima: cauda rotundata 2-pollices
ultra alas clausas protensa: rostro valido, tri-pollicari.
Longit. 26-polluc.
25. **C. corax**, L. (*maximus*, Scop. - *clericus*, Sparrm.)
Gould, Eur. t. 220. - Mus. Carls. t. 2, var. ex Eur. As. s.
Maximus: niger, unicolor, chalybeo-nitens; juguli plumis
sulcatis: remigum secunda longiore quam quarta, tertia
omnium longissima: cauda rotundata: rostro valido, subadunc.
26. **C. corax**, Daud. (**major**, Vieill. - *montanus*, Temm.)
Lev. Afr. t. 61. ex Afr. m. Major C. coracis Europae;
at niger opacus; alis tantum et cauda aequali nitentibus; ros-
tro aliore, magis incureo!
- Quid Corvus leuoccephalus, Vieill. (leucomelas, Wagl. - borealis*
albus, Br.) Orn. Append. VI. p. 33. t. 2. i. - Gal. Ois. t. 100. ex
Ins. Ferroe, nisi var. albina generatione propagata spe-
ciei Europeae?
- Quid Corvus leucognaphalus, Daud. Tr. Orn. II. p. 231. ex An-*
tilli s. Niger; capite, collo, ab domino, aliis, rectricibusque
mediis albis; fascia pectorali nigra, nisi var. albina acciden-
talis speciei Americanae?
830. **Corvultur**, Less. (*Corvus*, p. Gr.) Africa. 2.
 1. **CORVUS cafer**, Licht. (*albicollis*, Lath. *Daud.* - *vultu-*
rinus, Shaw. - *crassirostris* *Aliq. nec Rupp.*) Levailly.
Afr. t. 50. ex Afr. m. Macula alba lata (latiore quam
longa) cervicali.
2. **CORVUS crassirostris**, Rupp. Faun. Abyss. t. 8.
Mus. Lugd. ex Abyss. Macula alba longa (longiore
quam lata) nuchali: rostro magis elevato.
831. **Gymnocorvus**, Less. N: Guinea. 1.
CORVUS senex, Garnot. (*tristis*, Less.) Voy. Coq. t. 24.
ex N. Guinea.
832. **Picathartes**, Less. (*Galgulum*, Wagl.) Africa. 1.
CORVUS gymnocephalus, Temm. (*Galgulum gymno-*
cephalus, Wagl.) Pl. col. 327. ex *Africa centr.*

SUBFAM. 114. FREGILINAE.

833. **Podoceſ**, Fischer. (*Garrulus*, p. *Gr.*) Roſtrum gracie, curvum: nares plumis dense tectae: pedes robusti, digiti breviſſimis; lateralibus inter ſe aequalibus: alae rotundatae; remigum prima mediocri; ſecunda septimam aequante; tertia, quarta et quinta omnium longiſſimis: cauda brevis, subrotundata: plumae densae, longae, molles.

Asia occid. 1.

Podoceſ panderi, Fischer. (*Pica!* *panderi*, *Wagl.* *Garrulus!!* *panderi*, *Gr.* - *Corvus!!!* *panderi*, *Licht.*) *Mem. Soc. Imp. Mosc.* v. t. 21. - *Mus. Berol.* ex *As. occ.* *Statura Turdi meraula: albo-canescens; subtus albo-rinaceus, gula crisoque albis; loris, macula magna pectorali, caudaque nigris; alis albo nigroque variis; remigibus candidis, apice rachidibusque nigris.*

834. **Pyrrhocorax**, Vieill.

Eur. centr. As. 1.

CORVUS PYRRHOCORAX, L. (*Pyrrhoc. alpinus*, Vieill.) *P. pyrrhocorax*, Temm. *Pl. enl.* 531. jan. - *Gould, Eur.* t. 218. ex *Eur. As. in Alp. et Himal.* *Corvus crinitus*, Daud. (*sexstaceus*, Shaw, - *hexagenus*, Cuv. *Pastor setifer*, Wagl. - *Pyrrhocorax setifer*, Vieill. - *P. crinitus*! *Gr!*? *Lev. Afr.* t. 82. est *Avis fictitia*!

835. **Corcorax**, Less. 1831. (*Cercoronus! Caban.*)

Australia. 1.

CORACIAS melanorhynchus, Vieill. (*Pyrrhocorax leucopterus*, Temm. - *Fregilus leucopterus*, Vig. - *Corcorax australis*, Less. - *C. leucopterus*, Gr. - *Corcoronus melanorhynchus*, Caban.) *Gould, Austr.* iv. t. 16. - *Gr. et Mitch. Gen. B.* t. 78. ex *Austr. or. et m.*

836. **Fregilus**, Cuv. (*Coracia*, Br. - *Graculus*, Koch)

Europa. Asia. 1.

CORVUS graculus, L. (*eremita!* Gm. - *Coracias docilis?* Gm. *erythroramphos*, Vieill. - *Pyrrhocorax graculus*, Temm. *Fregilus europeus*, Less. - *Fr. erythropus*, Sw. - *Coracia graculus*, Degland, ex Br.) *Pl. enl.* 255. - *Gal. Ois. t. 103.* - *Gould, Eur.* t. 219. ex *Eur. Asia*, *Montib. excelsis*, praesertim in *scopulis altissimis* in *mare pendentibus*.

837. **Neomorpha**, Gould.

N. Zelandia. 1.

N. gouldi, Gr. (acutirostris et crassirostris, Gould.)*Austr. iv. t. 19. - O. des Murs, Pl. p. t. 2. mas. N. Zeland.**Nigerrima: carunculis lutois: rostro, caudaeque apice nigris.**Mas rostro brevi, subrecto.**Faem. rostro longissimo, curvo, acuminato.**An hujs Familiae? Forsan melius, suadent. Lafresnayo**Upupidarum circumscriptore, Subfamilia cum patris**Glaucope et Creadio magnipedibus constituenda?*838. **Creadion**, Vieill.

N. Zelandia. 1.

SURNUS CARUNCULATUS, Forst. Gm. (Graeula virescens,*Shaw. - Creadion psaroides, Vieill. - Icterus novae-*
*zelandiae et rufitorques, Less.) Lath. Syn. t. 79. - Voy.**Astrolab. Ois. t. 12. - Voy. Cog. t. 23. 1. ex Nova*
*Zelandia. Niger; dorso, tectricibusque alarum ferrugi-**neis: caruncula pendula aurantia ad utrumque oris angulum.**Faem. fusco-ferruginea.*

FAMILIA 54. MELLIPHAGIDAE.

SUBFAM. 115. MELLIPHAGINAE.

839. **Anthochaera**, Vig. 1820.

Austral. 4.

a. Carunculata.

1. **MEROPS CARUNCULATUS** et Corvus paradoxus? Lath.

(Anthochaera lewini, Vig. et H. - A. carunculata, Gould.)

*Austr. iv. t. 55. ex Austr. m.*2. **CREADION CARUNCULATUS**, Vieill. (Anthochaera carunculata,Vig. et H. - **A. inauris**, Gould.) Gal. Ois. t. 94.*Austr. iv. t. 54. ex Austr. m.*

b. Carunculis nullis.

3. **CERTHIA MELLIVORA** et Merops chrysopterus? Lath. (Me-

rops garuck? Shaw. - Philemon chrysoptera? Vieill.

Anthochaera mellivora, Gould.) Vieill. Ois. dor. t. 88.

*Austr. iv. t. 56. ex Austr. m. Tasmania.*4. **A. lunulata**, Gould, 1837. *Austr. iv. t. 57. ex Austr. m.*

840. **Tropidorhynchus**, Vig. 1826. (Philedon, p. *Cuv.*) Austr. N. Guin. 14:

a. Australasiiani.

1. **MEROPS corniculatus** et monachus, Lath. (*Tropidoro-*
rhynchos diemenensis? Less. *Tr. p. 401.* - *corniculatus,*
Vig. et II.) *White Voy. p. 90.* - *Lev. Ois. Am. et Ind.*
t. 24. - *Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 133.* - *Austr. iv. t. 58.*
ex Austr. m. or.
2. **Tr. argenticeps**, Gould, 1830. *Austr. iv. t. 59.* ex
Austr. s. occ. *Similis* praecedenti.
3. **Tr. citreogularis**, Gould, 1830. *Austr. iv. t. 60.*
ex Australia mer. orient. *Protuberantia nulla ad*
basim rostrum
4. **Tr. sordidus**, Gould, *Introd. Austr. p. 64.* sp. 312, fig.
nulla. ex *Austr. s. occ.* *Simillimus* praecedenti, sed mi-
nor et rostro grandiore.

b. Oceanici.

5. **Tr. inornatus**, Gr. et Mitch. *Gen. B. p. 125.* sp. 11. t. 39.
ex Oceania.
6. **Tr. novae-guineae**, Müll. *Verh. Nat. Gesch. Ethnogr.*
p. 153. ex *Nova-Guinea.*
- *7. **Tr. gitolensis**, Temm. *Mus. Lugd.* ex *Gitol.* Si-
milis *Tr. argenticipiti*, sed minor.
8. **Tr. subcorniculatus**, Hombr. et Jacq. *Ann. Sc. Nat.*
1841. p. 314. ex *Oceania.*
9. **PHILEDON buceroides**, Sw. (*corniculatus*, *Mus. Paris.*
1828. - *Tropidorhynchus buceroides*, *Sic*) *Less. Tr.*
Orn. t. 52. 2. ex *Oceania.*
10. **Tr. subcornutus**, Temm. - *Voy. Pole Sud, Ois.*
t. 16. 1. ex *Ceram.*
11. **Tr. timorensis**, Müll. *Verh. Nat. Gesch. Ethnogr.*
p. 153. ex *Timor.*
12. **Tr. chrysotis**, Less. (*Myzantha flaviventer*, *Less.*)
Voy. Coq. Ois. t. 21 bis.
13. **Tr. buruensis**, Less. ex *Quoy et Gaim. Voy.*
Astrol. t. 8. 2. ex *Celebes.* *Protuberantia nulla ad*
basim rostri.
- *14. **Tr. cineraceus**, Müll. *Mus. Lugd.* ex *Timor.*
Fusco-cineraceus, subitus sordide canus; pretuberantia ad basin
rostri nulla.

*Quid Genus Leptornis, Hombr. et Jacq. 1845. (*Tropido-*
rhynchus sp. 7 et 8. Gr.) *Voy. au Pole Sud, Ois. t. 17. 1 et 18?**

841. **Entomyza**, Sw. 1837. (Entomyzon, Sw. 1825. - Tropidorhynchus, p. Gr.) Australia. 2.
1. **GRACULA cyanotis**, Turdus cyaneus et Merops cyanops, Lath. (Entomyza cyanotis, Gould.) Lewin, B. of New-Holl. t. 4. - Vieill. Ois. dor. t. 87. - Gould, Austr. iv. t. 68. ex Austr. or.
 2. **Ent. albipennis**, Gould, 1840. Austr. iv. t. 69. ex Austr. s.
- Quid Genus Philemon, Vieill. 1816. (Turdus moluccensis, Gm. Philemon cinereus, Vieill. - Tropidorhynchus moluccensis, Gr.) ex Moluccis?*
842. **Acanthogenys**, Gould. Australia. 1.
- Ac. rufigularis**, Gould, Austr. iv. t. 53. ex Austr. m.
843. **Prosthemadera**, Gr. Nov. Zeland. 1.
- MEROPS novae-seelandiae**, Gm. (Merops circinnata, Lath. - Sturnus crispicollis, Daud.) Brown, Ill. t. 9. Lev. Afr. t. 92. ex N. Zealandia.
844. **Meliphaga**, Lewin, 1808. (Xanthomyza, Gould. - Zanthomyza, Sw.) Australia. 1.
- MEROPS phrygius**, Lath. (Zanthomyza phrygia, Sw. - Meliphaga phrygia, Lewin. - Turdus squamatus? Vieill. Xanthomyza phrygia, Gould.) Birds of N. Holl. t. 14. Levaill. Afr. t. 116. Austr. iv. t. 48. ex Austr. m. or.
845. **Pogonornis**, Gr. (Ptilotis, p. Laf.) Nov. Zeland. 1.
- PTILOTIS cincta**, Dubus. (Ptilotis auritus, Laf.) Bull. Acad. Sc. Brux. 1839. cum fig. - Mag. Zool. 1840. Ois. t. 11. ex N. Zealandia.
846. **Anthornis**, Gr. (Anthomyza, Sic.) Nov. Zeland. 2.
1. **CERTHIA melanura**, Sparrm. (C. sannio, Gm. - olivacea, Forst. - Philemon dumerili, Less. - Anthomyza caeruleocephala, Sw.) Mus. Carls. t. 5. - Vieill. Ois. dor. t. 64. Voy. Coq. Ois. t. 21. 2. ex N. Zealandia.
 2. **A. melanocephala**, Gr. App. Dieffenb. Trav. in New. Zeal. II. p. 188. - Voy. Ereb. et Terr. B. t. 2. ex N. Zealand.

847. **Ptilotis**, Sw. 1837. (Meliphaga, p. Gr.)

Australia. 19.

a. Australasianae.

1. **CERTHIA chrysotis**, Lath. (xanthotis, Shaw. - Ptilotis lewini? Sw. - Pt. chrysotis, Gould. - Meliphaga chrysotis, Lew.) *B. of N. Holl.* t. 5. - *Vieill. Ois. dor.* t. 84. *Austr.* iv. t. 32.
 2. **Pt. sonora**, Gould, 1840. *Austr.* iv. t. 33.
 3. **Pt. versicolor**, Gould, 1843. *Austr.* iv. t. 34.
 4. **Pt. flavigula**, Gould, 1838. (Melithreptes flavicollis? Vieill. - Meliphaga flavigula, Gr.) *Austr.* iv. t. 35. ex *Tasmania*.
 5. **TURDUS leucotis**, Lath. (Meliphaga leucotis, Gr. - Ptilotis leucotis, Gould.) *Pl. col.* 435. - *Jard. et Selby, Ill. Orn.* t. 35. 2. - *Voy. Astrol. Ois.* t. 8. 1. - *Austr.* iv. t. 36. ex *Austr. centr. et or.*
 6. **MUSCICAPA auricomis** et *mystacea*, Lath. (Certhia auriculata, Shaw. - chrysotis, Donov. - Turdus melanops, Lath. - Muscicapa novae-hollandiae, Lath. - Philemon erythros, Vieill. - Ptilotis auricomis, Gould.) *Nat. Rep.* t. 112. - *Vieill. Ois. dor.* t. 85. - *Sw. Zool. Ill.* t. 43. - *Austr.* iv. t. 37.
 7. **Pt. cratitia**, Gould, 1840. *Austr.* iv. t. 38.
 8. **Pt. ornata**, Gould, 1838. *Austr.* iv. t. 39.
 9. **Pt. plumula**, Gould, 1840. *Austr.* iv. t. 40.
 10. **Pt. flavesiens**, Gould, 1839. *Austr.* iv. t. 41.
 11. **Pt. flava**, Gould, 1842. *Austr.* iv. t. 42.
 12. **Pt. penicillata**, Gould, 1836. *Austr.* iv. t. 43. ex *Austr. m. et or.*
 13. **Pt. fusca**, Gould, *Austr.* iv. t. 44. ex *Austr. or.*
 14. **SYLVIA chrysops**, Lath. (Ptilotis chrysops, Gould.) *Jard. et Selb. Ill. Orn.* t. 35. 1. - *Austr.* iv. t. 45. ex *Austr. m. et or.*
 15. **Pt. unicolor**, Gould, 1842. *Austr.* iv. t. 46.
- b. Oceanicae.
16. **Pt. maculata**, Müll. (Meliphaga maculata, Temm.) *Pl. col.* 29. fig. 1. ex *Timor.*
 17. **Pt. reticulata**, Müll. (Meliphaga reticulata, Temm.) *Pl. col.* 29. fig. 2. ex *Timor.*
 18. **Pt. limbata**, Müll. *Verh. Nat. Gesch. Ethnogr.* p. 162. ex *Timor.*
 - *19. **Pt. fumata**, Müll. (Meliphaga concolor, Temm.) *Mus. Lugd.* ex *N. Guinea.* *Cinerco-fumigata, alis caudaque obscurioribus.*

848. **Meliornis**, G r. (Meliphaga, *Gould*, ex *Lewin*. - Strigiceps? *Less.*, nec *Bp.*) Australia. 5.
 1. **CERTHIA novae-hollandiae**, Lath. (Meliphaga bal-
gonera, *Steph.* - barbata, *Sw.* - *novae-hollandiae*, *Gould*.)
White, *Voy. t. p. 186.* - *Vieill. Ois. dor. t. 57.* - *Austr.*
iv. t. 23. ex *Austr. m. et or.*
 2. **MELIPHAGA longirostris**, *Gould*, *Austr. iv. t. 24.* ex
Austr. m.
 3. **MELIPHAGA sericea** et sericeola faem. *Gould*. (Meli-
threptus atter? *Vieill.*) *White*, *Voy. t. p. 297.* - *Ois. dor.*
t. 71. - *Austr. iv. t. 25.* ex *Austr. m.* *Tasmania*.
 4. **MELIPHAGA mystacalis**, *Gould*, 1840. *Austr. iv. t. 26.*
 ex *Austr. m.*
 5. **MELIPHAGA australasiana**, *Shaw*. (Certhia pyrrho-
ptera? *Lath.* - Meliphaga australasiana, *Gould*. - Meli-
threptus melanoleucus, *Vieill.* - Meliphaga inornata,
Gould, jun.) *Vieill. Ois. dor. t. 55.* - *Austr. iv. t. 27.*
 ex *Austr. m.*
Quid Meliphaga melanodera, *Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Ois.*
t. 8. l. ex Australia m?
Quid Meliphaga pyrrhotis, *Less. Rev. Zool. 1840. p. 271?*

849. **Glyciphila**, Sw. Australia. 4.
 1. **CERTHIA fulvifrons**, *Vig. et H.* (melanops? *Lath.* - meli-
livora, *Shaw*. - Meliphaga fulvifrons et albiventris?
Lewin. - Glyciphila fulvifrons, *Gould*. - Philemon ru-
brifrons, *Less.*) *Lewin. B. of N. Holl. t. 22.* - *Austr.*
iv. t. 28. ex *Austr. m. et or.* *Tasmania*.
 2. **G. albifrons**, *Gould*, 1840. *Austr. iv. t. 29.* *Austr. m.*
 3. **G. fasciata**, *Gould*, 1842. *Austr. iv. t. 30.* *Austr. s.*
 4. **G. ocularis** et subocularis, *Gould*, 1837. *Austr. iv. t. 31.*
 ex *Austr. univers. N. Guinea*, *Timor*.
Quid *G. aurita*, *Gr. ex Lath. et Lamb. Icon. ined. n. 44?*
Quid *G. agilis*, *Gr. ex Lath. et Lamb. Icon. ined. n. 72?*
Quid *G. fuscata*, *Gr. ex Gm. et Vieill. Ois. dor. t. 65?*

850. **Melicophila**, *Gould*. (Entomophila, p. *Gr.*) Australia. 1.
M. picata, *Gould*. (Entomophila picata, *Gr.*) *Austr. iv.*
t. 49. ex *Austr. m. et oce.*
 851. **Plectrorhyncha**, *Gould*. (Melithreptus, p. *Gr.*) Australia. 1.
Pl. lanceolata, *Gould*. 1837. *Austr. iv. t. 47.* ex
Austr. or.

852. **Entomophila**, Gould. Australia. 3.
1. **Ent. picta**, Gould. 1837. Austr. iv. t. 50. ex Austr. m.
 2. **Ent. albicularis**, Gould. 1842. Austr. iv. t. 51. ex Austr. s.
 3. **Ent. rufigularis**, Gould. 1842. Austr. iv. t. 52. ex Austr. s.
853. **Acanthorhynchus**, Gould. (Leptoglossus, Sw.) Australia. 3.
1. **CERTHIA tenuirostris**, Lath. (Certhia cucullata, Shaw. Acanthorhynchus tenuirostris, Gould.) Vieillot, Ois. dor. t. 60? - Austr. iv. t. 61. ex Austr. or.
 2. **A. dubius**, Gould. (tenuirostris, p. Auct.) Intr. Austr. p. 65. sp. 314. ex Tasmania.
 3. **A. superciliosus**, Gould. 1837. Austr. iv. t. 62. ex Austr. occ. Tasmania.
854. **Moho**, Less. 1831. (Acrolocerus, Caban. 1847.) Micronesia. 1.
- MEROPS niger**, Gm. (fasciculatus, Lath. - Gracula nobilis, Merr. - Epimachus pacificus, Licht. - Acrolocerus niger, Caban. - Moho niger, Gr.) Gould, Icon. Av. p. 7. t.2. - Dixon, Voy. t.19. - Pl. col. 471. ex Ins. Sandw. Oahu. Niger; lateribus, crissoque flavis: rectricibus lateribus apice albis.
855. **Myzomela**, Vig. (Phylidonyris, Less.) Austr. Ocean. 9.
- a. *Oceanicae.*
1. **M. vulnerata**, Müll. Verh. Nat. Gesch. Zool. Av. p. 66. t. 10. 3. mas. 4. faem. ex Timor.
 2. **M. boiei**, Müll. Verh. Nat. Gesch. Zool. Av. p. 66. t. 10. 2. mas. 1. faem. ex Banda.
 3. **M. chermesina**, Gr. et Mitch. Gen. B. t. 38. ex N. Guineae.
 4. **CERTHIA sanguinea**, Gm. (Myzomela sanguinea, Gr.) Lath. Syn. I. II. p. 739. sp. 43. ex Ins. Sandwich. Quid Myzomela sp. 9 et 10. Gr. Gen. B. p. 118. ex Voy. Polo Sud, Ois. t. 22. 5. 6?
 - b. *Australasianae.*
 5. **CERTHIA sanguinolenta**, Lath. (dibapha, Lath. - australasiae, Leach. - Meliphaga cardinalis, Vig. - Cinnyris rubrater, Less. - Myzomela sanguinolenta, Gould.) Zool. Misc. t. 14. - Kittl. Kupf. Vog. t. 8. c. - Austr. iv. t. 63. ex Austr. or.

6. *M. erythrocephala*, Gould, 1839. Austr. iv. t. 64.
7. *M. pectoralis*, Gould, 1840. Austr. iv. t. 65.
8. *M. nigra*, Gould, Austr. iv. t. 66.
9. *M. obscura*, Gould, 1842. Austr. iv. t. 67.

856. **Manorhina**, Vieill. (Myzantha, Vig. nec Hodgs. - Phialanthus, Less.) Australia. 6.
1. *TURDUS melanophrys*, Lath. (Myzantha flavirostris, Vig. et H. - Manorhina viridis, Vieill. - M. melanophrys, Gould.) Gal. Ois. t. 149. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 78. Austr. iv. t. 80. ex Austr. or. m.
 2. *MEROPS garrulus* et *Gracula melanocephala*, Lath. (Mephitis hinc Myzantha garrula, Gould.) Austr. iv. t. 76. ex Austr. m. et or. Tasmania.
 3. *MYZANTHA obscura*, Gould 1840. - Austr. iv. t. 77. ex Austr. occ. et m.
 4. *MYZANTHA flavicula*, Gould, 1839. Austr. iv. t. 79. ex Austr. occ.
 5. *MYZANTHA lutea*, Gould, 1839. Austr. iv. t. 78. Austr. s. Quid M. citreola, Gould, Pr. Zool. Soc. 1839, p. 144?

857. **Melithreptus**, Vieill. 1816. (Haematops, Gould 1830. Gymnophrys, Gould 1837. - Eudopsarus, Sw.) Australia. 6.
1. *M. validirostris*, Gould. (Eudopsarus bicinctus? Sw.) Austr. iv. t. 70. ex Tasmania.
 2. *M. gularis*, Gould, Austr. iv. t. 71. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 40. ex Australia.
 3. *CERTHIA lunulata*, Shaw. (Meliphaga atricapilla, Temm. Gymnophrys torquatus, Sw. - Melithreptus lunulatus, Gould.) Vieill. Ois. dor. t. 61. - Lewin, B. of New Holland, t. 24. - Jard. et Selb. Ill. Zool. t. 134. 2. Sw. Zool. Ill. t. 116. - Pl. col. 335. i. - Austr. iv. t. 72. ex Austr. m. et or.
 4. *M. chloropsis*, Gould, Austr. iv. t. 73.
 5. *M. albicularis*, Gould, Austr. iv. t. 74.
 6. *M. melanocephalus*, Gould. (Certhia agilis? Lath. Haematops atricapilla, Jard. et Selby nec Certhia atricapilla, Lath.) Austr. iv. t. 75. ex Tasmania.

SUBFAM. 116. PHYLLOORNITHINAE.

858. **Phyllornis**, Boie. (Chloropsis, Jard.- Philemon, p. Vieill.) Asia m. Oc. 10.

1. **CHLOROPSIS hardwicki**, Jard. (cyanopterus, Hodgs. chrysogaster, MacClell. - auriventris, Deless. - Zosterops curvirostris, Sw. nec Blyth. - Phyllornis cyanopterus? Hodgs. - hardwicki, Blyth, Cat. 1284.) Deless. Voy. Ind. II. t. 7. - Mag. Zool. 1840. Ois. t. 17. ex Assam, Arakan.
2. **CHLOROPSIS aurifrons**, Jard. (malabaricus err. in tab.) Selb. Orn. Ill. t. 5. - Pl. col. 484. 1. Assam, Arakan, Sumatra.
3. **TURDUS malabaricus**, Gm. (Chloropsis aurifrons, Jerd. nec Jard. - Phyllornis malabaricus, Boie. - icterocephala? Less. - Chloropsis casmarhynchus? Tickell. malaccensis, J. Gr.) Pl. col. 512? ex As. m. Ceylon.
4. **P. jerdoni**, Blyth. (Chloropsis gampsorhynchus, Tick. casmarhynchus, J. Gr. - cochinchinensis, Jerd.) Hard. Ill. Ind. Zool. t. 43. ex India m. Medapur.
5. **TURDUS cochinchinensis**, Gm. (malabaricus, Lath. jun. - Philemon nigricollis, Vieill. - Certhia cosinsinica, Shaw. - Meliphaga javensis, Horsf. - Chloropsis malabaricus, Eyton. - Phyllornis cochinchinensis, Boie. Ph. moluccensis, Gr. ex Gm.) Pl. col. 643. 3. - Vieill. Ois. dor. t. 77, 78. ex Malacca et Ins. Sondaicis.
6. **CHLOROPSIS sonnerati**, Jard. (gamsorhynchus, Selb. jun. - zosterops, Vig. jun. - Turdus viridis, Horsf. jun. Phyllornis mulleri, Temm. - Ph. sonnerati, Blyth, Cat. 1289.) Ill. Orn. t. 100. ad. t. 7. jun. ex Java, Sumatra, Borneo.
- * 7. **P. media**, Müll. Mus. Lugg. ex Sumatra. Similis Ph. sonnerati, sed fronte flava, et rostro minore.
- * 8. **P. icterocephala**, Temm. Pl. col. 512. 2. Sumatra.
9. **P. cyanopogon**, Temm. (Chloropsis mystacalis, Sw. jun. hujus speciei nec malabarici!) Pl. col. 312. 1. ex Malacca, Sumatra.
- * 10. **P. venusta**, Temm. Mus. Lugg. ex Sumatra. Mas gula atro-cyanæa. Faem. gula coerulea.

859. **Jora**, Horsf. Genus incertae sedis: melius ad Phyllornithos, vix ad Timaliinas, minime vero ad Paridas adpropinquandum!

Asia. Ocean. 6.

1. **J. scapularis**, Horsf. Zool. Res. Java cum figura faem. ex Java, Sumatra, Borneo.

2. MOTACILLA *typhia*, L. (Ficedula bengalensis, Briss. - Jora
scapularis, Franklin, nec Horsf. - typhia, Temm. - Mo-
tacilla subviridis, Tick.) Edw. B. t. 79. ex Bengal.
Arakan, Malacca.
3. MOTACILLA *zeylonica*, cingalensis et melanictera, Gm.
(Fringilla! multicolor, Gm. - Muscicapa cambayensis?
Lath. - Jora melaceps, Sw. - J. zeylanica, Blyth, Cat.
1292. - Egithina quadricolor, Vieill. - J. typhia, var.
nigra, Sundev.) Brown, Ill. t. 15. 2. - Lev. Afr. t. 141.
ex Asia mer. Ins. Ceylon.
4. J. *innotata*, Blyth. (laresnayi? Hartl.) Mag. Zool.
1845. t. 60. ex Arakan.
- * 5. J. *viridis*, Temm. Mus. Lugd. ex Borneo. Similis
J. scapulari; sed subtus flaviovere, et rostro validiore.
- * 6. J. *viridissima*, Temm. Mus. Lugd. ex Sumatr.
Borneo. Intense viridis; subtus vix pallidior: macula
oculari, crissosque flavis: alis albo-fasciatis, caudaque nigris.
Quid Jora familiaris, Gr. ex Kittl. Mem. Ac. Petersb. 1835.
sp. 235. t. 13?

860. **Yuhina**, Hodgs. 1837. (Polyodon, Ixulus et Myzornis,
Hodgs. 1845.) Asia centr. 5.

a. Yuhina.

1. **Y. nigrimentum**, Hodgs. Journ. As. Soc. Beng.
1845. p. 592. ex Himal.

2. **Y. gularis**, Hodgs. Ac. Res. xix. p. 166. ex Darjil.

b. Myzornis.

3. **MYZORNIS pyrrhura**, Hodgs. 1843. (Yuhina pyrrhura,
Gr.) Mitch. Gen. B. t. 53. ex Nepal, Darjiling.

c. Ixulus.

4. **Y. occipitalis**, Hodgs. (Polyodon occipitalis, Hodgs.
1844. - Siva occipitalis, Blyth.) Journ. As. Soc. xiii.
p. 937. et xiv. p. 552. ex Sikkim, Darjiling.

5. **Y. flavigollis**, Hodgs. 1837. (Ixulus flavigollis, Blyth,
Cat. 518.) As. Res. xix. p. 167. ex Darjil. Butan.

861. **Zosterops**, Vig.

Afr. As. m. Oc. 24.

a. Australasianae.

1. **CERTHIA caerulescens**, Lath. (diluta, Shaw. - Sylvia annulosa var. β . Sw. - S. lateralis? Lath. - Philedon caeruleus, Cuv. - Zosterops dorsalis, Vig. et H. Z. lateralis, Gr. - Z. caerulescens, Blyth, Cat. 1332.) Zool. Ill. t. 165. - Gould, Austr. iv. t. 81. ex Austr. Tasmaniae.
2. **Z. chloronotus**, Gould 1840. nee Vieill. (Z. gouldi, Bp.) Austr. iv. t. 82.

3. **Z. lutea**, Gould, Austr. iv. t. 83. ex Austr. occ. Quid Z. albicularis et Z. tenuirostris, Gould, Pr. Soc. 1836. p. 75? Quid Dacnis westernensis, Quoy et Gaim. (Zosterops westernensis, Hartl.) Voy. Pole Sud, Ois. t. 11. 2?

b. Oceanicae.

4. **DICAEUM conspicillatum**, Kittl. Mém. Ac. Petersb. 1835. II. t. 4. - Kupf. Vög. t. 19. 1. ex Ins. Mariann.
5. **DICAEUM flavum**, Horsf. (Zosterops flava, Hartl. Gr. nee Sw.) Linn. Tr. XIII. p. 170. ex Java.
6. **DICAEUM FLAVUM?** Meyen. (Zosterops megenii, Bp.) Kittl. Kupf. Vög. t. 19. 2. ex Ins. Philipp.
7. **SYLVIA javanica**, Horsf. (Zosterops javanica, Hartl.) Linn. Tr. XIII. p. 156. ex Java.
8. **Z. lugubris**, Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 109. Quid Zosterops sp. 17. 18. 19. Gr. Gen. B. p. 198. ex Hombr. et Jacq. Voy. Pole Sud, Ois. t. 19. 3. 4. et t. 20. 6.

c. Asiaticae.

9. **SYLVIA palpebrosa**, Temm. (annulosa var. a. Sw. Zosterops madagascariensis ex India vel Z. maderaspatica, Auct. - Z. palpebrosa, Gr.) Pl. col. 292. 3. ex Indiocc. et n.
- * 10. **Z. chloris**, Müll. Mus. Lugd. ex Banda. Flavovirescens; subtus flava, lateribus viridi indutis; superciliis pectore, abdomineque albidis.
- * 11. **Z. citrinella**, Müll. Mus. Lugd. ex Timor. Flavovirescens; gula, crissoque sulphureis; superciliis pectore, abdomineque albidis.
- * 12. **Z. montana**, Müll. Mus. Lugd. ex Sumatra. Similis Z. flavae ex Java, sed paullo maior.

13. *Z. nicobarica*, Gr. ex Blyth, Journ. As. Soc. Beng.

XIV. ex Ins. Nicobar.

14. *Z. japonica*, Temm. et Schleg. Faun. Jap. t. 22.

ex Japan.

d. Africanae.

15. *Z. flava*, Sw. nec Gr. (*Z. senegalensis*, Bp.) B. of

west. Afr. 11. p. 43. t. 3. ex Africa occ. Senegal.
Similis Z. dorsal; sed rostro nigro, robustiore.

16. *MOTACILLA madagascariensis*, L. (*Sylvia annulosa* et *Zosterops flavigula*, Sw.) Br. Orn. III. t. 28. 2.
Lev. Afr. t. 132. - Sw. Zool. Ill. t. 164.

17. *Z. chloronota*, Vieill. (*Certhia borbonica*, Gm.
Zosterops curvirostris, Sw. ex Blyth. - *Z. chloronota*, Gr.)
Pl. enl. 681. 2. - Ois. dor. t. 28. ex Ins. Mauritius.

18. *Ficedula borbonica*, Br. (*Zosterops cinerea*, Sw. - *Z. borbonica*, Gr. ex Bodd.) Pl. col. 705. 2. ex Madagascar.

19. *Z. curvirostris*, Elyth, nec Sw. Journ. As. Soc. XIV.
p. 363. et xv. p. 44. ex Ins. Mauritius.

20. *Z. abyssinica*, Guér. Rev. Zool. 1834. p. 185. ex
Afr. or.

21. *Z. pallida*, Sw. Two Cent. and a Quarter p. 294.
ex Africa m.

22. *Z. lateralis*, Sundev. Mus. Holm. ex Caffr.

23. *Z. virens*, Sundev. Mus. Holm. ex Caffr.

24. *Z. capensis*, Sundev. (Tcheric? Lev.) Mus. Holm.
ex Africa m.

Quid Z. ambigua, Sw. Two Cent. and a Quarter, p. 295?

FAMILIA 55. CAEREBIDAE.

SUBFAM. 117. CAEREBINAE.

862. *Caereba*, Vieill. 1807. ex Br. (*Nectarinia*, Cuv. - Arbelo-
rhina! Caban.)

Amer. mer. 6.

1. *CERTHIA cyanea*, L. (flavipes, Gm. - cyanogastra, Lath.
armillata, Sparrm.) Mus. Carls. t. 36. - Pl. enl. 83. 2.
Vieill. Ois. dor. t. 41. 42. 43. ex Brasil. Guiana.

2. *CERTHIA caerulea*, L. (ochrochlora, Gm. - surinamensis, Lath. - Fringilla cyanomelas? Gm. - Caereba caerulea, Vieill.) Edw. B. t. 21. l. - Sparrm. Mus. Carls. t. 82. - Ois. dor. t. 44, 45. - Penn. Gen. B. t. 3. 2. Nov. Comm. Petr. xi. t. 15. 6. ex Brasil. Guiana.
3. *CERTHIA gutturalis*, L. (Caereba gutturalis, Gr.) Pl. enl. 578. 3. ex Brasil.
4. *CERTHIA gularis*, Sparrm. (Caereba gularis, Vieill.) Mus. Carls. t. 79. ex Amer. m.
5. *CERTHIA trochilea*, Sparrm. (Caereba trochilea, Gr.) Mus. Carls. t. 80. ex Amer. m.
6. *C. nitida*, Hartl. Rev. Zool. 1847. p. 84. ex Amer. m.
Quid Caereba coccinea, Gr. (Trochilus coccineus nec Certhia coccinea, L. - C. rubra mexicana, Br.) Seba, Thes. t. 70. 8. ex Mex?
Quid Caereba fulva. - C. purpurea et C. variegata, Gr. ex Gm. Seba, Thes. t. 3. 2. et 72. 1?

863. *Dacnis*, Cuv. 1817.

Amer. mer. 11.

1. *CERTHIA cayana*, L. (Dacnis cayana, Cuv.) Pl. enl. 669. Vieill. Gal. Ois. t. 165. ex Brasil.
2. *CERTHIA cyanocephala*, L. (Dacnis cyanater, Less. D. cyanocephala, Orb.) Sw. Zool. Ill. ii. t. 117.
3. *D. angelica*, De Filippi 1845. Similis praecedentia sed minor; fronte, loris, temporibus, interscapulio rotutino, alis caudae minus splendide, nigris: capite, dorso, pectore, lateribus, scopularibus tertiarisque margine, nitidissime turcoso-caeruleis: ventro medio, tibiisque candidis: rostro pedibusque nigris.
4. *D. flaviventer*, Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 13. 2.
5. *D. bicolor*, Boekl. Mém. de Mosc. vii. t. 23.
6. *CERTHIA brasiliiana*, Gm. (Caereba brasiliiana, Br.) Orn. III. t. 32. 4. ex Brasil.
7. *CERTHIA spiza*, L. (Dacnis spiza, Gr. - Caereba spiza, Blyth.) Seba, Thes. II. t. 3. 4. - Pl. enl. 578. 1. et 682. 2. ex Brasil. Cayenne.
8. *CAEREEBA atricapilla*, Vieill. (Certhia spiza var. β. Lath. Merops spiza, Merr. - Nectarinia mitrata, Licht. - Dacnis atricapilla, Gr.) Pl. enl. 578. 2. et 682. 1. - Edw. B. t. 348. - Merr. Icon. Av. t. 5. - Vieill. Ois. dor. t. 49. ex Brasil.
9. *D. analis*, Orb. et Laf. Syn. Av. p. 21.

10. **SYLVIA plumbea**, Lath. (Daenis plumbea, Caban. 1844.

Sylvia caerulescens? Wied. - Mniotilta caerulescens?

Gr.) Tschudi, Faun. Peruan. p. 37. ex Brasil, Peru.

Cyano-plumbea; subtus plumbeo-alba.

Faem. griseo-virescens; subtus albo-virens.

11. **D. rufo-cinerea**, Bp. 1845. ex Bolivia. Capite, dorso, et tectricibus superioribus plumbis: fronte, genis, uropygia, et toto corpore subtus ferrugineis: alis, caudaque fusco-plumbeis.864. **Diglossa**, Wagl. 1832. (Campylops, Licht. 1837. - Anchiorhinus err. Agilarhinus, Bp. - Serrirostrum 1838. hinc Uncirostrum 1839. Lafr.) Mexico.Am.m.12.1. **D. baritula**, Wagl. (Uncirostrum brelayi, Lafr. - Anchiorhinus sittaceus, Bp.) Gr. et Mitch. Gen. B. t. 42. 1. mas. 2. faem. ex Mexico.2. **UNCIROSTRUM orbignyi**, Boiss. Hartl. (Diglossa baritula, p. Gr.) Gen. B. p. 137. sp. 1. et App. ex N. Grenada.3. **SERRIROSTRUM sitoides**, Orb. (Agrilorus olivaceus, Fraser. - Diglossa sitoides, Gr.) Voy. Am. m. figura. ex Columbia.4. **D. similis**, Lafr. Rev. Zool. 1846. p. 318.5. **D. mystacalis**, Lafr. (mystacea, Gr.) Rev. Zool. 1846. Mitch. Gen. B. t. 42. 3.6. **D. brunneiventris**, Lafr. - O. des Murs. Pl. p. 43. ex Chili.7. **D. aterrima**, Lafr.8. **UNCIROSTRUM lafresnayi**, Briss. (Agrilorus humeralis, Fraser. - Diglossa lafresnayi, Gr. p.) Rev. Zool. 1840. p. 5. ex Nova-Grenada.9. **AGRILORHINUS bonapartii**, Fraser. (Diglossa lafresnayi, Gr. p.) Pr. Zool. Soc. 1840. p. 22. - Bp. Act. Ital. Mediolan. 1844. ex S. Fe de Bogota.10. **UNCIROSTRUM cyaneum**, Lafr. (Agrilorus personatus, Fraser. - Diglossa melanopis, Tschudi. - D. cyanea, Gr.) Rev. Zool. 1840. p. 102. ex Nova-Grenada.11. **D. albilateralis**, Lafr. Rev. Zool. 1843. p. 98.12. **D. major**, Caban. in Schomb. Reise III. p. 157. ex Guyana.865. **Conirostrum**, Lafr. 1837.

America m. 6.

1. **C. cinereum**, Orb. et Lafr. Voy. Am. m. Ois. t. 59. 2.2. **C. atro-cyanum**, Lafr. Rev. Zool. 1848. p. 9. ex Columbia.

3. *C. albifrons*, Lafr. Rev. Zool. 1842. p. 301. - Mag. Zool. 1843. Ois. t. 35. ex Columbia.
4. *C. sitticolor*, Lafr. (bicolor, Less.) Gr. et Mitch. Gen. B. t. 34. ex Am. m.
5. *C. superciliosum*, Hartl. Rev. Zool. 1844. p. 215. ex America m.
6. *C. coeruleifrons*, Lafr. Rev. Zool. 1842. p. 103. ex America m.

866. **Certhiola**, Sundeval, 1836. America m. 1.
CERTHIA flaveola, L. (bartholemica, Sparrm. - Nectarinia anti'lensis, Less.) Edu. B. t. 122, et t. 362. 2. Catesb. Car. t. 59. - Mus. Carls. t. 57. - Zool. Ill. t. 52. ex Antill.

FAMILIA 56. PROMEROPIIDAE.

SUBFAM. 118. NECTARINIINAE.

867. **Pachyglossus**, Hodgs. (Dicaeum, p. Gr.) Asia mer. 1.
P. melanoxanthus, Hodgs. (Dicaeum melanoxanthum, Gr.) Journ. As. Soc. Beng. 1843. p. 1009.
868. **Myzanthe**, Hodgs. nec Vig. (Dicaeum, p. Gr.) Asia mer. 2.
 1. **SYLVIA hirundinacea**, Shaw. (rubricollis, Lath. - Pippigularis, Lath. - P. desmaresti, Leach. - Dicaeum pardalotus, Cuv. - atrigaster, Less. - sanguineum, Sw. Myzanthe hirundinacea, Gould.) Lewin, N. Holl. B. t. 7. - Mag. Zool. 1833. Ois. t. 14. - Gould, Austr. t. 34. ex Austr. univers.
 2. **M. ignipectus**, Hodgs. (Dicaeum ignipectus, Gr.) Journ. As. Soc. XII. p. 983. ex Nepal, Sikim, Buton.
Quid Myzanthe? Voy. au Pole Sud, Ois. t. 22. 4?
869. **Dicaeum**, Cuv. 1817. Asia m. Oc. 16.
 1. **CERTHIA cruentata**, L. nec Horsf. (coccinea, Scopoli. erythronotus, Lath. - Nectarinia ignita, Begbie. - Dicaeum rubricapillum, Less. - D. coccineum, Gr. - D. cruentatum, Blyth.) Edu. B. t. 81. - Sonn. Voy. Ind. t. 117. t. - Vieill. Ois. dor. t. 33. ex Bengal, Arakan, Malacca, Borneo.

2. CERTHIA *trigonostigma*, Scopoli. (cantillans, Lath.)
Dicaeum croceiventre, Vig. - D. trigonostigma, Gr.)
Sonn. Voy. Ind. t. 117.2. - Pl. col. 478.3. ex Arakan,
Penins. Malacca, Sumatra, Borneo.
3. **D. chryschlorum**, Blyth. (*chrysoorrhacum*, Temm.)
Pl. col. 478.1. ex Arakan, Tonasseri, Malacca,
Java, Borneo.
4. **D. concolor**, Jerd. Ill. Ind. Orn. t. 39. ex Mont.
Nilgher. Malabar.
5. NECTARINIA *minima*, Tickell. (Certhia erythrorhyncha?
Lath. ex fig. mala jun. - Dicaeum tickelliae *hinc* mini-
mum, Blyth. - Myzanthe inornata, Hodg.) Journ. As.
Soc. II. p. 577.
6. **D. cruentatum**, Horsf. nec L. (Nect. *rubrocana*,
Tenn.) Pl. col. 108. - Lev. Afr. t. 136. ex Java,
Borneo.
7. **D. celebicum**, Müll. (leclancheri, Lafr.) Verhand.
Ethnogr. p. 162. ex Celebes.
8. **D. macklotii**, Müll. Pl. col. fig. nulla. ex Timor.
9. **D. sanguinolentum**, Temm. Pl. col. 478.2. Java.
10. CERTHIA *papuensis*, Lath. (Dicaeum papuense, Gr.)
Pl. enl. 707.2. ex N. Guinea.
11. **D. pectorale**, Müll. Verhand. Ethnogr. p. 162. ex
Nova-Guinea.
12. **D. erythrothorax**, Less. Voy. Coq. Ois. t. 30.1.2.
ex Ins. Buru, Amboina.
13. **D. rubescens**, Vieill. (Certhia erythropygia? Lath.)
Lev. Afr. t. 136.
14. CERTHIA *rubra*, Gm. (Dicaeum atriceps, Vieill. - D.
scarlatinum, Schinz. - D. rubrum, Gr.) Syst. Nat. I.
p. 479. sp. 46.
15. CERTHIA *grisea*, Scopoli. (taeniata, Shaw. - Dicaeum
flaviceps, Vieill. - D. griseum, Gr.) Sonnini, Voy.
t. 117.3.
16. **D. pygmaeum**, Kittl. Mem. de Petersb. 1835. t. 5.
Quid Dicaeum mangei, D. aterrimum et D. nigrum, Gr. { Gen. p. 100.
sp. 15. 18. 19. ex Lesson, Tr. Orn. p. 303. et Cent. Zool. t. 30?
Quid D. saccharinum, Eyton, Gr. ex Latham?
870. **Drepanis**, Temm. 1820. (Vestaria, Flem. 1822.) Micronesia. 5.
1. CERTHIA *pacifica*, Gm. (Vestaria hoho, Less.) Vieill.
Ois. dor. t. 63. - Lev. Guép. t. 19. ex Ins. Amic.

2. *CERTHIA coccinea* et *obscura*, *Gm.* (*vestiaria*, *Lath.*)
Vestiaria evi et *akaroa*, *Less.* - *Drepanis coccinea*, *Gr.*)
Gen. Syn. t. 33. 1. - *Merr. Icon. Av. t. 4.* - *Vieill.*
Ois. dor. t. 52. et 53. - *Shaw, Nat. Misc. t. 75. ex*
In s. Sandw.
3. *CERTHIA falcata*, *Gm.* (*Drepanis falcata*, *Gr.*) *Syst.*
Nat. 1. p. 470. sp. 30. ex Oceania.
4. *CERTHIA sanguinea* et *virens*, *Gm.* (*Nectarinia byro-*
nensis et *flava*, *Blox.* - *Phyllornis tonganensis*, *Less.*
Drepanis sanguinea, *Gr.*) *Vieill. Ois. dor. t. 66. 67. 68.*
5. *NECTARINIA rufa*, *Blox.* *Byron, Voy. p. 250.* - *Voy.*
Sulphur. B. fig. optima.
Quid D. olivascens, Vieill. Ois. Orn. t. 5?

871. *Hemignathus*, *Licht.* 1838. (*Heterorhynchus*, *Lafr.* 1839.)

- Drepanis*, *p. Gr.* Micronesia. 1.
NECTARINIA lucida, *Licht.* (*Heterorhynchus olivaceus*,
Lafr. - *Vestiaria heterorhyncha*, *Less.* - *Drepanis lu-*
cida et *olivacea*, *Gr.*) *Mag. Zool. 1839. Ois. t. 10.* - *Voy.*
Venus, Ois. t. 1.

872. *Nectarinia*, *Ill.* 1811. nec *Sw.* (*Cinnyris*, *p. Cuv.*) Afr. As. m. Oc. 16.

a. Africanæ.

1. *CERTHIA pulchella*, *L.* (*Cinnyris caudatus*, *Vieill.* - *C.*
pulchella, *Cuv.* - *Nectarinia pulchella*, *Gr.*) *Pl. enl.*
670. 1. - *Sw. B. of west. Afr. II. t. 14.* - *Jard. Nectar.*
t. 18. - *Vieill. Ois. dor. t. 40.* - *Lev. Afr. t. 293. 1.*
ex Afr. m. et occ. Senegal, et Kordofan, 15.

2. *CERTHIA formosa*, *L.* err. *famosa*. (*longicauda* et *bonae-*
spei, *Br.*) *Pl. col. 83. 1.* - *Vieill. Ois. dor. t. 37. 38.*
Lev. Afr. t. 289. 290. - *Nat. Libr. Nectarin. t. 17.*
ex Afr. m. 16.

3. *CERTHIA violacea*, *L.* (*erecta*, *Shaw.* - *Cinnyris cro-*
cea, *Less.* - *Nectarinia violacea*, *Gr.*) *Pl. enl. 670. 2.*
Lev. Afr. t. 292. - *Vieill. Ois. dor. t. 39.* - *Nat. Misc.*
t. 210. - *Nat. Libr. Nectarin. t. 16.* ex *Afr. m.* 17.

4. *CINNYRIS adelberti*, *Gerv.* (*Nectarinia adelberti*, *Gr.*)
Mag. Zool. 1835. Ois. t. 2. - *Jard. et Selb. Ill. Orn. n.*
s. t. 49. - *Jard. Nect. t. 30.* 18.

5. *CINNYRIS cardinalis*, *Vieill.* (*Nectarinia cardinalis*,
Gr.) *Lev. Afr. t. 291.* 19.

6. **CINNYRIS platura**, Vieill. (*Nectarinia sylviella*, Temm.
N. platura, Gr.) *Ler. Afr.* t. 293. 2. - *Temm. Pl. col.*
347. (note) - *Jard. Nect.* t. 19. ex *Senegal*.
7. **N. tocasze**, Stanl. (*Nectarinia tocasze*, Rupp.) *Faun.*
Abyss. t. 31. 3. ex *Afr.* or.
b. *Asiatica et Malaiasiana*.
8. **CERTHIA goolpariensis**, Lath. (*miles*, Hodgs. - la-
beula, MacClell. - *Cinnyris vigoris mas et concolor faem.*
Sykes. - *Nectarinia seheriae*, Tickel. - *N. lathami*, Jard.
N. goolparensis, Blyth.) *Royle, Ill. Him. Botan.* t. 7.
Jard. Monogr. Nect. t. 27. ex *Ind. m. s. et or.*
9. **CERTHIA siparaja**, Raffl. (*Nectarinia mystacalis*, Temm.
N. siparaja, Blyth.) *Pl. col.* 126. 3. - *Verh. Nat. Gesch.*
t. 9. 1. ex *Penins. Malacca, et Ins. Sondaicis.*
10. **CINNYRIS gouldiae**, Vig. 1830. (*Nectarinia gouldiae*,
Blyth.) *Gould, Cent. Him. B.* t. 56. ex *Sikim, Arak.*
11. **CINNYRIS ignicauda**, Hodgs. (*rubricaudata*; Blyth.
Nectarinia phaenicura, Jard. - *N. ignicauda*, Blyth. - *Cin-*
nnyris epimecurus, Hodgs.) *Nat. Libr. Nectarin.* t. 29.
12. **CINNYRIS nepalensis**, Hodgs. (*Nectarinia nepalensis*,
Blyth. - *Hemipteroc nepalense*, Hodgs.) *Nat. Libr.*
Nectarin. t. 27. ex *Him. m. or.*
13. **N. horsfieldi**, Blyth, *Journ. As. Soc.* xii. p. 975.
ex *Himal.*
14. **CINNYRIS saturata**, Hodgs. (*assamensis*, MacClell.
hodsonis, Jard. - *Nectarinia saturata*, Blyth.) *Nat. Libr.*
Nectarin. t. 29. ex *Him. s. Assam.*
15. **N. temminchi**, Müll. *Verh. Zool. Aves.* t. 8. 2, ex
Sumatra.
16. **N. eximia**, Horsf. nec Temm. (*kuhlii*, Temm.) *Pl. col.*
376. 1. 2. ex *Java*.
- Quid *Nectarinia aurantia* - *macassariensis* (*Seba, Thes.* t. 63. 3.
manillensis - *ambonensis* (*Seba, Thes.* t. 262.) *omnicolor* (*Seba,*
Thes. t. 69. 5.) - *indica* (*Seba, Thes.* t. 19. 2.) ex *Gm?*
Quid *Nectarinia verticalis* (*Vieill. Ois. dor.* t. 25?) - *frontalis* - *coc-*
ciniogaster - *chrysoptera* - *cirrhata* - *erythrorynches* - *parietum*
(*Sylvia indica*, *Vieill.*) - *tabacina* - ex *Latham?*
Quid *Nectarinia erythrothorax* - *violaceifrons* - *leucogaster* - *sola*.
subflava - *ruficollis* - *cinericeicollis* - *nigrescens* - *et nigrogaster*
ex *Vieillot. Gr. Gen. B.* p. 98. 99. sp. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94?

873. **Cinnyris**, Cuv. p. (Nectarinia, p. Gr.)

Afr. As. Ocean. 50.

a. Africanae.

1. **CERTHIA rubro-fusca**, Shaw. (Cinnyris erythronotus, Sw.) Vieill. Ois. dor. t. 27. - Nat. Libr. B. of west. Afr. t. 15. ex Afr. occ.
2. **CERTHIA amethystina**, Shaw. (Cinnyris amethystina, Cuv. - auratifrons, Vieill.) Lev. Afr. t. 294. t. - Vieill. Ois. dor. t. 5. 6. - Jard. Nectar. t. 13. ex Afr. m. et or.
3. **CERTHIA cuprea**, Shaw. (rubrofusca? Shaw. - Cinnyris tricolor et nigerus? Vieill. - C. chloronotus, p. Sw.) Ois. dor. t. 23. et 27. - B. of west. Afr. t. 15. Afr. occ.
4. **CERTHIA cyanocephala**, Gm. (Cinnyris chloronotus, p. Sw.) Vieill. Ois. dor. t. 7. - B. of west. Afr. t. 16. Jard. Nectar. t. 10. ex Afr. m. et occ.
5. **C. collaris**, Vieill. (Nectarinia collaris, Gr.) Lev. Afr. t. 299. - Jard. Nectar. t. 6.
6. **NECTARINIA cruentata** et proteus, Rüpp. Syst. Uebers. N. Ost. Afr. Vög. t. 9. ex Abyssinia.
7. **CERTHIA fuliginosa** et maculata, Shaw. (Nectarinia fuliginosa, Gr.) Vieill. Ois. dor. t. 20. 21. - Jard. Nect. t. 14.
8. **NECTARINIA stangeri**, Jard. Ill. Orn. n. s. t. 48. Nectar. t. 15.
9. **C. pusilla**, Sw. B. of west. Afr. II. p. 138. ex Afr. occ.
10. **C. rubescens**, Vieill. (Nectarinia rubescens, Gr.) Enc. Meth. p. 593. ex Afr. occ.
11. **NECTARINIA metallica**, Licht. - Rüpp. Atl. t. 7. Hempr. et Ehr. Symb. Phys. t. 1. - Temm. Pl. col. 347. 1. 2. ex Nubia, Abyssinia.
12. **NECTARINIA affinis**, Rüpp. (Nectarinia affinis, Gr.) Faun. Abyss. t. 31. 1. ex Abyssinia.
13. **C. aenea**, Vieill. (Nectarinia aenea, Gr.) Lev. Afr. t. 297.
14. **NECTARINIA habessinica**, Ehrenb. Symbol. Phys. Av. t. 4. ex Abyssinia.
15. **NECTARINIA gularis**, Rüpp. (Nectarinia gularis, Gr.) Faun. Abyss. t. 31. 2. ex Cordofan.
16. **CERTHIA rectirostris**, Shaw. (Cinnyris elegans, Vieill. - Nectarinia rectirostris, Gr.) Ois. dor. t. 75. Gal. Ois. t. 178. ex Afr. mer.
17. **NECTARINIA purpurata**, Illig. - Kittl. Kupf. Vög. t. 28. 1. ex Abyssinia.

18. **CERTHIA soui-manga**, Gm. (madagascariensis, Lath.)
Br. Orn. t. 32. 2. 3. - Vieill. Ois. dor. t. 18. 19.
19. **C. virescens**, Vieill. (Nectarinia virescens, Gr.) *Ois. dor. t. 34.*
20. **C. splendens**, Vieill. (Nectarinia splendens, Gr.)
Ois. dor. t. 2. ex Guineae.
21. **CERTHIA canora**, Scopoli. (viridis, Lath. - scarlatina, Sparrm.) *Sonn. Voy. Ind. n.t. 116.2. - Mus. Carls. t. 58.*
22. **CERTHIA anguliana**, Shaw. (lateria, L. Lath. - Cinnyris madagascariensis? Quoy et Gaim. - Nectarinia anguliana, Gr.) *Br. Orn. t. 33. 4. 5. - Pl. enl. 575. 2. 3. - Vieill. Ois. dor. t. 3. 4.*
23. **CERTHIA afra**, L. (Cinnyris smaragdina, Vieill. - Certhia erythrogaster, Shaw. - Cinnyris pectoralis, Vieill. Nectarinia afra, Gr.) *Edw. B. t. 347. - Lev. Afr. t. 300. Shaw, Nat. Misc. t. 387. - Vieill. Ois. dor. t. 10. - Jard. Birds, t. 2. ex Africa mer.*
24. **CERTHIA chalybea**, L. (capensis? L. - Nectarinia chalybea, Gr.) *Pl. enl. 246. 2. - Shaw, Nat. Misc. t. 381. - Vieill. Ois. dor. t. 80 et 14. - Sw. Ill. Zool. t. 95. Jard. Nectar. t. 1 ex Afr. mer. et occ.*
25. **C. verreauxii**, Smith. (Nectarinia verroxi, Gr.) *Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 51. a. mas. b. faem. - Jard. Monogr. Nectar. t. 9. ex Afr. m.*
26. **NECTARINIA obscura**, Jard. et S. *Ill. Orn. n. s. t. 51.*
27. **C. olivacea**, Smith. (Nectarinia olivacea, Gr.) *Ill. S. Afr. Zool. fig. nulla.*
28. **C. fusca**, Vieill. (Nectarinia fusca, Gr.) *Lev. Afr. t. 296. ex Afr. mer.*
29. **CERTHIA venusta**, Shaw. (Cinnyris pusilla, Sw. - quinticolor, Less. - Nectarinia parvula, Jard. - N. venusta, Gr.) *Nat. Misc. t. 369. - Vieill. Ois. dor. t. 79. - Jard. Nectar. t. 7.*
30. **C. pusilla**, Vieill. (Nectarinia pusilla, Gr.) *Lev. Ois. Afr. t. 298.*
31. **NECTARINIA chloropygia**, Jard. *Ill. Orn. n. s. t. 50.*
Nectar. t. 3.
32. **CERTHIA bifasciata**, Shaw. (Cinnyris nitens, Vieill. Nectarinia bifasciata, Gr.) *Vieill. Ois. dor. t. 24. - Jard. Nect. t. 4.*

33. *CERTHIA senegalensis*, L. (*Cinnyris senegalensis*,
Cuvier. - *discolor*, Vieill.) Br. Orn. iii. t. 34. 2. - Vieill.
Ois. dor. t. 8. 9. - Lev. Afr. t. 295. 2. - Kittl. Kupf.
Vög. t. 28. 2. ex Afr. m. et occ.
34. *C. superba*, Vieill. (*Nectarinia superba*, Gr.) Ois.
dor. t. 22.
35. *CERTHIA natalensis*, Jard. Nectar. t. 12.
36. *CERTHIA splendida*, Shaw. (*Cinnyris bombycinus*,
Vieill. - *Nectarinia splendida*, Gr.) Gen. Zool. t. 26.
Lev. Afr. t. 295. 1. - *Ois. dor. t. 82.* - Jard. Nectar. t. 5.
- b. Asiaticae et Malaiasianae.
37. *CERTHIA asiatica* et *curruccaria?* L? (mahrattensis, chry-
soptera, cirrhota, et curruccaria, Lath. - saccharina, Shaw.
epaulette et strigula, Hodgs. - *Cinnyris cyanus*, Vieill.
orientalis, Franklin. - jodea, Less. - *Nectarinia asiatica*,
Blyth. - mahrattensis, Gr.) Edu. B. t. 265. fig. inf.
Vieill. *Ois. dor. t. 12.* - Nat. Libr. Nectarin. t. 24.
ex India m. Ceylon.
38. *CERTHIA lotenia*, L. (polita, Lath. - purpurata, Shaw.
Nectarinia lotenia, Blyth. an Sw.) Edu. B. t. 265. fig. sup.
Vieill. *Ois. dor. t. 11.* - Nat. Libr. Nectarin. t. 23.
ex India m. Ceylon.
39. *NECTARINIA simplex*, Müll. (frontalis, Blyth.) Zool.
Ind. Archipel. t. 8. 4. ex Sumatra, Borneo.
40. *NECTARINIA phaenicotis*, Temm. Pl. col. 103. 1. et
338. 2. ex Burmania, Penins. Malacca, Su-
matra, Java, Borneo.
41. *NECTARINIA frenata*, Müll. Verh. Zool. Aves. t. 8. 1.
ex Celebes, N. Guinea.
42. *NECTARINIA solaris*, Temm. (*Cinnyris solaris*, Bp.)
Pl. col. 347. 3. - Verh. Nat. G. Ned. t. 8. 5. ex Timor.
43. *NECTARINIA pectoralis*, Horsf. (eximia, Temm. nec
Horsf. - *Certhia philippensis* olivacea, Br.) Pl. col. 138. 1.
Pl. enl. 576. 4. - Müll. Verh. t. 9. 2. ex Ins. Nicobar,
Java, Sumatra.
44. *NECTARINIA PECTORALIS*, Temm. (*Cinnyris macklotii*,
Bp.) Pl. col. 138. mas. 3. faem. 2. - Müll. Zool. Ind.
Archipel. t. 9. faem. mid. ov. ex Java, Sumatra.
45. *NECTARINIA flammavicularis*, et *jugularis*, Blyth,
Journ. As. Soc. xiv. p. 557. et xii. p. 979. ex Arakan,
Tenasserim.

46. CERTHIA *zeylonica*, L. (dubia? Shaw. - quadricolor? Scopoli. - Cinnyris sola, Jerd. - C. lepida, Sykes nov. Lath. faem. - nigralba, Less. - Nectarinia philippensis, Meyen - N. zeylonica, Blyth.) Vieill. Ois. dor. t. 16. 17. 81? - Sonn. Voy. t. 30. A. - Nat. Libr. Nectarin. t. 20. fig. mala. ex India m. Ceylon.
47. *C. minima*, Sykes 1832. (Nectarinia minima, Blyth.) Nat. Libr. Nectarin. t. in frontisp. ex India m.
48. NECTARINIA *leusselli*, Temm. (phayrii, Blyth 1843. Certhia sperata var. Raffles. - C. brasiliiana, Shaw.) Pl. col. 376. 3. - Verh. Nat. G. Nederl. t. 10. 5. - Jard. Monogr. Nectar. t. 22. ex Burmannia, Arakan, Tenasserim, Ins. Sondaicis.
49. *C. aspasia*, Less. (Nectarinia aspasia, Gr.) Voy. Coq. Ois. t. 30. ex Celeb. Amboina, N. Guinea.
50. *C. zenobia*, Less. (Nectarinia zenobia, Gr.) Voy. Coq. Ois. t. 30. 1. ex Gilolo, N. Guinea.

874. **Anthreptes**, Sw. (Nectarinia, p. Gr.) As. m. Oc. Afr. 5.
1. CERTHIA *lepida*, Lath. (malaccensis? Scop. - Nectarinia javanica, Horsf. - Anthreptes javanica, Sw.) Sonn. Voy. t. 116. 1. - Mus. Carls. t. 35. - Zool. Ill. t. 121. ex Ins. Sondaicis.
 2. NECTARINIA *hypogrammica*, Müll. (nuchalis, Blyth mas. - Anthreptes macularia, Blyth, faem.) Zool. Ind. Archipelag. t. 8. 3. ex Sumatra, Borneo.
 3. CINNYRIS *fraseri*, Jard. (Nectarinia fraseri, Gr.) Ill. Orn. n. s. t. 53.
 4. CINNYRIS *longuemarii*, Less. (Anthreptes leucosoma, Sw. - Nectarinia longuemari, Gr.) Ill. Zool. t. 23. - B. of west. Afr. t. 17. ex Afr. occ.
 5. CINNYRIS *melasoma*, Less. (Nectarinia melasoma, Gr.) Rev. Zool. 1840, p. 272. ex Senegal.
875. **Arachnothera**, Kuhl, Temm. Asia m. Ocean. 10.
1. CERTHIA *longirostra*, Lath. nec Raffles. - Pl. col. 84. 1. Griff. Anim. Kingd. vii. p. 391. cum fig. ex Java, Sumatra, Borneo, Celebes.
 2. CINNYRIS *longirostris*, Jard. (Arachnothera inornata, hinc affinis, Blyth.) Madr. Journ. XIII. p. 172. ex Arakan, Penins. Malacea.
 3. *A. inornata*, Temm. (Cinnyris affinis, Horsf.) Pl. col. 84. 2. ex Java, Sumatra.
1. Jan. 1850.

4. *CERTHIA LONGIROSTRA*, *Raffles* nec *Lath.* (Arachnothera
chrysogenys, Temm. - *flavigenys*, Sw.) *Pl. col.* 388.
1. mas. ex *Penins. Malacca, Sumatra, Borneo.*
5. *CINNYRIS MAGNA*, *Hodgs.* (Arachnothera *inornata* ex *Assam*,
Horsf. - Ar. *magna*, *Blyth.*) *Ind. Rev.* 1837. p. 272. ex
Nepal, Sikkim, Arakan.
6. *ANTHEPTES MODESTA*, *Eyton.* (Arachnothera *latirostris*,
Blyth.) *Proc. Zool. Soc.* 1839. p. 105. ex *Penins.*
Malacca.
7. *A. robusta*, *Müll. Zool. Ind. Archip. t. 11.* 1. mas. ex
Sumatra.
8. *A. armata*, *Müll. Zool. Ind. Archip. t. 11.* 2. mas. ex
Java, Sumatra.
9. *CINNYRIS NORAE-GUINEAE*, *Less.* (Arachnothera *nova-*
guineae, *Müll.*) *Voy. Cog. Zool. I.* p. 677. - *Zool. Ind.*
Archip. t. 11. 3. faem. ex *Nova Guinea.*
10. *A. uropygialis*, *Gr. et Mitch.* *Gen. B.* t. 33. ex

SUBFAM. 119. PROMEROPINAE.

876. *Promerops*, Br. (*Falcinellus*, *Vieill.* - *Ptiloturus*, *Sw.* 1837.)
Ptilurus, *Caban.* Africa merid. 1.
UPUPA PROMEROPS et *Merops cafer*, L. (*Promerops capen-*
sis, *Less.* - *Cinnyris longicaudatus*, *Vieill.*) *Pl. enl.* 637.
Lev. Afr. t. 287. 288. - *Vieill. Ois. dor. t. 4.* ex
Africa mer.

FAMILIA 57. IRRISORIDAE.

SUBFAM. 120. IRRISORINAE.

Ad Volucres, nec ad Oscines pertinet: inter Trochi-
lidas et Upupidas collocanda!

877. *Irrisor*, *Less.* Africa 7.
1. UPUPA *erythrorhynchos*, *Lath.* (*viridis*, *Licht.* - *Pro-*
merops erythrorhynchus, *Cuv.* - *Irrisor capensis*, *Less.*)
Syn. Suppl. t. 110. - *Nat. Misc. t. 533.* - *Lev. Prom.*
t. 1. 2. 3. - *Vieill. Ois. dor. t. 6.* ex *Afr. m.*
2. *I. melanorhynchos*, *Gr. ex Licht.* (*Falcinellus sene-*
galensis, *Vieill.* - *Promerops senegalensis*, *Sw.* - *Epi-*
machus melanorhynchos, *Wagl.*) *Lev. Prom. t. 4.*
Gr. et Mitch. Gen. B. t. 31. ex *Afr. occ.*

3. **FALCINELLUS caudacutus**, Vieill. (Irrisor caudacutus,
Gr. - Epimachus obscurus, Wagl.) Lev. Prom. t. 8. mas.

17. faem. ex Madagascar.

4. **UPUPA INDICA**! Lath. (Promerops *coeruleus*, Shaw.
Falcinellus caeruleus vel cyaneus, Vieill. - Epimachus
caeruleus, Wagl. - Irrisor indicus, Gr.) Vieill. Ois.
dor. t. 9. - Lev. Prom. t. 7. - Nat. Misc. t. 985. ex
Africa mer.

5. **EPIMACHUS unicolor**, Licht. (Irrisor unicolor, Gr.) Isis,
1829. p. 656. ex Africa mer.

6. **EPIMACHUS lamprolophos**, Wagl. (Irrisor lamprolo-
phos, Gr.) Lee. H. Nat. Promer. t. 11. 12. ex Afr. m.

7? **FALCINELLUS sibilator**, Vieill. (Epimachus sibilatrix,
Wagl. - Irrisor sibilator, Gr.) Lev. Prom. t. 10. Afr. m.

878. **Rhinopomastes**, Smith. (Irrisor, p. Gr.) Africa. 3.

1. **FALCINELLUS cyanomelas**, Vieill. (Upupa purpur-
cens, Burch. - Promerops cyanomelas, Cuv. - Pr. pur-
puratus, Sue. ex Burch. - Rhinopomastes smithi, Jardin.
R. levaillanti, Less. - Epimachus cyanomelas, Wagl.)
Levaill. Promer. t. 5. 6. - Zool. Journ. IV. t. 1. Afr. m.

2. **PROMEROPS pusillus**, Sw. (Promerops cyanomelas? Rüpp.
Irrisor aterrimus, Gr. ex Steph.) B. of west. Afr. II.
p. 120. ex Afr. occ. et or.

3. **EPIMACHUS hinc Promerops minor**, Rüpp. (Irrisor minor,
Gr.) Syst. Uebers. Vög. N. Ost. Afr. t. 8. Afr. or. Schea.

879. **Falculia**, Is. Geoffr. Madagascar. 1.

F. palliata, Is. Geoffr. Mag. Zool. 1838. Ois. t. 49.
ex Madag. Alba; alis, dorso, caudoque nigris.

FAMILIA 58. EPIMACHIDAE.

SUBFAM. 121. EPIMACHINAE.

880. **Epimachus**, Cuv. (Cinnamolegus, Less.) N. Guinea. 1.

UPUPA magna et fusca, Gm. (U. superba et papuensis,
Lath. - speciosa et striata, Bodd. - Cinnamolegus papu-
ensis, Less. - Epimachus superbus, Wagl. - E. spe-
ciosus, Gr.) Pl. enl. 638. 639. - Sonn. Voy. N. Guin.
t. 100. 101. - Lev. Promer. t. 8. 13. 14. 15. - Vieill.
Ois. dor. t. 7. - Less. Parad. t. 39. mas. 40. faem. ex
Nova Guinea.

881. **Ptiloris**, Sw. 1825. (Epimachus, p. Gr.) N. Guin. Austr. 2.

1. **P. paradiseus**, Sw. (Epimachus regius, Less. - Ep. brisbani, Wils.) Ill. Zool. t. 9. - Less. Cent. Zool. t. 3. Voy. Coq. t. 28. - Hist. Par. t. 29. mas. 30. faem. - Gould, Austr. iv. t. 100. ex Austr. or. m.
2. **P. victoriae**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1840. cum fig. ex N. Guinea.

882. **Craspedophora**, Gr. 1840. (Epimachus, p. Gr.) Nova Guinea. 1.

EPIMACHUS **magnificus**, Vieill. (splendidus, Steph.) Cuv. Rign. Anim. Ois. t. 4. 2. - Lev. Promer. t. 16. - Less. Tr. Orn. t. 74. 1. - Cent. Zool. t. 4. 5. - Hist. Parad. t. 32. mas. 33. jun. 34. faem. - Gr. et Mitch. Gen. of B. t. 32. err. paradiseus! ex N. Guinea.

883. **Seleucides**, Less. (Falcinellus, p. Vieill. - Nematophora

hinc Epimachus, p. Gr.) Nova Guinea. 1.

PARADISEA **alba**, Blumenbach. (nigricans, Shaw. - violacea, Bechst. - candida, Forst. - Falcinellus resplendens, Vieill. - Seleucides acanthylis, Less. - Epimachus albus, Vieill.) Lev. Prom. t. 16. 17. - Vieill. Gal. Ois. t. 185. Less. Parad. t. 36. 37. mas. 38. jun. ex N. Guinea.

FAMILIA 59. PARADISEIDAE.

SUBFAM. 122. PARADISEINAE.

884. **Paradisea**, L. (Manucodiata, Briss. - Samalia, Vieill.) Nova Guinea. 3.

1. **P. apoda**, L. (major, Shaw.) Pl. enl. 254. - Edw. B. t. 110. - Vieill. Ois. dor. t. 1. - Lev. Parad. t. 1. 2. Less. Parad. t. 6. mas. ad. ex Nova Guinea. Castanea, pectore violaceo induto: capite plumis brevissimis dense velutinis; fronte, loris, jugulo quo atro-viridis; pilo cerviceo flavis: plumis infra-humeralibus longissimis, sericis, fluitantibus, rachide nudo terminatis: rectricibus dualibus mediis in cirrho longissima recurvo ultra omnes productis. Faem. flavido-fuscens; fronte, guda, alis, caudaque castaneis; subtus unicolor, alba; plumis elongatis nullis.

2. **P. papuana**, Bechst. (minor, Forst. - apoda faem! Aliq. Phoenix, Belon.) *Lev. Parad.* t. 4. 5. - *Vieill. Ois. dor.* t. 2. - *J. Gr. Ill. Ind. Zool.* t. 27. - *Less. Parad.* t. 2. mas. ad. 3. faem. 4. jun. 5. hor. ex *N. Guinea*. Similis praecedenti; sed minor et dilutior; dorso toto, uropygio, alis, caudaque castanea: capite ex toto plumis brevissimis, congestis, atro-viridi, holosericeo: plumis infra-humeribus elongatis, latiusculis, fluitantibus, sanguineis.

3. **P. rubra**, Vieill. (sanguinea, Shaw.) *Ois. dor.* t. 3. *Lev. Parad.* t. 6. - *Less. Parad.* t. 7. mas. ad. 8. faem. *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 79.* Flava; subtus, et in uropygio, alis, caudaque castanea: capite ex toto plumis brevissimis, congestis, atro-viridi, holosericeo: plumis infra-humeribus elongatis, latiusculis, fluitantibus, sanguineis.

885. **Diphyllodes**, Less. (Paradisea, p. Gr.) Nova Guinea. 2.

1. **PARADISEA magnifica**, Scopoli. (cirthata, Lath. - speciosa, Gr. ex Bodda. - Diphyllodes seleucides, Less.) *Pl. entl. 631.* - *Sonn. Voy. t. 98.* - *Lath. Synt. t. 19.* - *Vieill. Ois. dor.* t. 4. - *Lev. Parad.* t. 9. 10. - *Less. Par.* t. 19. 20. mas. ex *Nova Guinea*. Castanea; uropygio, caudaque sordide virescenti-fuscis; alis flavo-fulvescentibus; subtus viridis, pectoris litura caerulea: capite ex toto flavo-fusco: fasciculo nuchali e plurimis densis, sericois, elongatis, flavis.

* 2. **D. respública**, Bp. *Comptes Rend. Acad. Par.* 1849. Fig. nulla. ex *Nova Guinea*. Fasciculo e plurimis elongatis nuchae rubris.

Quae sint qui summo ardore innitantur, ut pulcherrimas species Principum nominibus appellant; equidem cui omnium minime Principum auctoritas cordi est, speciosissimam Aiem Paradiseam Reipublicae nomine condecoravi: Republicas illius, quae esset Paradiseus, nisi Tartarus fieret malis artibus, atque ambitione Republicanorum, nomine quod sibi arrogaverunt indignorum... Sed cum non existat Respublica paradisea... existat saltem Paradisea res publica!...

886. **Cicinnurus**, Vieill. (Paradisea, p. Gr.) Nova Guinea. 1.

PARADISEA regia, L. (rex, Scopoli. - Cicinnura spintrix, Less.) *Pl. entl. 496.* - *Edw. B. t. 111.* - *Lev. Par.* t. 7. - *Vieill. Ois. dor.* t. 5. - *Less. Parad.* t. 16. 17. mas, 18. faem. ex *Nova Guinea*. Coccinea; subtus alba: superciliis angustis, nigris, holosericeis; fascia jugulari smaragdina: pectoris lateribus plumis elongatis, truncatis, cinerascentibus, fascia apicali viridi, albo-marginata: recticulis duabus mediis longissimis, filiformibus, apice in spiram contortis.

Faem. ex virescente fusco; subtus rufo-canescens, fusco-varia,

887. **Lophorina**, Vieill. (Paradisea, p. Gr.) Nova Guinea. 1.

PARADISEA **superba**, Scopoli, (nigra, Forst. - furcata, Lath. - atra, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 632. - Sonn. Voy. t. 96. - Vieill. Ois. dor. t. 7. - Lev. Parad. t. 14. 15. Nat. Miscell. t. 1021. - Less. Parad. t. 13. et 14. mas. ad. Fronte bicristata: chlamyde ex plumis elongatis nucha flava.

888. **Parotia**, Vieill. (Paradisea, p. Gr.) Nova Guinea. 1.

PARADISEA **aurea**, Gm. (sexsetacea, Lath. - penicillata, Scopoli. - sexpennis, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 633. - Sonn. Voy. t. 97. - Vieill. Ois. dor. t. 6. - Gal. Ois. t. 9. Lev. Parad. t. 12. 13. - Less. Parad. t. 10. et 11. mas. ad. 11. bis. jun. 12. faem. ex Nova Guin. Purpureo-nigra, jugulo medio plumis rotundatis, imbricatis, aureo-viridibus, apicibus topazino-amethystinis: sincipite albo; occipite cristato, plumis latis nigris, apice viridibus: lateribus copitis utrinque plumis trilobis, rachide longissima setacea, apice discoideo-vexillata.

FAMILIA 60. STURNIDAE.

SUBFAM. 123. LAMPROTORNITHINAE.

889. **Astrapia**, Vieill. (Lamprornis? Nitzsch. - Lamprotornis, p. Temm.) N. Guinea. 1.

PARADISEA **nigra**, Gm. (gularis, Lath. - Astrapia gularis, Vieill.) Gal. Ois. t. 107. - Lev. Parad. t. 20. 21. 22. Vieill. Ois. dor. t. 8. 9.

890. **Paradigalla**, Less. (Astrapia, p. Gr.) N. Guinea. 1.

P. carunculata, Less. (Astrapia carunculata, Eyt. ei Stanley. 1840.) Voy. Bonite Ois. cum figura. N. Guinea.

891. **Juida**, Less. p. (Lamprotornis, p. Temm. - Lamprocolius, p. Sundev. - Megalopterus, Smith.) Africa. 4.

1. TURDUS **aeneus**, L. (Merula viridis longicauda, Br. - Corvus aureo-viridis, Shaw.) Pl. enl. 220. - Lev. Afr. t. 87. Sw. B. of west. Afr. t. 7. ex Afr. occ. Senegal. Minor. Purpureo-cyanea; capite viridi-aureo: cauda violacea. ex Senegal.

2. **LAMPROTORNIS burchelli**, Smith. (*Megalopterus australis?* 1836.) *Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 47.* mas. ex Afr. m.
Similis praecedenti: cauda brevior; capite concolore: genis, humerisque auratis.
3. **LAMPROTORNIS aeneoides**, Temm. - *Rupp. Mus. Lugd.*
ex Africa.
4. **LAMPROTORNIS splendens**, Temm. *Levail. Afr. t. 84.*

892. **Lamprocolius**, Sundev. 1836. (*Lamprotornis*, p. Temm. Juida, p. Gr.) 13.
1. **LAMPROTORNIS ignita**, Licht. (*Juida ignita*, Gr.) Nordm. in Ermans Reise - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 80. ex Afr. occ. Ins. Prince. *Fulgidissima; pileo cerviceque viridi-aeneis; dorso, alis, abdomineque cupreis: crasso, remigibus, rectricibusque cyano-violaceis.*
 2. **LAMPROTORNIS pilorynchos**, Sw. (*Incida*, Licht.) ex Ins. Prince. *Guinea. Purpureo-cyanus; dorso alisque nigro punctatus, splendido viridis.*
 3. **LAMPROTORNIS chrysotis**, Sw. (*fulgida*, Licht.) ex Senegal. *Viridi-aeneus; subtus caeruleo-violaceus; maculae colli utrinque aurea; alis nigro punctatis.*
 4. **TURDUS splendens**, Leach. (niten var. b. Lath. - *Lamprotornis nitens*, Licht.) *Lev. Afr. 90.* - *Edw. B. t. 320.* ex Afr. occ. Senegal. *Aureo-viridis plus minus caeruleus; abdomine violaceo; alis nigro guttulatis.*
 5. **TURDUS nitens**, L. (*Lamprotornis*, Temm.) *Pl. enl. 561.*
ex Afr.
 6. **TURDUS auratus**, L. (*Sturnus auratus*, Daud. - *Lamprotornis auratus*, Licht.) *Pl. enl. 540.* nec Levail. ex Afr. m. *Aureo-viridis; abdomine concolore, uropygio, pectoreque purpurascensibus: alis immaculatis, vitta humerali purpurascens-aurea.*
 7. **LAMPROTORNIS cyanotis**, Sw. (*chalybea*, Licht. - *chalcura*, Nordm. in Erman's Reise). ex Afr. Minor: *viridi-aureus: auriculis, abdomine, cavaquo cyano-violaceis.*
 8. **LAMPROTORNIS corusca**, Licht. *Mus. Berol. ex Afr. m.*
Simillimus praecedenti, sed cauda longiore et rostro valde breviore, basi parum depresso.
 9. **TURDUS chrysogaster**, Gm. (*erythrogaster*, Hempr. et Ehr. - *Lamprotornis chrysogaster*, Licht.) *Pl. enl. 358.*
ex Abyssin. *Viridi-aeneus: capite fuscocanescens: abdomine ruso-cinnamomeo.*
 10. **LAMPROTORNIS melanogaster**, Sw. *Two Cent. p. 297.*
sp. 52. ex Senegal. Similis L. cyanoti; sed valde minor: ali⁹ immaculatis: abdomine nigro opaco.

11. **LAMPROTORNIS chloropterus**, Sw. Two Cent. ex Afr. occ. Minimus. *Viridi-nitens*; auriculis, humeris, tectoribus alarum inferioribus, lateribus, abdomineque cyaneonitentibus: tectoribus alarum superioribus nigro-maculatis.
12. **LAMPROTORNIS phaenicopterus**, Sw. (Nabirap, Lev.) Two Cent. p. 360. - Levaill. Afr. t. 89. ex Afr. m. *Medius*. *Viridi-splendens*; capite, uropygio, cauda, femoribus caeruleo-antennis, auriculis purpureo-violaceis: humeris cyano-virentibus, flumineo et violaceo marginatis: tectoribus alarum nigro-maculatis.
13. **LAMPROTORNIS superba**, Rüpp. (chrysogaster, mas Licht.) ex Abyssinia. *Minor*: *viridi-aureus*; *cervice pectoraque violaceis*: *capite fusco-aureus*, *holosericus*: *abdomine aurantio-castaneo*; *fascia arctica (pectoralis) crissaque candidis*.
893. **Calornis**, Gray. (Lamprotornis, p. Temm.) Africa. 1.
TURDUS leucogaster, L. (Lamprotornis leucogaster, Licht.) ex Afr. occ. *Galam*. *Violaceo-cupreus*: *abdomine latissime albo*; *alis*, *cauda subtus fuscis*.
894. **Spreo**, Less. (Turdus, Gm.) Africa. 3.
1. **TURDUS bicolor**, Gm. (Spreo bicolor, Blyth. - Lamprotornis albiventer, Sw. - Lamprotornis bicolor, Licht.) Lev. Afr. t. 88. ex Afr. mer. *Fusco-auratus*; *crisso latissime albo*.
2. **TURDUS morio**, L. (Corvus rufipennis, Shaw. - Atropomoria, Blyth.) Pl. enl. 199. - Levaill. Afr. t. 83. ex Afr. m. *Purpureo-niger*: *remigibus rufis, apice fuscis*.
3. **LAMPROTORNIS fulvipennis**, Sw. Two Cent. p. 298. sp. 5. fig. 49. a. - Lev. Afr. t. 91. ex Afr. m. *Minor* preceed. et *restro graciliore*. *Purpureo-niger*: *remigibus externe rufis, interne fulvis, rachidibus albo nigroque dimidiatis*; *cauda modice rotundata*.
895. **Lamprotornis**, Temm. 1820. p. (Calornis, Gr. 1841.) Asia m. Ocean. 9.
1. **TURDUS cantor**, Gm. (panayensis, Scopoli. - chalibaetus, mas et strigatus faem. Horsf. - Calornis cantor, Blyth. *Lanius insidiator*, Rafles.) Pl. col. 199. 1. 2. - Sonnin. Voy. t. 73. - Kittl. Kupf. Vögel t. 15. 1. ex Insul. Sondaic. et Philipp. N. Guinea, Malacca. *Nigro-viridis auratus*. Faem. *subtus fusco-striata*.
2. **CALORNIS affinis**, Hay. Journ. As. Soc. xv. p. 36 et 369. ex Arakan, Ins. Nicobar.

3. **L. metallica**, Temm. (Calornis metallicus, Gr.) Pl. col. 266. ex Amboina. Minor: viridi-aurea, dorso, pectoreque purpurascensibus: cauda valde cuneata.
- *4. **L. obscura**, Forsten, Mus. Lugd. ex Girol. Similis praecedenti, sed minus splendens, cauda brevior et rostro robustiore.
5. **TURDUS violaceus**, Gm. (caeruleus, Scopoli, - Calornis caerulea, Gr.) Sonn. Voy. t. 108. ex Asia m.
6. **TURDUS mauritanus**, Gm. Pl. ent. 648. 2. ex Ins. Mauritania et Afr. mer. Lamprot. cantori affinis, at major.
- *7. **L. minor**, Müll. Mus. Lugd. ex Timor. Simillima Lamprot. cantori, sed paulo minor, et rostro valde brevior.
8. **TURDUS columbinus**, Gm. (Calornis columbina, Gr. Lamprot. opaca, Licht.) Kittl. Kupf. Vögel, t. 15. 2. ex Ins. Mariann. et Carol.
9. **L. corvina**, Kittl. Kupf. Vögel, t. 15. 3. - Mem. Acad. Petersb. 1835. II. p. 7. t. 19. ex Ins. Ualan. Quid Voy. au Pole Sud, Ois. t. 14. 2. t. 15. 2. t. 16. 2. - Chlamydura sp. 3. et Calornis sp. 6. et 7. Gr. Gen. p. 325. et 327.

896. **Enodes**, Temm. (Calornis, p. Gr.) Oceania. 1.

LAMPROT. **erythrophrys**, Temm. (Calornis erythrophrys Gr. - Enodes erythrophrys, Blyth.) Pl. col. 267. ex Celebes. Fusco-plumbeus; uropygio, crasso, alis, caudaque flavo-virescentibus: genis nigris: superciliis latissime rubris.

897. **Aplonis**, Gould. Oceania. 3.

1. **LAMPROTORNIS nigroviridis**, Less. 1844. (obscurus, Dubus. - Aplonis marginatus, Gould. - A. marginatus, novae-hollandiae et obscurus, Gr. 1838.) Austr. birds. Syn. Dubus, Esq. Ornithol. t. 12. ex N. Zelandia.

2. **A. fuscus**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1837. p. 73. ex N. Zelandia.

3. **LAMPROTORNIS zelandicus**, Quoy et Gaim. (Aplonis zelandicus, Gr.) Voy. Astrol. t. 9. 1. - Zool. Ereb. et Terr. p. 8. ex N. Zelandia.

898. **Saraglossa**, Hodgs. (*Psaroglossa* Blyth.) As. centr. Madag. 2.

1. **LAMPROTORNIS spilopterus**, Vig. 1831. (*Saraglossa spiloptera*, Hodgs.) *Gould, Cent. Him. B. t. 34.* *As. centr.*
Mas fuscus cinereo-earia, uropygio rufescens: subtus alba; gula juguloque castanea: lateribus fulvescentibus: rostro remigibusque nigris.
Faem. Cinereo-fuliginosa: subtus albida, fuscocastanea.

- 2? **TURDUS madagascariensis**, Gm. (*madagascarius*, Herm.) *Saraglossa madagascariensis, Gr.* *Pl. enl. 557. 1.*
ex Madagascar. Nonne genus distinctum?

SUBFAM. 124. *STURNINAE.*

899. **Heterornis**, Gray. (*Maina*, *Hodgs.* p. - *Sturnia*, *Less.*)

Pastores sturniformes, Wagl.) As. m. Ocean. 8.

1. **STURNUS sericeus**, Gm. (*Heterornis sericea*, Bp. - *Turdus leucocephalus?* Gm.) *Brown, Ill. t. 21. Mus. Paris.*
ex Sonnerat. ex China. Medius: cinereus; capite, collo, crisoque albis: alis, caudaque nigro-acneis: speculo alari alto: rostro aurantiaco, apice fuscum.
Jan. cinereo-rufescens; subtus albo-rufescens: fronte tantum albicante.

2. **STURNUS dauricus**, Pall. (*Gracula sturnina*, Gm. - *Sturnus sturninus*, Daud. - *Turd. dominicanus?* Gm. jun. *Pastor malayensis*, Eyton. - *Sturnia daurica*, Blyth.) *Pl. enl. 627. 2. ex Asia or. Malacca, Java. Minor: albo-cinereus; dorso atro-violaceo: alis albo-variegatis: remigibus, rectricibusque aeneo-viridibus.*

- *3. **II. pyrrhogonyx**, Müll. (*Lamprotornis pyrrhopogon*!! Schlegel) *Faun. Jap. Av. t. 46. 1. adult. 2. jun. - Mus. Lugd. ex Borneo, Japon. Praecedent affinis: dorso chalybaeo-nigro: capite, gulaque albicantibus, genis postice ferrugineis, alis albo-variegatis, abdomine albo, lateribus griseis; criso, uropygioque rufescens. Jun. dorso cinerascens.*

*Quid Oriolus sinensis, Gm. (buffonianus, Show. - Past. turdiformis, Wagl. - *Sturnia cana?* Blyth.) Pl. enl. 617?*

4. **PASTOR ruficollis**, Wagl. (*Turdus dominicanus*, Mus. Paris, nec Gm.) *Pl. enl. 627. 1. jun. ex Ins. Philipp.*
Minor: capite cum gula, corporeque subtus albis: lateribus latissime griseis: genis pestice, collarique interrupto castaneis: dorso splendide chalybaeo-violaceo: alis albo-variegatis, caudaque aeneo-viridibus. Adult. uropygio violaceo concolor. Jun. uropygio albido-rufescenti.

5. PASTOR *elegans*, Less. (Sturnio erythropygia, Blyth.)

Voyage Belang. Ois. t. 6. ex Asia or. China.
Minor: griseous; alis, caudaque aeneo-nigris: tectoribus alarum abdomineque albis: mento, crasso, lateribus, uropygio, tectoricunque apice lato, rufis.

6. TURDUS *pogodarum*, Gm. (melanocephalus, Vahl.)

Sturnus subroseus, Shaw. - Maina sylvestris, Hodgs.
Gracula pogodarum, Daud. - Acritho. pogodarum, Vieill. - Sturnia pogodarum, Blyth.) Lev. Afr. t. 92. l.
Mem. Soc. Copenh. III. t. 8. ex India or. Cinereus; subtus, et in cervicali cinnamomeus, albo-striatus: pileo nucha que nigra: rectricibus lateralibus nigricantibus, apice albis.

7. TURDUS *malabaricus*, Gm. sp. 51. (Past. blythi, Jerd.

caniceps, Hodgs. - Sturnia malabarica et blythi, Blyth.
Past. malabaricus, var. Jerd. - Past. nanus, Less.) Jerd.
Ill. Ind. Av. t. 32. ex India, Malabarica. Minor: cinereus; subtus albidus, abdomine rufescente: remigibus nigricantibus: rectricibus lateralibus basi fuscis, apice latissime rufis: rostro flavo, basi nigricante.

8. PASTOR *senex*, Temm. Mus. Lugd. ex Beng. Dorso
brunnescente, alis caudaque chalybaeo-nigris, pileo griseo:
subtus sordide albo-cinereus.

900. ACRIDOTHERES, Vieill. (Maina, Hodgs. p.)

Asia, Oceania. 7.

1. PARADISEA *tristis*, L. (Gracula grylliavora, Daud. - Gr.
tristis, Licht. - Acridotheres tristis, Vieill. - Maina
tristoides, Hodgs.) Pl. enl. 219. ex Bengal. Ceylon.
*Major: brunneo-rufescens: capite cristato pectoreque nigri-
cantibus: spatio oculari nudo: rostro flavo: remigibus, rec-
tricibusque lateralibus nigris: crasso, tectoribus alarum in-
terioribus, remigibus basi, rectricumque apice albis.*2. TURDUS *ginginianus*, Lath. (Gracula grisea, Daud.
Gr. cinerea, Valenc. - Acridotheres ginginianus, Vieill.
Pastor griseus, Wagl. - P. gregicolus, Hodgs.) Lev.
*Afr. t. 95. 2. ex India sept. Scinde, Nepal, Beng.
Medius: spatio oculari nudo: crasso, tectoribus alarum infe-
rioribus, rectricibusque apice, rufescensibus: rostro flavo-
curvatio.*3. GRACULA *cristatella*, L. (Pastor cristatellus, Wagl.
Acridotheres cristatellus adult. et fuliginosus, jun. Blyth.)
*Edu. B. t. 19. - Pl. enl. 507. ex Bengal. Fusco-
plumbeus, subtus cinereus: remigibus, rectricibusque nigris,
crasso, caudaque ad apicem albis: tectoribus alarum infe-
rioribus nigris: rostro ex toto flavo.*

4. TURDUS *griseus*, Gm. (Pastor cristatellus, Wagl. - Past. griseus, Horsf.) ex Java, Similis A. cristatelli, sed subtilis obscurior, et rostro validiore.
- *5. A. *cinereus*, Müll. Mus. Lugd. ex Celebes. Similis A. griseo, ex Java, sed dilutior; dorso fusco-cinereo: subtus pallido cinereus, alis, caudaque nigricantibus, rectricibus albo-terminali.
- *6. MERULA *philippensis*, Br. (Pastor philippensis, Temm.) ex Ins. Philipp. Macao. Similis praecedentibus, sed obscurior, et tectricibus caudae inferioribus nigris, albo-marginaliis nec albis.
7. PASTOR *fuscus*, Wagl. ex Temm. (cristatelloides, Hodgs. mahrattensis, Sykes.) ex Asia cont. Similis Acr. cristatelloi; sed dorso obscuriore, speculo alari albo expanso, rostro ad basin utrinque nigro maculato, tectricibusque alarum inferioribus nigris nec albis.

901. **Basilornis**, Temm. (Pastor, p. Wagl.) Malaiasia. 1.

PASTOR *corythaix*, Wagl. (Basilornis celebensis, Temm. Mus. Lugd.) Syst. Av. ex Celebes nec Java. Aeneo-viridis: capite cristato; collaris albidus, lateribus dilatatus, antice interrupto; rostro pedibusque fulcis.

902. **Sturnopastor**, Hodgs. (Gracupica, Less. - Psarites, Caban.) Asia m. Oc. 4.

1. STURNUS *contra* et capensis, L. (auricularis? Drapies.) Pl. enl. 280. - Edw. B. t. 187. ex India. Niger; genis, uropyglio, litura alarum, pectore, abdomine, crissone, tibialisque albos.
2. PASTOR *jalla*, Horsf. (contra, Aliq.) Wagl. Syst. Av. gen. Pastor. sp. 17. ex Java. Simillimus praecedenti, sed minor, et orbitis, genisque nudis.
3. GRACULA *melanoptera*, Daud. (Gr. tristis var. alba! ex Mauritius! Mus. Paris. - Pastor tricolor, Horsf. - candidus, Temm. - melanopterus, Wagl. - Turdus candidus, Licht.) Gr. et Mitch. Gen. B. t. 83. ex Java. Candidus: remigibus, rectricibusque apice excepto aeneo-virescentibus; rostro pedibusque flavis. Iun. dorso cinereo-plumbeo.

4. **PASTOR temporalis**, Wagl. ex Temm. (*Sturnus temporalis*, Blyth. - *Gracula melanoleuca*, Mus. Paris. ex Sonnerat. - *Gracupica melanoleuca*, Less.) *Act. Holm.* Pl. enl. . - *Syst. Av. gen. Pastor. sp. 7. ex China,* Ind. m. *Maximus: albo et nigricante varius: capite et collo albis: torque latissime nigro: genis nudis, rubris.*
Quid Gracula nigricollis, Paykull. (*Pastor bicolor*, Gr.) *Act. Holm.* xxviii. t. 9?

903. **Sturnus**, L.

Eur. As. Afr. Oc. 4.

1. **S. vulgaris**, L. (*varius*, Meyer. - *domesticus*, sylvestris, septentrionalis et nitens, Brehm.) *Pl. enl.* 75.
Gould, Eur. t. 210. ex Eur. As. Afr. s.
- 2? **S. splendens**, Temm. (*indicus*, Hodgs.) *Mus. Lugd.* ex India.
3. **S. unicolor**, La Marmora. (*vulgaris niger vel unicolor*, Auct.) *Pl. col.* 111. - *Bp. Faun. Ital. Av. t. 3. 1.*
Gould, Eur. t. 211. ex Ins. Sardinia, Sicilia, Afr. s. As. occ.
4. **S. cinereacus**, Temm. *Pl. col.* 536. - *Faun. Japon.*
Av. t. 45. ex India, Himal. Japon.

904. **Pastor**, Temm. (*Aridotheres*, Ranzani. - *Psaroides*, Vieill. - *Boscis*, Brehm. - *Nemodites*, Petaniz. - *Thremophilus*, Macgillivr.)

Eur. As. Afr. 2.

1. **TURDUS roseus**, L. (*seleucus*, Gm. - *suratensis*, Lath. *Sturnus roseus*, Scopoli. - *Pastor roseus*, Wagl. - *Aridotheres roseus*, Ranzani. - *Gracula rosa*, Cuv.) *Pl. enl.* 251. - *Edic. B. t. 250.* - *Lev. Afr. t. 96.* - *Bp. Faun. Ital. Av. t. 4.* - *Gould, Eur. t. 212. ex Eur. s. or. As. Afr. s.*
2. **P. peguanus**, Less. *Traité Orn.* p. 404. sp. 10. ex *As. or. Junior.* Vix specie distinctus!

905. **Dilophus**, Vieill.

Africa or. 1.

- GRACULA carunculata**, Gm. (*larvata*, Shaw. - *gallinacea*, Daud. - *Sturnus gallinaceus*, Daud. - *Dilophus gallinaceus*, Vieill. - *D. carunculatus*, Gr.) *Lev. Afr. t. 93.* 1. mas. 2. faem. et 94. 1. jun. 2. hornot. var. ex *Afr. m. Senegal.*

906. **Philepitta**, Geoffr. An hujus Familiae? - Forsan ad
Volucres pertinet! Madagascar. 2.
1. **Ph. sericea**, Is. Geogr. Mag. Zool. 1839. Ois. t. 8.
O. des Murs, Pl. p. 32. ex Madagascar.
 2. **Ph. geoffroyi**, O. des Murs, Rev. Zool. 1846. p. 241.
Pl. p. 33. ex Madagascar. An hujus generis?
907. **Ampeliceps**, Blyth. (Gracula, p. Gr.) Asia m. or. 1.
GRACULA **coronata**, Gr. (Ampeliceps coronatus, Blyth.)
Mitch. Gen. B. t. 81. ex Tenasserim. Niger; pi-
leo, gula, speculoque alarum luteis.
908. **Gymnops**, Cuv. (Gracula, p. Gr.) Oceania. 1.
GRACULA **calva**, L. (Gymnops calvus, Cuv. - Pastor calvus,
Temm. - Acerotheres calvus, Vieill.) Pl. enl. 200.
*ex Molucc. Phélippin. Niger: dorso, uropygio,
lateribusque canis: humeris candidis: rostro, pedibusque ni-
gris: píeo genique nudis: vitta mediana angusta tantum
plumosa.*
909. **Gracula**, L. (Eulabes, Cuv. - Mainates et Mino, Less.
Maina, Hodgs.) Asia m. Ocean. 6.
 1. **Mino dumonti**, Less. (Gracula dumonti, Wagl.) Voy.
Coq. Ois. t. 26. - Kittlitz, Kupf. Voy. t. 13. 1. ex
*N. Guineae. Minima: nigra, abdomine luteo: uropygio,
crisso, speculoque alarum albis: rostro, pedibusque flavis.*
 2. **G. religiosa**, L. (minor, Temm. - Pastor musicus,
Daud. - Eulabes indicus, Cuv. - Mainates javanus?
Jerd. ex Less.) Edw. B. t. 17. fig. supera. ex India m.
Ceylon.
 3. **G. intermedia**, Hay, Journ. As. Soc. xv. p. 32. ex
Assam, Nepal, Arakan.
 4. **G. javanensis**, Osbeck. (Gracula religiosa var. b. Lath.
Eulabes javanus, Cuv. - Pastor musicus, Wagl. - Mai-
natus major, Br. - M. sumatrana, Less.) Edw. B. t.
17. fig. inf. - Pl. enl. 208. ex India extra Gan-
gem et Ins. Sondaicas.
 - *5. **G. venerata**, Temm. Mus. Lugd. ex Sumbava.
Rostro flavissimum, elongato.
 6. **G. ptilogynys**, Blyth, Journ. As. Soc. xv. p. 285.
ex Ceylon.

SUBFAM. 125. BUPHAGINAE.

910. **Buphaga**, L. (*Buphagus, Br.*) Africa. 2.
 1. **B. africana**, L. (*rufescens, Vieill.*) *Pl. enl.* 293.
Lev. Afr. t. 27. - Vieill. Gal. Ois. t. 93. - Gr. et
Mitch. Gen. B. t. 82. ex Afr. m.
 2. **B. erythrorhyncha**, Stanley. (*habessinica, Ehrenb.*)
Symbol. Phys. t. 9. - Pl. col. 465. ex Afr. or.

SUBFAM. 126. EURYCEROTINAE.

911. **Scissirostrum**, Lafresn. Valde anomalam. An hu-
 jus Familiae? Celebes. 1.
Sc. pagei, Laf. (*Edolius dubius?* Gr. - *Scissirostrum*
 dubium! Hartl. ex Lath.) *Mag. Zool.* 1848. cum fig. ex
In s. C e l e b. Cinereo-nigricans: rachidibus tectricum
caudae superiorum penicillo tamquam vitro filamentoso coc-
cineo auctis! rostro flavo.
912. **Euryceeros**, Less. Genus 219. Hujus Conspectus p. 92.
 inter Volucres minime numerandum. Madagascar. 1.
E. prevosti, Less. *Cent. Zool. t. 74. - Ill. Zool. t. 13.*
ex Madagascar. Niger; dorso, alisque rufis.

FAMILIA 61. ICTERIDAE.

SUBFAM. 127. QUISCALINAE.

913. **Scolecophagus**, Sw. p. America s. 2.
 1. **Oriolus niger**, Turdus hudsonicus, novaehoracensis et
 labradorius, Gm. (*O. leucocephalus, Lath. var. accid.*
Gracula quiscula, var. β , Lath. - Gr. ferruginea, Wils.
Pendulinus ater, Vieill. - Chalcophanes virescens,
Wagl. - Scolecophagus ferrugineus, Blyth.) Am. Orn.
t. 21. 3. - Aud. Am. t. 157. ex Amer. bor.
 2. **Sc. mexicanus**, Sw. (*Quiscalus breweri, Audub.*
Icterus aeneus, Licht.) Aud. Am. 2da edit. t. 492.
x Mexico occid. et Am. bor. Nigro-viridi nitens;
capite pectorque cyaneo-purpurascensibus; remigum prima
longiore quam quarta.

914. **Quiscalus**, Vieill. 1816. (Chalcophanes, Wagl. 1827.) America. 11.

1. **GRACULA QUISCALA**, L. (Oriolus ludovicianus et hudsonius,
Gm. - Quiscalus **versicolor**, Vicill. - Sturnus quis-
calus, Daud. - G. purpurea, fulgida et nitens, Licht.)
Pl. enl. 646. - *Wils. Am. Orn.* t. 21. 4. - *Bp. Cont.*
t. 5. 1. - *Aud. Am.* t. 7. ex *Am.* s. *Nigerrimus splen-
dens; in capite nitor chalybeo, in collo pectoreque viridi-cu-
preo: remigibus tercia et quarta aequalibus. Long. ultra
pedalis. Rostr. 1 $\frac{1}{2}$ poll. Al. semi-pedal. Tars. 1 $\frac{1}{2}$ poll.*
- 2? **Q. purpuratus**, Sw. *Tico Cent.* p. 298. sp. 56. ex
Am. s. *Capite, collo, pectoreque purpureo-nigris nitor
violaceo, minime viridi. Long. vix pedalis. Rostr. 1 $\frac{1}{2}$.
Al. 5 $\frac{1}{2}$ poll. Tars. 1 $\frac{1}{2}$. An a faemina praeced. sane dis-
tinguitus?*
3. **Q. lugubris**, Sw. *Tico Cent.* p. 299. sp. 57. fig. 50. c.
ex *B r a s i l.* *Niger vix purpureo nitens: alis brevioribus,
caudaque subcaventibus. Long. 9 $\frac{1}{2}$ poll. Rostr. 1 $\frac{1}{2}$. Al. 4 $\frac{1}{2}$ poll.
Cauda 4 poll. Tars. 1 $\frac{1}{2}$.*
4. **Q. tenuirostris**, Sw. *Two Cent.* p. 299. sp. 58. fig.
51. b. c. ex *M e x i c o*. *Niger violaceo parum nitens: remi-
gum secundo et tertio omnium longissimis: rostro, unguibus
que vix curvis, gracilis. Long. 15 $\frac{1}{2}$ poll. Rostr. 1 $\frac{1}{2}$ poll.
Al. 6 $\frac{1}{2}$. Cauda 7 $\frac{1}{2}$. Tars. 1 $\frac{1}{2}$.*
5. **Q. macrourus**, Sw. *Two Cent.* p. 299. sp. 59. fig. 51. a.
ex *M e x i c o*, *Real del Monte.* *Niger; corpore cyano-
nitens; alis caudaque subcaventibus: unguibus gracilibus, in-
curvis. Long. 20-poll. Rostr. 2-poll. Al. 8-poll. Cauda
10-poll. Tars. 1 $\frac{1}{2}$.*
6. **Q. major**, Vieill. (*corvinus*, Sw. - *Corvus mexicanus*?
Gm. - Chalcophanes major, Temm.) *Bp. Am. Orn.*
t. 4. 1. mas. 2. faem. - *Aud. Am.* t. 187. ex *mer. Am.* s.
*Ex auro virido-niger; auriculis, gulaque splendite purpu-
rascentibus: alis brevissimis, remigum prima longiore quam
quinta: dígitó interno longiore quam externo. Long. sesqui-
pedalis. Rostr. sub 2-poll. Al. 7 $\frac{1}{2}$. Caud. 7-poll. Tars. 1 $\frac{1}{2}$.*
7. **Q. inflexirostris**, Sw. *Two Cent.* p. 300. fig. 52.
ex *Amer. m.* *Similis Quiscalu lugubris; sed rostro toto
Quiscalu diverso longiore, valde graciliore, magis incurvo,
tamiis inflexis nec sinuosis.*
8. **Q. peruvianus**, Sw. *Two Cent.* p. 354. ex *Peru*.
*Nigro-nitens, in capite colloque purpurascens, in corpore
praesertim subtus, vix autem in alis caudaque virescens.
Long. 13 $\frac{1}{2}$ poll. Rostr. 3 $\frac{1}{2}$ poll. Al. 7 $\frac{1}{2}$. Caud. 7 $\frac{1}{2}$. Tars. 2-poll.*

9. *Q. crassirostris*, Sw. Two Cent. p. 355. ex Jamaica.
*Similis Q. versicolor, sed purpureo-niger abeque nitore viridi
aut aeneo: remigum tertia breviora quam quarta: rostro cras-
so, marginibus inflatis, haud sinuosis. Long. 10-poll.*
Rostr. 1½ poll. Al. 6-poll. Tars. 1½.
10. *GRACULA baritae*, Gm. (*Quiscalus nasicularis*, Licht.
Q. barita, Gr.) Voy. Ile Cuba Ois. t. 18. ex Antill.
*Quid Agelaius! niger, Gr. ex Bodda. Pl. enl. 534. ex Ins. His-
paniol?*
11. *Q. subalaris*, Boisson. et Laf. Rev. Zool. 1840.
*p. 70. ex A. m. m. Sta Fe de Bogota. Modius; ni-
gerrimus, tectricibus alarum minoribus et inferioribus cas-
taneis.*
- *915. *Lampropsar*, Caban. 1847. (*Icterus*, p. *Licht.*) Alae
breves, rotundatae: cauda rotundata. America m. 2.
1. *L. guianensis*, Caban. in Schomburgk. ex *Guiana*.
Minimus.
- *2. *L. dives*, Caban. (*Icterus dives*, *Licht.*) Mus. Berol.
ex Mexico. Maximus: ex toto nigerrimus.
- *916. *Hypopyrrhus*, Bp. (*Agelaius*, p. *Gr.*) America m. 1.
Casicus pyrrhogaster, Tarragon. (*Agelaius pyr-
rhogaster*, *Gr.*) Rev. Zool. 1837. p. 252. ex *Bogota*.
*Nigerrimus; capitis plumis rigidis, angustissimis; abdomina
latissime coccineis; cauda valde rotundata.*
- *917. *Psarocolius*, Bp. ex Wagl. (*Agelaius*, *Casicus* et *Scaphi-
dura*, p. *Gr.*) America m. 6.
1. *CASICUS solitarius*, Vieill. ex Azara 58. (*Cacicu*s soli-
tarus, *Gr.* - *Janus bursarius*, *Merr.*) Av. Bras. t. 63. 1.
ex Brasil.
2. *Sturnus curaeus*, Molina. (*Icterus aterrimus*, *Kittl.*
Leistes niger, *Sw.* - *Agelaius aterrimus*, *Gr.*) Vogel v.
Chili, t. 2. ex *Patagonia*, *Chili*. *Nigerrimus;*
*plumis capitis collique lanceolatis: rostro rectissimo, depre-
so, culmine in fronte valde producto.*
3. *AGELAIUS chopè*, Vieill. ex Azara 62. (*Icterus unicolor*,
Licht. - 1. *sulcirostris*, *Spix.* - *Trupialis animosus*,
Merr. - *Agelaius sulcirostris*, *Sw.* - *A. curaeus*, *Gr.* nec
Molina, - *A. brevirostris*, *Gr.* jun. - *Chopis ater*, *Ver-
reaux*). Av. Bras. t. 64. ex *Bras.* *Nigerrimus; plu-
mis capitis collique lanceolatis: toris dense plumosus: maxilla
apice subincisa: mandibula ad basim sulcata!*
Quid Icterus badus, Vieill. ex Azara 73?

4. AGELAIUS *pustulatus*, Sw. Two Cent. and a Quart.

p. 303. sp. 70. ex Bras. sept. et centr. Coracinus;
plumis capitis lanceolatis; loris et mandibulae basi nudis
plicatis.

5. ICTERUS *aeneus*, Licht. (Psarocolius aeneus, Wagl.

Agelaius aeneus, Gr.) Isis, 1829. p. 758. ex Mexico.

6. AGELAIUS *cyanopus*, Vieill. ex Azara 71. (Trupialis hy-

bridus, Merr. - Agelaius cyanops, Gr.) Orb. et Lafr.

Syn. p. 5. ex Am. m. Brasil.

918. SCAPHIDURUS, Sw. (Cassidix, Less. - Scaphidura, Aliq.) Amer. trop. 6.

1. QUISCALUS *ater*, Vieill. ex Azara 60. (Psarocolius pallia-

tus, Wagl. - Cassidix mexicana, Less. - Japus azarae,

Merr.) Gr. et Mitch. Gen B. t. 84. ex Bras. Parag.

Ex chalybeo viridi-purpurascens; capite, pallio, dorso, abdo-
mine quoque virentibus: wropygio violascente: aliis, caudaque
caeruleantibus. Statura Turi merulae.

2. Sc. *barita*, Sw. Two Cent. and a Quart. p. 301. fig.

33. a. ex Brasil. Nigerrimus; capite corporeque purpu-
rascentibus. Longit. 14-poll. Rostr. 1½. Alar. 7. Caud. 6.
Tars. 1½.

3. Sc. *crassirostris*, Sw. Two Cent. p. 301. fig. 33. b.

ex Brasil. Nigerrimus, subaeerulans, sed absque splen-
dore (minime versicolor.) Longit. 11½ poll. Rostr. parum
ultra pollic. Al. 5½. Cauda 1½. Tars. 1½.

Quid Quiscalus crassirostris, Gosse, Ill. Jam. p. 217. t. 53. ex
Jamaica?

4. Sc. *palustris*, Sw. Phil. Mag. 1827. p. 436. ex Mex.

*5. Sc. *vieilloti*, Bp. (Cassicus niger? Vieill.) Gal. Ois.

t. 89? ex Cayenna, Antillis. Mus. Darmstadt.
Statura media: remigibus primis quatuor apice emarginato-
 dilatatis.

Quid Scaphidura nigra! Sw. Gr. ex Gm?

6. Sc. *atroviolaceus*, Orb. Voy. Ille de Cuba, Ois. t. 19.

ex Antillis.

SUBFAM. 129. ICTERINAE.

*919. CLYPIETERUS, Bp. (Cassicus, p. O. des Murs.)

America mer. 1.

CASSICUS *eseryi*, Deville, Rev. Zool. 1849. p. 57.

Mus. Paris. ex Brasil, Pebas. Rubro-castaneus:
pectore frontaque flavo-olivaceis: remigibus fuscis: cauda
flavissima, rectricibus mediis margineque externarum oli-
vaceis.

920. **Ocyalus**, Waterhouse. (*Cacicus*, p. *Gr.*) America mer. 2.

1. **CACICUS wagleri**, *Gr. et Mitch. Gen. B. p. 342. sp. 8.*

*t. 85. ex Venezuela. Similis sequenti; sed major,
cristatus; alis minus elongatis: rectricibus lateralibus apice
etiam flavis: rostro ingenti, flavo.*

2. **CASSICUS latirostris**, *Sv.* (*Ocyalus popayanus*, *Wa-*

*terh. 1840. - Cacicus latirostris, Gr.) Tico Cent. p. 358.
sp. 224. ex Brasil, Pobas. Coracinus; dorso abdo-
mineque nigerrimis, holosericeis: pileo cerviceque castaneis:
rectricibus lateralibus basi latissimo flavis: rostro brevi,
crasso.*

921. **Cassicus**, Ill. (*Cacicus! Cuv. - Psarocolius*, p. *Wagl.*) Amer. calid. 10.

1. **Oriolus cristatus**, *Gm.* (*Xanthornus maximus*, *Pall.*

Cacicus cristatus, Cuv.) Pl. enl. 344. - Sv. Orn. Draw.

*Bras. B. t. 32. - Azara 57. ex Guiana, Brazil.
Nigricans, uropygio crissoque latissime castaneis: cauda
flava, rectricibus mediis nigris: rostro albo.
Faem. valde minor, vix cristata.*

2. **C. viridis**, *Vieill.* (*Oriolus cristatus* var. *Lath.* - O. ru-

*firostris, Shaw.) Pl. enl. 238. ex Am. m. Laete viri-
dis, uropygio crissoque castaneis: rectricibus lateralibus fla-
vis: rostro albido, clypeo frontali maximo, convexo, mandibu-
laeque lateribus basi tumidis.*

3. **C. atrovirens**, *Lafr. - Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 51. 2.*

*ex Bolivia, Yungas. Medius: fusco-viridis; tibialis
concoloribus; uropygio crissoque rufescens: rectricibus
lateralibus flavis: rostro albo, parum dilatato.*

4. **C. angustifrons**, *Spix.* (*Xanthornus virescens? Aliq.*

*Cacicus viridis, Gr. p. nec Vieill.) Av. Bras. t. 62.
Naturf. s. 1. t. 1. ex Am. m. Bras. Major: brunneo-oli-
vaceus, uropygio rufescens: cauda flava; rectricibus mediis
totis, lateralibus extremo apice, olivaceis: rostro parum dilata-
to nigricante.*

5. **C. yuracares**, *Lafr. - Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 51. 1.*

*ex Bolivia. Maximus: antice flavo-viridis, postice ru-
bro-castaneus; cauda flavissima; rectricibus mediis olivaceis:
rostro nigro, basi et apice albido.*

- * 6. **C. devillii**, *Bp. Mus. Paris.* *ex Brasil. Pebas.*

*Similia praecedenti, sed valde minor, et rostri basi nigra, api-
ce tantum albo.*

7. **C. bifasciatus**, *Spix.* (*montezuma*, *Less.*) *Av. Bras.*

*t. 61. - Cent. Zool. t. 7. ex Brasil. Mexico? Ma-
ximus; rubro-castaneus, capite colloque nigricantibus: rec-
tricibus lateralibus flavis: rostro nigro, basi apiceque rubellis.*

8. *Oriolus haemorrhous*, L. (*Cassicus ruber*, Brisson.
C. haemorrhous, Daud.) *Pl. enl.* 482. - *Sw. Orn. Draw.*
B. of Br. tab. 1. ex Brasil. *Nigerrimus*, *tergo coccineo.*
9. *C. uropygialis*, Laf. (*hinc crassirostris*. - *C. affinis*,
Sw.) *Rev. Zool.* 1843. p. 290. et 1847. p. 218. - *Sw. Orn.*
Dr. B. of Bras. t. 2. ex Colombia, Bogota, Peru.
Similis praeced. sed rostro curvo, basi incrassato.
10. *Oriolus persicus*! L. (*O. casicus*, Shaw. - *Cassicus lutens*,
Br. - *C. persicus*, Daud. - *C. icteronotus*, Vieill.)
Pl. enl. 184. - *Sw. Bras. B. Orn. Dr. t. 3. ex Brasil.*
Minor: nigerrimus; macula alarum, dorso postico, crissio,
rectricibusque basi, flavo-aureis. *Faem. valde minor.*

922. *Cassiculus*, Sw. (*Caciclus*, p. Gr. - *Japus*, p. Merr. - *Psal-*
rocolius, p. Wagl.)

Am. m. Mexico 5.

1. *Icterus melanicterus*, Bp. (*I. diadematus*, Temm.
Cassiculus coronatus, Sw. - *Caciclus melanicterus*, Gr.)
Pl. col. 482. - *Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 45. ex Mexico.*
Niger; cristatus; flavo varius.
2. *Cassicus chrysomelatus*, Laf. - *Orb. Voy. Am. m.*
Ois. t. 52. 1. Mus. Paris. ex Bolivia. *Nigerrimus;*
cristatus; dorso postico latissime flavo; rostro apice albido.
3. *Cassicus albirostris*, Vieill. *ex Azara 50.* (*Xanthornus*
chrysopterus, Vig. - *Japus dubius*, Merr. - *Caciclus al-*
birostris, Cuv.) *Zool. Journ. III. p. 190. t. 9. Suppl.*
ex Bras. Parag.

- * 4. *Xanthornus leucoramphus*, Bp. 1843. (*Cassiculus*
leucoramphus, Bp. 1850.) *Act. Ital. Mediolan. ex S. ta.*
Fe de Bogota. *Niger; dorso postico et alarum macula*
luteis; capite laeve; cauda rotundata; rostro apice albido; pe-
dibus nigricantibus. Longitudo fere pedalis.

Similis praecedenti; praecipue quo ad rostrum! at multo
major, capite non cristato, et humeris concoloribus nec luteis.
Quid Agelaius chrysopterus, Vieill. ex Azara 67. minime cum
Pendulino cayananensi confundendus?

Quid Caciclus leucurus, Gr. ex Wied, Beitr. Nat. Braz. p. 1245.
ex Brasil?

5. *Amblyramphus prevosti*, Less. (*Cassicus nigerrimus*,
Sw.) *Cent. Zool. t. 54.* - *Orn. Draw. Bras. t. 4. ex*
Mexico. *Nigerrimus, subcristatus; rostro flavo acutissimo.*

923. **Amblyrhamphus**, Leach. Amer. m. 1.

Oriolus ruber, Gm. (holosericeus, Scop. - *Sturnus pyrrhocephalus*, Licht. - *Amblyramphus bicolor*, Leach. *Sturnella rubra*, Vieill. - *Leistes erythrocephalus*, Sw. *Janus rubricapillus*, Merr.) Sonn. Voy. t. 68. - Zool. Misc. t. 36. ex Amer. m. *Niger*; capite, collo latissime, pectore, tibiisque coccineo-aurantiis. Juv. *nigricans*, facie pectoraque tantum rubro variiis.

924. **Sturnella**, Vieill. (Alauda et *Sturnus*, p. L.) America sept. 3.

1. **STURNUS ludovicianus** et Alauda magna, L. (Cacicus alaudarius, Daud. - *Sturnella collaris*, Vieill. - St. ludoviciana, Bp.) Pl. enl. 256. - Catesb. Carol. t. 23. Wils. Am. Orn. t. 19. 2. - Wils. Am. Orn. t. 19. 2. Aud. Am. t. 136. ex Amer. sept.
2. **St. hippocrepis**, Wagl. (collaris, Vig. nec Vieilli.) Bp. Proc. Zool. Soc. 1837. ex Mexico, Antill. Minor.
3. **St. neglecta**, Aud. Am. B. Suppl. t. 489. ex Lewis et Clark Journ. Exp. Rocky Mount. ex Mississippi super

*925. **Trupialis**, Bp. ex Auct. (Sturnella et *Leistes*, p. Gr.) Amer. mer. 5.

a. **Sturnini**. Majores: variegati; rostro longiore. *Nidum ex humis.*

1. **STURNUS militaris**, L. (Sturnella militaris, Vieill.) Pl. enl. 113. ex Chili. Maximus: tectricibus alarum inferioribus albis; remigum prima quintam subaequante: rostro elongato sturnino! Medius quasi inter Sturnellas et Trupiales! rostro, statura, facie, et coloribus partium superiorum ad primas accedit!.. pedibus autem et coloribus partium inferiorum ad secundos pertinet!
2. **STURNUS loyca**, Molina. (Sturnella loyca? Gr. - St. bellincosa, De Filippi.) ex Peru, Bolivia. Medius: tectricibus alarum inferioribus albis: remigum prima quintam subaequante: rostro modico, icterina.
3. **STURNUS MILITARIS**, Steph. ne L. (Sturnella militaris! De Filippi. - **St. defilippi**, Bp. - Icterus erythrothorax? Natter.) Azara 70. ex Bras. Parag. Montevideo. Medius: tectricibus alarum inferioribus nigris: remigum prima quinta valde longiore: rostro modico, icterino. Similis praecedenti!

b. *Agelaini*. Minores: nigri: rostro brevi. *Nidi penduli.*

4. *Oriolus guianensis*, L. jun. (americanus, Gm. adult.
Tanagra militaris, Gm. - Agelaius militaris, Vieill.
Leistes americanus, Vig.) Pl. enl. 236, 2 adult. et 536,
jun. - Gal. Ois. t. 88? - Azara 68. 69. ex Guiana,
Brasil. Niger: (plumis in junioribus rufescenti limbatis):
gula, pectora, abdomineque rubris: superciliis nullis: tectrici-
bus alarum earamque flexura rubris: rostro ex toto nigro-
caeruleo.

- * 5. *Icterus superciliaris*, Natter. Mus. Lugd. Paris.
ex Mexico. Aterrimus: superciliis posticis, brevibus, al-
bis: gula, juguloque sanguineis, in pectore tantum dilatatis:
alarum tectricibus minoribus sanguineis; flexura alarum ob-
scura (haud rubra): rostro subtus albicante.

926. *Agelaius*, Vieill.

America. 7.

a. Rostro brevi: humeris rubris.

1. *Oriolus phoeniceus*, L. (Sturnus melanocholicus
cor. β? Lath. - Icterus ptero-phoeniceus, Briss. - I.
phaeniceus, Daud. - Sturnus praedatorius, Wils. - Age-
laius phoeniceus, Vieill.) Pl. enl. 402 et 448? - Wils.
Orn. t. 30. 1. - Audub. t. 67. ex Amer. s. Niger; ala-
rum tectricibus minoribus rubris, bicoloribus, fascia termi-
nali ochracea.

2. *A. tricolor*, Audub. B. of Amer. t. 388. 1. ex occid.
Am. s. Niger; alarum tectricibus minoribus rubris, bico-
loribus, fascia terminali candida, latissima.

3. *Psarocolius gubernator*, Wagl. 1832. (Agelaius gu-
bernator, Bp. 1837.) Audub. Biogr. Orn. fig. nulla. ex
Mexico. Major: niger, alarum tectricibus minoribus ru-
berinis, unicoloribus: alis amplis: cauda vix rotundata.

4. *Leistes humeralis*, Vig. (Icterus humeralis, Orb. - Age-
laius pyrrhopterus, Gr. - Ag. humeralis, Bp.) Voy. Ille
de Cuba Ois. t. 5. ex Antillies. Minor: nigerrimus:
umeris rubro-testaceis, margine pallidiora.

Quid Agelaius pyrrhopterus, Vieill. ex Azara 74. Amer. m?

b. Rostro acuminato: humeris flavi.

- * 5. *A. xanthocarpus*, Bp. Mus. Paris. ex Peru. Ni-
ger, plumis apice rufescientibus; superciliis albidis. Faem. sub-
tus flavidus; superciliis nullis: scapularibus rufo-maginatis.
Quid Oriolus melanocholicus, L. ex Edw. B. t. 85. nisi faemina
Agelai?

6. *Turdus thilius*, Molina. (Xanthornus chrysocarpus, Vig.)

Proc. Zool. Soc. 1832. p. 3. ex *Chili*. *Niger*; *super-*
ciliis nullis: humeris flavissimis. *Faem. subtus rufo-grisea,*
fusco-maculata; superciliis latissimis, lineaque mediana albis!

7. *Icterus tibialis*, Sw. (Xanthornus tibialis, Gr.) *Two Cent.*

p. 302. sp. 87. ex *Brasil*. *Niger*; *humeris infra supra-*
que tibiisque luteis: cauda longata.

*927. *Xanthocephalus*, Bp. (Agelaius, p. Gr.) America s. 1.

Icterus icterocephalus, Say, nec L. (*Icterus xanthocephalus*,
Bp. - perspicillatus, Licht. - *Agelaius xanthocep-*
halus, Sw. - *A. longipes*, Sw. 1827. - *Psarocolius per-*
spicillatus, Wagl. 1829. - *Xanthocephalus perspicilla-*
tus, Bp. 1850.) *Am. Orn. Cont.* t. 3. 1. mas. 2. faem.
Audab. Am. t. 388. 2. 3. ex Amer. occ. bor. Major;
niger; capite pectoreque flavis: speculo alarum duplice albo.

*928. *Gymnomystax*, Reichenb. (*Icterus*, p. Gr.) Amer. calid. 1.

Oriolus mexicanus, L. nec Leach. (*Agelaius melanice-*
rus, Vieill. - *Icterus citrinus*, Spix. - *Psarocolius gym-*
nops, Wagl. - *Icterus mexicanus*, Gr.) *Pl. ent.* 533.
Av. Bras. t. 66. ex Brasil. Cayenna. Major: fla-
vus, dorso, aliis, caudoque nigris: tectricibus alarum mino-
ribus et inferioribus luteis: rostro recte, nigerrime: orbitis et
fascia utrinque gulari denudatis.

929. *Chrysomus*, Sw. Amer. m. 3.

1. *Oriolus icterocephalus*, L. (*Icterus icterocephalus*,
Auct. - Chrysomus icterocephalus, Sw.) *Pl. ent.* 343.
ex Amer. m. Niger, capite colloque flavis.
2. *Agelaius frontalis*, Vieill. ex Azara 72. (*Trupialis rufi-*
ceps, Merr. - *Agelaius ruficapillus*, Vieill. - *A. ruficol-*
lis, Sw. - *Chrysomus frontalis*, Gr.) *Mitch. Gen. B.t.* 86.
ex Brasil. Parag. Nigerrimus; capite colloque anti-
ce cum pectoro castaneis: remigium secunda, tertia et quarta
omnium longissimis: cauda rotundata.
3. *Oriolus flavus*, Gm. (*Psarocolius flaviceps*, Wagl. - *Chry-*
somus xanthopygius, Sic. - *Icterus flavius?* Less. - *Chr.*
flavus, Gr.) *Azara* 66. - *Sonn. Voy. t. 69. - Voy. of*
Beagle, Av. figura. ex Amer. m. Nigerrimus: capite,
uroppygio, humeris, corporeque subtus flavissimis: ungue pos-
tico elongato, rectiusculo.

930. **Yphantes**, Vieill. (Hyphantes, Reichenb.)

Amer. s. 4.

1. **Oriolus baltimore**, L. (Icterus minor, Br. - I. baltimore, Daud. - Yphantes baltimore, Vieill.) *Pl. enl.* 506. 1. 3. et t. 53. 4. - *Aud. Am. t. 13. ex Amer. s.*
2. **Icterus bullocki**, Sw. 1827. - *Aud. B. of Am. t. 388. 5. ex Amer. s. occ. Mexico.*
3. **Oriolus coztototl**, Gm. (Icterus coztototl, Daud. - Psarocolus coztototl, Wagl.) *Isis*, 1829. p. 75. *ex Mexico.*
Quid Icterus auricollis, Wied, Voy. Am. s. App. p. 269?
4. **Oriolus spurcatus**, varius et capensis! Gm. (castaneus, Lath. - mutatus, Wils. - Xanthornus flavus, Daud. faem. X. varius, Blyth. - Pendulinus solitarius, viridis et rugigaster? Vieill. - Icterus castaneus, Hahne. - Psarocolius, Wagl.) *Pl. enl. 607. 1. mas. 2. faem. et 509. 2. - Am. Orn. t. 4. - Aud. Am. t. 62. ex Amer. s.*

931. **Pendulinus**, Vieill. (Xanthornus, p. Gr.)

America. 12.

1. **Oriolus bonana**, L. (Icterus bonana, Daud. - Xanthornus bonana, Gr.) *Pl. enl. 535. 1. ex Amer. m. Fulvescens; copite, pectoreque castaneis; dorso, alis, caudaque nigris.*
- *2. **P. rufaevillius**, Bp. Mus. Par. *ex Mexico.* *Nigerimus; humeris cinnamomeo-castaneis; tectricibus alarum minoribus citrino-castaneis; cauda elongata; rostro elongato, acutissimo.*
- *3. **P. periporphyrus**, Bp. Mus. Par. *ex Bolivia.* *Niger; humeris castaneis; cauda elongata; rostro brevi, exili.*
4. **Oriolus chrysocephalus**, L. (Gracula chrysoptera, Merr. - Pendulinus chrysocephalus, Vieill. - Xanthornus chrysocephalus, Gr.) *Vieill. Gal. t. 86. - Merr. Icon. Av. t. 3. - Spix, Av. Bras. t. 67. 1. ex Am. m. Niger; occipe, tectricibus alarum minoribus et inferioribus, cauda nonnullis, femoribusque luteis.*
5. **Oriolus dominicensis**, L. (jugularis? Lath. - Turdus atre? Gm. - Pendulinus flavigaster, Vieill. - Psarocolius flavigaster, Wagl. 1829. - Xanthornus dominicensis et flavigaster, Gr.) *Pl. enl. 5. 2. et 559? Nigerimus; tergo, criso, abdomine latissime, lateribus, tectricibus alarum minoribus, femoribusque luteis; tectricibus cauda inferioribus nigris.*
- *6. **P. lessoni**, Bp. (Troupiale noir à ventre jaune? Less.) *Mus. Par. ex Mexico. Similis praecedenti; sed minor, et colore flavo magis virescente; cervice flavo-viridi; tectricibus caudae inferioribus flavis. An adulus?*

7. *Oriolus cayanensis*, L. (*Icterus flaviscapularis?* Less.
Xanthornus cayanensis, Gr.) *Pl. enl.* 535. 2. - *Edw.*
B. t. 322. - *Sv. Zool. Ill.* t. 22. *ex Am. m.* *Medius:*
nigerrimus; tectricibus alarum minoribus et inferioribus lu-
tatis: rostro rectiusculo, gracili.
- *8. *Icterus hypomelas*, Dubus. (*virescens?* *Vig. faem.* - *Psar-*
rocolius melanopsis? *Wagl.* - *Agelaius virescens?* *Gr.*)
Hist. Cuba, Ois. t. 19. bis. faem. ex Mexico. Cuba.
Minor: nigerrimus; torso, tectricibus alarum minoribus et
inferioribus tibialisque flavis.
9. *Icterus californicus*, Laf. (*Pendulinus californicus*,
Less. - *Xanthornus californicus*, Gr.) *Rev. Zool.* 1844,
p. 436. ex Am. s. o. e. Sordide flarus; loris, juguloque
nigerrimis: dorso nigricante, plumis cinereo-marginatis:
alis nigris, fascia humerali lata, remigum tectoriumque mar-
ginibus candidis; rectricibus nigris, apice albicantibus.
10. *Icterus abeillii*, Less. *Rev. Zool.* 1839. p. 101. - *Mus.*
Brux. ex Mexico. Niger; subtus et in loris flarus; gula
anguste, lateribusque latissime nigris: tectricibus alarum
albis: cauda flava, rectricibus mediis, epicibusque latera-
lium nigris.
11. *Icterus auricapillus*, Cassin. 1847. (*Pendulinus au-*
ricapillus, Ep) *Journ. Acad. Philad.* 1. t. 16. 2. *ex*
Mexico. Flavissimus; capite auro-aurantio; facie, gula,
pectore, dorso, alis, cauda nigerrimis; alis latissime flavis.
12. *Icterus maculi-alatus*, Cassin. 1837. *Journ. Acad.*
Philad. 1. t. 16. 1. *ex Mexico. Niger; tectricibus*
alarum minoribus, scapularibus, torso, lateribus et abdomina
latissime flavis: fascia alari conspicua et remigum prima-
riariorum margine externo albis.
13. *Icterus cucullatus*, Sw. *Phil. Mag.* 1827. p. 430.
Mus. Brux. ex Mexico. Rubro-aurantius; capistro,
loris latissime, gula, jugulo, interscapulo, alis, caudaque
nigris: tectricibus alarum mediis, margine remigum, rectri-
cumque extremo apice, albis: rostro brevi, gracilissimo, curvo.
Quid Oriolus nidipendulus, Gm. (Xanthornus nidipendulus, Gr.)
Sloane, Jamaic., t. 258. 3?
Quid Xanthornus viridis, Gr. ex Gm. Gen. B. p. 344. sp. 9. nisi
Leistes?
Quid Oriolus olivaceus, Gm. (Icterus olivaceus, Daud.) Pl. enl. 606. 2?
Quid Icterus musicus, Cabot, Proc. Boston Nat. Hist. 1834. p. 155?

932. **Xanthornus**, Cuv. 1800. (Icterus, Cuv. 1829. - Pendulinus, p. Vieill.)

America. 6.

1. **Oriolus XANTHORNUS**, L. (Icterus xanthornus, Daud. - Xanthornus *linnaeis*, Bp.) *Pl. enl. 5.1. - Edw. B. t. 243.*
ex Brasil. Cayenna, Antill. Flavus, dorso vi-
rescens: gula, alis, caudaque nigris: tectricibus alarum mi-
noribus flavis; scapularium marginibus albis.
2. **ICTERUS mesomelas**, Licht. (atrigularis, Less. - Psaro-
- colius mesomelas, Wagl. - Xanthornus mesomelas, Gr.)*
Cent. Zool. t. 22. Mus. Brux. et Paris. ex Tobasco.
Flavissimus; dorso, gula, jugulo, alis, caudaque nigerrimis:
fascia alari, rectricibusque lateralis flavis.
** Jun. flavus, subvirescens; loris, gula, dorso, alis, caudaque ni-*
gris: tectricibus alarum exterioribus flavis fasciam consti-
tuentibus.
- * Var. *ex Peru. Minor. An species?*
3. **X. chrysater**, Less. *ex Mexico.* Similis praeces-
tenti: *flavissimus; nucha et thorace subaurantius; facie, gula,*
pectori, alis, caudaque nigris; humeris flavis.
4. **ICTERUS melanopterus**, Hartl. (giraudii, Cassin.
Xanthornus melanopterus, Bp.) *Journ. Acad. Philad. t.*
t. 17. ex Columbia. Perflavus; fronte, gula, alis, cau-
daque gradata omnino nigra: rostro elongato, recto.
5. **PsARCOLIUS melanoccephalus**, Wagl. 1829. (Icterus
graduacauda! Less. 1839. - Icterus melanocephalus et
graduacauda, Gr.) *Ibis 1829. p. 756. ex Mexico.*
Flavo-virescens; capite, jugulo, alis, caudaque valde gradata ni-
gris: tectricibus alarum minoribus et inferioribus luteis: ros-
tro brevi, recto, acuminato.
Faem. griseo-virescente et nigrante varia: gula nigra: ab-
domino flavo-virescens. Juv. flavus, dorso subvirente: capite
ex toto, gula, pectoreque, alis, caudaque omnino nigra.
6. **ICTERUS parisorum**, Bp. (Melanochrysurus, Less. 1839.)
Ann. Bononiens. 1836. et Proc. Zool. Soc. 1837. p. 110.
sp. 15. ex Mexico. Nigerrimus: tectricibus alarum mi-
noribus, torgo, abdomine, rectricibusque basi flavo-virescen-
tibus: tectricibus alarum mediis opice albis: rostro elongato,
gracili, recto.

933. **Icterus**, Br. (Xanthornus, Scopoli. - Rhynchace, Merr.

America. 10.

1. **Oriolus ICTERUS**, L. (Coracias xanthornus, Scopoli. nec L.
Icterus vulgaris, Daud.) *Pl. enl. 535. - Aud. B.*
of Am. Suppl. t. 499. ex Am. m. et accidentaliter
merid. Am. s. Flavo-aurantius; capite, pectore, alis, cau-
daque nigris: fascia alari transversa, remigumque secundari-
arum margine, albis.

2. **AGELAIUS longirostris**, Vieill. (Icterus longirostris
Ep.) Mus. Paris. ex Amer. m. Similis praecedenti,
sed cervice nigra.
3. **ORIOLUS jamacaii**, Gm. (aurantius, Valenc. - Icterus
jamacaii, Daud. - Xanthornus brasiliensis, Br. - Ite-
rus aurantius, Less. - Xanthornus aurantius, Gr.) Cat.
Carol. t. 5? ex Brasil. Flavo-aurantius; copite, ju-
gulo, alis, interscapilio, caudaque nigris; fascia alari au-
rantia; remigibus secundariis margino externo basi alto.
- * 4 **Ict. JAMACAI**, Valenc. ex Maregr! (fasciatus? Merca-
torum. - Psarocolius jamaicai juv. Wagl. 1827. - Ps. cro-
conotus, Wagl. 1829. - Icterus croconotus, Gr.) Isis 1829.
p. 757. ex Mexico, Bolivia. Simillimus praecedenti;
sed rostro breviore et pileo interscapilioque vivide auran-
tiaco, nec nigro.
- * 5. **Ict. auratus**, Dubus, Mus. Brux. ex Yucatan.
Flavo-aurantius: gula late, alis, caudaque nigris; tectricibus
alarum minoribus florissimis; mediis, remigibusque albo-
marginatis: rostro brevi, recto.
6. **Ict. pustulatus**, Licht. (Psarocolius pustulatus,
Wagl.) Isis 1829. p. 757. Mus. Brux. et Paris. ex
Mexico. Rubro-aurantius; loris, alis, caudaque nigris;
interscapilio nigro-guttulato: tectricibus alarum minoribus
lateis; mediis, remigibus marginatis, rectricumque apice al-
bis; rostro brevi, crassiculo, recto.
7. **Ict. personatus**, Temm. in Pl. col. 482, fig. nulla.
ex Jamaica. Ex virecenti flavus; pileo, cervice, dorsoque
ex flavo viridibus: facie, gula, jugulo, alis, caudaque nigris;
tectricibus alarum minoribus et mediis albis: majoribus, sca-
pularibusque albo-marginatis.
8. **PSAROCOLIUS pectoralis**, Wagl. (Icterus guttulatus,
Lafr. - Ict. pectoralis, Gr.) Isis 1829. p. 755. - Mag.
Zool. 1844. t. 52. - O. des Murs, Pl. p. 10. Flavus; lo-
ris, gula, jugulo, dorso, alis, caudaque nigris; pectore, lateri-
busque nigro-guttulatis: tectricibus alarum minoribus fla-
vissimis: speculo alari parvo: scapularibus margine externo
latissime candidis: rostro subincurvo.
9. **Ict. gularis**, Licht. (Psarocolius gularis, Wagl.
Icterus mentalis, Less. - Ict. gularis, Gr.) Isis 1829.
p. 754. - Cent. Zool. t. 41. - O. des Murs, Pl. p. 9.
ex Mexico. Rubro-aureus; loris, gula et fascia jugulari,
dorso, alis, caudaque nigris; tectricibus alarum minoribus su-
pra infraque aureis: remigibus basi, tectricibus majoribus
apice, remigibusque secundariis margine externo, albis.

10. **ORIOLUS MEXICANUS**, Leach, nec L. (Psarocolius *leucopteryx*, Wagl. - Icterus leucopteryx, Gr.) Zool. Misc. 1. t. 2. ex Mexico. Similis praecedenti, atque latissime albo-varius; sed minus splendidus, dorsoque concolor, nec nigro.

934. **Leistes**, Vig. America mer. 3.

1. **ORIOLUS viridis**: Gm. (Agelaius guirahuro, Vieill. - Icterus dominicensis, Licht. nec Auct. - Trupialis palustris, Merr. - Xanthornus gasqueti, Quoy et Gaim. - Leistes suchii, Vig. - L. orioloides, Sw. - L. viridis, Gr.) Pl. enl. 236. 1. - Voy. Uran. Ois. t. 24. - Zool. Journ. II. t. Suppl. 10. ex Am. m. Montevideo. Fusco-olivaceus: tectricibus alarum minoribus et inferioribus, uropygio, abdomineque latissime flavis.

Var. flavissima extat in Mus. Paris typ. Trou piale d'or, Less.

2. **I. brevirostris**, Sw. (Agelaius bicolor? Vieill.) Two Cent. p. 304. ex Brasil. Similis praecedenti, sed minor et rostro brevior. An avis junior?

3. **ICTERUS anticus**, Licht. (tenuirostris, Sw. - Oriolus draco, Mus. Paris. - Trupialis draco, Merr. - Agelaius virescens? Vieill. ex Azara 65. - Leistes antiquus, Aliq. Leistes virescens, Hartl.) Cat. Dupl. Berl. Mus. 182. ex Brasil. Olivaceo-fuscus, uropygio nigricante: subtus et in tectricibus alarum minoribus flavus: rostro exili, apice depresso.

935. **Molothrus**, Sw. (Tanagra, Emberiza, Fringilla, Oriolus, Sturnus, p. Auct. - Icterus, p. Bp.) America. 5.

1. **FRINGILLA pecoris**, Gm. (Oriolus fuscus et Sturnus obscurus, Gm. - Sturnus juncteti, Lath. - Icterus emberizoides, Daud. - Icterus pecoris, Bp. - Emberiza pecoris, Wils. - Molothrus pecoris et M. ater, Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 606. 1. mas. - Am. Orn. t. 18. 1. mas. 2. faem. 3. jun. Audub. Am. t. 99. ex Amer. sept.

2. **M. brevirostris**, Sw. Two Cent. and a Quart. p. 305. ex Amer. mer. Niger, vix purpurascens: rostro brevi, semi-pollicari: aliis quadri-pollicariibus, fuscoscentibus. Faem. fusa; subtus dilutior, gula albida.

3. **TANAGRA bonariensis**, Gm. (Icterus niger, Daud.

I. minor, Spix. - Passerina discolor, Vieill. - Scoleco-phagus! minor? Sw. - Molothrus bonariensis, Gr.) Pl. enl. 710. - Av. Bras. t. 63. 2. ex Amer. m. Nigropurpureus: alis brevibus: cauda rotundata.

4. **ICTERUS sericeus**, Licht. (I. tanagrinus, Spix. mas, fringillarius, Spix. faem. - I. violaceus, Wied. - Scolecophagus! sericeus? Sw.) Two Cent. p. 301. sp. 64. Av. Bras. t. 64. 1. mas, t. 65. faem. ex Bras. Boliv. Major: nigro-purpureus: alis elongatis: cauda aequali: rostro brevi, crasso.

Faem. Fusco-cinereus, dorso brunnescens: alis, caudaque nigri-cantibus; remigibus extero cinnamomeo-rufis.

5. **LEISTES unicolor**, Sw. (Agelaius unicolor, Gr.) Two Cent. p. 304. sp. 75. ex Brasil. Niger opacus: alis caudaque valde rotundatis: rostro breve, parvo, rectissimo. Faem. Rufo-fusco, nigro striata; subtus fuscocinnamomea.

*936. **Cyrtotes**, Reichenb. (Molothrus, p. Gr.) Maxilla constricta, sinuosa, angustata! Amer. mer. 1.

ICTERUS maxillaris, Lafresn. (Molothrus bonariensis, p. Gr.) Orb. Voy. Amer. m. t. 52. 2. mas. 3. rostrum. ex Bras. Major: nigro-olivaceus: alis caudaque virescentibus.

937. **Dolichonyx**, Sw. (Emberiza, p. L. - Icterus, p. Bp.) Amer. sept. 1.

EMBERIZA oryzivora, L. (Passerina oryzivora, Vieill.)

Icterus agripennis, Bp. - Dolichonyx oryzivora, Sw.) Pl. enl. 388. - Wils. Am. Orn. t. 12. 1. - Aud. Am. t. 54. ex Amer. sept. Locum tenet Emberizae hor-tulanii gastronomis, nisi ornithologis, americanis, semetipsae pinguisceens.

N. B. Secunda hujus generis species **Dolichonyx rufescens**, Gr. (Psarocolius rufescens, Wagl.) ex Vieill. Nouv. Dict. II. Nat. xxv. p. 25. non est hujus generis; sed una ex acuticaudis speciebus Familiae S p i z i n a r u m !

FAMILIA 62. PLOCEIDAE.

SUBFAM. 130. PLOCEINAE.

939. **Alecto**, Less. (Bubalornis, Smith. - Dertroides, Sw. - Textor, Temm. Gr.)

Africa. 3.

1. **TEXTOR ALECTO**, Temm. (Dertroides *albirostris*, Sw.)

Pl. col. 446. ex Afr. or. Kordofan, Sennaar.
Maximus: niger, plumarum basi latissime, remigumque limbo
externo anguste, albis: rostro albicante, apice nigro.

2. **TEXTOR erythrorynchus**, Smith. (olim Bubalornis

niger, 1836.) Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 64, mas. ex Afr. m.
Maximus: nigerrimus, remigibus externe albo-marginatis:
rostro corallino.

3. **TEXTOR dinemelli**, Horsf. - Rüpp. *Syst. Uebers.*

N. O. Afr. t. 20. - Gr. et Mitch. Gen. B. t 87. 1. faem.
ex Afr. or. Major: albis; dorso, aliquo fuscis; uropygia,
cristo quo cinnabarinis: remigibus rectricibusque nigris: spe-
culo alari maximo, candido.

940. **Sycobius**, Vieill. 1816. (Malimbus et Ficophagus? Vieill.

Symplectes, Sw. 1837. - Eupodes, Jard. 1837.)

Afr. occ. et m. 7.

1. **PLOCUS MALIMBUS ET Sycobius cristatus**, Vieill.

(*Tanagra malembica*, Daud.) *Ois. Chant. t. 42. - Ann.*
Mus. t. 1. 10. ex Africa occident. Angola.
Mas nigerrimus; pileo cristato, genis, gula, pectoreque cocci-
*neis: rostro nigro. *Faem. minor; fuso-nigra; subtus fuli-*
ginosa; capite haud cristato, pectoreque rubris: rostro carneo.

2. **MALIMBUS CRISTATUS**, Faem. Vieill. (Textor *malimbus*,

Temm. - Fringilla textrix, Licht. - Sycobius rubricol-

lis, Sw. - Plocus fasciatus, Steph. - Euplectes rufo-

velatus, Fraser, 1842. - Plocus malimbus, Mus. Berol.)

Ois. Chant. t. 43 ex Afr. occ. Congo, Ins. Fer-
nando Po. Nigerrimus, pilo, cerviceaque coccineis.

3. **PLOCUS melanotis**, Laf. nec Sw. nec Guérin. (erythro-

cephalus, Rüpp. 1845.) *Rev. Zool. 1830. p. 20. - Mag.*
Zool. 1839. t. 7. ex Senegal, Abyssin. Fusco-
cinerous; subtus albis: capite, pectore, remigum, rectricum-
que marginibus externe rubris: genis mentogno nigris.

* 4. **HYPHANTORNIS rubriceps**, Sund. Mus. Holm. ex Afr. m.

Affinis praecedenti.

5. *S. scutatus*, Cassin. Proc. Acad. N. Sc. Philad. iv.

p. 157. - Journ. Acad. I. p. 297. t. 41. I. mas. 2. faem. ex Afr. occ. Sierra Leone. Niger; scuto pectorali lato, tectricibusque caudae inferioribus coccineis. Mas pileo cerviceoque coccineis; gula et regione parotica nigerimis. Faem. (nonne sp. dist. nomine S. cassini disingnada?) pileo cerviceoque nigris, corpore concoloribus.

6. *Ploceus nitens*, J. Gr. (Sycobius nitens, Gr.) *Gr. et*

Mitch. Gen. B. t. 87. 2. ex Afr. occ. Nigerrimus; scuto pectorali coccineo; rostro nigro, apice flavo.

7. *Ploceus nigerrimus*, Vieill. (niger, Sw. - Sycobius

nigerrimus, Gr.) Enc. Meth. Orn. p. 700. Mus. Paris. ex Angola. Ex toto niger: rostro nigerrimo: pedibus pallidis.

***941. *Symplectes*, Bp. ex Sw. (Sycobius, p. Gr. - Eupodes, p. Jard.)**

Africa. 4.

1. *Malimbus nigricollis*, Vieill. (Sycobius nigricollis, Gr.) *Ois. Chant. t. 45. ex Angola. Aureus; dorso, alis, caudaque atro-virentibus; gula restropique nigris.***2. *Scorus bicolor*, Vieill. (Fringilla gregalis, Lich. 1823.**

Symplectes chrysomus, Sw. - Ploceus chrysogaster, Vig. 1831. - Eupodes xanthosomus, Jard. - Hyphantornis bicolor et chrysogaster, Gr. - Tangara à gorge rayée!! Less. Tr. Orn.) Selb. Ill. Orn. n. ser. t. 10. Mus. Berol. et Paris. ex Afr. m. Brunneo-oliveus; subtus flavissimus; gula plus minus fuscescens; tectricibus alarum inferioribus albis.

3. *Sycobius atti thomae*, Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 109. ex Afr. occ. Olivaceus: pileo et cervice nigricantibus: fronte, superciliis, genis, colli lateribus, et pectore fulvo-aurantiis: abdomine fuscescens.***4. *S. princeps*, Bp. Mus. Paris. ex Insulis Princip. Afr. occ. Flavo-viridis; subtus flavissimus: pileo flavo-rufo: resto robustissimo, curvo, albido.**

Quid Ploceus flavicapillus, Vieill. Enc. Meth. p. 698. ex Afr. occ. Congo?

***942. *Nelicurvius*, Bp. (Ploceus, p. Gr.)**

1.

***Loxia penitidis*, Gm. (nelicourvi, Scopoli. - Ploceus ne-**

licourvi, Gr.) Sonnini, Voy. Ind. t. 17. ex Madag. Luteo-viridis: pileo genisque nigris: nacha rufa: gula, jugulo et torque cervicali lateis: abdomine plumbeo: criso cinnamomeo. Faem. sincipite flavo: nacha pirescente.

943. **Hyphantornis**, Gr. p. (Ploceus, Auct.) Africa. 6.
1. **MALIMBUS! aurantius**, Vieill. (Hyphantornis aurantia, Gr.) Ois. Chant. t. 44. Mus. Paris. ex Angola. Minor: aureo-aurantiacus; dorso viridi-olivaceo; toris nigris.
 2. **PLOCEUS ocularius**, Smith. 1832. (gutturalis? Vig. 1831. Hyphantornis ocularia, Gr.) Ill. S. Afr. Zool. Ar. t. 30. 2. mas. ex Afr. m. Viridi-flavus; pileo, genis, pectoreque aureis: gula, vittaque utrinque ocularia nigra.
 3. **PLOCEUS brachypterus**, Sw. (Hyphantornis brachyptera, Gr.) Nat. Libr. vii. t. 10. ex Afr. occ. Similis praecedenti; sed rostro breveiore, robustiore, strictiore: dorso magis virescente: jugulo, orbitaque lato nigris.
 4. **PLOCEUS personatus**, Vieill. nec Sw. (melanotis, Sw. nec Laf., nec Guérin. - Hyphantornis personata, Gr.) Gal. Ois. t. 84, ex Afr. Minor: flavo-viridis; subtus et in nucha flavissima: sincipite, genis, guttureque nigris. Faem. ex toto cinereo-virens, subtus albida.
 5. **PLOCEUS AETHIOPICUS!** Less. ex Cuv. nec Auct. (**capensis**, Smith, 1832. nec Sw. - Hyphantornis capensis, Gr.) Ill. S. Afr. Zool. Ar. t. 66. 2. mas. ex Afr. m. Flavus, dorso sulphurascente: fronte, gula, pectoreque aurantiacis.
 6. **PLOCEUS aurifrons**, Temm. (icterocephalus, Sw. - Hyphantornis aurifrons, Gr.) Pl. col. 175. 176. ex Afr. m. et r. Simillimus Pl. capensi; sed major, et magis flavus; fronte gulaque fore aurantiacis.
Quid Cocothraustes olivaceus, Fraser (genus Ligurnus! Reichenbach, 1850.) Proc. Zool. Soc. 1842. p. 144. ex Ins. Fernando Poo?
- *944. **Textor**, Bp. ex Auct. (Ploceus, Auct. - Hyphantornis, p. Gr. Africa. 15.
1. **ORIOLUS TEXTOR, et LOXIA melanocephala**, Gm. (Ploceus textor, Auct. - Pl. senegalensis, Steph. - Pl. collaris, Fraser, 1842. - Fringilla velata, Licht. - Hyphantornis textor et grandis! Gr.) Pl. enl. 375. 376. Sw. Zool. Ill. n. s. t. 37. Major: flavus; capite nigro: cervice, jugulo, lateribusque castaneis: dorso, aliquo nigro varii, cauda virescente.
 2. **PLOCEUS larvatus** mas et flavo-viridis faem. Rüpp. (Hyphantornis larvata et flavo-viridis, Gr. - Loxia abyssinica? Gm.) Faun. Abyss. t. 32. 1. mas. - Ueb. Vog. N.O. Afr. t. 29. faem. ex Afr. Abyssinia. Aureus; sincipite, genis, gulaque nigri: dorso nigro-vario. Faem. dorso cinereo; pileo olivaceo.

3. **TANAGRA capitalis**, Lath. (*Fringilla capitalis*, Licht.)
Ploceus velatus? Vieill. - Pl. personatus, Sw. nec Vieill.
Toucnam-courvi, Mus. Paris. nec Buff. - Pl. philippinus!
Cuv. nec Auct. - *Hyphantornis velata et capitalis*, Gr.)
Synops. t. 112. ex *Senegal.* Major; olivaceus, dorso
 fuscō-striato; subtus cum torque occipitali aureus: capite,
 antice guttareque nigris: pectore castaneo: cauda subrufes-
 cente.
4. **PLOCEUS aureicapillus**, Sw. (*Hyphantornis aurei-*
capilla, Gr.) *Twe Cent.* p. 346. ex *Afr. m.* Similis
 praecedenti; sed minor, et pulchro flavus: capitis nigrolineo
 minus extensa; sincipite aureo-rufo.
5. **PLOCEUS spilonotus**, Vig. 1831. (*stictonotus*, Smith,
 1831. - flavigeckii, Sw. 1837. nec Cuv. - *Ieterus*, Fringilla,
Ploceus chrysostictos! Licht. - *Hyphantornis spilonota*,
 Gr.) *Ill. S. Afr. Zool. Av.* t. 66. 1. mas. - *Nat. Libr.*
B. of west. Afr. VIII. t. 32. ex *Afr. m.* Flavus, dorso
 nigro-vario; gula genisque nigris.
6. **PLOCETS subaureus**, Smith, 1832. (Pl. tohutohi ?
 Smith, jan. - *Hyphantornis subaurea*, Gr.) *Ill. S. Afr.*
Zool. t. 30. 1. mas. ex *Afr. m.* Flavo-virens; capite,
 pectoreque aureis, abeo nigrolineo.
7. **PLOCEUS aureiflavus**, Smith. (*Hyphantornis aureiflava*,
 Gr.) *Ill. S. Afr. Zool. note to Pl. 30.* ex *Afr. occ.*
Seneg. Minor: capite ex toto, pectoreque sulphureo-mel-
 linis.
8. **PLOCEUS mariquensis**, Smith. (*Hyphantornis mari-*
quensis, Gr.) *Ill. S. Afr. Zool. t.* 103. ex *Afr. m.*
Medius: cinereo-virens, fuscō-varius; subtus albo-flavus:
 alis, caudaque fuscis pennis flavo-marginatis.
9. **PLOCEUS cucullatus**, Sw. (*Hyphantornis cucullata*, Gr.)
Twe Cent. and *a Quart.* p. 307. ex *Senegalambia*.
Medius: flavus, subtus virens: capite, juguloque nigris.
10. **PLOCEUS galbula**, Rüpp. (*Hyphantornis galbula*, Gr.)
Faun. Abyss. tab. 32. 2. ex *Afr. or.* Minor: flavis-
 simus; dorso virente fuscō-striato: facies anguste ruso-brun-
 nea: remigibus flavo-marginatis, rectricibusque fuscis.
11. **FRINGILLA vitellina**, Licht. (*Ploceus ruficeps*, Sw.
 Pl. intermedius, Rüpp. - *Hyphantornis vitellina et in-*
termedia et Ploceus ruficeps, Gr.) *Syst. Uebers. Vog.*
Nord Ost. Afr. p. 71. ex *Afr. or. et occ.* Minor:
 flavo-virens fuscō-striatus: subtus et in nucha flavo-auran-
 tius: facie, gulaque nigro-brunneis, castaneo-marginatis.
Quid Ploceus collaris, Vieill. *Enc. Meth.* p. 699?

12. *Ploceus melanotis*, Guérin, 1843, nec Lafr. nec Sw.(auricularis, Fl. Prev. - *Hyphantornis guerini*, Gr.)*O. des Murs in Voy. Lefebure* fig. bona. ex Abyssin.*Minor*: *flavo-viridis fuscus striatus*: sincipite corporeque
subtus aureis: loris genisque late nigris.Faem. cinereo-viridis (fronte genisque concoloribus): subtus
flavissima.13? *HYPHANTORNIS flavigula*, Hartl. Rev. Zool. 1845.p. 406. ex *Aceria*, Afr. occ. Ex flavescente olivaceus;
subtus et in fronte, superciliisque citrinis; stria oculari ni-

gerrina. A precedenti vix distinctus!

Quid H. modesta, Hartl. Rev. Zool. 1845, p. 406. ex *Seneg.*
Abyssin. brunneus, plumarum margine pallidior,
nisi Avis junior?14. *Ploceus rubiginosus*, Rüpp. (*Hyphantornis rubi-**ginosa*, Gr.) Faun. *Abyssin.* t. 33. l. ex *Abyss.*
Senegal. Rufo-brunneus, alis caudaque dilutioribus: ca-
pite juguloque nigris.Quid *Ploceus isabellinus*, Less. Rev. Zool. 1840, p. 226?Quid *Ploceus collaris*, J. Gr. Zool. Misc. l. p. 6. nec Vieill. ex Afr?15. *Ploceus castaneo-fuscus*, Less. (*Hyphantornis**castaneo-fusca*, Gr.) Rev. Zool. 1840, p. 99. ex Afr.
occ. *Nigerrinus*, dorso, abdomineque rufo-castaneis: ros-
tro nigro; pedibus pallidis.945. *Ploceus*, Gr. p. ex Cav.

Asia Ocean. 5.

1. *Loxia philippina*, L. (*Euplectes philippensis*, Sic. nec*Mus. Paris.* - *Ploceus philippinus*, Bp.) Pl. enl. 135. 2.ex As. m. or. In s. *Philip.* Flavus, fuscus-varius;pileo pectoreque flavissimis: fronte gulaque nigricantibus:
abdomine pure albo; remigibus fusca albo-marginatis; rectri-
cibus flavo-limbatis; rostro longo, valido, curvo.Faem. omnino nigricans plumis late rufo-marginatis: superci-
liis angustis, maculaque auriculari flavis: subtus flavo-cin-
namomea, pectore lateribusque rufis, nigro-striatis.2. *Loxia philippina*, Strickl. (*Ploceus bayza*, Blyth, Journ.

As. Soc. - Pl. philippinus, Blyth, Cat. sp. 614. - Pl.

philippinus ex India, Auct.) Journ. As. Soc. XIII. p. 945.ex Asia m. *Fuscus*, albido varius: pileo tantum flavo:
subtus ex toto albo-rufescens, gula vix fuscescente.

Faem. minor; pileo concolore, superciliis isabellinis.

3. **Loxia hypoxantha**, Daud. (*Fringilla philippina*; *Horsf.* mas. - Fr. *manyar*, *Horsf.* faem. - *Ploceus philippinus*, *Temm.* nec *Strickl.* - Pl. *Philippinus ex Java*, *Auct.* - Pl. *hypoxanthus*, *Blyth.*) *Sparrm. Mus. Carls. III. t. 71. jun. ex Java, Sumatra. Minor: flaviissimus; genis mentoque nigricantibus: dorso flavo fusco-que vario; alis caudaque fuscis: rostro valido subpyrrhulaceo. Juv. genis mentoque concoloribus; sincipite dorsoque fusco-cinereis.*

4. **Pl. flavigeeps**, Cuv. nec Sw. (*Euplectes flavigeeps*, Sw. *bengalensis*, *Jerd.* nec *L.* - *Enpl. striatus*, *Blyth.*) *Two Cent. and a Quart. p. 310. sp. 90. ex As. m. Beng. Nepal. Nigricans, rufescens striatus; pilo, pectoreque flavis; subtus rufescens, lateribus, crissquo nigro-striatis: sincipite flavo: gula, colloque nigricantibus. Juv. Fuscus, albido varius; pilo, cervice, pectoreque flavis: gula albida, fuscescente marginata: abdomine albo-flavido.*

5. **Loxia bengalensis**, L. (*regina*, *Bodd.* - *Coccothrautes chrysoccephalus*, *Vieill.* - *Euplectes albirostris*, Sw. *Eupl. bengalensis*, Gr. - *Ploceus aureus*, *Lesson*, *nec Auct.* - Pl. *bengalensis*, *Blyth.*) *Pl. enl. 393. 2. - Edw. B. t. 180. ex Bengal. Fusco-cinereus; subtus albus: capite, colloque albidis, pilo subcristato auro-flavo: scuto pectorali nigre: rostro albicante. Juv. Fusco-brunneus, pilo concolor; superciliis, gulaque flavis: subtus albo-rufescens, pectore nigerrimo, lateribus obscuris fuso-lineolatis.*

*Quid Ploceus baglefecht, Vieill. ex Loxia philippina var. *Lath.* Enc. Meth. Orn. p. 698. ex *Abys. s. nisi species Textoris?* Quid Euplectes aurinotus, Sw. (*Loxia aurea*, Gm. - *Ploceus aureus*, Gr.) Brown, Ill. t. 25. l. ex Afr. occ. *Benguela. Nigerrimus; dorso auro: alis fuscis; tectricibus nigro-notatis, apice albis: rostro nigro: pedibus pallidis?**

946. **Plocepasser**, Smith. 1846. (*Agrophilus*, 1837. et *Leucophrus*, Sw.)

Africa. 3.

1. **P. mahali**, Smith. (*Leucophrus pileatus*, Sw. 1838. *Ploceus haematocephalus*, Licht. - *Agrophilus mahali*, Caban. - *Plocepasser mahali et pileatus*, Gr.) *Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 65. mas. ex Afr. m. Rufo-cinereus; pilo, alis, caudaque nigricantibus: subtus cum superciliis dilatatis, uropyglio, fascia que alare duplice, albis: remigibus, rectricibusque albo-marginatis.*

2. *P. melanorhynchus*, Rüpp. (hinc Pl. mahali var.)

Syst. Verz. Vög. N. O. Afr. p. 78. ex Afr. or. Schœa.
Simillimus praecedenti, sed minor et rectricibus minus marginatis.

3. *AGROPHILUS superciliosus*, Sw. (Ploceus superciliosus,

Rüpp. - Plocepasser superciliosus, Smith.) Rüpp.
Zool. Atl. t. 15. ex Cordofan. Rufo-cinereus; sub-
tus albus: pileo rufo-castaneo: superciliis albis; stria utrin-
que mandibulari nigricante: alis, caudaque fusco-cinereis:
rectricibus, remigibusque albo-marginatis.

Faem. minor; sed simillima.

947. *Nigrita*, Strickl. (Æthiops, Strickl. 1841.)

Africa occ. 3.

1. *N. canicapilla*, Strickl. Proc. Zool. Soc. 1841. p. 30.

ex Afr. occ. Fernando Po. Canescens, verticis la-
teritus uropygoque albiscantibus: fronte, genis, gula, corpo-
re que subtus nigerrimis: alis nigris, tectricibus macula api-
cali alba.

2. *N. fusconota*, Fraser. Proc. Zool. Soc. 1842. p. 145.

Zool. Typic. figura. ex Afr. occ. Ins. Fernando Po.
Nigra; subtus sordide alba: dorso scopularibusque cinereo-fus-
cis: remigibus nigricantibus: rostro pedibusque nigerrimis.

*3. *N. arnaudi*, Pucheran, Mus. Paris. ex Nil. albo.

Rufo-cinerea, pileo pulchro griseo; alis caudaque nigro-ca-
riis: rostro nigro.

948. *Sporopipes*, Caban. 1847. (Pholidocoma, Reichenb. 1850.

Estrelda, p. Gr.) Africa. 2.

1. *FRINGILLA lepidoptera*, Lichet. 1842. (Amadina squa-

mifrons, Smith. - Estrelda squamifrons, Gr. - Ploceus
lepidopterus, Gr. - Sporopipes lepidopterus, Caban.)
Ill. S. Afr. Zool. Ac. t. 95. faem. ex Afr. m. Minor:
cinerea; subtus alba: gula nigra (jun. hinc inde nigro-margi-
nata): sincipitis, alarum caudaque plumis pennisque niger-
rimis, pulchre albo-marginatis.

2. *FRINGILLA frontalis*, Vieill. (Amadina frontalis, Rüpp.

Estrelda frontalis, Gr. - Sporopipes frontalis, Caban.)
Ois. Chant. t. 16. ex Afr. or. et occ. Senegal,
Nubia, Abyssinia. Major: cervico rufa-sinopite,
et fasciis gularibus exiguis, nigris, albo-punctulatis.

949. **Phlaeterus**, Smith, 1837. (Euplectes, p. *Siv.*) Africa m. 1.

Loxia socia, Lath. (Ploceus patersoni, Less. - Pl. socius, Cuv. - Euplectes lepidus, *Siv.* - Phlaeterus lepidus, Smith.) Paterson, Voy. t. 19. - Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 8. mas. ex Afr. m. Rufo-brunneus, plumis cinnamomeo-marginatis: subtus cinnamomeus; mento nigra; lateribus macula magna nigra, albo-marginata.

950. **Quelea**, Reichenb. 1850. (Ploceus, p. *Gr.*) Africa. 1.

Loxia sanguinirostris, L. (Emberiza quelea, L. - Passer senegalensis erythrorynchos, Briss. - Fringilla quelea, Licht. - Loxia lathami, Smith, jun. - Ploceus sanguinirostris et Amadina lathami, Gr. nec Gould.) Pl. enl. 183.2. et 223.1. - Edw. B. t. 271. 2. - Vieill. Ois. Chant. t. 22. mas. 23. faem. 24. var. ex Afr. or. occ. et mer. Brunnea, plumis allo-rufescente marginatis: subtus albida, pectore rufescente, lateribus rufo-fuscouscentibus: remigibus externe flavo-limbatis: rostro rubello. Mas ad. fronte, genis, gulaque nigris: vertice, occipite, collique lateribus flavo-cinnamomeis: abdомine roseo. Mas jun. pileo ex toto, corporeque subtus cinnamomeis. Faem. et juv. pileo fusco: subtus sordide alba.

*951. **Foudia**, Reichenb. 1850. (Ploceus, p. *Gr.*) Africa. 4.

1. **Loxia madagascariensis**, L. (Cardinalis madagascariensis, Briss. - Euplectes rubra, *Siv.* - Ploceus ruber? Blyth. - Pl. madagascariensis et ruber, *Gr.*) Pl. enl. 134. 2. - Vieill. Ois. Chant. t. 63. ex Ins. Maur. Madagasc. Rubra, dorso nigro maculata; stria oculari nigra; alis caudae rotundata fuscis: tectricibus alarum allo-flavido limbatis: rostro brevi, rectissimo, nigerimo: pedibus carneis.

Quid Ploceus fusco-fulvus, Gr. ex Bodd. (Emberiza borbonica, Gm.) Pl. enl. 321. 2. ex Ins. Borbonica?

2. **FRINGILLA erythrocephala** et Emberiza rubra, Gm. (Ploceus erythrocephalus, *Siv.* - Pl. martineti: Gr. - Hyphantornis erythrocephalus, Blyth.) Pl. enl. 665. 1. mas. 2 faem. - Brown, Ill. Zool. t. 28. 2. - Vieill. Ois. Chant. t. 28. ex Ins. Mauritius. Minor: fusco-virens, dorso striolata; subtus allo-olivea: alis bifasciatis: capite, collo, pectore, uropygione rubris: orbitis nigris: rostro gracile, subincurvo, nigro. Faem. fusco-virens, subtus allo-virens: unicolor: alis tantum bifasciatis.

*3. *F. eminentissimus*, Bp. Mus. Paris. ex Afr. or.

Zanzi bar. Major; nigricans, plumaram marginibus olivaceis: subtus albo-olivacea, capite, jugulo, pectore que coccineis: orbitis concoloribus: rostro valido, curvo, compresso, nigro.

*Juv. (an hujus speciei?) Mus. Paris. ex Madagasc. Minor: ex toto cinereo-virens; subtus albidio-olivacea, lateribus obscurioribus: rostro carneo.

4. *PLOCEUS erythrops*, Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 109. ex

In s. S. Thomas Afr. occ. Fusca, plumis marginie fulvescentibus: capistro, loris, et striola superciliari sanguineis: subtus fuscescens, gula et abdomine medio albidiis.

Faem. capistro, loris et superciliis flavis.

SUBFAM. 134. VIDUINAE.

9.1
952. *Euplectes*, Sw. 1829. (Pyromelana, Bp. 1831.-Oryx, Less.

1831. nec Smith. - Orynx, Reichenb.-Ploceus! Gr. ex Cuv.) Afr. As. m. 11.

a. Pyromelanae.

10.1

1. *LOXIA oryx*, L. (Fringilla carolinensis! Gm. - Fringilla oryx, Licht. - Euplectes oryx, Smith. - Ploceus oryx et Pl. sp. 29! Gr.) Pl. enl. 6. 2. 309. 2. et 181. 2. Vieill. Ois. Chant. t. 66. ex Afr. m. Major: rubra; facie, abdomineque nigro-holosericeis: alis caudaque fusco-griseis, pennis albidio-marginatis.

*2. *E. sundevalli*, Bp. (Ploceus oryx var. minor, Sundev.) Mus. Holm. ex Caffr. Similis praecedenti, sed minor.

3. *E. flammiceps*, Sw. (Ploceus flammiceps, Gr.) B. of west. Afr. I. t. 13. ex Senegal. Rubra; dorso, crissoque flavo-cinnamomeis: genis, gula, abdomineque nigro-holosericeis: alis, caudaque nigris; tectricibus caudae brevissimis.

4. *E. petiti*, O. des Murs, 1846. (Oryx petiti, Flor. Prevest.) Lefebure, Voy. Abyss. All. Ois. t. 10. ex Abyssinia. Rubra; genis, gula, abdomine, tectricibus que caudae nigris; dorso, crissoque rufescitibus.

5. *PLOCEUS craspedopterus*, Schiff. Mus. Francf. ex Abyssinia. Similis praecedenti; sed minor et tectricum margine semper albo.

6. *LOXIA ignicolor*, Vieill. (franciscana? Isert. - Fringilla ignicolor, Licht. - Ploceus franciscanus, Gr.) Pl. enl. 134. - Ois. Chant. t. 59. ex Afr. or. Sonnenaar. Minor: rubra: pileo, genis (gula rubra) abdomineque nigro-holosericeis: alis, caudaque griso-fuscis; tectricibus longissimis (caudam excedentibus).

11. E

11. E

12. E

13. E

14. E

15. E

16. E

17. E

18. E

19. E

7. *E. nigriventris*, Cassin. - Proc. Acad. Philad.

1848. p. 66. - Journ. Acad. Philad. 1849. I. p. 242. t. 31. I.

ex *Zanzibar*. Rubra; subtus et in genis omnino nigra; criso, tibiisque albido-rufescens: alis, caudaque rufescens.

b. Xanthomelanae.

8. *Loxia capensis*, L. (Icterus flavesiensis, Daud. - Fringilla phalerata, Licht. - Ploceus capensis, Blyth. mini-

me vero Euplectes capensis, Smith.) Pl. enl. 101. mas. et 659. I. faem. ex Afr. m. Maxima: nigro-holosericea; uropygio, humeris, tectricibusque alarum inferioribus flavis: alis fuscis, pennis albido-marginatis.

9. *E. xanthomelas*, Rüpp. (Ploceus capensis var. minor?

Sundev.) Syst. Verz. Vog. N. Ost. Afr. t. 28. ex Abyssin. Media: nigro-holosericea; uropygio, humeris, tectricibus alarum inferioribusque flavis: alis nigris, pennis singulis albido-marginatis. Faem. nigricante et flavido varia; subtus rufescens fusco-striata; humeris uropygioque flavicantibus.

10. *Loxia abyssinica*, Vieill. nec Gm. (*melanogastra*,

Lath. - afra, Gm. - Fringilla abyssinica, Gm. - Fringilla ranunculacea, Licht. - Ploceus melanogaster, Auct. Pl. abyssinicus? Gr.) Brown, Ill. t. 24. 2. - Vieill. Ois. Chant. t. 28*. ex Senegal. Minor: flava; genis, gula, abdomineque medio late nigra; tectricibus alarum inferioribus albidiis: collare corvicali, alis, caudaque fuscis. Minor praeced. et pectora flavo!

Quid Fringilla luteola, Licht. (Ploceus luteolus, Gr.) Cat. Dupl. Berl. Mus. p. 23?

11. *E. taha*, Smith. (Ploceus melanocephalus? Vieill.

Pl. taha, Gm. - Pl. dubius, Smith, jun.) Ill. S. Afr. Zool. t. 7. ex Afr. m. Minor: flava capitis lateribus, collo, pectora, abdomineque nigro-holosericeis: alis caudaque fuscis; tectricibus caudae inferioribus albidiis.

Quid Ploceus jonquilleus, Vieill. Enc. Meth. p. 700. - Guérin, Icon. Rég. Anim. Cuv. t. 18. 8. ex Afr. occ. Angola. Olivaceus, pileo, linea quo oculari nigricantibus; superciliis flavis: subtus flavissimus?

*953. *Urobrachya*, Bp. (Vidua, p. Gr.)

Africa.

2.

1. *Vidua axillaris*, Smith. Ill. S. Afr. Zool. Av. t.

17. mas. ex Afr. m. et or. Nigra: humeris rubris; tectricibus alarum mediis et inferioribus, scapularium marginibus, femoribusque rufo-cinnamomeis: maxilla nigra, mandibula alba.

Faem. rufo-cinerea fuscoque varia; subtus albida.

2. VIDUA *albonotata*, Cassin. Proc. Acad. Phil. 1848.
p. 66. et Journ. 1849. 1. p. 241. tab. 30. 2. ex Afr. occ.
Nigra; humeris flavis; maculis alaribus albis.

954. Chera, Gr. 1844. (Vidua, p. Cuv.) Africa mer. 1.

- C. progne*, Gr. ex Bodd. (Loxia caffra et Emberiza longicauda, Gm. - Vidua phoenicoptera, Sw.) Pl. ent. 635.
Mill. Icon. t. 111. - Vieill. Ois. Chant. t. 39. 40.
ex Afr. m. Major: nigerrima: mento sordide albido: humeris coccineis, postice late albis: tectricibusalarum remigibusque albido-limbatis; cauda valde recurva.

955. Pantheria, Caban. (Coliuspasser, Rüpp.) Africa. 5.

1. LOXIA *macroura*, Gm. minime Colius! (L. longicauda, Lath. - Fringilla flavoptera et chrysoptera, Vieill. - Vidua chrysomata, Sw. - V. macroura, Gr. - Pantheria macroura, Caban.) Pl. ent. 183. 1. - Ois. Chant. t. 41.
ex Afr. occ. Nigra; fascia dorsi et alarum flavo-rufa; cauda longa, cuneiformi.
2. FRINGILLA *laticauda*, Licht. (Coliuspasser torquatus, Rüpp. - Vidua laticauda, Gr.) Faun. Abyss. Wirbelth. t. 36. 2. ex Abyssinia. Nigerrima; dorso, alis, crissusque flavido varia; pilos, cervico, fasciaque pectorali coccineis; cauda longissima, cuneata.
Faem. minor; ex toto flavido nigroque varia; subtus flavo-ochracea; cauda longa, nigricante.
3. EMBERIZA PANAYENSIS! Gm. (signata, Scopoli. - Fringilla auricollis, Licht. - Vidua *rubritorques*, Sw. - V. panayensis, Auct. - V. ardens, Gr. ex Bodd. - V. lenocinaria, Less. - Coliuspasser rubritorques, Rüpp.) Pl. ent. 647. - Sonn. Voy. t. 75. ex Afr. m. et or. Nigra; semitorque pectorali rubro-aurantiacus; cauda subrecurva.
Faem. fusco flavoque varia; subtus cum superciliis flavis; cauda brevi.
Quid Vidua panayensis, Licht. Mus. Ber. ex Collect Ray v. Breukelerw. Major: nigerrima; semitorque ruberrimo [nec aurantiaco]: rostro validissimo, albido nisi artefacta avis?
4. VIDUA *concolor*, Cassin. Proc. Acad. Philad. 1848.
p. 66. et Journ. 1849. 1. p. 241. tab. 30. 1. ex Afr. or. m.
Port Natal. Ex toto nigra,

5. COLIUSPASSE *flaviscapulatus*, Rüpp. (macrurus;
Rüpp. nec Gm. - Fringilla macrocerca, Licht. - Vidua
macrocerca, Gr.) Brown, Ill. t. 11. ex Abyssinia.
Nigerrima; humeris flavo-citrinis; pectoris medio fasciculo
plumorum albarum ad basim.
Fam. et jun. Similes Dolichonici oryzivorae: rufo, fla-
vido, nigroque variis; subtus sordido flavi; margine alarum
flavo; cauda brevi, rectricibus fuscis, pallido-marginatis.

*956. **Steganura**, Reichenb. 1850. (Vidua, p. Gr.) Africa. 2.

1. **EMBERIZA paradisea**, L. (Fringilla paradisea, Licht.
Vidua paradisea, Cuv.) Pl. enl. 194. - Vieill. Ois.
Chant. t. 37. 38. ex Afr. occ. Nigra; cervico late,
abdomineque flavo-cinnamomeis; pectore ferrugineo-castaneo;
rectricibus brevibus; lateralibus albo-limbatis.
*2. **VIDUA sphænura**, Verreaux, Mus. Paris. (Steganura
verreauxi, Bp.) ex Afr. or. Abyssin. Similis praeces-
tenti; sed major; tectricibus caudae valde longioribus, api-
ce acuminatis.

957. **Vidua**, Cuv. p. (Videstrelida! Laf. 1850.) Africa. 3.

a. *Tetraenura*, Reichenb.

1. **EMBERIZA regia**, L. (Vidua regia, Cuv. - Fringilla regia,
Licht.) Pl. enl. 8. 1. - Vieill. Ois. Chant. t. 34. 35.
ex Afr. occ. Senegal. Albo-rufescens: pileo, dorso,
alii, cauda, uropygio, crissoque nigris; tectricibus caudae
inferioribus aliis; rectricum mediarum rostridibus mirifice
elongatis, apice tantum dilatato plumosis.

2. **VIDUA superciliosa**, Vieill. Gal. Ois. t. 61. Mus.
Wils. Philad. ex Afr. m. Rarissima. Nigra; subtus
et in superciliis, fascia mediana, apice tectricum alarum,
rectricumque basi, alba; collare pectorale nigro; rectricibus
duabus mediis longissimis, angustis.

b. *Vidua*, Reichenb.

3. **EMBERIZA VIDUA**, serena et **principalis**, L. (Vidua prin-
cipalis, Cuv. - V. erythrocyncha, Sic.) Pl. enl. 8. 2.
Edw B. t. 270. - Vieill. Ois. Chant. t. 36. - B. of west.
Afr. t. 12. ex Afr. occ. Minor: nigra; subtus cum cer-
vico et tectricibus alarum superioribus late albis: rectricibus
lateralibus dimidiata aliis; rostro parvo, rubro.

- * 953. **Hypocheira**, B.p. (Amadina et Estrelida, p. Gr. - Loxigilla!
p. Less. - Vidua, p. Cabanis.) Africa. 3.
1. **FRINGILLA nitens** ex Afr. Gm. - Amadina nitens, Sw.
Loxigilla nitens, Less.) Pl. enl. 291. t. mas. 2. faem. ex
Afr. or. et occ. Senegal. Dongola.
Mas coracino-virens; rostro pedibusque rubellis.
Faem. cinnamomeo nigroque varia; subtus albida.
 2. **FRINGILLA ultramarina**, Gm. (funerea? Tarragona 1847.
Tiaris funerea, Gr. - Loxigilla melas, Verr.) Edw. B. t.
362. t. - Vieill. Ois. Chant. t. 21. ex Afr. occ. et or.
Senegal. Abyssin. Cap. Bon. Spei. Coracino-
cyanea, remigibus, rectricibusque fuscis margine pallidio-
ribus; rostro pedibusque rubellis.
 3. **LOXIA musica**, Vieill. (Estrelida musica, Gr.) Ois.
Chant. t. 11. Mus. Paris. ex Afr. occ. Senegal.
Cinerea; subtus alba, pectore striato.

SUBFAM. 132. ESTRELDINAE.

959. **Spermospiza**, Gr. 1840. (Spermophaga, Sw. 1837.) Africa occ. 1.
- LOXIA haematina** et guttata, Vieill. (Spermophaga
cyanorhyncha, Sw. - Spermospiza haematina, Gr.) Ois.
Chant. t. 67. 68. - Jard. et Selb. Ill. Orn. n. s. t. 11.
ex Afr. occ. Nigerrima; jugulo, pectore, lateribusque
rubris; rostro cyaneo-margariaceo!
960. **Pyrenestes**, Sw. Africa. 1.
- LOXIA ostrina**, Vieill. (Pyrenestes sanguinea, Sw. - P.
ostrina, Gr. - P. coccineus, Cassin. 1847.) Ois. Chant.
t. 8. - Journ. Acad. Philad. 1840. 1. p. 242. tab. 31. 2.
ex Afr. or. Minor: niger; capite, pectore, lateribus,
uropygoque coccineis.

- * 961. **Coryphegnathus**, Reichenb. 1850. (Pyrenestes, p. Gr.) Africa. 3.
1. **PYRRHULA albifrons**, Vig. 1830. (Pyrenestes frontalis,
Sw. - P. albifrons, Gr.) Smith, Ill. S. Afr. Zool. t. 61.
adult. 62. a. jun. hyem. b. juv. ex Afr. m. Fusco-brun-
neus, capite colloque violaceo dilutioribus (minus obscuris);
fronte et speculo alarum albis.
Faem. fronte concolor: plumis omnibus pallido-marginatis.

*2. PYRENESTES **capitalba**, Bp. Mus. Luggd. ex Afr. &c.

Ashantea. Valde similis praecedenti; sed minor, (Long. 6 poll.); fronte et vertice omnino albis; genis, colloque undique rufis.

*32. PYRENESTES **schieffii**, Bp. Mus. Senk. Francof. ex Afr.

Faem. valde rufescens; subtus alilda, fuscoc-maculata; fronte concolore; tectricibus alarum minoribus albidis nec nigris! rostro flavo-margaritaceo.

962. **Munia**, Hodgs. (Spermestes, p. Sw. - Dermophrys, Hodgs.

Amadina, p. Gr.)

As. Afr. Oc. 12.

a. **Padda**, Reichenb. Rostrum validum; cauda rotundata.

1. **LOXIA oryzivora**, L. (Amadina oryzivora, Sw. - Loxia

javensis, Sparrm.) Pl. enl. 152. i. - Edw. B. t. 41. 42.
Vieill. Ois. Chant. t. 61. - Mus. Carls. t. 89. - Sw.
Zool. Ill. n. s. t. 156. mas. ad. 2. var. nec faem. ex Ma-
latiasia. Cinereo-holosericea; pileo, gula, uropygio, cau-
daque nigris; abdomine vinaceo; genis, crissoque albis.

2. **LOXIA fuscata**, Vieill. (Amadina fuscata, Gr.) Ois.

Chant. t. 62. ex Java, Borneo, Ins. Maluccis.
Rufo-brunneus; genis, abdomineque albis.

Quid Loxia cana, Gm. (Amadina cana, Gr.) ex Edw. B. t. 179. 1?

b. **Maja**, Reichenb.

3. **LOXIA maja**, L. (leucocephala, Raffles. - Maja sinensis,

Br. - Munia maja, Hodgs. - Amadina maja, Gr.) Pl.
enl. 109. i. - Edw. B. t. 306. i. - Vieill. Ois. Ch. t. 56.
ex As. or. m. Sumatra. Fusco-castanea; capite, col-
lo, pectoreque albis; abdomine crissoque nigris.

Faem. abdomine cinnamomeo; criso castaneo.

4. **LOXIA ferruginea**, Sparrm. nec Lath. (Fringilla maja-

noides, Temm. - Amadina ferruginea, Gr.) Mus. Carls.
t. 90. 91. - Pl. col. 500. 3. ex Java. Rufa; pileo, ge-
nis, cervicoque albis; gula, pectore, abdomine medio, crissos-
que nigris.

Faem. griseo-rufa; pileo concolor; subtus albo-cinnamomea, gula
pectoreque rufescens.

5. **LOXIA malacea**, L. (ferruginea et indica? Lath. jun. atricapilla, Vieill. - Coccothraustes javanensis et sinensis, Briss. - Fringilla malacea, Auct. - braccata et atricapilla, Licht. - Amadina javensis, Blyth. nec Auct. A. malacea, Sw. - A. malacea et sinensis, Gr. - Munia malacea, rubro-nigra et ferruginea, Blyth. - Lonchura melanocephala, McClell. 1839. - Spermestes macronyx, Schiff. Mus. Senk.) Pl. enl. 139. 3. - Edw. B. t. 43. et 355. 2. - Vieill. Ois. Chant. t. 52. et 53. ex Asia m. et or. Malaisia. Adult. rufo-testacea; capite, collo, pectoreque nigris. Jun. rufo-castanea, subtus alba; capite, collo, pectore, abdomine medio, tectricibus caudae inferioribus nigris.

Quid Loxia indica, Gm. (Amadina indica, Gr.) Edw. B. t. 272. 1. nisi Spermophilus?

6. **FRINGILLA minutula**, Meyen. (Amadina minuta, Gr.) Nov. Act. Nat. Curios. Bonn. xvi. Suppl. t. 12. 2. ex Ins. Philippin. Minor: rufo-testacea; gula pectoreque nigris; abdomine allo-rufescente.

7. **LOXIA quinticolor**, Vieill. (Amadina quinticolor, Gr. Fringilla maja, Mus. Paris. nec L.) Ois. Chant. t. 54. ex Timor. Purpureo-rufa, pileo gulaque obscurioribus: subtus alba, pectore immaculata: tectricibus caudae superiores aurantio-rufis; inferioribus nigris.

Quid Fringilla (nec Lozia) maja, L. (Loxia cubensis! Daud.) Pl. enl. 109. 2. (minima Maja, Hernández, quae mexicana!) Purpurascens; subtus alba, fascia pectorali saturatiore?

8. **LOXIA punctularia**, L. (Coccothraustes javensis naevia, Briss. - Fringilla nisoria, Temm. - Lonchura nisoria, Sykes. - Amadina punctularia, Sw.) Pl. enl. 139. 1. Edw. B. t. 40. - Vieill. Ois. Ch. t. 50. - Pl. col. 500. 2. ex Peninsula Malacea, Malaisia, Timor. Rufo-brunnea; gula intense sericeo-castanea: subtus alba, pectore et lateribus brunneo-undulatis: cauda cinereo-cinamomea.

Hybrida cum M. malacea! (Loxia undulata? Leth. - Munia lineiventer? Hodgson. - M. undulata? Blyth. - Amadina undulata? Gr.) Mus. Paris. Cinereo-brunnea: subtus alba, gula fusco-castanea; pectore, lateribusque fusco-undulatis: cauda nigra, saepe rubro-indsta. (buncta?) lineata? amoenata?

9. LOXIA **molucca**, L. (variegata, Vieill. - Coccothraustes moluccensis, Briss. - Munia acuticauda, Hodgs. - M. molucca, Blyth. - Amadina molucca et variegata, Gr.) *Pl. enl.* 139. 2. - *Ois. Ch. t. 51. ex A. s. c e n t r. o r. m. Molucca. Flavo-fusca; capite, jugulo, alijs, caudaque nigri-cantibus; uropygio, corporeo subtus albis, nigro-undulatis.*
10. LOXIA **striata**, L. (Fringilla leuconota, Temm. - Lonchura leuconota, Sykes. - Munia striata adult. et melanictera jun. Blyth. *Cat.* 628. et 629. - Amadina striata, Gr. - A. leucogastra, Blyth. jun.) *Pl. enl.* 153. 1. - *Pl. col.* 500. 1. *ex Ceylon. Cinereo-nigricans; dorso albido-striolato; tergoris macula alba: pectore, crisoque nigerrimis: abdomen, lateribusque albis. Jun. dorso unicolor.*
11. LOXIA **malabarica**, L. (bicolor, Tickel, nec Lath. Longura sheet, Sykes. - Amadina malabarica, Gr. Munia malabarica, Blyth.) *Jard. et Selb. Ill. Orn. n. s. t. 34. ex A. s. m. Ceylon. Cinerea; gula crisoque alabis: remigibus rectricibusque nigris.*
12. PLOCÆUS **fringilloides**, Lafresn. (Amadina pectoralis? Blyth. - Amadina fringilloides, Gr.) *Mag. Zool.* 1835. t. 48. *ex India m. Rufofusca obsolete albostriolata: subtus alba: capite, jugulo, fusca pectorali interrupta, uropygio, caudaque nigris: rostro ploceino!*
Quid Fringilla melanoleuca, Gm. - Pl. enl. 224. 2?

963. DONACOLA, Gould. (Weebongia, Less. - Amadina, p. Gr.) Ocean.

3:

1. AMADINA **castaneothorax**, Gould. (Weebongia albiventer, Less. - Donacula castaneothorax, Gould.) *Austr. III. t. 94. ex Australiæ or. Cinereo-cinnamomea; pilo cervicoque caescentibus: genis, gula, fascia pectorali, crisoque nigris: pectore cinnamomeo: abdomine albo: cauda flavo-cinerea.*
2. AMADINA **pectoralis**, Gould, 1840. (Bonacola pectoralis, Gould, 1846.) *Austr. III. t. 95. ex Austr. s. occ. Griseo-brunnea, alarum tectricibus apice albis: genis gula que nigro-purpurascenscentibus: pectore lateribusque, albis plurimæ basi nigra: abdomine cinereo-vinaceo.*
3. **D. flaviprymnæ**, Gould. (Amadina flaviprymna, Gr.) *Austr. III. t. 96. ex Austr. Griseo-castanea, capite dilutiore; subtus cinnamomea: tectricibus caudæ superioribus flavis, inferioribus nigris.*

* 904. **Spermestes**, Bp. ex Sw. (Amadina, p. Gr.) Africa.

4.

1. **S. cucullata**, Sw. (Loxia prasipteron, Less. - Fringilla aeneocephala, Aliq. - Amadina cucullata, Gr.) *B. of west. Afr. p. 201. ex Gambiæ. Minor: fuscocinerea; subtus alba: capite postoreque nigris: tectricibus caudæ infra supraque albo nigroque striatis: humeris, lateribusque viridi-cupreis.*

2. **AMADINA poensis**, Fraser. (Spermestes poensis, Bp.) *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 145. - Zool. typ. figura. - Mus. Paris. ex Ins. Fernando P. o. Nigro-nitens: abdomine et tectricibus inferioribus alarum alarum caudæque albis; remigibus, torso, lateribusque albo-fascioliatis.*

3. **AMADINA bicolor**, Fraser, *Pr. Zool. Soc. 1842. p. 145. Zool. typ. figura. Nigra: abdomine, tectricibus inferioribus alarum et caudæ albis.*

Jun. fuscæ; fronte, gents, gulaque nigricantibus: uropygio lateribusque albo-fascioliatis.

4. **PYRRHULA nana**, Pucheran. (Spermestes nana, Bp. Mus. Paris.) *Mag. Zool. 1845. Ois. t. 3. ex Madagascar. Minima: cinereo-fusca; subtus sordide albo-rufescens: gula, caudaque nigra.*

965. **Amadina**, S. w. p. (Sporothlastes, p. Caban. 1845.) Africa.

3.

1. **LOXIA fasciata**, Gm. (jugularis, Shaw. - Fringilla de-truncata, Lichet. - Amadina fasciata, Sw.) *Brown. Ill. Zool. t. 27. - Vieill. Ois. Ch. t. 58. - Sw. B. of west. Afr. t. 15. ex Afr. occ. et or. Senegal, Dongola, Kordofan. Media: fusca, rufo-undata et ocellata; subtus rufa, ocellis albidis nigro-marginatis: mento albidus; fascia gulari sanguinea.*

2. **LOXIA erythrocephala**, L. (brasiliiana! Gm. - maculosa, Burchell. - Cardinalis angolensis, Briss. - Amadina erythrocephala, Smith.) *Pl. ent. 309. t. - Edw. B. t. 180. t. - Vieill. Ois. Ch. t. 49. - Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 69. a. mas. b. faem. ex Afr. m. Major: rufo-cinerea: subtus albida, lateribus rufoscentibus, nigro-undulata: pileo, genis, gulaque rubris: rectricibus lateralibus, scapularibusque apice albis.*

Faem, capite ex toto cinereus.

3. **LOXIA cantans**, Gm. (Amadina cantans, Gr.) *Brown, Ill. Zool. t. 27. 2. - Vieill. Ois. Ch. t. 57. ex Nubia. Minor: cinnamomeo-cinerea; píleo obsolete striato: subtus albo-isabellina; rectricibus mediis longioribus, acutis, nigri-cantibus.*

*966. **Otygospliza**, Sundevall. (Amadina et Estrelda, p. Gr.) Africa.

1.

FRINGILLA POLYZONA, Temm. (molucca ! Mus. Berol., - atricollis, Vieill. - Amadina polyzona, Sw. - Am. polyzona et Estrelda atricollis, Gr.) Pl. col. 221, 3. ex Abyssin. Minor: fusco-cinerea; mento et annulo oculari albis: gula plumbeo-nigra; pectore rufescente; jugulo, lateribusque lunulis fasciis et albis: cauda brevi, angusta, rectricibus apice albis.

*967. **Sporothlastes**, Bp. ex Caban. (Amadina, p. Gr.) Australia.

6.

1. **LOXIA GUTTATA**, Vieill. nec Shaw. (Amadina **castanotis**,

Gould. 1830.) Ois. Ch. t. 3. - Austr. III. t. 87. ex Austr. centr. Fusco-cinerea; subtus albida; genis, lateribusque albo-guttatis, castaneis: fascia pectorali nigra: gula juguloque albo nigroque lunulatis: rectricibus caudae superioribus nigris, albo-maculatis.

Faem. pectore, lateribusque concoloribus.

2. **LOXIA GUTTATA**, Shaw, nec Vieill. (Fringilla leucocephala var? Lath. - Fr. leucocephala, Vieill. - lathami, Vig. et Horsf. - Amadina guttata, Gr. - Am. lathami, Gould.) Lewin, B. New-Holl. t. 9 - Lath. Gen. Hist. I. t. 89. Lev. Mus. figura. - Vieill. Ois. Ch. t. 26. - Austr. III. t. 86. ex Austr. mer. Fusco-cinerea; capite subcanescente; uropygio coccineo; subtus alba; pectore, lateribus albo-guttatis, et cauda nigra.

Faem. pectore, lateribusque cinereis.

3. **FRINGILLA OCULEA**, Quoy et Gaim. (Estrelda oculata, Gould.) Voy. Astrol. Ois. t. 18, 2. - Gould, Austr. III. t. 79. ex Austr. occ. Olivacea, nigro-vermiculata: loris et annulo oculari nigris: macula postoculari, uropygioque coccinea: gula pectoraque cinereis nigro-undulatis: abdomine nigro albo-maculato.

4. **LOXIA NITIDA**, Lath. (Estrelda bella, Gould. - Amadina bella, Auct.) Vieill. Ois. Ch. t. 55. et 60. - Griff. Anim. Kingd. II. cum fig. - Austr. III. t. 78. ex Austr. Cinerea; subtus alba, nigro minute undulata: capistro superne nigro holosericeo: uropygio coccineo: rectricibus apice nigris: rostro albidio.

5. **FRINGILLA TEMPORALIS**, Lath. (Fringilla quinticolor, Vieill. - Estrelda temporalis, Gould.) Lew. N.-Holl. B. t. 12. - Vieill. Ois. Ch. t. 15. nec 55. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 12, 2. - Gould, Austr. III. t. 82. ex Austr. Fusco-virens; pileo et cereice plumbeis; subtus pallide plumbata: superciliis, rectricibusque caudae superioribus rubris,

6. **AMADINA cincta**, Gould, 1837. (Poephila cincta, Gould.)

Austr. III. t. 93. ex Austr. sept. et contr. Rufocinnamomea, pileo, genis, cerviceque caeruleo-canis: loris, gula, tergo et cauda nigris: uropygio crisoque albis.

Quid Amadina calida, Gr. ex Latham?

968. **Poephila**, Gould, 1842. (Amadina, p. Gr.)

Oceania. 4.

1. **AMADINA acuticauda**, Gould. (Poephila acuticauda,

Gould.) Austr. III. t. 90. ex Austr. sept. occ. Rufocinnamomea, abdomine subroseo, pileo genisque cyano-griseis: loris, gula, fascia uropygiali, caudae nigris: tec-tricibus caudae superioribus et inferioribus albis: rostro pendibusque flavis.

2. **P. personata**, Gould, 1842. (Amadina personata, Gr.)

Austr. III. t. 91. ex Austr. s. occ. Brunneocinnamomea; facie anguste, fascia abdominali postica late, cauda-que nigris: uropygio crisoque albis: capitis lateribus, tec-tricibusque caudae superioribus et inferioribus albis.

3. **P. leucotis**, Gould, 1846. (Amadina leucotis, Gr.)

Austr. III. t. 92, ex Austr. s. or. Castaneo-cinna-momea; subtus cinnamomeo-vinacea: facie anguste, fascia abdominali interrupta late, caudaque nigris.

4. **AMADINA gouldiae**, Gould. (Poephila mirabilis, Hombr.

*et Jacq. - P. gouldiae, Gould. - Amadina gouldiae, Gr.) Austr. III. t. 88. et 89. - Voy. Pole Sud, Ois. t. 22. 2. - O. des Murs. Pl. p. fig. bona. mas et faem. ex Australiæ sept. Lacte viridis; occipite nigro-marginato; collaris; uropygioque caeruleo; gula nigerrima; pectore violaceo; abdomine flavo; criso albo.
Mas adult. sincipite genisque coccineis.
Jun. sincipite genisque nigris.*

*969. **Steganopleura**, Reichenb. (Amadina, p. Gr.)

Australia. 4.

1. **FRINGILLA bichenovii**, Vig. (Estrela bichenovii,

Gould. - Amadina bichenovii, Gr.) Jard. Ill. Orn. t. 12. 3. - Gould, Austr. III. t. 80. ex Austr. centr. Brunnea; subtus rufo-alba; genis gulaque albis nigro-cinctis; fascia frontali et abdominali nigris: uropygio albo; alis ni-gris albo vermiculato-maculatis.

2. **AMADINA annulosa**, Gould 1830. (Estrela annulosa,

Gould.) Austr. III. t. 81. ex Austr. s. Similis praecedenti; sed minus maculata, et uropygio nigro.

3. **AMADINA ruficauda**, Gould 1836. (Estrelida ruficauda; Gould.) *Austr. ill. t. 84. ex Austr. m.* *Cinereo-virens; facie rubra; genis, pectore, lateribusque virentibus maculis crebris albis; abdomen albo-flavicans; cauda nigricans rubro-induta.*
4. **AMADINA modesta**, Gould 1836. (Estrelida modesta, Gould.) *Austr. ill. t. 85. ex Austr. or. m.* *Brunneocinerea, maculis alarum et uropygii albis: sincipite obscuro purpurascens: subtus albo-brunneofasciata: mento, toris, caudae valde cuneata nigris; abdome, crissos, rectricibus que extimis apice albis.*

970. **Erythrura**, Sw. 1837. (Erythrina, Blyth nec Brehm. - Amadina et Estrelida, p. Gr.)

Oceania. 5.

- *1. **Er. pucheranii**, Bp. Mus. Paris. ex Ins. Ocean. *Glauco-cyanæa; pileo, genis, tectricibusque caudæ superioribus sanguineis: rostro crasso, curvo, comppresso, nigro.*
2. **FRINGILLA psittacea**, Gm. (Acalanthe - Fringilla pulchella, Forst. - Estrelida psittacea, Gr.) *Vieill Ois. Chant. t. 32. Mus. Paris. ex Nova Caledonia.* *Viridis; facie, gula, uropygio, caudaque cuneiformi coccineis.*
3. **FRINGILLA tricolor**, Vieill. (sylvestris, Temm. - Amadina prasina, p. Gray!) *Ois. Chant. t. 20. ex Timor. Laete viridis; fronte, genis, subtusque ex toto, cyaneis; cauda parum elongata rubra; rostro brevi, recto.*
*Faem. viridis, subtus ochracea; fronte cyano-nigricante.
4. **FRINGILLA trichroa**, Kittl. (Estrelida trichura! Gr. Amadina prasina var. *Mus. Magunt.* - Erythrura kittlitzii, Bp. in litt.) *Mem. Acad. Petersb. 1835. II. p. 8. t. 10.* ex Ins. Carolina. *Laete viridis, facio tantum intense cyanea; rectricibus mediis caerulescentibus, lateribus exteris cum tectricibus caudæ superioribus ruhirs: cauda parum elongata.*
*Faem. viridis fronte vix caeruleo-rosea; genis, gula, pectore, abdome crisoque rufo-cinnamomeis.
5. **LOXIA prasina**, Sparrm. nec Lath. (Emberiza quadricolor et cyanopis? Gm. - Fringilla sphenura, Temm. Erythrura viridis, Sw. - Er. prasina, Blyth. - Lonchura quadricolor, Sykes. - Amadina prasina, Gr.) *Mus. Carls. t. 72. 73. - Pl. entl. 101. 2. - Pl. col. 96. - Ois. Chant. t. 20. ex Malaasia, Java. Viridis; fronte gula quo dilute cyaneis: abdome, caudaque valde elongata rubris.*
Faem. viridis; subtus rufo-ochracea, pectore vix caeruleo-rosea; cauda breviora.

971. **Neochmia**, Hombron. (Estrelada, p. Gr.) Affinis Estreldae. Oceania. 1.

FRINGILLA phaeoton, Hombr. et Jacq. (Estrelada phaeton,

Gould. - Neochmia phaeton, Hombr. et Jacquinot.)

Voy. Pole Sud. t. 22. 3. - Gould, Austr. III. t. 83.

ex Afr. s. Sanguineo-lateritia, genis, gula, uropygio-que magis rubris: píleo fusco-caeruleo: lateribus albo-punctatis: abdomine medio crisoque nigris.

972. **Estrelada**, Sw. 1827. (Loxigilla, Less. - Habropyga, Caban.

1847. - Astrilda, Reich. 1850.)

As. Afr. Oc. 20.

a. **Granatinae. Africanae.**

1. **FRINGILLA granatina**, L. (Estrelada granatina, Gr.) Pl.

enl. 109. 3. - Edw. B. t. 191. - Vieill. Ois. Chant. t.

17. 18. ex Afr. m. Castanea; genis violaceo-lilacinis; uropygio cyaneo-violaceo: gula, caudaque valde cuneata nigritib-

cantibus.

Quid Fringilla bicolor, Vieill. (Azur rouge - Estrelada bicolor, Gr.)

Ois. Ch. t. 19. ex Afr. occ. abdomine rubro, nisi fictitia avis?

2. **FRINGILLA BENGALUS!** L. (Estrelada **phaenicotis**, Sw.

E. benghalia, Gr.) Pl. enl. 115. l. - Vieill. Ois. Chant.

t. 5. - Sw. B. of west. Afr. II. t. 14. - Kittl. Kupf. Vög.

t. 3. ex Afr. occ. et or. Cordofan. Ruso-grisea; superciliis, genis, gula, pectore, lateribus, uropygio, caudaque valde cuneata, caeruleis: macula magna utrinque auriculare coccinea.

Jun. pallide cinerea: pectore caudaque vix caerulecentibus; macula auriculari nulla.

3. **FRINGILLA angolensis**, L. (Estrelada benghalia, p. Gr.

E. angolensis, Bp.) Edw. B. t. 131. ex Afr. m. Similis praecedenti; sed macula auriculari nulla.

b. **Estrelada e. Undulatae. Cauda longa, gradata. Africanae.**

4. **LOXIA astrild**, L. (Fringilla undulata, Pall. - tricolor,

Vieill? - Senegallus striatus, Briss. - Estrelada astrild,

Sw.) Pl. enl. 157. 2. - Edw. B. t. 354. 2. et 179. 2.

Vieill. Ois. Chant. t. 12. - Kittl. Kupf. Vög. t. 10. 2.

ex Afr. m. Ins. Mauritius. Cinereo-vinacea, fusco-virenti undulata, píleo immaculato; stria oculari coccinea; abdomine medio rubro: criso, caudaque nigris: rostro rubello (jun. nigro!)

Quid Loxia astrild var. β (leucopygia) et var. γ (melanura) Gm.

Pl. enl. 230. 2. et 3. - Ercouen, Ill. t. 29. 1. et 2. (leucura)?

5. FRINGILLA **troglydotes**, Licht. (rubiventris? Vieill.)
Ois. Chant. t. 13. ex Sennaar. Vix a praecedente distincta; minor!
- * 6. **E. rhodoptera**, Sundev. Mus. Holm. ex Sennaar.
Affinis E. astrild: minor, et tectricibus claram rubro-marginalis;
7. FRINGILLA **erythroneota**, Vieill. (Estrela lipiniana, Smith. - E. erythroneota, Gr.) *Ois. Chant. t. 14. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 90. 1. ex Africa m. r. Rufocinerea, undulis nigricantibus, in scapularibus latioribus: remigibus immaculatis: genis, canaque elongata nigris: tergo, uropagio, abdomenque coccineis: rostro compresso, pedibusque nigris.*
8. FRINGILLA **cinernea**, Vieill. (Estrela cinerea, Hartl.)
Ois. Chant. t. 6. - Kittl. Kupf. Vög. t. 10. 2. ex Cordofan. Rufocinerea, subtus albo-violacea, minutissime et obsoleti fuscovermiculata: stria oculari coccinea: abdomine medio rubello; cauda cunctata, nigra; rectrice extima externo dimidiata alba.
*e. Amandava e. Punctulatae. Cauda longa, gradata.
 † Asiatica. Albo-maculatae (maculis albis majoribus)*
9. FRINGILLA **amandava**, L. (senegal! p, Vieill. - mystacea? Vieill. jun. - Estrela amandava et mystacea? Gr.) *Pl. enl. 115. 3. mas 2. var. melanina. - Edw. B. t. 355. 1. - Vieill. Ois. Chant. t. 1. 2. ex As. m. India. Rubra; dorso, abdomenque sordidioribus; alis fuscis, lateribusque albo-maculatis: cauda nigricante; rectricibus apice albis: rostro pedibusque pallidis.*
10. FRINGILLA **punicea**, Horst. (Estrela amandava, Gr. p. E. punicea, Blyth.) *Linn. Trans. XIII. p. 100. ex Java. Similis praecedenti; sed valde minor, et ruberrima, maculis albis majoribus.*
Juv. capite, dorso, aliquo fuscis: abdomine aurantio: tectriculus caudae superioribus tantum ruborimis, albo-punctatis: maculis claram grandioribus.
† Africanae. Albo-punctatae (punctulis albis vix conspicuas atque evanescentibus!)
11. FRINGILLA **rubricata**, Licht. (Estrela rufa-pieta? Fraser. - E. rubricata et rufo-pectus! Gr.) *Vieill. Ois. Chant. t. 9. - Mus. Berol. et Paris. ex Africa m. Major: brunneo-plumbea; tectricibus caudae inferioribus nigricantibus: rectricibus extus basi rubentibus.*
Faem. obscurior; subtus rubella.

12. FRINGILLA *senegala*, L. (*ignita*, Gm. *punctis nullis*.
Loxia senegalla, Dand. - Estrelda *senegala*, Gr.) *Pl.*
enl. 157. 1. *ex Afr. occ. Sanguinea*; *dorsu, alis, caudaque fusco-virentibus; punctulis albis, obsoletis.*
13. FRINGILLA *minima*, Vieill. (*senegala var?* Auct. - Amadina *minima*, Rüpp. - Estrelda *minima*, Gr.) *Ois. Chant.*
t. 10. Mus. Senkenb. et Paris. ex Afr. occ. et or. Senegal, D o n g o l a. Mar rubra; dorso, alis, cauda, crisoque fuscentibus; punctulis albis supra nullis, subtus paucis, minimis, vis conspicuus.
Facm. minima; griseo-cinnamomea; loris, rectricumque marginne externo rubellis; rostro gracili, curvo, elongato.
- 14? FRINGILLA *viridis*, Vieill. (*Bengali vert.* - Estrelda *viridis*, Gr.) *Ois. Chant. t. 4. ex Afr. occ. Virens; subtus albida; stria oculari rubra.*
15. FRINGILLA *caeruleascens*, Vieill. (*Estrelda caerulescens?* Sw. *lateribus albo-punctatis!*) *Vieill. Ois. Chant. t. 8. ex Afr. m. Cinereo-grisea, gula albicans: abdomine nigricans: uropygio, crissos, rectricumque marginibus externis rubris.*
Quid Estrelda incana, Sundev. Mus. Holmiens. ex Caffraria, affinis E. perreini?
16. FRINGILLA *perreini*, Vieill. (*Estrelda melanogastra*, Sw. - E. *melanogaster et perreini*, Gr.) *B. of west. Afr. t. 194. ex Afr. occ. Cyaneo-grisea; gula albicans: crissos caudae nigricantibus: loris nigris: tergo et uropygio coccineis: rostro, pedibusque nigris.*
17. FRINGILLA *melpoda*, Vieill. (*lippa, Licht.* - Estrelda *melpoda*, Hartl.) *Ois. Chant. t. 7. ex Angola. Minima: rufo-cinnamomea, pileo plumbeo: uropygio rubro: subtus alba: loris genisque, et abdomine medio flavo-aurantiis.*
- d. Neisna. Subundulatae. Cauda brevi.
18. FRINGILLA *subflava*, Vieill. (*sanguinolenta*, Temm. Amadina! *sanguinolenta et Estrelda subflava*, Gr.) *Pl. col. 221. 2. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 90. 2. 3. ex Senegal. Minima: fusco-virens; subtus rubro-aurantia: supercilios ruberrimis: gula flava: lateribus fusco-olivaceis, albo-undulatis.*
19. FRINGILLA *dufresni*, Vieill. (*melanotis*, Temm. neisna, Licht. - Estrelda *melanotis et dufresni*, Gr.) *Pl. col. 221. 1. ex Afr. m. et occ. Olivacea; pileo, cereisque plumbeis: genis, mento, caudae nigris: dorso postico et tectricibus alarum superioribus rubris: pectore albo-caeruleante: abdome albo rufescente.*

*20. *E. quartinia*, Bp. Mus. Paris. ex *Abyssinica*.
Similis praecedenti; sed abdomine flavo.

Quid Fringilla melanogenys, Sundev. Mus. Holm. ex *Caffer*.
affinis praecedenti?

Quid Estrelda versicolor, Gr. Gen. B. p. 339. sp. 29. ex *Vieill.*
Enc. Orn. p. 991?

*973. *Habropyga*, Bp. ex Cabanis. (Spermophaga, Amadina et
Estrelda, p. Gr.)

Africa. 2.

1. *AMADINA larvata*, Rüpp. (Estrelda larvata, Bp. in litt.)

Faun. Abyss. t. 36. 1. ex Afr. or. Fusca; fronte, genis, gulaque nigris: cervice, pectore, uropygio, rectricumque marginibus purpureo-vinaceis: lateribus punctulis albis: rostro gracili, pedibusque nigricantibus.

2. *SPERMOPHAGA margaritata*, Strickl. (Amadina ver-

reauxi, Massena. - Spermospiza margaritata, Gr.) Ann.
N. Hist. XIII. 1844. t. 10. - *O. des Murs*, Pl. p. 64.
ex Afr. o c. m. Cinereo-ferruginea: superciliis, genis,
gula, pectore, uropygio, marginibusque rectricum vinaco-
rubris: abdomine nigro, maculis roseis subrotundis.

974. *Emblema*, Gould. (Fringilla, p. Gr.) Australia. 1.

E. picta, Gould 1842. (Fringilla picta, Gr.) Austr. III.

t. 97. ex *Austr. s. o c. c.* Rufo-cinerea: facie, gula, uropygio, abdomineque medio cinnabarinis: pectore, lateribus albo-maculatis, crissoque nigerrimis.

975. *Pytelia*, Sw. (Fringilla et Estrelda, p. Gr.) Africa. 4.

1. *FRINGILLA elegans*, Gm. (formosa? Lath. nec Gr. - Es-

trelda speciosa, Gr. ex Bodd. - Pytelia elegans, Sw.) Pl.
enl. 203. 1. - *Edw. B. t. 128.* jun. - *Vieill. Ois. Chant.*
t. 25. ex Afr. m. et occ. Flavo-olivacea; facie, gula,
pectoreque rubris: pileo, cervice, genisque cinereis: pectore
aurato: abdomine albo, viridi arcte undulato: cauda rubicunda.
Faem. facie concolor: capite ex toto cinere: gula albida.

2. *FRINGILLA melba*, L. (elegans, Rüpp. - Estrelda melba?

Gr.) *Edw. B. t. 272.* 2. ex *Senna ar.* Similis praecedenti;
sed gula cum facie tantum rubra; pectore magis aureo:
cauda magis rubra: abdomine laxe undulato.

3. FRINGILLA *africana*, Gm. (Chardonneret à face rouge, Vieill.)
Estrelda afra, Gr. (Brown, Ill. t. 25. 2. Mus. Paris. ex
Angola. Minor: cinereo-viridis; gents, gula, coudaque ru-
bris; remigibus primariis atris, margine externo aurantiaco.
Quid Estrelda formosa, Blyth, Cat. Calc. Mus. p. 119. sp. 638.
ex *Asia centrali* nisi
ESTRELDA *lateralis*, Verreaux, Mus. Paris. Minima;
viridi-olivacea; subtus flava, crasso flavissimo, lateribus al-
bo et olivaceo fasciatis: cauda nigricante: rostro gracili,
curvo, rubello?
4. *P. phoenicoptera*, Sw. (Estrelda erythroptera,
Less. - E. phoenicoptera, Gr.) B. of west Afr. t. 16.
ex Afr. occ. Cinerea; subtus et in lateribus albo-undu-
lata; tectricibus caudae superioribus, tectorum alarum remi-
gumque marginibus, rubris.

FAMILIA 63. FRINGILLIDAE.

SUBFAM. 133. EMBERIZINAE.

Ad Alaudidas accedunt coloribus Cynchrami et ungue postico Plectrophanis!

976. **Plectrophanes**, Meyer. (Centrophanes, Kaup. - Hortulanus, Leach. - Leptolectron! Reichenb. 1850.) Eur. As. Am. s. 5.
a. Plectrophanes.

1. EMBERIZA *nivalis*, L. (montana et mustelina, Gm. - gla-
cialis, Lath. - borealis, Degland, nec Zetterstedt! - Plec-
trophanes nivalis, Meyer. - Pl. borealis, montanus et
mustelinus, Brehm. - Hortulanus glacialis et montanus,
Leach.) Pl. enl. 497. 1. et 511. 2. - Wils. Am. Orn.
t. 23. 2. - Aud. Am. t. 365. - Gould, Eur. t. 170.
ex Boreal. utriusque continentis.

b. Centrophanes.

2. FRINGILLA *lapponica*, L. (montana, Briss. - calcarata,
Pall. - Emberiza lapponica, Nilss. - E. calcarata, Temm.
Plectrophanes calcaratus, Meyer. - Pl. lapponicus, Selby.
Centrophanes calcaratus, Kaup. - C. lapponica, Blyth.)
Pl. enl. 654. 2. jun. - Richards. Faun. Bor. Am. t. 48.
Bp. Am. Orn. t. 13. 2. 3. - Aud. Am. t. 365. - Gould,
Eur. t. 169. ex Boreal. utriusque continentis.

3. *Pl. pictus*, Rich. (Leptoplectron aestivale? Reichenb.

1850.) *Sv. Faun. Bor. Am. t. 49. - Aud. Am. t. 400. 5.*

ex Boreal. Am. s.

4. *Pl. ornatus*, Towns. - *Audub. Amer. t. 394. 1. ex*

Amer. s. occ.

5. *Pl. smithi*, Aud. Am. 2da edit. t. 487. *ex Am. s.*

contr. Illinois.

977. **Cynehramus**, Bp. (*Spinus, Moehr. - Miliaria, Br. - Spina,*

Kaup. - Emberiza, p. Gr.)

Eur. As. occ. Afr. I.

EMBERIZA miliaria, L. (*calandra!* *L. apud Gr. - Miliaria*

europea, Sw. - M. septentrionalis, germanica et pere-

grina, Brehm. - Cynchramus miliaria, Bp.) Pl. enl. 223.

Gould, Eur. t. 171. ex Eur. univ. As. occ. Afr. s.

*978. **Schaenicola**, Bp. (*Cynchramus, Kaup. nec Antig. - Hor-*

tulanus! Vieill. - Emberiza p. Gr.)

Eur. Asia.

3.

1. **EMBERIZA SCHAENICIUS**, L. (*arundinacea*, Gm. - pas-

serina, Pall. - Cynchramus schaenicius, Kaup. - C. sta-

gnatilis et septentrionalis, Brehm. - Passer torquatus seu

arundinaceus, Br.) Pl. enl. 247. 2. et 497. 2. - Gould,

t. 183. ex Eur. univ. As. s.

2. **EMBERIZA intermedia**, Michahellss. (*canneti, Brehm.*

Schaenicola intermedia, Bp.) Fig. nulla. ex Eur. m.

Dalmatia.

3. **EMBERIZA pyrrhuloides**, Pall. (*strata? Rafin. - pa-*

lustris, Savi. - caspia, Menetr.) Zoogr. Ross.-As. II.

t. 49. 1. - Roux, Orn. Prov. t. 114. bis. - Gould, Eur.

t. 182. - Bp. Faun. It. Av. t. 35. 1. mas al 2. faem. 3 jun.

nidum. ex Eur. m. Italia, Sicilia, As. occ.

979. **Emberiza**, L. (*Cia, Citrinella, Cirlus, et Orospina, Kaup.*

Ocyris? et Heterura? Hodgs.)

Eur. As. Afr. 20.

a. *Emberizae. schaenicoloides*. Rostro parvulo,

subincurvo. Eur. m.

1. **E. provincialis**, Gm. (*durazzi, Bp.) Pl. enl. 656. 1.*

Faun. It. Av. t. 36. 2. nec 1. ex Gallia m. Italia.

Macula genarum fuscocastanea.

2. *E. lesbia*, Gm. nec Temm. (durazzi, Bp. p.) Pl. enl.
656. 2. - Faun. It. Av. t. 36. 1. nec 2. ex Gallia m.
Liguria. Macula genarum dilute rufa.
- b. *Emberiza Plectrophanoides*. Rostro elongato,
recto, compresso; scapularibus remiges primarias longitudine
aequantibus! ungue postico elongato, rectincuso (minus in-
curvo) *Asia*. Habitu et moribus Alaudinisi!
3. *E. fucata*, Pall. (lesbia, Temm. nec Gm. - cia? Jerd.)
Zoogr. Ross. As. t. 46. - Gould, Eur. t. 178. minimo
Eur. - Faun. Japon. t. 57. m. adult. et pennas m. ex
Asia sept. et orient. Rufescens, nigro-varia; subtus
alba, abdomine rufescente; collari pectorali e maculis nigris:
rectricibus acutis.
- c. *Emberizae verae*. Rostro modico, recto; scapula-
ribus brevibus; ungue postico incurvo. Eur. Afr. s. As.
4. *E. pusilla*, Pall. (sordida? Hodgs. - Euspiza pusilla?
Blyth. - Ocyris oinops? Hodgs. 1845.) Zoogr. Ross.
As. t. 47. 1. - Schleg. Verh. Teyler's Haarlem 1849.
tab. 5. fig. optima. ex *Asia centr.* accident. Eur.
etiam occ. Minor: rufo-cinerea, fuscovaria; subtus alba,
pectore lateribusque fusco-striatis: gonis rufis: cauda emar-
ginata; rectricibus extimus medio longitudinaliter albis.
5. *E. cinerea*, Strickl. Proc. Zool. 1836. p. 99. ex *Asia*
occid. Smyrnæ. Cinereo-fusca, nigricante striata,
uroppigio pure cinereo; pilo flavo-vircente, nucha cinerascente;
subtus alba, pectore lateribusque cinereis: gula flava: rectri-
cibus duabus extimus dimidiato aliis.
6. *E. elegans*, Temm. Pl. col. 583. 1. mas. - Faun. Jap.
t. 55. mas adult. m. pennas mutans, et jun. Minor: rufo-fus-
co-varia; subtus albida: occipite gulaque flavis: sincipite
cristato, genis, fascia pectorali nigris: rectricibus dualus
utrinque extimus magna ex parte aliis.
7. *E. chrysophrys*, Pall. Zoogr. Ross. As. t. 48. 2.
Selys, Faun. Belg. t. 4. ex As. s. occ. Eur. accident.
Ferrugineo, cinereo, fuscoque varia: vertice nigro vitta me-
diana alba: superciliis protractis flavissimis: subtus albido;
fascia pectorali rufescente; lateribus fusco-striatis; rectri-
bus externis maxima ex parte aliis.
8. *E. sulphurata*, Temm. et Schleg. Faun. Jap. t. 60.
ex *Japonia*. Minima: ex flavescente virens, dorso rufo-
induto, nigro-flammulato: subtus sulphurea, jugulo, lateri-
busque fusco-maculatis: rectricibus alarum nigris, apice al-
bis: cauda emarginata, rectricibus tribus lateralibus allo-
notatis.

9. **E. albida**, Blyth, Journ. As. Soc. XVIII. p. 128. ex
Asia centr. ultra Simla!
10. **E. citrinella**, L. (flava, Br. - sylvestris et septentrio-
nalis, Brehm.) Pl. enl. 30. 1. - Gould, Eur. t. 173.
ex Eur. m. et s. Rufo, griseo, nigre varia; capite ex
toto, corpore quo subtus, flavis; uropygio fulvo; remigibus flavo-
marginatis; prima quartam aquante: rectricibus duabus ex-
timis albo notatis.
11. **E. personata**, Temm. (barbatula, Mus. Paris. ex
Tamm. jun.) Pl. col. 580. - Faun. Japon. t. 59. B.
mas et faem. adult. ex Japon. Similis E. citrinella; sed
minor, capite haud flavo, capistro late nigro.
12. **E. spodocephala**, Pall. Zoogr. t. 49. 2. ex Asia
s. e. p. t. o. r. Simillima E. personatae; sed capite omnino, col-
loque viridi-cinereis.
13. **E. melanops**, Blyth. (E. chlorocephala ex Nepal.
Hodgs.) Journ. As. Soc. XIV. p. 554. et xv. p. 39. ex
India. Similis E. hortulanus; sed abdomine flavo (nec rufo)
lateribus fuscō-striatis.
14. **E. hortulanus**, L. (chlorocephala et badensis? Gm.
tunstalli, Lath. - melbyensis, Sparrm. - pinguiscaens,
Brehm. - buchanani, Blyth. - chlorocephala? Hodgs.
Citrinella hortulana, Kaup. - Euspiza hortulana, Blyth,
Cat. 715.) Pl. enl. 247. 1. - Brown, Ill. t. 30. - Mus.
Carls. t. 21. - Gould, Eur. t. 176. ex Eur. Asia.
Rufo et nigricante varia; uropygio cinereo-olivaceo; capite,
collo supra, pectore quo griseo-virentibus; orbitis, mystacibus,
juguloque flavis; abdomine rufo; remigibus cinereo-margina-
tis; prima quartam excedente: rectricibus extimis albo-notatis.
Quid Emberiza ruficanda, Menetries?
- *15. **E. shah**, Bp. Mus. Paris. ex Persia. Major: rufo-
cinnamomea, dorso nigro-striato: subtus castaneo-cinnamo-
mea; capite juguloque cinereo-virentibus; gula flaveida: rectri-
cibus utrinque dualis extimis mucula interna oblique alba.
Faem. (an hujus speciei?) rostro robustiore! omnino cinnamo-
mea, pilos etiam nigro-striato; subtus pallidior, criso (nec
gula) flavidente.
16. **E. cirlus**, L. (sepiaria, Br. - eleothorax, Bechst.) Pl.
enl. 653. 1. 2. - Gould, Eur. t. 175. ex Eur. Afr. s.
Cinereo-olivaceo, fusco-varia; uropygio virescente: linea su-
pra et infra-oculari flava; gula nigra; pectore rufo-virescente:
abdomine flavo.

17. *E. cia*, L. (pratensis, Briss. - lotharingica, Gm. - barbata, Scopoli. - Euspiza! cia, Blyth.) *Pl. enl.* 3. 2. et t. 511. 1. - *Erm.* t. 3. 3. - *Gould*, *Eur.* t. 179. ex *Eur.* m. *Asia* a. *Cinereo-rufa*, *nigro striata*; *uropygio rufo-castaneo*; *capite colloque cinereo-plumbeis*, *vittis lateralibus nigris*; *remigibus cinereo-marginatis*; *prima quintam aequante*; *rectricibus duabus extimis macula alba notatis*.
18. *E. coides*, Temm. et Schleg. nec Brandt. (*ciopsis*, Bp.) *Faun.* *Jap.* t. 59. mas et faem. adult. ex *As.* or. *Japan.* Ab *E. cia* ex *Europ.* *vix distincta*; *alitis brevioribus*; *coloribus vegetioribus*, *magis distinctis*.
*Spec. *Mus. Paris.* ex *China* or. *Nankin*, *magis rufa*; *gula alba*!
19. *E. cia*, Pall. nec L. (*cioides*, Brandt, nec Temm. - *pityornithoides*, Aliq.) *Bullet. Acad. Pet. et Voy. Tchihatcheff*, *Cat. Anim. Vert.* p. 24. sp. 68. ex *Sibiria occid.* *Affinis E. pityorn.* *potius quam E. ciae!*
20. *E. pityornis*, Pall. (leucocephala, Gm.-Fringilla dalmatica, Gm. - sclavonica! *Degland* ex *Brisson*. - bona-partii, *Barthelemy de la Pommer.*) *Zoogr. Ross.* *As.* t. 44. - *Nov. Comm. Petrop.* xv. t. 23. 3. - *Erman, Verz. Thier.* t. 7. 2. - *Gould*, *Eur.* t. 180. ex *Eur.* or. *As.* *Rufa*, *dorsu nigro-maculato*, *uropygio rufo*: *pileo nigro*, *vertice medio longitudinaliter albo*: *remigibus rufo-marginatis*; *prima quartana aequante*; *gula rufa*; *rectricibus extimis albo-notatis*.
21. *E. rustica*, Pall. (*lesbia*, *Calvi*, nec Auct. - borealis, *Zetterstedt.*) *Zoogr. Ross.* *As.* t. 47. 2. - *Gould. Eur.* t. 177. ex *Japan.* - *Temm. et Schleg. Faun. Jap.* t. 58. mas hyem. m. nupt. temp. et jun. ex *As.* s. et or. accid. *Eur.* m. et s. *Rostro recto, longo, subulato*; *jungulo, hypochondriisque vivide rufis*; *remigum prima tertiam aequante*; *rectricibus extimis albo-notatis*.
Quid *Emberiza sinensis*, *Gmelin?*
Quid *Emberiza asiatica* et *E. chrysoptera*, *Lath.* - *Portl. Voy.* t. in p. 35?
980. *Fringillaria*, S. w. (Plectonyx! Reichenb. artefactum!) Afr. Ear. m. 7.
1. *EMERIZA caesia*, Cretzschm. (rufibarba, Hempr. - *Fringillaria caesia*, Gr.) *Rüpp. Atl.* t. 10. b. - *Erman, Verz.* t. 8. 1. 2. - *Gould*, *Eur.* t. 181. ex *Eur.* m. *Afr.* s. et or. *Rufo fuscoque varia*, *uropygio rufo-cinereo*: *pileo, cervice, pectoreque plumbeis*; *gula, abdomineque, ferrugineis*: *remigibus duabus primi omnium longissimis*: *rectricibus extimis albo-notatis*.

2. **FRINGILLA striolata**, Lich. (Emberiza striolata, Temm.)
Fringillaria striolata, Gr.) Rüpp. Atl. t. 10. fig. a.
Gould, Eur. t. 152. ex Afr. s. Eur. m. occ. Lusitania. Castaneo-cinnamomea; capite, collo, pectore quo cinnereis nigro-striolatis; superciliis albidis; remigum prima quinta breviora; rectricibus immaculatis; pedibus exilibus, carneis. (Avis fictilia gen. Plectronyx, Reichenb. constitutens pedibus robustis, nigris?)
3. **EMBERIZA septemstriata**, Rüpp. (capistrata? Licht.)
Mus. Berol. 1842. - Fringillaria rufa, Sw. - Fr. septemstriata et rufa, Gr.) Faun. Abyss. t. 30. 2. - Two Cent. p. 315. sp. 103. fig. 63. a. ex Afr. or. Rufa, dorsi plumis medio nigris; capite atro, lineis 7 albis capistrato; gula atra; abdomine cinnamomeo; remigibus, rectricibusque nigris rufo-limbatis. Longit. 6j pollic.
4. **EMBERIZA impetuans**, Smith. (Fringillaria anthoides, Sw. - Fr. impetuani et anthoides, Gr.) Report. S. Afr. Exped. p. 60. - Two Cent. p. 316. sp. 105. fig. 36. b. ex Afr. m. Alaudina! rufosconis, plumis medio fuscis: subtus albido-rufa, gula albicans.
5. **EMBERIZA tahapisi**, Smith. (Fringillaria vittata? Sw. jun. - Fr. tahapisi et vittata, Gr.) Report. Afr. Exp. p. 50. - Two Cent. p. 315. sp. 104. fig. 63. c. ex Afr. m. Brunnea, fusco-striata; subtus brunneo-cinnamomea; capite cum gula nigra, vittis septem (una centrali, tribusque utrinque lateraliibus,) albis; rectrice extima margine apiceque rufescens.
6. **PASSERINA flaviventris**, Vieill. (Emberiza capensis var. β. Gm. - xanthogaster, Steph. - Emberiza flavigaster, Rüpp. - Fringillaria capensis, Sw. - Fr. flaviventris et flavigaster, Gr.) Pl. enl. 664. 2. - Rüpp. Atl. t. 25. B. of west. Afr. t. 18. ex Afr. m. et or. Rufo-castanea; subtus flava, pectore fulvescente: pileo, cerviceque nigro-vittatis; rectricibus alarum apicibus, lateribus, crissu, rectribusque extimis trilobis apicis, albis.
7. **EMBERIZA capensis**, L. (capensis a. et γ. Gm. - Fringillaria capensis et erythroptera, Gr. - erythroptera, Temm. adult. - caffraicensis, Steph.) Pl. enl. 634. 1. adult. 158. 2?
jun. ex Afr. m. Minor: cinnamomeo-cinerea nigro-striata; subtus albo-cinerea: capitis lateribus albo nigro quo vittatis; rectricibus alarum secundariisque rufo-marginatis: rectribus unicoloribus.
Quid Emberiza quinque-vittata, Lichet. (hinceta? Forster.) Descr. Anina p. 405. - Icon. ined. 154. a?
Quid Zonotrichia africana, Smith. (Fringillaria africana, Gr.) Report. S. Afr. Exp. p. 48?

SUBFAM. 134. SPIZINAE.

981. **Euspiza**, Bp. (Passerina, p. Vieill.)

Am.s.Eur.As. 12.

a. Europaea simul et Asiatica e (Sibiriae occidentalis).

1. **EMBERIZA melanocephala**, Scopoli. (granativora, *Melanocercus*. - Fringilla crocea et Passerina melanocephala, Vieill. - Xanthornus! caucasicus, Pall. - Tanagra melanocephala, Guldens.) Ois. Chant. t. 27. - Zoogr. Ross. As.t.19.-Bory, Exped. Mor. t.6. - Gould, Eur. t. 172. ex Eur. or. Asia. Rufa; subtus flava; pilo, genisque nigris; remigum prima et secunda omnium longissimis; rectricibus immaculatis.

2. **EMBERIZA aureola**, Pall. (sibirica, Erman. - selysii, Verany. - Passerina collaris, Vieill. - Fringilla pinetorum, Lepechin.) Zoogr. Ross. Asiat. t. 50. - Kittl. Kupf. Vög. t. 22. l. - Erman, Verz. Thier. fig. 6. - Gould, Eur. t. 174. ex Eur. or. Sibiria. Rubro-castanea; subtus flava, collaris duplice castaneo; facie nigerrima; abdomine albido; humeris externe candidis; remigum prima et secunda omnium longissimis; rectrice extima macula elongata alba.

3. **EMBERIZA dolichonia**, Bp. (E. oryzivora? Schinz.) Act. Ital. Neapol. 1845. ex Eur. m. or. Ins. Ionicis, accident. Italia, Helvetia. Griseo-olivacea, plumis centro longitudinaliter nigratis; subtus flavo-velva, pectora et hypochondria nigro-striatis; testricibus alarum inferioribus albis: cauda emarginata; rectricibus acutulis, extima utrinque oblique dimidiato-alba.

b. Asiatica e non Europaea (Sibiriae orientalis).

4. **E. simillima**, Blyth. (Emberiza melanocephala ex India, Auct. - Tanagra rudis? Lath. nec Mus. Carls. faem.) Journ. As. Soc. xviii. Cat. Calc. Mus. p. 128. sp. 709. ex India. Simillima Eusp. melanocephala, sed minor.

5. **E. flavigularis**, Blyth. (Emberiza aureola ex India, Auct. - Passerina collaris, mas. jun. Mus. Par.) Journ. As. Soc. xviii. p. 129. ex Nepal, Arakan. Similis Eusp. aureolae; sed facie minime nigricante: superciliis flavis, distinctis; gula flava castaneo terminata.

6. EMBERIZA *luteola*, Lath. (icterica, Eversm. - brunneiceps, Brandt. - Loxia flavicans var. a. Lath. - Eupiza luteola, Blyth.) Sparrm. Mus. Carls. iv. t. 93? faem. Addend. Pall. Zoogr. II. t. 10. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 91. ex Asia contr. et occid. Rufoflava, dorso striato; capite juguleque brunneo-rufis; subtus flavissima rectricibus; unicoloribus, extima vix apice albicante.
7. EMBERIZA *rufilla*, Pall. Zoogr. Ross. As. t. 51. - Faun. Japon. t. 56. B. adult. ex Asia s. et or. Rufo-brunnea; abdomine flavo, lateribus griseo-olivaceis: rectrice extrema tantum albido-signata.
8. EMBERIZA *variabilis*, Temm. (hyperborea, Aliorum nec Pallas? faem.) Pl. col. 583. 2. mas adult. - Faun. Japon. t. 56. mas et faem. Rectricibus unicoloribus! Mas adult. plumbeo-cinereus! dorso nigricante maculato. Faem. ex flavicante brunnea, uropygio rufescens, abdomine albicante: maculis dorsalibus ruso-marginatis: pileo vittis dualius rufescensibus: corpori subtus fuscoguttato.
- *9. E. *pyrgita*, Bp. Mus. Paris. ex Camtschata. Fusco-brunnea, nigricante varia, uropygio castaneo-rufescente: subtus albida, pectore lateribusque fuscescentibus: remigibus fuscis: rectricibus brunneis.
- c. Americanae.
10. EMBERIZA *arctica*, Lath. (chrysops, Pall. - Fringilla arctica, Vig.) Zoogr. Ross. As. t. 48. - Beach. Voy. p. 20. - Brandt. Icon. Ross. 2. 6. ex Amer. s. Fusca, subtus albida fusco-striata: superciliis flavis; stria suboculare nigra.
11. EMBERIZA *atricapilla*, Gm. (coronata, Pall.) Lath. Syn. t. 45. ex Am. s. occ. Ins. Sandwich. Rufouscupo varia; subtus cinerea: fronte et fascia ocularia nigris; vertice flave; occipite cinereo.
12. EMBERIZA *americana* et Fringilla flavicollis, Gm. (Emb. mexicana, Lath. - Passerina nigricollis, Vieill.) Lath. Syn. t. 44. - Wils. Am. Orn. t. 3. 2. - Aud. Am. t. 384. 1. mas 2. faem. - Erman, Thiere, fig. 1. mas. 2. faem. ex Am. s. Superciliis, linea hinc inde gulari, pectore reque flavis: mento alio: macula jugulari nigra. Faem. macula jugulari destituta.

*982. Oriturus, Bp. (Fringilla, p. Brandt.) Rostrum Monti-fringillae: cauda elongata, gradata. As. or. Am. occ. 2.
*1. O. *mexicanus*, Bp. fig. nulla, Mus. Lugd. ex Mexico. Unicolor: uniformis.

*2. **FRINGILLA wrangeli**, Brandt. (*Oriturus sibiricus*, Bp. in litt.) *Fig. nulla. Mus. Lugd. ex Aes. s. maxime or. Variegatus.*

*983. **Melanodera**, Bp. (*Chlorospiza hinc Emberiza!* p. Gr.) Cam *Chlorospizis affinitatem praebet!* Amer. merid. 2.

1. **CHLOROSPIZA xanthogramma**, Gr. nec Blyth. (*Emberiza xanthogramma*, Gr. Gen. B.) *Beagle Voy. t. 33. mas. ex Terra del Fuego, Ins. Falkland. or.*

2. **EMBERIZA MELANODERA**, Quoy et Gaim. (*Chlorospiza hinc Emberizal melanodera*, Gr. - **M. typica**, Bp.) *Beagle, Voy. t. 32. mas et faem. ex Patagonia et Ins. Falkland. or.*

984. **Gubernatrix**, Less. 1837. (*Lophocoryphus*, Gr. 1840.) Amer. mer. 1.
EMBERIZA cristatella, Vieill. (*gubernatrix*, Temm. *cristata*, Sw. nec Vig.) *Gal. Ois. t. 67. - Pl. col. 63. 64. Zool. Ill. t. 148. ex Brasil.*

985. **Melophus**, Sw. 1837. (*Euspiza*, p. Gr.) As. centr. et or. 1.
FRINGILLA melanictera, Gm. nec Blyth. (*lathami*, J. Gr. *cristata*, Vig. nec Sw. - *suberistata*, Sykes. - *erythroptera*, Jardine. - *nepalensis*, Hodgs. - *Euspiza lathami*, Gr. - *Melophus erythropterus*, Sw.) *Pl. enl. 224. 1. fig. mala. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 132. (minime Gould, Cent. Hist. B.) ex Nepal, China etiam mer. Nigerrima, cristata; alis caudaque rufa.*

*986. **Lophospiza**, Bp. (*Tachyphonus et Tiaris*, p. Gr. - *Tiaris*, Reichenb.) Genus inter Paroarias et Tiares medium; *Tachyphonis* analogium, minime vero affinitatem, praebens! Amer. mer. 4.

1. **FRINGILLA cristata**, Gm. nec Tanagra. (Fr. araguira, Vieill. ex Asara 136. - *flammea*, Temm. nec Auct. - *Emberiza araguira*, Orb. - *Tachyphonus rubescens*, Sw.) *Pl. enl. 181. 1. minime Tachyphonis! - Vieill. Ois. Ch. t. 28. bis. ex Brasil. Paraguay. Major: fusco-rubens, uropygio vividiors; dorso, alis, caudaque obscurioribus: piloeristato, ruberrimo, nigro-marginali: genis fuscis: rostro superne nigricante.*

2. FRINGILLA *pileata*, Wied. (Tanagra cristatella, Spix mas jun. - Passerina ornata, Less. - Tachyphonus fringilloides, Sic. - T. cristatellus, Gr. - T. pileatus, Hartl. ex Azara 114. - Tiaris pileata, Schiff. - Emberiza rutilipilla? Sparrm.) Mus. Carls.t. 44. - Av. Br. II. t. 53. I. ex Brasil. Parag. Minor: cinereus; subtus albidus: pileo cristato, rubro, nigro-marginato; alis caudaque nigricantibus; rostra flavo.
3. TIARIS *cruenta*, Less. Rev. Zool. 1844. p. 485. ex Guayaquil. Aterrima; subtus rubra, pectore igneo, abdome lateribusque aurantiacis; crista occipitis fulgida: alis caudaque coracinis; remigibus interne albis.
4. EMBERIZA *griseo-cristata*, Orb. (Euspiza griseo-cristata, Gr. - Lophospiza griseo-cristata, Bp.) Voy. Am. m. t. 47. I. ex Am. m. Ex toto cinerea; subtus albida, pectore lateribusque cinerascentibus: capitis crista elongata; rectricibus extimis partim albis.

987. TIARIS, Sw.

Amer. mer. 1.

FRINGILLA *ornata*, Wied. (elegans, Temm. - Tiaris ornatus, Sw.) Pl. col. 208. ex Bras. Cristatus: cinereus; subtus rufescens: genis albis; pileo cristato; gula, pectore, remigibus, rectricibusque nigris.

988. PAROARIA, Bp. 1822. (Spiza! p. Gr. - Calyptrophorus!!! Caban. 1847.) Analogiam cum Cardinalibus praebet.

America mer. G.

a. PAROARIA. Rostro robusto.

1. LOXIA *cucullata*, Lath. (Fringilla dominicana cristata! Bodd. - Cardinalis dominicanus, Briss. p. - Spiza! cucullata, Gr. nec Bp.) Pl. enl. 103. - Mill. Ill. t. 2. A. Briss. Orn. III. t. 6. 4? - Brown, Ill. Zool. t. 23. Vieill. Ois. Chant. t. 70. - Passerini, Mem. special. Florentiae, 1840. cum fig. variis. ex Brasil. Parag. Plumbea; subtus cum collare alba; capite cristato, juguloque rubris.
2. LOXIA *dominicana*, L. (Coccothraustes brasiliensis, Br. - Cardinalis! dominicanus, Blyth. - Spiza! dominicana, Gr. nec Bp. - Spiza! larvata! Gr. ex Bodd.) Pl. enl. 55. 2. - Edw. B. t. 127. - Vieill. Ois. Chant. t. 69. ex Am. m. Brasil. Nigra; subtus alba; capite laevi, juguloque rubris.

3. **TANAGRA nigroaurita**, Cassin, 1849. (Tachyphonus coronatus, Schiff, Mus. Senkenb. 1847.) *Act. Acad. Philad.* iii. fig. bona. *ex Ins. S. et Thomasae. Niger-rima; subtus cum torque alba: pileo, gula, juguloque coccineis: genis nigris: rostro nigro, mandibula basi flava.*

b. Coccopsis, Reichenb. Rostro gracili.

4. **TANAGRA gularis**, L. (Nemosia gularis, Vieill.) *Pl. enl.*

155. 2. - *Desm. Tang.* t. 12. mas. 13. mas pennas mutans.
14. jun. *ex Am. m. Guiana. Nigra; subtus alba: capite cum gula rubro: jugulo nigro: rostro nigro, mandibula basi flava.*

5. **TACHYPHONUS capitatus**, Orb. et *hujus Consp.* p. 237.

sp. 11. (*Tanagra capitata*, Gr.) *Azara* 37? - *Voy. Am. m. t. 19. 2. ex Bras. Parag. Ex nigricante ardesciaca; subtus alba: capite coccineo: jugulo nigricante: rostro pedibusque rubellis.*

6. **NEMOSIA nigrigenys**, Lafr. et *hujus Consp.* p. 236.

sp. 8. *ex Columbia, Orenoco. Nigra; subtus alba: capite cum gula, jugulo, pectoraque medio longitudinaliter rubris: toris, mento, gulaque nigris: rostro gracillimo, nigro, mandibula basi flava.*

989. **Poospiza**, Caban. (*Chipiù, Azara, - Pipilo, p. Gr.*) America mer. 10.

1. **EMBERIZA nigro-rufa**, Orb. (*personata*, Temm. - *Pipilo personata*, Sic.) *Azara* 112. - *Beagle, Voy. Zool. B. t. 35. - Two Cent. p. 311. sp. 94. fig. 58. ex Bras. m. Parag. Chilli. Fusco-cinerea; subtus rufa; ritta oculari nigra supra infaque allo-marginata: aldonine medio, rectricibusque extimis apice albis.*

2. **FRINGILLA thoracica**, Ill. (*Carduelis! rufigularis*, Less.

1839. - *Pipilo rufitorques. Sw. - P. thoracica, Gr.*) *Two Cent. p. 312. sp. 96. fig. 60. - Erman, Reise, Atl. 1835. t. 4. ex Bras. Cinereo-virens; subtus alba; pectora, lateribusque rufo-castaneis: linea subeculari, speculoque alarum allis.*

3. **EMBERIZA hypochondria**, Orb. *Voy. Am. m. t. 45. 1.*

ex Bolivia. Olivaceo-plumbea; subtus albo-flavicans: genis, collarique pectorali cinereis: lateribus rufis: superciliis, rectricibusque lateralibus albis.

4. **EMBERIZA lateralis**, Natter. (*Fringilla lateralis*, Erman.
Pipilo superciliosus, Sw.) Azara 116. - *Two Cent. and
a Quart.* p. 311. sp. 95, fig. 59. ex Bras. m. Cine-
reus; subtus et in uropygio rufa: superciliis albis nigro-mar-
ginatis: abdomine medio, vitta alaris, rectricemque lateralius
apicibus, albis.
- *5. **P. cabanisi**, Bp. Azara 143? Mus. Paris. ex Parag.
Olivaceo-plumbea: subtus sordido alba: uropygio, lateribus,
crissoque fulvo-castaneis: superciliis protractis, rectriceque
extima apice albis.
6. **EMBERIZA melanoleuca**, Orb. - Azara 144. ex Bras.
mer. Parag. Bolivia. Fusco-cinerea, pilo, cervice,
capitis et colli lateribus, aliis, caudaque nigris; subtus alba,
hypochondriis griseo-rufescitibus: remigibus cinereo-mar-
ginatis: rectricibus lateralibus apice albis.
Faem. pilo concolor.
- *7. **PYRGITA! cinerea**, Cuv. Mus. Paris. ex Brasil.
Ex olivaceo rufo-cinerea, aliis caudaque concoloribus; sub-
tus ex flavido alba: rectricibus extimis apice latissimo albis.
Similis P. melanoleucae, sed rostro aliquo longioribus.
- *8. **P. hispaniolensis**, Bp. Mus. Paris. ex Ins. S. tt
Domin. Plumbea: genis, fascia pectorali, aliis, caudaque
nigris: superciliis protractis, gula, jugulo, abdomine
medio, rectricibusque interne aliis: scopularibus rufo-margi-
natis: rostro rubente.
9. **EMBERIZA torquata**, Orb. (*Poospiza torquata*, Bp.) Syn.
p. 82. sp. 26. ex Bolivia. Similis P. hispaniolensi; sed
rostro fusco, graciliore: crasso rufo: corpore subtus albo, tor-
que nigro angustiore: aliis albo- (minime rufo) variiis.
- *10. **P. olivacea**, Bp. Mus. Paris. ex Brasil? Viridi-
olivacea, capite aliquo subcinerascensibus: subtus albo-viri-
dis, gula pallidior: vitta postoculari alba: rectricibus acu-
tis: rostro robusto, subincurvo.

- *990. **Volatinia**, Reichenb. 1850. (*Tiaris*, p. Gr.) America mer. 2.
1. **TANAGRA jacarina**, L. (*Fringilla nitens* var. b. ex Am.
Gm. - *splendens*, p. Vieill. - *Passerina jacarina*, p.
Vieill. - *Emberiza jacarina*, Orb. - *Euphona jacarina*,
Licht. - *Spiza jacarina*, Aliq. - *Carduelis! obscurus*,
Cuv. faem.) Pl. enl. 224. 3. - Edw. B. t. 306. 2. ex
Brasil. Ex toto caeruleo-chalybea, unicolor.
Faem. rufo-cinerascens.

2. FRINGILLA *splendens*, Vieill. p. (Passerina jacarini, p. Vieill. - Tiaris nitens, Sw. - T. jacarina, p. Gr. - T. splendens, Schiff.) Ois. Chant. t. 33. - Mus. Senk. Franef. ex Brasil. Chalyboe-nigerrima, humeris albis: rostro validiore.
Faem. cinerascens.

991. Spiza, Bp. Ad Pitylinas saltem nisi ad Tanagridas
ipsas accedit! America. 6.

1. EMBERIZA *ciris*, L. (Fringilla mariposa, Scopoli. - Fr. ciris, Wils. - Passerina ciris, Vieill. - Chloris ludoviciana vulgo Papa dicta, Briss.) Pl. enl. 159. 1. 2. - Alb. Av. ill. t. 68. - Cat. Carol. 1. t. 44. - Edw. B. t. 130. et 273. 1. - Wils. Am. Orn. t. 6. 1. 2. - Aud. Am. t. 53. 1. 2. mas adult. 3. jun. 4. iuv. 5. faem. ex Amer. s. merid. Rubra; capite cereicegue cyaneis: dorso flavo-viridi: alis fuscо-rufis; tectricibus minoribus purpureis; majoribus, caudaeque viridis.

Faem. olivacea, subtus flava.

2. TANAGRA *cyanea*, L. (canadensis caerulea, et caerulea carolinensis, Briss. - Emberiza cyanella, Sparre. - E. caerulea, cyanea et cyanella, Gm. - Passerina cyanea, Vieill. - Spiza cyanea, Bp.) Edw. B. t. 273. 2. - Mus. Carls. t. 42. et 43. m. jun. - Catesb. Car. 1. t. 45. Wils. Am. Orn. t. 6. 5. mas. - Bp. Am. Orn. t. 11. 3. faem. Aud. Am. t. 74. ex Amer. s. merid. Glauco-cyanea, capite azureo; remigibus rectricibusque fuscis glauco-marginatis: rostro rubustiore.

Faem. flavo-rufa; subtus et in genis flavo-cinereis.

3. TANAGRA *caerulea*, Gm. nec Br. (Spiza cyanea, p. Gr. caelestis? Aliq.) Pl. enl. 203. 2. ex Brasil. Cayenna. Cyaneo-caerulea: remigibus rectricibusque fuscis caeruleo-marginatis: rostro graciliore.

* Faem. rufa; subtus caeruleo-cinerea.

4. EMBERIZA *amaena*, Say. (Fringilla amaena, Bp.) Am. Orn. t. 6. 4. mas. - Aud. Am. t. 398. 3. mas adult. 424. 1. mas jun. ex Am. s. occ. Cyanea; subtus alba, pectore rufo: alis albo-bifasciatis: rostro emarginato.

* Faem. rufa; fasciis alarum albis.

5. **S. versicolor**, Bp. 1837. (*Carduelis! luxuosus*, Less.
1839. - *Fringilla lazulina*, *Mus. Berol.* - *Tanagra iridina*, *Mus. Dresd.* nec *Hartl.* - *caelestis*, *Aliq.*) *Proc. Zool. Soc.* 1837. p. 120. sp. 12, fig. nulla. ex *Peru*.
Versicolor; *sincipite*, *nucha*, *juguloque rubris*: *uroppgio taete cyanoe*; *fronte*, *cervice*, *pectoreque violaceis*: *dorsu fuscovirantealis*, *caudaquefuscis:rostro brevi*, *turgidulo*, *subincurvo*.
* Faem. *fuscescens*, *nucha rubicante*, *uroppgio caeruleo* *escante*.

6. **PASSERINA leclancheri**, Lafr. 1840. (*Calliste leclancheri*, *Gr.* et *hujus Consp.* p. 235. sp. 27.) *Magaz. Zool.* 1841. *Ois.* t. 22. *Mus. Paris.* ex *Mexico occ.*
Caerulea; *dorsu virescente*; *pilos olivaceos*: *subtus* *flavissima*; *pectore aurantiaco*.

992. **Struthus**, Bp. ex Boie. (*Niphaca*, *Audub.* - *Fringilla et Eu-*
spiza, p. Gr.) Ad *Fringillas accedit*.

America. 3.

1. **EMBERIZA hyemalis**, L. (*nivalis*, *Wils.* - *Fringilla hys-*
malis, *L. Syst. Nat. ed. 10.* - *hudsonia*, *Forst.* - *Lo-*
xia hudsonica, *Lath.* - *Pyrhula* *hudsonia*, *Vieill.* - *Pas-*
ser nivalis, *Catesb.*) *Carol.* t. 36. - *Wils. Am. Orn.*
t. 16. 6. - *Aud. Am. t. 13.* 1. mas. 2. faem. - *Gould. Eur.*
t. 190. specia. haud Eur. ex *Amer. s.* *Plumbeo-nigri-*
cans: *abdomine*, *rectricibusque lateralibus albis*: *rostro ro-*
busto, *albido*.

2. **FRINGILLA oregonia**, *Townsend.* (*atrata*, *Brandt.* - *Fringilla rufidorsis*, *Licht.* - *cinerea*? *Vieill.* - *Stru-*
thus oregonus, *Bp.*) *Aud. Am. t. 398.* 3. mas. 4. faem.
Brandt. Icon. Ross. t. 2. 8. ex *Am. s. occ.* *Mexico*
sept. *Plumbeus* *subtus* *albo-cinereus*: *dorsu medio*, *rectri-*
cibusque alarum internis rufo-castaneis: *rectricibus nigri-*
cantibus, *extimus duabus utrinque dimidiato albis*: *rostro*
exili, *mandibula flava*.

3. **FRINGILLA surinama**, L. (*Linaria surinama?* *Fermin.*)
Hahn. Vog. Am. As. figura. ex *Am. m. or.* *Cinereus*;
abdomine albo: *alis caudaque nigricantibus*; *remigibus hinc*
inde, *rectricibus lateralibus intus*, *albis*.

993. **Calamospiza**, Bp. (*Corydalina*, *Aud.*) Amer. s. occ. 1.

FRINGILLA bicolor, *Townsend*, nec *L.* (*Calamospiza bico-*
lor, *Bp.* - *Corydalina bicolor*, *Aud.*) *Am. t. 390.* 2. 3.
Mus. Wied. New Wied. ex *Am. s. occ.* *Nigra*: *rectri-*
cibus alarum medialis, *marginalibus angustis remigium rectricum*;
que, *rectricibusque tribus extimus macula epizyli*, *albis*.

- *994. **Diuca**, Reichenb. (Euspiza, p. Gr.) America mer. 3.
1. FRINGILLA **diuca**, Molina. (Emberiza diuca, Orb. 1838. Euspiza diuca, Gr.) Kittl. Mem. Ac. Petersb. 1831. t. 11. Voy. Favor. t. 17. - Mag. Zool. 1836. t. 9. et 1837. t. 69. ex Chili, Patagonia. Major: cinereo-plumbea: gula, abdomine medio, criso rufo induito, rectricumque (mediis exceptis) apice, albis.
 - *2. **D. minor**, Bp. Mus. Paris. ex Patagonia. Similis praecedenti, sed valdo minor et subrufescens: pectoris fascia tantum cinerea: rectricibus alarum minoribus apice albido.
 3. EMBERIZA **speculifera**, Orb. Voy. Am. m. t. 46. i. ex Bolivia. Fusco-plumbea: vitta oculari, gula, abdome, speculo alarum amplio, rectricibusque lateralibus externe, albis.
995. **Phrygilus**, Caban. (Euspiza, p. Gr.) Amer. m. 9. 11.
1. FRINGILLA **fructiceti**, Kittl. (Emberiza luctuosa, Gerv.) Kupf. Vog. t. 23. 1. - Mag. Zool. 1836. t. 1. et 1834. t. 71. ex Chili, Patagonia. Plumbea, pileo dorso-que nigro-striatis: gula juguleque nigris; abdomine latissime albido: alarum fascia duplice alba.
 2. FRINGILLA **carbonaria**, Gr. (Emberiza carbonaria, Orb.) Beagle Voy. p. 94. - Orb. Voy. Am. m. t. 45. 2. ex Patagonia. Plumbeo-fuscus: rostro pedibusque flavis.
 3. FRINGILLA **alaudina**, Kittl. (Emberiza guttata, Meyen.) Fringilla erythroryncha, Less. - campestris, Bp. - Passerina guttata, Lafr. - Phrygilus guttatus, Tschudi.) Kupf. Vog. t. 23. 2. - Nov. Act. Nat. Curios. Bonn. Suppl. t. 12. 1. - Mag. Zool. 1836. t. 70. - Griff. Anim. Kingd. n. fig. ex Chili. Plumbeo-fuscus; dorso cinereo-rufescens nigro striato: abdomine latissime albo: cauda nigra, fascia mediana alba.
 4. EMBERIZA **unicolor**, Orb. (Phrygilus unicolor, Cab.) Tschudi, Faun. Per. p. 210. sp. 3. ex Peru. Similis Phr. alaudinae, sed cauda immaculata.
 5. EMBERIZA **rustica**, Licht. (Phrygilus rusticus, Cab.) Tschudi, Faun. Per. p. 210. sp. 5. ex Peru. Similis praecedenti; sed nigris caerulescens.
 6. **P. plebejus**, Tschudi, Faun. Per. p. 210. sp. 4. t. 19. 1. ex Peru. Cinereo-rufescens, fusco-striatus; subtus alborugineus, gula crissaque allis: remigibus, rectricibusque nigri: cantibus, albo-marginatis.

7. FRINGILLA *gaii*, Eydoux. (*Emberiza gayi*, var. *Orb.*

Euspiza gayi, Gr.) *Mag. Zool.* 1834. *Ois.* t. 23. ex
Chili, *Patagonia*. *Caeruleo-plumbeus*: *dorsu rufo-*
olivaceo: *pectoro, abdomineque olivaceo-flavis*: *rostro frin-*
gillaceo!

* *Faem. capite et uropygio griseis*: *dorsu virescente*: *pectore fla-*
vicante; *alis caudaque fuscis*.

8. FRINGILLA *formosa*, Gould, *Beagle Voy.* p. 93. ex
Terra del Fuego. *Similis Phr. gayi*, sed *vallo minor*
et pulchrior!9. EMBERIZA *atriceps*, Orb. *Voy. Am. m.* t. 47. 2. ex
Bolivia. *Fulvo-cinnamomeus*, *uropygio corporeque subtus*
flavis, *crisso albo*: *capite juguloque nigris*; *alii caudaque fus-*
cis; *rostro elongato subicteraceo*!906. Passerella, Sw. (*Zonotrichia*, p. Gr.)

America s. 6.

1. FRINGILLA *iliaca*, Merr. (*ferruginea*, Gm. - *rufa*, Wils.)
Emberiza pratensis? Vieill. - *Zonotrichia iliaca*, Gr.
Passerella iliaca, Sw.) *Edu. B. t.* 354. 1. - *Wils. Am.*
Orn. t. 22. 4. - *Aud. Am. t. 22. 4. ex Amer. s.* *Ros-*
tro conico: *rufo cinereogriseus*; *subtus alba*, *maculis rufo-*
brunneis; *cauda rufo-ferruginea*.2. FRINGILLA *cinerrea*, Aud. nec Gm? (*guttata*, Nutt. - *Pas-*
serella cinerea, Bp. - *P. guttata*, Gambel.) *Aud. Am.*
t. 390. 4. mas. ex Am. s. occ. California, *Rocky*
mountains. *Supercilia latis plumbaeis*.3. FRINGILLA *townsendi*, Aud. (*meruloides*, Vig. - *Zono-*
trichia townsendi, Gr. - *Passerella townsendi*, Gambel.)
Aud. Am. t. 188. mas 424. 7. faem. - Zool. Beach. Voy.
p. 19. ex California. *Brunnea*; *alii, uropygio, cris-*
soque rufescensibus; *subtus alba*, *rufo-brunneo-maculata*.4. EMBERIZA *hyperborea*, Pall. (*Passerella hyperborea*,
Bp. Mus. Lugd.) *Zoogr. Ross. As.* II. p. 35. t. 43. 2.
ex As. s. or. Terris Tschuktschicis. *Rufo-*
brunnea; *subtus alba*, *maculis latis rufo-brunneis*: *rostro*
conico, acuto.5. EMBERIZA *unalaschensis*, Penn. nec Lath. (*sandwi-*
chensis! Lath. - *Zonotrichia! unalaschensis*, Gr.) *Arct.*
Zool. II. p. 363. sp. 229. ex Unalaska, *nec Ins. Sandwich.*
Fusca, *subtus sordide albida fusco-maculata*: *temporibus atris*;
supercilia flavidis: *rostro producto*.6. EMBERIZA *rufina*, Brandt, *Orn. Ross.* t. 2. 5. e *Sitka*.
Minor: *rufo-cinerea*, *dorsu maculis rufo-brunneis*: *subtus al-*
bicans, *maculis rufo-brunneis*: *rostro producto, gracill.*

997. **Zonotrichia**, Sw.

America. 14.

a. Americanae septentrionales.

1. **FRINGILLA albicollis** et striata? *Gm.* (*pennsylvanica*, *Lath.* - *Spiza pensylvanica*, *Bp.*) *Edw. B. t. 304.* - *Wils. Am. t. 22.* 2. - *Aud. Am. t. 8.* *ex Amer. s. univ.* *Capite albo nigroque striato: loris flavis: genis pectoraque cinereis: gula abdomineque albis.*
2. **EMBERIZA leucophrys**, *Forst.* (*Zonotrichia leucophrys*, *Sw.*) *Wils. Am. Orn. t. 31.* 4. - *Aud. Am. t. 114.* *Reinh. Faun. Groenl. t. 1.* 2. *ex Am. s. bor. et media.* *Capite albo, corona verticali, lineaque transoculari nigris:* *subtus pallide cinerea, crissu ochraceo.*
3. **FRINGILLA gambeli**, *jur.* et *leucophrys*, *p. adult.* *Nutt.* (*Zonotrichia gambeli*, *Gambel.*) *Man. Orn. I. p. 556.* *2.^{da} ed. ex Am. s. occ.* *Similis praeced. sed minor.*
4. **EMBERIZA ATRICAPILLA**, *Aud.* *ne Lath. (auricapilla*, *Nuttall.* - *Zonotrichia auricapilla*, *Gambel.*) *Am. t. 394.* 3. *ex California.* *Similis Z. gambeli; sed major, et pileo nigro, vitta mediana flavo postice cinerea.*
5. **FRINGILLA mortoni**, *Aud.* (*Zonotrichia mortoni*, *Bp.*) *Am. B. 2. da edit. t. 490.* *ex N. California.* *Similis praecedentibus; sed cauda valde breviore; rostro minus robusto; ungulis longioribus minus incurvis.*
6. **FRINGILLA melodia**, *Wils.* (*fasciata?* *Gm.* - *Passerina musica?* *Vieill.* - *Zonotrichia melodia*, *Bp.* - *Zon. fasciata*, *Gambel.*) *Am. Orn. t. 16.* 4. - *Aud. Am. t. 25.* *ex Am. s. univ.* *Pile castaneo, vitta centrali albida;* *pectore lateribusque fuscō-maculatis: cauda rotundata: remigium prima breviore secunda.*
7. **FRINGILLA graminea**, *Gm.* (*Zonotrichia graminea*, *Sw.*) *Wils. Am. Orn. t. 31.* 5. - *Aud. Am. t. 94.* *ex Am. s. univers.* *Pectore lateribusque fuscō-maculatis: tektrocibus alarum minoribus badiis: rectricibus duabus extimis dimidiato albis.*
8. **FRINGILLA cinerea**, *Gm.* *nec Aud.* (*Zonotrichia cinerea*, *Gr.*) *Penn. Arct. Zool. II. p. 878.* *ex Am. s. occ.* *Cinereo-fusca, plumis ferrugineo marginatis; fascia genarum duplice grisea et altra: gula pure, juguloque albido-maculata,* *cineris.*
9. **FRINGILLA querula**, *Nutt.* (*harrisi*, *Aud.* - *Zonotrichia querula*, *Gambel.*) *Am. B. 2. da ed. t. 484.* *ex Misouri, Rocky mountains.*

10. FRINGILLA *comata*, Wied. (Zonotrichia comata, Bp.)

Voy. Am. s. figura nulla. *Cinereo-brunnea, plumis albo-rufescente marginatis: genis albo-cinereis: píleo, facie, gulaque nigris: subtus alba, plumis basi fuscoc-plumbeis; rostro flavo; cauda valde elongata, truncato-rotundata (rectricibus aequalibus, extima tantum utrinque breviore).*

b. Americanae meridionales.

11. FRINGILLA *matutina*, Licht. (Chingolo, Azara 135.

Tanagra ruficollis, Spix. - Zonotrichia matutina, Gr. Emberiza capensis var. ♂ Gm. - E. nuchalis, Temm. Passer pileatus, Gr. ex Bodd. - Pyrgita peruviana? Less. Rev. Zool. 1830. p. 45. - Euspiza peruviana, Blyth.) Pl. enl. 386. 2. - Av. Bras. t. 53. 3. - Kittl. Kupf. Vög. t. 23. 3. ex Patagonia s. Plata, Chilli. Rufocinereis, dorso nigro-maculato; subtus alba; píleo, genisque cinereis, vittis quatuor nigris: cervice, lateribusque colli et pectoris rufa, macula utrinque nigra.

12. *Z. canicapilla*, Gould, Beagle Voy. Av. p. 91. ex Patagonia m. Tierra del Fuego. *Fusca; píleo cinereo; toris et regione parotica nigricantibus; dorsi et colli lateribus rufis; dorso medio obscurè fuscus, plumis margine pallidioribus: alis albo-bifasciatis.*13. *Z. strigiceps*, Gould, Beagle Voy. Av. p. 92. ex Santa F. *Fusca, plinis medio obscurioribus: capite castaneo-linea mediana nigricante: superciliis, faciei collique lateribus, gula, pectore abdomineque medio cinereis: hypochondriis, crissoque flavescentibus: akarum flexura rufa.**14. *Z. galapagoensis*, Bp. Mus. Paris. *Rufocinerea, dorso vegetiore nigro-maculata; subtus sordide albida, pectore cinerascente, lateribus brunneis: sincipite flavido, hinc inde nigro-marginato: alis albo-bifasciatis: cauda subrotundata. Quid Lexia dominicensis, Gm. (Zonotrichia dominicensis, Gr.) Pl. enl. 341. 2. nisi faemina Tanagra in Avis? Quid Emberiza ludovicia, L. (Zonotrichia ludovicia, Gr.) Pl. enl. 153. 1. nisi faemina Viduae paradiseae, uti 153. 2. faemina Viduae superciliosae, petius quam Fringillariae capensis?*

998. CHONDESTES, Sw. (Zonotrichia, p. Gr.) Cauda elongata, valde rotundata,

America. 1.

FRINGILLA *grammaca*, Say. (Chondestes strigata, Sw.

Chond. grammaca, Bp. - Zonotrichia grammaca, Gr.) Bp. Am. Orn. t. 5. 3. - Aud. Am. t. 390. 1. ex Am. s. o. c. Capite albo nigroque vittato: cauda rotundata, rectricibus lateralis magna ex parte albis.

*999. **Chrysopoga**, Bp. Amer. s. occ. 1.

C. typica, Bp. (Zonotrichia? aureigula, Bp. in litt.) Mus.

Paris. ex California. Brunneo-oliveacea; subtus albo-cinerea; criso, femoribusque rufo-fuscescentibus: capite nigricante: vitta vertico-occipitali alba: gula aurea.

1000. **Spizella**, Bp. (Zonotrichia, p. Gr.) America s. 5.

1. **FRINGILLA canadensis**, Lath. (monticola et hyemalis?)

Gm. - arborea, Wils. - Passerina monticola, Vieill. Zonotrichia! monticola, Gr. - Spizella canadensis, Bp. Spizella monticola, (Gambel,) Pl. enl. 223. 2? - Am. Orn. t. 16. 3. - Aud. Am. t. 188. ex Amer. s. univ. Pileo rufo-castaneo; superciliis, colli lateribus, mento, pectore que pallide griseis; alas albo-bifasciatas; rostro nigro, mandibula flava.

2. **EMBERIZA pallida**, Sw. (Zonotrichia pallida; Gr. - Spizella pallida, Bp.) Faun. Bor. Am. 251. - Aud. Am. t. 398. ex Amer. s. occ. N. Mexico, California.

3. **EMBERIZA shattuckii**, Aud. (Zonotrichia shattuckii, Gr. - Spizella shattuckii, Bp.) Suppl. 2. da edit. Am. t. 493. ex Missouri s. sup. Plumbea; dorso, aliquae rufescensibus: rostro rubro-cinnamomea.

4. **FRINGILLA pusilla**, Wils. (juncorum? Nutt. - Zonotrichia pusilla, Gr. - Spizella pusilla, Bp.) Am. Orn. t. 16. 2. Aud. Am. t. 13. ex Amer. s. Pileo fusco-castaneo vitta obscuriorie; genis, superciliis, gula, pectore que brunnescentibus: rostro rubro-cinnamomeo.

5. **FRINGILLA socialis**, Wils. (Zonotrichia socialis, Gr. Spizella socialis, Bp.) Am. Orn. t. 16. 5. - Aud. Am. t. 104. ex Amer. s. Pileo castaneo, fronte nigra; mento et superciliis albidis: colli lateribus, pectore quo pallide griseis: rostro ex toto nigro.

1001. **Passerculus**, Bp. (Zonotrichia, p. Gr.) America s. 2.

1. **FRINGILLA savanna**, Wils. (Passerina savannarum?

Vieill. - Zonotrichia savanna, Gr. - Passerculus savanna, Bp.) Am. Orn. t. 34. 4. mas. et 22. 3. faem. - Aud. Am. t. 109. ex Amer. s. Superciliis et regione auriculari flavis; pectore, lateribusque nigricante maculatis; canda emarginata: remigum prima secundam aequante.

2. **FRINGILLA palustris**, Wils. (georgiana? Lath. - Zonotrichia palustris, Gr. - Passerculus palustris, Bp.) *Am.*
Orn. t. 22. 1. - Aud. Am. t. 64. ex Am. s. *Fronte nigra; pileo loddio: macula anteculari alba: colli lateribus pectoreque obscure cinereis; cauda emarginata, lateribus rotundatis: rostro fuso, mandibula caeruleo-roseata.*
1002. **Peucaea**, A u d u b. (Passerculus et Ammodromus, p. Bp.)
Zonotrichia! et Ammodromus, p. Gr.) America s. 2.
 1. **FRINGILLA lincolni**, Aud. (Passerculus lincolni, Bp.)
Zonotrichia lincolni, Gr.) Am. t. 193. ex Am. s. centr.
 2. **FRINGILLA bachmani**, Aud. (Ammodromus bachmani, Bp. Gr.) *Am. B. t. 165. 2. ex merid. Am. s.*
1003. **Coturniculus**, Bp. (Ammodromus, p. Gr.) America. 7.
 1. **FRINGILLA passerina**, Wils. (nec savannarum! Gm.
nec caudata! Lath. - Ammodromus! passerinus, Gr.
Coturniculus passerinus, Bp.) Am. Orn. t. 25. 5. - Aud.
Am. t. 130. ex Am. s. *Superciliis, humeris, tectricibus
 subalorum minoribus flavis: pectore ochraceo: rectricibus
 subacutis, extima partim alba.*
 2. **EMBERIZA bairdi**, Aud. (Coturniculus bairdi, Bp.) *Suppl.*
2. da edit. t. 500. ex Missuri sup.
 3. **FRINGILLA henslowi**, Aud. (Ammodromus henslowi, Gr.)
Coturniculus henslowi, Bp.) Am. B. t. 170. ex Am. s.
 4. **EMBERIZA lecontii**, Aud. (Ammodromus lecontii, Gr.)
Suppl. 2. da edit. t. 488. ex Missuri sup. *Affinis
 precedentibus*
 5. **C. laticrus**, Gosse, B. of Jamaica Ill. t. 60. *ex Ja-*
mica. Plumis also-marginatione.
 6. **FRINGILLA manimbe**, Licht. (Emberiza manimbe, Lafr.
Ammodromus xanthornus, Gould. - Amm. manimbe,
Gr.) Azara 141. - Beagle, Voy. Av. t. 30. ex Mal-
dono a do, Bahia. Cinereus, nigro fuscoque striolatus;
loris et alarum flexurae latere flavis: gula abdomineque albis;
pectore cinereo-fusco-striolato: remigibus secundariis rufo-
marginitis: cauda emarginata. Long. 4½-poll.
 *7. **C. peruanus**, Bp. Mus. Paris. *ex Am. m. o.c. Simi-*
lis C. manimbe, sed rostro longiore; minus variegatus: loris
et flexura alarum flavissimis.
Quid Fringilla aestivalis, Licht. Cat. Dupl. Mus. Berol. p. 254.
ex Am. s. Georgia. Simillimus precedentibus, sed
major et ab domine toto cinereo; cauda graduata?

1004. **Ammodromus**, S. w. Rostrum gracile: cauda cuneata, rectricibus acutis.

America. 5.

1. **FRINGILLA macgillivrayi**, Aud. (*Ammodromus macgillivrayi*, Bp.) *Am. t. 355.* 1. mas. 2. faem. ex *Am. s. Fuscus; subtus albidus: genis ochraceis: pectore fusco-guttulato.*
2. **A. bimaculatus**, Sw. *Ann. Phil. 1827. p. 435. sp. 48.* ex *Mexico.* *Cinerous, lineis castaneis maculisque nigris varius; subtus albo-ochraceus, macula utrinque pectorali nigra.*
3. **FRINGILLA maritima**, Wils. (*Ammodromus maritimus*, Sw.) *Am. Orn. t. 34. 2. - Aud. Am. t. 93. ex Am. s. or. Superciliis angustis et alarum margine flavis: pectore cinereo: rostro elongato.*
4. **ORIOLUS caudacutus**, Gm. (*Fringilla caudacuta*, Wils. nec Lath. - *Ammodromus caudacutus*, Sw.) *Wils. Am. Orn. t. 34. 3. - Aud. Am. t. 149. ex Amer. s. or. Cepite utrinque vitta duplice brunneo-aurantiaca: pectore cinnamonomeo albo-guttulato.*
5. **A. longicaudatus**, Gould. (*Sylvia albifrons?* Vieill. ex Azara 214.) *Beagle, Voy. t. 29. ex Monte Video, Maldonado. Cinereo-fuscus, dorso pallidire, uropygio rufescens, plumis singulis medio nigricantibus: subtus et in fronte et superciliis flavescens: rectricibus alarum majoribus, remigibus, rectricibusque nigricantibus externe albo-marginatis.*

1005. **Emberizoides**, Temm. (hinc Chlorion. - Tardivola, 1827. hinc Leptonyx, 1837. Sw. - *Coryphaispiza*, Gr. 1845.)

America mer. 4.

1. **FRINGILLA macroura**, Gm. (*Emberizoides marginalis*, Temm. - *Sphenura fringillaris*, Licht. - *Sylvia herbicola* et *Passerina sphenura*, Vieill. ex Azara 230. - *Eunomnagra macroura*, Orb.) *Pl. col. 114. 2. ex Parag. Bolivia. Major: rufa-oliveacea, plumis medio nigris; subtus albo-rufescens: humeris viridi-flavis: cauda elongata, gradata; rectricibus acuminatis.*
- *2. **E. megarhyncha**, Bp. *Mus. Paris. ex Brasil.* *Similis praecedenti; sed major, humeris concoloribus, pectore lateribusque fusco-guttulatis; rectricibus minus acutis, rotetro valde robustioribus.*

3. **E. melanotis**, Temm. (*Leptonyx melanotis, Sw.*) *Pl. col. 114.* 1. - *Two Cent. p. 314. sp. 100. fig. 62. ex Brasil. m. Minor: olivacea, rufo-varia; capite cinerascente; subtus et in superciliis albida: genis, maculaque utrinque pectorali nigris: tectricibus alarum inferioribus, remigiumque margine externo flavis: rectricibus exterioribus macula apicali interma alba.*
4. **E. poliocephala**, Gould. (*Embernagra poliocephala, Gr.*) *Beagle, Voy. p. 98. ex Am. m. Plata s. Oli-
vacea, plumis medio nigris; pileo variegato, gulaque cinereis:
subtus albo-rufescens, criso lateribusque obscurioribus:
margine alarum late flavo.*

1006. **Embernagra**, Less.

America mer. 5.

1. **EMBERIZA platenensis**, Gm. (*bonariensis, Commerson.*
Tanagra dumetorum, Mus. Paris. - *Embernagra dumetorum, Less.* - *E. platenensis, Less.*) *Azara 90.* - *Vieill. Enc. p. 922. ex Bras. m. Parag. Major: olivacea,
nigro-striata: subtus cum facie fuscocinerea.*
2. **E. olivascens**, Laf. - *Orb. Voy. Am. m. Ois. p. 285.*
*ex Boliv. affinis E. plateni: dorso subunicolore: rostro
fere ex toto flavido.*
3. **E. viridis**, Gr. ex Vieill. (*Tanagra fabialatu, Mus. Paris.*
Embernagra fabialatu, Less.) *Traité Orn. p. 465. sp. 58.*
*ex La Plata. Simillima praecedentibus: minor; cauda
obscurior; pedibus longioribus.*
4. **E. longicauda**, Strickland, *Ann. Nat. Hist. 1844.*
*p. 420. ex Am. m. Similis E. plateni, sed mandibula flava,
nec aurantiaca; superciliis albis; cauda longiore et magis cur-
vata; tarso, unguibusque brevioribus.*
5. **FRINGILLA chlorura**, Audubon? (*blandingiana, Gam-
bel.* - *Zonotrichia! chlorura, Gambel.* - *Embernagra
blandingiana, Bp.*) *Journ. Acad. Philad. 1849. tab. 9. 1.*
*Mus. Paris. ex California, Oregon. Cinereo-
virens, alis caudaque externe viridi-flavis; vertice rufo: sub-
tus albida, lateribus crisoque griseo-rufescens: genis su-
perciliis, linea gulari hinc inde, pectoreque plumbeis: gula
alba.*

*1007. **Buarremon**, Bp. (*Arremon et Embernagra, p. Gr.*) Am. m. et c. 10.

1. **EMBENAGRA torquata**, Orb. (*Arremon affinis, Laf.*
A. silens! p. Gr.) *Voy. Am. m. Ois. t. 27. 1. ex Gan-
gao. Major Arremonis silentis: rostro elongato, nigerrimo:
humeri vix flavicantibus: lateribus crisoque fusco-olivaceis.*

2. ARREMON *assimilis*, Lafr. et Boissonn. Rev. Zool. 1840. p. 67. ex Columbia. Similis praecedenti; sed torque pectorali nullo: flavo-olivaceus; pileo, cervice, pectorisque lateribus plumbeis: vitta utrinque verticali lata, genisque nigra: gula, colli lateribus, pectore abdomineque medianis, candidis; hypochondriis fusco-olivaceis; rostro nigro-rimo, gracili, conico-elongato.
3. ARREMON *pallidinucha*, Lafr. et Boissonn. Rev. Zool. 1840. p. 68. ex S.ta Fe de Bogota. Fusco-virens; subtus flavus, postice virescens; pileo cerviceque nigra, vitta mediana latissima, antica rufa, postice albida.
* Junior fusco-virens; subtus flavescens: macula verticis latissima flavo-rufa.
4. EMBERNAGRA *brunneinucha*, Lafr. (Arremon frontalis, Tschudi.) Rev. Zool. 1839. p. 97. ex Mexico, Columbia, Peru. Similis B. torquato: viridi-olivaceus; pileo castaneo rufo-marginato; fronte, loris, genisque nigra: maculis frontalibus tribus, gula, collique lateribus candidis: torque jugulari lato nigro: pectore, abdomineque medio albo, schistaceis: crasso, lateribusque olivaceointibus.
5. ARREMON *albifrenatus*, Lafr. et Boissonn. Rev. Zool. 1840. p. 68. ex Columbia. Olivaceus; remigibus, recticulisque nigrae olivaceo-marginatis; subtus flavus, lateribus, crissaque olivaceintibus.
6. ARREMON *rufinucha*, Orb. (Embernagra rufinucha, Lafr.) Voy. Am. m. Ois. t. 27. 2. ex Yungas. Nigrovirescens; subtus flavus: pileo, cerviceque rufa; genis latissime nigra.
7. EMBERNAGRA *albinucha*, Lafr. 1838. (mexicana, Less. 1839.) Rev. Zool. 1838. p. 165. ex Mexico. Fuscus, subtus flavus: pileo, genisque nigra, vitta verticali alba.
8. ARREMON *gutturalis*, Lafr. Rev. Zool. 1843. p. 98. ex Columbia. Similis praecedenti, sed major: niger; vitta mediana verticis, gula, juguloque flavissimis; subtus albidocinerous, lateribus obscurioribus: rostro conico, nigra.
9. ARREMON *schistaceus*, Lafr. et Boiss. Rev. Zool. 1840. p. 69. ex Bogota. Fusco-plumbeus, subtus dilutior: pileo cerviceque castaneis; gula alba; genis, vittaque hinc inde gulari, nigra.
10. EMBERNAGRA *pyrgitooides*, Lafr. Rev. Zool. 1839. p. 97. ex Mexico. Cinereo-rufescens, fuscus varius; capite canescens; superciliis late, castaneis, nigro-marginatis; linea infraoculari castanea, mystacalique nigra utrinque: macula anteoculari candida nigraque: subtus albidio-rufescens, gula abdomineque albicantibus: cauda valde gradata, castanea. Analogus Eusipixis!

*1008. **Pipilepsis**, B.p. (Artemon, p. Gr. - Artemon, Nemosia,
et Tachyphonus, p. Auct.)

America m. 10.

1. **ARREMON semirufus**, Lafr. et Boiss. Rev. Zool. 1840.

p. 69. ex Bogota. Olivaceus, capite cerviceque rufis;
gula, pectoreque flavo-rufis; abdomine flavo; lateribus viri-
dibus.

2. **EMBERIZA fulviceps**, Orb. (Euspiza fulviceps? Gr.) Voy.

Am. m. Ois. t. 46. 2. Mus. Paris. ex Bolivia. Vi-
ridi-olivaceus; pileo, genis, cerviceque fulvo-rufis; macula
frontali hinc inde, gula, pectore, abdominisque medio longi-
tudinaliter flavis; remigibus, rectricibusque fuscis.

3. **ARREMON personatus**, Caban. in Schomb. Guiana,

III. p. 678. sp. 58. ex Guiana. Fusco-cinerous, dorso
olivascens; subtus flavus; pileo, gula, collique lateribus rufos.

4. **TACHYPHONUS! ruficeps**, Strickl. Ann. N. Hist. 1844.

p. 419, et hujus Consp. p. 237. sp. 13. ex Brasil.
Plumbeus; pileo gulaque rufis; capistro, loris, orbitisque nigris.

5. **ARREMON flavipectus**, Lafr. (Tachyphonus! flavipec-
tus, hujus Consp. p. 237. sp. 14.) Rev. Zool. 1840. p. 227.

ex S.t.a Fe de Bogota. Viridi-olivaceus; pileo, cervi-
ceque plumbeis; gula abdomineque albis; jugulo, pectore, late-
ribus, crissoque flavis.

*6. **ARREMON canigularis**, Lafr. (Tachyphonus! canigu-
laris, hujus Consp. p. 237. sp. 16.) Rev. Zool. 1845. p. 12.

Mus. Paris. ex Columbia. Similis praecedenti; sed
minor, gula cinerea, et fascia tantum pectorali flava.

7. **ARREMON ophthalmicus**, Dubus 1847. (Tachyphonus!
albitempora, hujus Consp. p. 237. sp. 16. ex Lafr.) Rev.

Zool. 1848. p. 12. ex Columbia. Similis P. flavipec-
tori, sed pedibus valde majoribus, et macula pontoculari alba.

8. **ARREMON rubrirostris**, Lafr. (hinc Nemosia) Rev.

Zool. 1840. p. 227. ex S.t.a Fe de Bogota. Olivaceus;
capite et collo ex toto cinereis; gula, pectoreque griseis; abdo-
mine crissoque flavis; rostro tenui, compresso, rubicante; pe-
dibus luride carneis.

9. **ARREMON superciliaris**, Lafr. (hinc Nemosia. - Seto-

phaga caniceps? Licht.) Rev. Zool. 1840. p. 227. ex
S.t.a Fe de Bogota. Olivaceous; subtus omnino flaves-
cens; fronte cinerea; supercilii, lineaque verticali obsoleta,
albis; rostro gracili, subarcuato, plumbo.

10. **ARREMON atripileus**, Lafr. Rev. Zool. 1842. p. 335. ex

S.t.a Fe de Bogota. Flavo-olivaceous; subtus dilutior,
gula flavissima; pileo, genisque nigris; supercilii protractis
albis; rostro brevi tenui. Cum praecedentibus Nemosiae
affinis vix hujus Familiae!

1009. **Atmophila**, Sw. (Haemophila, Reichenb. - Embernagra,
p. Gr.) Americ. mer. 2.
1. **A. superciliosa**, Sw. (Embernagra superciliosa, Gr.) Two Cent. and a Quart. p. 314. sp. 101. fig. 63. e, f, g.
ex Mexico. Brunnea nigricante striata; subtus cinerea;
linea oculare mentoque albicolor et macula suboculari nigra;
pileo castaneo, vitta mediana rufa.
 2. **A. rufescens**, Sw. (Embernagra rufescens, Gr.) Two
Cent. and a Quart. p. 313. sp. 102. fig. 63. d. *ex Mexico.*
Rufo-fusca, immaculata; subtus albo-cinnamomea; pileo rufo
nigro-marginato: capitis lateribus et linea oculare cinereis:
mento et regione auriculari nigro-marginatis.
1010. **Junco**, Wagl. (Fringilla, p. Gr.) Mexico. 1.
- FRINGILLA **cineræa**, Sw. 1827, nec Auct. (Junco phæno-
tus, Wagl.) *Iasis* 1831. p. 526. sp. 44. Mus. Monac. ex
Mexico. Cineræus; dorso, tectricibus alarum majoribus,
remigumque secundariarum margine externo fuscocrufo: sub-
tus cinerascens, criso albo: cauda aequali, tectricibus nigri-
cantibus, extimis utrinque duabus maxima ex parte albis:
rostro fuscocarneo, mandibula, pedibusque flavidis.
1011. **Atlapetes**, Wagl. Embernagra, p. Gr.) Mexico. 1.
- A. pileatus**, Wagl. (Embernagra pileata, Gr.) *Iasis* 1831.
p. 526. Mus. Paris, ex Mexico. Minor; olivaceus; sub-
tus flava, lateribus subvirentibus: nucha, genis tectricibus-
que alarum minoribus cinereis: pileo rufo: pedibus cum un-
guibus flavidofuscescentibus: rostro spizino!
1012. **Pyrgisoma**, Pucheran. (Arremon, p. Gr. - Pyrgita, p.
Prev.) Mexico. 2.
1. **ARREMON biarcuatus**, Lafr. (Pyrgita biarcuata, Prev.
Emberiza! biarcuata, O. des Murs.) *Voy. Venus, Ois. t. 6.*
ex California, Guatemala. Rufo-brunneus; sub-
tus et in genis albidus: pileo vittaque utrinque madarí rufa,
macula terminali fronteque nigra; colli, lateribus pectoris-
que cinereis: hypochondriis, crissosque brunneo-olivaceis. Ana-
legiam cum Passere areuato Africæ merid. præbel
 - *2. **P. kieneri**, Bp. Mus. Paris. ex Am. occ. Similis
præcedenti sed valde major, rostro robustiore: genis imma-
culatis rufis: macula pectorali nigricante.

1013. **Pipilo**, Vieill.

America sept. 8.

1. **FRINGILLA erythrophthalma**, L. (Fr. carolinensis, Br. Emberiza erythrophthalma, Gm. - Pipilo ater, Vieill. P. erythrophthalmus, Bp.) *Catesb. Carol. I. t. 38. Wils. Am. Orn. t. 10. 5. mas et t. 53. 5. faem. - Aud. Am. t. 29. ex America s. Niger (Faem. rufo-brunnea); abdomine albo criso, lateribusque ladiis: cauda rotundata; rectricibus tribus extimis ex parte albis.*
2. **P. maculatus**, Sw. 1827. - *Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 31. 34. ex Mexico, California. Simillimus precedentibus; sed dorso aliquo allo-maculatus.*
3. **P. arcticus**, Sw. *Faun. Bor. Am. t. 51. 52. - Aud. Am. t. 394. 4. 5. ex borealibus Am. s.*
4. **P. rufescens**, Sw. (*FRINGILLA crissalis, Vig.*) *Philos. Mag. 1827. p. 434. Mexico.*
5. **P. fuscus**, Sw. (*FRINGILLA crissalis, Vig.*) *Philos. Mag. 1827. p. 434. ex Mexico, California. Fuscus: subtus albidus; gula fulva, fusco-maculata; criso castaneo; cauda nigricante, immaculata.*
6. **P. macronyx**, Sw. *Phil. Mag. 1827. p. 434. ex Mexico. Similis P. maculatus sed macululis alaribus, tectricibus inferioribus, rectricumque apicibus flavis: pedibus, unguibusque grandioribus.*
7. **P. rufipileus**, Lofr. *Rev. Zool. 1848. p. 176. sp. 5. ex Mexico. Cinereo-oliveaceus, alis caudaque virentibus: subtus cinereus, gula candida, abdomine medio crisoque rufescensibus: pileo rufe, fronte, genis, loris, superciliis que cincisis: unguibus elongatis.*
8. **P. torquatus**, Dubus, *Bull. Acad. Brux. et Rev. Zool. 1824. p. 240. ex Mexico m. Oliveaceus, dorso nigro maculato, uropygio rufescente, alis caudaque flavicantibus: subtus albidus, lateribus crisoque rufa: sincipite genis, et torque pectorali late, nigra: superciliis gulaque albis: occipite rufe, nigro vario: rectricibus dualibus extimis apice flavicante maculatis.*
Medius quasi inter Pipilones et Arremones!

1014. **Arremon**, Vieill.

Amer. merid. 7.

1. **TANAGRA silens**, Lath. (*Arremon torquatus, Vieill. - A. silens, p. et torquatus, Gr.*) *Plent. 742. - Gal. Ois. t. 78. Desmar. Tangar. t. 38. mas. 39. jun. 40. faem. ex Guiana. Oliveaceus; subtus albus: pileo, genis, et torque angusto, nigris; vitta mediana lata, linea superciliari, cereiceque cinereis: humeris florissimis: rostro nigro, subincurvo.*

2. *A. flavirostris*, Sw. (silens! faem. Orb.) Two Cent.
and a Quart. p. 347. ex Brasil. Similis A. silenti;
sed rostro flavo, culmine tantum nigricante: superciliis an-
tice truncatis.
- *3. *A. polionotus*, Pucheran. (silens! mas, Orb.) Mus.
Paris. ex Corrientes. Plumbeus: subtus candidus,
lateribus fuscouscentibus: pilo, genis, et torque latissimo,
nigerrimis; vitta brevi postoculari alba: humoris et tectri-
cibus alarum extornis flavo-olivaceis: rostro conico-acuto,
flavo, superius fuscus.
4. *A. aurantiirostris*, Lafr. 1847. - O. des Murs, Pl.
p. 55. ex Columbia. Olivaceus; subtus albus, lateribus
cinereo-olivaceis: capite, cervice, et torque posteriori lato, ni-
gris; superciliis albis, vitta mediana verticis cinerea:
flexura alarum aureo-flava: rostro robusto, conico, flavo-rubro.
5. *A. semitorquatus*, Sw. Two Cent. and a Quart.
p. 357. ex Brasil. Similis praecedentibus; sed superci-
liis albis protractis; mento nigro; alarum margine minimo
flavo; collari interrupto; rostro conico, maxilla nigra, man-
dibula flava.
- *6. *A. schlegeli*, Lafr. Mus. Lugd. ex Am. m. Affinis
praecedenti; sed rostro omnino flavidio, longiore, magis in-
curvo, nec conico: supercilia nullis: nucha pallide cinerea:
dorsu aliquis fusco-cinereis; tectricibus superioribus flavo-
olivaceis: flexura alarum flava.
- *7. *A. conirostris*, Bp. Mus. Paris. ex Brasil. Oli-
vaceus; pilo, cervice, superciliisque canis, vitta utrinque
cervicali lineaque transoculari nigricantibus; subtus albo-
rufescens, lateribus cinerascentibus, collari nullo: alarum fle-
xura viridi-flava: rostro robusto, conico, nigro, subtus basi
flavescens: pedibus validis, cum unguibus, pallidis.

SUBFAM. 135. PITYLINAE.

1015. *Saltator*, Vieill. 1816. (Spermagra, Sw. 1827.) America mer. 10.1. *TANAGRA atriceps*, Less. (Arremon giganteus, Bp. 1837.

Saltator atriceps, Gr.) Cent. Zool. t. 69. ex Mexico.

Maximus: flavo-olivaceus; subtus griseo-plumbeus: pilo, cer-
vice, genisque nigricantibus: gula alba, nigro-cincta: criso
rufo-cinnamomeo.

2. **S. magnoides**, Lafr. Rev. Zool. 1844, p. 41. sp. 2. ex
Mexico. Magnus: vivide olivaceus; fronte, loris, genis,
 corporeque subtus cinereis: gula alba; guttare nigro-cincto,
 crissaque rufis. Similis *S. magno*; sed major, subtus cine-
 reus, et gula undique nigro-cincta.
3. **TANAGRA magna**, Gm. (*Salinator olivaceus*, Vieill. - *S.*
cayennensis, Orb. - *S. magnus*, Gr.) Pl. ent. 205. ex
Brasil. *Guanan*. Medius: laete olivaceus: subtus albo-
 rufescens: genis cinereis: gula alba hinc inde nigro-margi-
 nata; jugulo crissaque rufo-cinnamomeis: rostro nigerrimo.
Quid Coracias cayennensis, Gm. (*cayana*, Loth. - *Saluator vires-*
cens, Vieill.) Pl. ent. 616. ex *Cayenna*, *Brasilia*,
rostro rubro?
4. **S. similis**, Lafr. - Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 28. 2.
 ex *Corrientes*. Olivaceus; pileo, genis, uropygio, cau-
 daque subardesiacois: subtus griso-rofescens: superciliis, gu-
 laque nigro-marginata, candidis.
5. **S. albicollis**, Vieill. (*cayennensis*, Mus. Paris. nec
 Auct.) Enc. Meth. p. 793. ex *Cayenna*. Minor (an
 juv?) Fusco-olivaceus; subtus albo-subrivescens fuso-macu-
 latus: superciliis guaque albeis.
6. **S. guadelupensis**, Lafr. Rev. Zool. 1844, p. 167. sp. 1.
 ex *Ins. Guadalupe*. Similis praecedenti sed major; ro-
 stro valde robustiore, basi fuso, apice flavido: plumis pecto-
 ris, abdominisque medio fuscis.
- *7. **S. martinicensis**, Bp. Mus. Paris. ex *Ins. Mar-
 tinica*. Simillimus praecedenti; sed rostro minus robusto.
8. **S. striatipectus**, Lafr. Rev. Zool. 1847, p. 73. sp. 14.
 ex *Nova Granada*, *Cartagena*. Minor: oliva-
 ceus, uropygio caudae cinereis: subtus albus, pectora sub-
 virescente, flammulis fuso-olivaceois; gula fuso-marginata,
 crissaque albis: superciliis vix ullis; rostro fuso-carneo,
 apice vix pallidio.
9. **S. maculipectus**, Lafr. Rev. Zool. 1847, p. 73. sp. 15.
 ex *Nova Granada*. Similis praecedenti; sed minor:
 rostro breveiore, apice flavo; pileo, cervicque cinereis, nec oli-
 vaceis; pectora albo.
10. **S. rufiventris**, Vig. nec Lafr. (*vigorsi*, Gr.) Zool.
 Beach. Voy. p. 19. ex *Am. contr. occ.* Plumbea-
 cinereus, dorso caudae virescens: subtus rufescens, cris-
 so saturatiore, superciliis albidis: rostro plumbeo.
11. **S. ruficentris**, Lafr. - Orb. Voy. Am. m. Ois. t. 28. 1.
 ex *Bolivia*. Fusco-plumbeus: superciliis protractis al-
 bidis: abdome latissime rufo-castaneo.

12. *S. icterophrys*, Lafr. Rev. Zool. 1844, p. 41. sp. 3.
ex Mexico, Villa Maria. Fusco-olivaceus; subtus
olivaceo-brunneus, abdomine rufescente, crasso rufo; superci-
liis, gulaque nigricante marginata, flavidis; rostro brevi,
arcuato.
13. *S. orenocensis*, Lafr. Rev. Zool. 1846, p. 274. ex
Columbia. Griseo-plumbeus; subtus ochraceus, lateribus
crissoque ferrugineis: superciliis lati, macula parva hinc
inde ad rostri basin, gula, guttureque albis: genis, colli et
pectoris lateribus, alis, caudaque nigricantibus: tectricibus,
remigibus, rectricibus cinereo-limbatis: rostro nigricante.
14. *S. aurantitrostris*, Vieill. ex Azara 83. - Orb.
Voy. Am. m. Ois p. 238. 62. ex Corrientes, Pa-
raguay. Major: fuso-plumbeus; subtus cinnamomeus:
fronte, genis, collarique latissimo, nigris; pectore cineras-
cente: rectricibus duabus extimus apice albis: rostro aurantio.
15. *S. azarae*, Orb. Voy. Am. m. p. 281. ex Bolivia.
S. t. Cruz. Plumbeo-virens; subtus griseo-ochraceus, gula
nigricante marginata pallidiori, crasso rufocente: superci-
liis albis: remigibus extus albo-caeruleo limbatis: rostro elon-
gato, nigro.
16. *S. caerulescens*, Vieill. (Tanagra decumana, Licht.
supercilialis, Spix.) Av. Bras. t. 57. 1. ex Brasil.
Peru. Fusco-olivaceus; subtus sordido albidiis: superciliis,
gula, tectricibus que alarum inferioribus albidis: remigibus
olivaceo-limbatis: rostro crasso, corneo.
17. *S. olivascens*, Caban. in Schomb. Reise III. p. 676.
sp. 52. ex Guyana. Similis praecedenti; sed magis oli-
vaceus, subtus flavescentia, crasso rufescente, rostroque nigri-
cante.
18. *TANAGRA psittacina*, Spix. (Saltator psittacinus, Gr.)
Av. Bras. t. 57. 2. ex Brasil. Ex toto nigricans: alis
subtus albicantibus: cauda valde rotundata.
19. *S. atricollis* et validus, Vieill. ex Azara 82 et 84. (sor-
didus, Less. - Coccothraustes nigricollis, Vieill. - Lo-
xia! capsicum, Valenciennes. - Fringilla jugularis,
Wied. - Tanagra jugularis, Licht. - T. atricollis, Spix.)
Av. Bras. t. 56. 2. ex Brasil. Rufo-fuscus; subtus cum
tectricibus alarum inferioribus albo-rufescens; facie, gulaque
nigris; rostro inferne, lateribusque, flavis.
Quid Pyrrhula! raptor, Cabot, Boston Journ. Nat. Hist. v. p. 90.
t. 12. ex Yucatan?
- Quid Saltator maculatus, Vieill. Enc. Meth. p. 762. ex Azara 86?
- N. B. Saltator icteropygia, Dubus, Esq. Orna. t. 13. species est com-
munis cauda Ptilogenoides cinerei donata! uti docet
Lafresnayus Naturaes scrutator diligentissimus.

S. rubiceoides, Lafr. Rev. Zool. 1844. p. 41. 4. ex Mexico
non est Saltator; sed Tachyphoni species mexicana,
affinis *T. rubro* sive *Salt. rubico*, Vieill. ex Azara
85 (flammeeps, Temm. Pl. col. 177. - porphyrio, Licht. ex
Brasil. Parag. Testaceo-ruber; vertice cristato flam-
men) minor, rostro longiore, magis compresso, tarsis brevioribus;
rubro colore dilutiore.

1016. **Bethylus**, Cu v. 1817. (*Cissopis*, Vieill.) Americ. mer. 3.

1. **Lanius picatus**, Lath. (*leverianus*, Shaw. - *Corvus* col-
lurio, Daud. - *Cissopis bicolor*, Vieill. - *C. leverianus*,
Gr. - *Bethylus picatus*, Bp.) *Levaill. Afr. t. 60. - Gal.
Ois. t. 140. ex Brasil. Major*; dorso fere omnino ni-
gro-violaceo; rostro crasso, incurvo.

*2. **B. medius**, Bp. (*Cissopis minor*, Caban.) Schomb.
Reise III. p. 677. sp. 56. ex Guiana. Medius; dorso
dimidiato albo; rostro crasso, incurvo.

3. **SALTATOR BICOLOR**, Lafr. (*Cissopis minor*, Tschudi.)
Faun. Peruan. p. 211. ex Peru, Bolivia. Minor;
dorso albo; rostro minus valido, brevi, rectiusculo.

*1017. **Diucopis**, Bp. (*Schistochlamys*, Reichenb. - *Tanagra*, p.

Gr.) Afinis Diucae! Americ. mer. 4.

1. **TANAGRA fasciata**, Licht. et hujus Conspl. p. 238. sp. 4.
(axillaris, Spix.) *Av. Bras. t. 54. 2. ex Brasil. Fus-
co-cinerea; subtus dilutior, gula, crissoque albis; humeris ni-
gris, fascia alba.*
2. **TANAGRA capistrata**, Spix (conspicillata, *Mus. Paris.*
atra faem. Less. - leucophaea? Gr. nec Licht.) *Av. Bras.
t. 54. 1. ex Brasil. Plumbeo, capite rufescente; capistro
lorisque nigris; genis, gula, pectore, abdomen, crissoque ru-
fis; ventre, lateribusque griseis; tectricibus alarum inferio-
ribus albidis.*

3. **TANAGRA leucophaea**, Licht. nec Gr. (Tangara roux,
Less.) *Tr. Orn. p. 464. sp. 52. Mus. Paris. ex Brasil.
Faem. rufo-olivacea; subtus et in fronte superciliisque flavo-ru-
fescens; remigibus externe, rectricibusque inferne, cinnamo-
meis; rostro praecedentis robustiore!*

4. **TANAGRA atra**, Gm. (*melanopis*, Lath. - *Saltator melanopis*, Vieill. - *Saltator ater*, Caban. - *Schistochlamys atra*? Reichenb. - *Nemosia! atra*, hujus *Consp.* p. 236. p. 1.) *Pl. enl.* 714. 2. - *Desm. Tang.* t. 42. ex *Guiana. Plumbea; facie, gula, juguloque nigris.*
Quid *Saltator ruficapillus*, Vieill. *Enc. Meth.* p. 373?

1018. **Lamprospiza**, Caban. 1847. (*Saltator*, p. Vieill. - *Tityra!* p. Gr.) Americ. mer. 1.

PSARIS habia, Less. (*Saltator melanoleucus*, Vieill. - *Tityra habia*, Gr. - *Lamprospiza habia*, Caban.) *Cent. Zool.* t. 59. ex *Cayenna. Nigro-violacea, pectore ab domineque albissimo rostro rubro.*

1019. **Psittirostra**, Temm. (*Psittacopsis*, Nitsch. - *Psittaciros-tria*, Aliq.) An hujus Familiae? Ad *Melliphagidas* accedit! Polynesia. 1.

LOXIA psittacea, Lath. nec Pall. (*Psittirostra icterocephala*, Temm. - *sandwichensis*, Steph.) *Synops. t. 42. Pl. col. 457. ex Insulis Sandwich. Viridis, capite colloque luteis.*

*1020. **Psittospiza**, Bp. 1840. (*Chlorornis*, Reich. 1850. - *Saltator*, p. Gr.) Americ. mer. 1.

TANAGRA prasina, Less. (*riefferi* Boisson. 1840. - *Saltator elegans*, Tschudi. - *S. riefferi*, Gr.) *Mitch. Gen. B. t. 98. 1. ex Peru. Viridis; gula, genis, crissquo rufa.*

*1021. **Pyrrhulagra**, Schiff, *Mus. Senkenb.* (*Spermophila*, *Pitylus*, et *Tanagrella*, p. Gr. - *Loxia*, *Fringilla* et *Tanagra*, Auct.) Amer. mer. 4.

1. **Loxia portoricensis**, Daud. (*gularis?* *Van Ernest.* *Pyrrhula aurantiocollis*, Vieill. - *P. violacea* et *robinsoni!* *Gosse*, var. - *Pitylus portoricensis*, Gr.) *Gal. Ois. t. 55. - Gosse, Ill. Jam. t. 66. mas ad. t. 67. var. albovaria, ex Antilles. Maxima: nigerrima: sincipite in superciliis latissimis expanso, jugulo, crissquo fulvo-rufis.*

2. **LOXIA violacea**, L. (*Coccothraustes purpurea*, *Catesb.*
Pyrrhula bahamensis violacea, *Br.* - *P. nigerrima*, *Vieill.*
Loxia rufo-barbata, *Hahn.* - *Spermophila violacea*, *Gr.*
Cat. Carol. t. 40. - *Hahn*, *Ausl. Vög. As. Am.* vii. t. 6.
 $\text{ex Antill. Ins. Baham.}$ Major: *subviolacea-nigricans*;
supercilios brevibus, angustis, gula, crissque rufis.
3. **TANAGRA ruficollis**, Gm. (*Fringilla martinicensis*, *Lath.*
rufobarbata, *Jacq.* - *Loxia haitii*, *Ricord.* - *Tachyphonus ruficollaris*, *Lafr.* - *Tanagrellal ruficollis*, *Gr. et thujus* *Consp. p. 236. sp. 3.* - *Spermophilus haitii*, *Gr. sp. 25.*)
Jacq. Beitr. p. 11. - Gosse, Ill. Jamaic. t. 58. ex Jamaica. Media: *plumbeo-cyanæa: capistro, lorisque nigris;*
gula, juguloque rufis.
4. **FRINGILLA noctis**, L. (*Passer niger*, *Br.* - *Spermophilus noctis*, *Gr.* - *Pyrrhulagra noctis*, *Schiff.*) *Pl. enl. 201. t.*
 $\text{ex Surinam, Martinica. Minor (Long. vix 5-poll. Al. 3-poll.): nigro-nitens; macula ante-oculari, gula, vix crissoque rufis.}$
Faem. fusco-olivacea, alis caudaque subrufescens.
Quid Loxia regulus, Shaw. (Guirea! regulus, Gr.) Lever. Mus.
II. t. p. 45. Patriæ ignotæ, nigerrima, occipite nucha quoque rufa?
Quid genus Goniocephala, Bowdich?

- *1022. **CATAMENIA**, Bp. (*Fringilla*, p. *Gr.* - *Linaria!* p. *Lafr.*) Amer. mer. 2.
1. **LINARIA analis**, *Lafr.* mas. (inornata? *Lafr.* faem. - *Fringilla analis*, *mas et inornata*, *faem.* *Gr.* sp. 43. et 73.)
Orb. Voy. Am. m. t. 48. 1. Mus. Paris. ex Bolivia.
Plumbea, subtus dilutior; dorso rufo induito: criso castaneo:
alis caudaque nigris; scopularibus rufo-marginalis; remigibus;
rectricibusque macula mediana candida, griseo-limbatis:
rostro fringillaceo, albido, apice nigro.
** Faem. *Cinereo-rufa plumis medio nigris: subtus albido rufescens nigro-striata: uropygo cinerascente.**
2. **LINARIA analoides**, *Lafr.* (*Fringilla anatoides!* *Gr.*)
Rev. Zool. 1847. p. 75. Mus. Paris. ex Peru, Lima.
Similis precedentibus; sed minor, magis plumbea, criso rufo dilutiore: pennis alarum, rectricibusque unicoloribus: fascia caudali alla apice proximiore: rostro breviore, subpyrrhula-
ceo, ex toto albo.

* 1023. **Phonipara**, Bp. (Fringilla et Spermophila, p. Gr.)

Rostrum breve, valde compressum : pedes debiles : alae brevissimae : cauda modica, submarginata. Amer. calid. 5.

1. **Loxia canora**, Gm. (Tomelio-Tomeguin del Pinar, Hispan.)

Pyrrhula collaris, Vig. 1827. - *Spermophila collaris*, sp. 24. nec 45. Gr. - *Passerina collaris*, Lembreye, Av. Cub. 1850.) Brown, Ill. Zool. t. 24. 1. ex Mexico, Cuba. Reguli cristati parus major : rostro nigro, brevi, subpyrrhalaceo (*validiusculo*, *incurveo*, *valde compresso*).

* Mas adult. virens, facie pectoraque nigres; superciliis in torque gulari dilatatis aureis.

2. **Fringilla lepida**, L. (Emberiza! olivacea, L. - dominicensis, Br. - Passerina olivacea, Vieill. - Tiaris pusillus, Sic. 1827. - *Spermophila olivacea*, Gr.) Br. Orn. III. t. 13. 5. - Jacq. Beytr. t. 2. - *La Sagra*, Voy. Cuba, t. 15. ex Ins. Hispaniola, Cuba e, Por orico. Rostro brevi, minus robusto, serinaceo.

Mas adult. virens, superciliis gulaque aureis : loris, linea utrinque gulari marginali, pectoraque nigris.

Faem. superciliis gulaque vix et restriete fluorescentibus.

3. **Fringilla bicolor**, L. nec Auct. (Chloris bahamensis, Br.

Spermophila bicolor, Gr. sp. 60. nec sp. 2.) Catesb. Carol. I. t. 37. - *Gosse*, Ill. Orn. Jamaica, t. 64. ex Antill. Rostro brevi, robusto, serinaceo.

Mas ad. fuscovirens; capite, pectoraque nigricantibus.

* Faem. capite, pectoraque vix fuscescentibus.

Quid Tiaris omissa, Jard. Ann. Nat. Hist. 1847. xx. p. 332. Edw. B. t. 362. 2. ex Ins. Tobago nec Africa?

4. **Fringilla gutturalis**, Licht. (melanocephala? Wied. nec Vieill. - *Pyrrhula gutturalis*, Less. - *Loxia plebeja* errore ignobilis, Spix. - *Spermophila gutturalis*, Gr. sp. 58. ex Licht. et sp. 59. ex Less. - *S. ignobilis*, Gr. sp. 8. ex Spix. - *S. melanocephala*, Gr. sp. 64. nec 33. Sp. olivaceo-flava? Laf. 1833.) Av. Bras. II. t. 60. 3. nec 59. ex Brasil. Similis praecedenti, sed ab domine albo-flavo.

Mas fuscovirescens: capite pectoraque nigris: abdomen late allido.

Faem. capite, pectoraque vix dorso obscurioribus.

5. **LINARIA caniceps**, Sagra, Voy. Cuba, t. 16. ex Ins.

Cuba. Rostro elongato, subfringillaceo!

Mas viridi-olivaceo; subtus et in fronte flavo-virens; pileo, genis nuchaque plumbeis.

Quid *Spermophila anoxantha* et *Sperm. adoxa*, Gosse, Ill. Jam. tab. 63. et 65?

1024. **Spermophilla**, Sw. (Sporophila, Cabanis.)

Am. m. Antill. 22.

a. Pyrrhomelanae. Minutae: cinereo-rufae.

1. **Sp. castaneiventris**, Caban. (Loxia bicolor? L.
nec Fringilla. - Fringilla rubra minor, Br. - Rubicilla fusca
minor? Edw.) Edw. B. t. 83, 1 p. ex Am. m. Cayenna.
Plumbea, alis caudae nigricantibus; subtus dilatior, gula,
pectoris et abdominis medio, crissaque castaneis.
2. **LOXIA minutæ**, L. (bicolor? Gm. - Pyrrhula minuta,
Vieill. - Spermophilica minuta, Gr. - Sp. fusciventris?
Gr. ex Bodd.) Pl. ent. 319, 2. - Azara 122. - Orb. Syn.
p. 87? ex Cayenna, Brasil. Olivaceo-brunnea, sub-
tus et in uropygio rufa: remigibus basi late albis.
* Jun. Olivaceo-cinnamomea, subtus flavo-cinnamomea; remigibus,
rectricibusque nigricantibus pallido, marginatis.
3. **PYRRHULA cinnamomea**, Laf. (Spermospiza cinnamomea,
Gr.) Rev. Zool. 1839. p. 99. ex Bras. Rio
grande. Similis praecedenti; sed omnino brunneo-cinna-
momea, pileo cinereo: remigibus, rectricibusque nigricanti-
bus, griseo-marginatis; speculo alarum albo.
4. **PYRRHULA pyrrhomelas**, Vieill. (capistrata, Vig. 1835.
Loxia brevirostris, Spix. - L. fraterculus, Less. - L.
ignobilis err. plebeja, Spix, jun? - Spermophila rubiginosa?
Sic. - Sp. pyrrhomelas, sp. 6. et sp. 32. haud diversae,
Gr. - Sp. minuta, Aliq. nec L. - Sp. plebeja? Gr. jun.
Sp. capistrata? Gr.) Av. Bras. II. t. 59. 1. mas 2. et 3. juv.
neat. 60. 3. ex Brasil. Rufo testacea: (jun. cinnamomeo-
rubella) pilo, alis, caudae nigris: speculo alari albo parum
conspicuo.
* Juv. Brunneocinerea, unicolor, subtus sordide albo rufescens.
Quid Pyrrhula abeillii, Less. (Spermophila abeillii, Gr.) Rev.
Zool. 1839. p. 40. ex Brasil. Cinnamomea; occipite,
dorso, caudaque fuscouscentibus; fronte, collo, corporeque sub-
tus flavescentibus; rectricibus alarum, remigibusque nigris,
externe rufis.
Quid Loxia superciliosa, non Ernest. (Pyrrhula superciliosa,
Daud. - Spermophila superciliosa, Gr.) Tr. Orn. p. 415. sp. 59.
ex Florida.
- * 5. **Sp. torqueola**. Bp. Mus. Berol. ex Mexico. Simi-
lis praecedenti; subtus et in uropygio tantum late rufo; dorso
etiam, genis et torque nigris: speculo alarum magno albo.
6. **PYRRHULA nigro-rufa**, Laf. (Spermophila nigro-rufa,
Gr.) Orb. Syn. Av. p. 87. ex Bolivia. Valde affinis
Sp. minutæ; sed major, pileo dorsoque nigris, alis variegatis.

7. PYRRHULA *telasco*, Less. (Spermophila telasco, Lafr.)
Voy. Cog. Ois. t. 15. 2. Mus. Paris. ex Peru. Cinerea, plumis medio nigricantibus; subtus alba, gula rufa; remigibus basi latissimo albis.
8. PYRRHULA *alaudina*, Lafr. (inornata? Vig. Zool. Beach. p. 20. - Spermophila alaudina et Sp. inornata? Gr.) Orb.
Syn. Av. p. 83. ex Peru. Rufo-cinerea, plumis centro fuscocentibus; subtus rufo-alba, lateribus fuscocentibus: alis, et cauda brevi rotundata, nigricantibus; remigibus, tectricibusque cinereo-marginatis; rectricibus apice albicanibus.
- b. Leucomelanae. Majusculae: albo-nigrae.
- * 9. *Sp. lafresnayi*, Bp. (Pyrrhula melanocephala !! var. Orb. et Lafr.) *Synops. Av. p. 86. sp. 2. Mus. Paris. ex Corrientes.* Major: rufa; pileo, genis, fascia dorsali lata, torque angusto pectorali, alis, caudaque nigris: gula speculoque alarum albis.
10. *Loxia americana* et collaria var. β . Gm. nec L. (pectoralis et collaria var. β . Lath. - cucullata, Bodd. - Fringilla atricapilla, Wied. - Pyrrhula melanocephala, Lafr. nec Wied. - P. diops, Temm. - Spermophila collaris, Gr. ex Bodd. sp. 45 nec 24. - Sp. collaris, Gr. ex L. sp. 44. - Sp. melanocephala? Gr. sp. 33. nec Vieill. - Sp. pectoralis, Gr. ex Lath. sp. 18.) *Pl. enl. 393. 3. mas aduit. et 659. 2. Azara 124?* - Orb. *Syn. p. 85. ex Brasil. Parag. Bolivia.* Pileo, genis, interscapilio, alis, cauda, et torque pectorali nigris: subtus rufescens: macula ante-oculari, infra-oculari, jugulo, collari interrupto, alarum flexura, remigumque basi albis.
- Faem. et Juv. magis rufescentes: collari lato, uropygio, remigumque marginibus rufescentibus.
11. PYRRHULA *mysia*, Vieill. (Coccothraustes mutans? Vieill. ex Azara 126. - Spermophila mysia et mutans? Gr.) *Ois. Chant. t. 46. ex Brasil.* Nigra; subtus cum semitorque cervicali, fascia tectorium, speculoque alari, alba. Similis praecedenti; sed minor, haud rufescens, fascia pectorali interrupta, et rostro minus robusto.
12. *Loxia leucopterygia*, Spix. (Pyrrhula leucoptera? Vieill. ex Azara 127. - Spermophila leucopterygia et leucoptera? Gr.) *Av. Bras. t. 58. 3.* Cinerea; pileo, genis, cervice, interscapilioque coracinis: alis albo-variis caudaque nigricantibus.

- * 13. *Sp. moreletti*, Pucheran, Mus. Paris. ex G u a t i-m a l a. Minor: pilo, genis, pectore, dorso, alis, caudaque nigris; gula, semicollaris, uropygio, abdomine, speculoque alarum duplice alba.
- Faem. olivacea; subtus, flavo-rufa; alarum fascia duplice albida.
14. *Loxia albicularis*, Spix. (Spermophila albicularis, Sw.) Av. Bras. t. 60. 1. mas. 2 faem. ex Brasil. Fusco-cinerea; subtus albida: pilo, genis, fascia lata, pectoris, alis, caudaque nigris; speculo alarum albo.
15. *FRINGILLA hypoleuca*, Lich. (Spermophila hypoleuca, Gr.) Cat. Dupl. Mus. Carls. p. 26, sp. 202. - Azara 123. ex Brasil. Parag. Similis praecedentibus; sed gutture albo, et speculo alari angustiore.
16. *FRINGILLA ornata*, Lich. nee Wied. (leucopogon? Wied. Pyrrhula ornata, Auct. - Spermophila ornata et leucopogon, Gr.) Azara 125? fig. nulla. Mus. Berol. ex Brasil. Minor: ardesiaco-nigricans, píleo obscuriore; pectore nigro; gula, abdomine latissime, speculoque alari, albis; rostro albidio-corneo.
17. *FRINGILLA luctuosa*, Lich. (Pyrrhula leucomelas? Less. - Spermophila luctuosa, Blyth. Cat. 680. an Gr? Sp. luctuosa, Laf.) Rev. Zool. 1843. p. 291. ex Columbia, Brasil, Peru. Altra, abdomine crisoque latissime albis; speculo alarum albo; rostro pallide plumbeo.
- * 18. *Sp. aurita*, Bp. Mus. Paris. ex Bras. Similis praecedenti; gula pectoreque nigerrimis: sed rostro nigro et macula utrinque auriculari alba.
19. *Loxia lineola* et fusca? L. (Pyrrhula lineola, crispa, et fusca? Vieill. - P. lineola, Temm. - Spermophila lineola, Gr.) Pl. enl. 319. 1. - Briss. Orn. III. t. 17. l. - Qis. Chant. t. 47. ex Brasil. Nigra; subtus, cum genis, stria vetricis longitudinali, speculoque alarum, alba: gula nigra.
- Quid Fringilla crispa, L. ex Edw. B. t. 271. 1. non hujus generis?
20. *Pyrrhula bouvronides*, Less. (Spermophila nigricularis? Gould. Voy. Beagle, p. 88. - Gr. sp. 40.) Traité Orn. p. 450. sp. 8. ex Am. m. o. c. Nigra: subtus cum uropygio alba; gula nigra; vitta utrinque malari speculoque alarum candidis.

21. PYRRHULA *caerulescens*, Vieill. (Coccothraustes collaris? Vieill. - Spermophila caerulescens et torquata, sp. 29. et 66. Gr.) Traité Orn. p. 450. Mus. Paris. ex Bras. Brunneo-caeruleans; subtus alba: gula media, genis, et fascia pectorali latissima, nigra.
22. PYRRHULA *nigricollis*, Vieill. (albo-collaris? Less. Spermophila nigricollis et albo-collaris? Gr. sp. 28. et 57.) Enc. Meth. p. 1027. Mus. Paris. ex Brasil. Fusco-olivaceus, capite subnigricante: gula pectoraque nigra; vitta utrinque gulari, fascia transversa jugulari, abdome neque latissime albo-ochraceis: rostro albido. Maximam affinitatem cum Phoniparis praebet!

*1025. **Sporophila**, Bp. ex Caban. (Sporophila, p. hinc Coccoborus, Caban.)

America m. 10.

a. *Coccoborus*, Caban.

1. LOXIA *crassirostris*, Gm. (Pyrrhula nigra, p. et P. crassirostris ex Lath. Vieill. - Spermophila crassirostris, Gr. Coccoborus atter, Caban. in Schombourg III.) Gal. Ois. t. 57. - Enc. Meth. Orn. p. 1029. ex Guiana. Major, nigerrima: tectricibus alarum inferioribus, speculoque alari parvo (postico, angusto) albis: rostro coccoborino! pedibusque albidis.
2. LOXIA *nigra*, L. (Pyrrhula mexicana nigra, Briss. - P. nigra, p. et P. crenirostris, Vieill. - Spermophila nigra, Gr.) Catesb. Carol. I. t. 68. - Vieill. Ois. Ch. p. 77. Ois. Am. s. III. - Orb. Voy. Ile Cuba Ois. t. 17. ex Mexico, Antill. Minor: nigerrima: tectricibus alarum inferioribus, speculoque alari magno (antico, expanso) albis: rostro pyrrhulino! pedibusque nigris.

*Faem. fusco-virens; subtus griseo-rufescens: speculo alari nullo.

- *3. **Sp. othello**, Bp. Mus. Berol. ex Am. centr. Major: nigerrima: remigibus extus basi late albis: tectricibus inferioribus nigris.

- *4. **Sp. corallina**, Bp. Mus. Berol. ex Brasil. Minima; nigerrima: remigibus ex toto nigris: aliis intus tectricibus inferioribus albis: rostro rubro, valde incurvo.

5. LOXIA ANGOLENSIS! (*torrida*, Gm. jun? - nasuta, Spix.
Coccothraustes rufiventris, Vieill. ex Azara 121, 122.
Pitylus! torridus, Orb. et Lafr. - Pyrrhula torrida,
Tomm. - Coccoborus magnirostris, Sw. - Spermophila
torrida, Bp. - Pitylus torridus, Spermophila nasuta, sp.
10. et Sp. angolensis sp. 48. Gr.) Ediv. B. t. 352. 1.
Av. Brasil. II. t. 58. 1. mas. 2. faem. - *Sw. Class. B.* II.
p. 111. fig. 150. ex *Brasil.* Nigra, abdome latissime
castaneo: tectricibus alarum inferioribus, speculogus alari
minimo albis.
Faem. rufo-fusca; subtus cinereo-rufa.
b. *Spermophilus*, Bp. ex Caban.
- 6? LOXIA *flabellifera*, Gm. (Pyrrhula flabellifera, Tomm.
Spermophila flabellifera, Sw. - Sp. flabellum, Gr. ex
Bodd.) Pl. enl. 380. ex *Brasil.* nec *Virginia!* Oliva-
ceo-brunnea; subtus sordide cinnamomeo-rufa: rostro per-
magno.
7. PYRRHULA *falcirostris*, Tomm. (Spermophila falciro-
stris, Sw. - Bouvreuil olivert, Cuv. Mus. Paris.
Less. Tr. Orn. p. 450. sp. 5.) Pl. col. 11. 2. ex *Bras.*
Cinereo-oliveacea; subtus allo-virens: rostro nigro apice pal-
lidio.
Quid Pyrrhula oliveacea, Vieill. (viridis? Less. Traité Orn. p. 451.
sp. 10. - Spermophila oliveacea, Gr.) Enc. Meth. p. 1027?
- N. B. Pyrrhula virescens, Cuv. Mus. Paris. ex *Brasil.* non
est hujus generis!
8. PYRRHULA *bicolor*, Lafr. nec Auct. (Spermophila bico-
lor, sp. 2. Gr. nec sp. 36. ex Gm. quae Sp. minuta, aut castanei-
ventris, nec sp. 60. quae Phonipara.) Orb. Voy. Am. m. Ois.
t. 50. 1. ex *Bolivia?* Nigra; subtus alba: speculo ala-
rum allo: rostro rubro.
9. PYRRHULA *cinerola*, Tomm. (rubrirostris? Vieill. Sper-
mophila cinereola, Sw.) Pl. col. 11. 1. ex Amer. m.
Fusco-cinerea; subtus dilutior, tectricibus alarum, caudaeque
inferioribus allis: rostro rubro.
10. PYRRHULA *cinerrea*, Lafr. - Orb. Synops. Av. p. 87.
ex *Bolivia.* Similis Sper. cinereolae; sed coloribus, et
rostro minore corneo, nec rubro.
Quid Lexia grisea, Gm. (Fringilla cana? Gm. - Spermophila gri-
sea, Gr.) Pl. enl. 393. 1. ex *Brasil.* nec *Virginia.* Mi-
nor: caeruleo-grisea, fronte et collo albis?

1026. **Callirhynchus**, Lesson. (*Spermophila*, p. *Gr.*) Am. m. occ. 1.

Pyrenula rufescens, Vieill. (*Callirhynchus peruvianus*?

Less. - *Spermophila rufescens*, et *Sp. peruviana?* *Gr.*
sp. 31. et 46.) *Rev. Zool.* 1842. p. 209. ex *Peru. Mus.*
Paris. ex *Brazil.* *Rufo-brunneus*; *subtus et in uropygio*
allicans: *speculo alarum albido*: *rostro nigro*: *pedibus pallide*
carneis.

1027. **Paradoxornis**, Gould. (*Bathyrhynchus*, *Mac Clell.*

Heteromorpha, *Hodgs.*)

Asia centr. 5.

a. **Paradoxornis.** Ad *Conostom.* accedit!

1. **P. flavirostris**, Gould, 1836. (*Bathyrhynchus brevirostris*, *Mac Clell.* 1838.) *Icon. Av. fig. bona. ex Asia centr.* *Griseo-brunnea*, *subtus dilatior*; *capite nuchaque rufo-brunneis*; *macula auriculari aterrima*; *facie, guttureque albis nigro-variis*: *pectore nigro*: *rostro vivide aurantiaco*: *pedibus caerulecentibus.*

2. **P. gularis**, Gr. ex Horsf. Ms. - Gr. et Mitch. *Gen. B.* t. 94. 2. ex *Asia centr.*

3. **P. unicolor**, Blyth. (*Heteromorpha unicolor*, *Hodgs.*) *Journ. As. Soc. Beng.* 1843. p. 448. t. 4. ex *Cachar.* *Brunneo-olivaceus*, *in capite cristato*, *alii*, *caudae vegetior*: *rostro flavo*: *pedibus ardesiacis.*

b. **Bathyrhynchus.** Ad *Paridas* accedit!

4. **P. ruficeps**, Blyth. (*Heteromorpha ruficeps*, *Blyth*, *Cat. 527.*) *Journ. As. Soc. xi.* p. 187. et *xii.* p. 1010. *cum fig. ex Bootan. Arakan. Pileo rufo.*

5. **P. caniceps**, Blyth. (*Heteromorpha caniceps*, *Blyth*, *Cat. 528.*) *Journ. As. Soc. XVIII.* p. 189. ex *Sikim. Darjiling.* *Pileo cinereo.*

1028. **Cardinalis**, Bp. 1831.

America. 5.

L.

a. **Pyrrhuloxia.**

Restrum compressum, *turgidum*, *sinuatum!* *Rubro colore tantum induitus!* *Medius quasi inter Paradoxornitheos et Loxinas.*

1. **C. sinuatus**, Bp. *Proc. Zool. Soc.* 1837. p. 111. ex *Mexico occ. Zaca tecas.* *Rubro cinereoque varius*; *gula et copistro coccineis*; *cauda vis rotundata*: *rostro fuscum.* *Adult.* *plumbeo-cinerus*; *subtus dilatior*: *pectore, abdomine, alie, cauda, tibiisque rubro induitis*: *capistro, gula, jugulo, tectricibusque alarum inferioribus rubris.*

b. Cardinalis.

Rostrum conicum, coccothraustaceum. Color (maris) ruberrimus.

2. *LOXIA CARDINALIS, L. (C. virginianus, Bp. ex Br.*

Fringilla cardinalis, Auct. - Pitylus cardinalis, Audub.)

Pl. ent. 37. - Willoughb. Orn. t. 44. 8. - Catesb.

Car. i. t. 38. - Frisch. Av. i. t. 4. 1. - Jonst. Av. t. 37.

Seba Thes. t. 60. 4. - Albin. Av. t. 57. 3. et t. 61.

Wils. Am. Orn. t. 11. 1. mas. 2. faem. - Aud. Am. t. 159.

ex Am. s. Ruber, subtus vegetior; gula et capistro nigris: cauda valde rotundata: rostro conico, subdentato, rubro.

3. *C. phoeniceus, Gould, (granadensis! Laf. 1847.) Bp.*

Pr. Zool. Soc. 1837. p. 111. ex America m. Nova Granada, Honduras m. Ruberrimus; capistro tenuissimo nigricante; cauda rotundata: rostro robustissimo conico-turgescente, sinuato-dentato, albo.

Adult. crista valde elongata, acuminata: mento nigro.

Quid Loxia cardinalis, Sparm. (L. carlsoni, Daud. - Cardinalis carlsoni, Gr.) Mus. Carls. t. 41. similissimus C. phoeniceo, at capite laevi, et rostro rubro, nec albo, nisi Haematospiza si pah; uti indubio est Loxia fulgens, Less.

4? *C. lessonii, Bp. (C. carneus junior an varietas? Less.)*

Fusco-ruber; subtus cinereo-ferrugineus, maculis rubellis: fronte sanguinea; crista rubra: gula atra: remigibus fuscis rubro-marginatis: cauda elongata, rubra, emarginata!

5? *C. carneus, Less. Rev. Zool. 1842. p. 209. ex Ace-*

pulco et Realejo. Olivaceo-brunneus; subtus rufo-ochraceus; crista carnea: gula atralis brunneis, pteromatibus sanguineis, subtus rubro-carneis: cauda rubella: rostro rubro: pedibus cinereis.

*1029. *Guiraca, Sw. p. (Coccoborus, p. Sw. - Habia! Reichenb.*

nec Azara?)

America s. 2.

1. *LOXIA ludoviciana, L. (obscura? Gm. faem. - rosea,*

Wils. nec Auct. - Fringilla punicea, Gm. mas. - Cocco-

thraustes rubricollis, Vieill. - Guiraca hinc Coccoborus ludovicianus, Sw.) Pl. ent. 153. 2. - Am. Orn. t. 17. 2.

Aud. Am. t. 127. ex Am. s. m. et centr. Mas niger: uropygio, abdomine quo latissime ciliis: pectore, tectricibus quo alarum inferioribus rubris: alis caudaque albo nigroque variis.

Faem. et jun. cinereos, olivaceo, albidoque variis: uropygio conco-

lore: subtus et in superciliis albi; pectore concoloro, lateribus

fusco-striatis, tectricibusque alarum fulvis: alis, caudaque

vix variegatis.

2. **G. melanocephala**, Sw. 1827. (Fringilla maculata,
Aud. - xanthomascalis, Wagl. 1831. - epopaea, Licht.
Pitylus guttatus, Less. - Pitylus! melanocephalus, Gr.)
Aud. Am. t. 373. ex Am. s. occ. Mexico. Tectricibus alarum inferioribus flavissimis.
Mas fulvus: pileo, genis, mento, alis, caudaque nigris: dorso ni-
gro-maculato: crisso albicante: alis caudaque albo-variegatis.
Facm. fulvescente fuscogrisea varia; subtus et in superciliis au-
ranti-o-rufa: alis caudaque vix variegatis.
Quid Guiraca tricolor, Less. Rev. Zool. 1839. p. 41. ex Mexico.
Minor; brunnea; pileo, genisque nigerrimis: torque cervicali,
uropygio, corpore quo subtus cinnamomeo-rufis: alis, albo-
fasciatis, caudaque nigris; rectricibus extimis apice albis?

*1030. **Cyanoloxia**, Bp. (Guiraca, p. Gr.) America. 5.

1. **LOXIA caerulea**, L. (Fringilla caerulea, Bp. - Pyrrhula carolinensis caerulea, Br. - Guiraca hinc Coccoborus caeruleus, Sw.) Catesb. Carol. I. t. 39. - Wils. Am. Orn. t. 24. 6. - Aud. Am. t. 122. ex merid. Am. s. Laete cyanea; alis caudaque nigricantibus; tectricibus ala-
rum minoribus, apicibusque medianarum castaneis: tectricibus cauda inferioribus apice albis.
Faem. cinnamomeo-olivacea, vix cyaneo-induta: subtus griseo-
rufescens.
2. **LOXIA cyanea**, L. (L. caerulea, var. β . Gm. - Pyrrhula caerulea brasiliiana, Br. - Fringilla brissonii, Licht. - Pi-
tylus cyanus, Laf. - Pitylus cyanus, et P. brissonii,
Gr. sp. 5. et 6.) Br. Orn. III. t. 17. 2. - Edw. B. t. 125.
Vieill. Ois. Chant. t. 64. - Azara 119. ex Am. m.
Bras. Parag. Intense cyanea, fronte, superciliis, hu-
merisque dilatioribus: alis, caudaque fuscis: rostro nigro,
modice, curvato.
Faem. rufa fere unicolor.

3. **COCOBORUS cyanoides**, Laf. (Pitylus cyanoides, Gr.)
Rev. Zool. 1847. p. 74. sp. 17. ex Panama. Similli-
ma praecedenti C. cyanea ex Brasil. at rostro valde
longiore (conico-elongato) ad basin minus turgido, altiori et
magis arcuato!

- *4. **FRINGILLA parellina**, Licht. (Pitylus lazulus? Less.
Rev. Zool. 1842. p. 174.) Mus. Berol. ex Mexico, Al-
varado. Minor: cyanea, dorso obscuriore; fronte, humeris-
que vividioribus: remigibus, rectricibusque nigricantibus.

5. PYRRHULA *glauco-caerulea*, Lafr. (Spermophila glauco-caerulea, Gr.) *Orb. Voy. Am. m. t. 50. 2. ex Am. m. o r. M a d o n a d o.* Minor: ex toto glauco-caerulea unicolor, superciliis flexuaque alarum vegetoribus; alis, caudae nigricantibus, remigibus rectricibusque caerulescenti-marginatis: rostro brevi, turgido, arcuato.

1031. **Pitylus**, Cuv. p. (Pitylus et Cissurus, Reich. 1850.) Amer. mer. 2.

1. LOXIA *grossa*, L. (Pitylus grossus, Cuv.) *Pl. enl. 154. ex Amer. m. C a y e n n a, B r a s i l.* Minor: cyaneo-plumbeus, capistro juguloque nigricantibus, gula medio alba: rostro rubro.

2. FRINGILLA *gnatho*, Licht. (Pitylus atrichalybaeus, Jard. erythrorhynchus, Sw. - P. gnatho, Gr. - ardesiaeus? Less. 1840. faem. - Cissurus gnatho, Reich.) *Selby, Ill. Orn. t. 3 ex B r a s i l.* Major: plumbeo nigricans; facie pectore que nigris, gula concolor; tectricibus alarum inferioribus albis: rostro maximo, acute dentato, rubro.
Faem. ex toto plumbeo-nigricans, pectore concolor.

*1032. **Periporphyrus**, Reichenb. 1850. (Pitylus, p. Gr.) America. 2.

1. PITYLUS *atropurpuratus*, Lafr. (Fringilla celseno, Licht. - Pyranga mexicana, Less. 1839. et hujus *Conspectus* p. 241. sp. 6.) *Rev. Zool. 1838. p. 224. ex Mexico.* Niger: corvice, colli lateribus, pectore hinc inde abdomineque fusco-purpureis.

2. LOXIA *erythromelas*, Gm. (Pitylus erythromelas, Cuv.) Fringilla erythromelas, Licht. *Lath. Syn. t. 43. Vieill. Gal. Ois. t. 59. ex C a y e n n a.* Fusco-ruber; subtus et in cervice ruberrimus; capite, colloque antice nigris.

*1033. **Caryothraustes**, Reichenb. 1850. (Pitylus et Guiraca, p. Gr.) America mer. 3.

1. PITYLUS *atro-olivaceus*, Lafr. *Rev. Zool. 1838. p. 224. ex Mexico.* Olivaceus; subtus flavus: pilos, colli lateribus, juguloque nigris.

2. **FRINGILLA episcopus**, Licht. (Loxia canadensis var. *a.*

Lath. - Pitylus poliogaster? *Dubus* 1848. - flavocineus?
Cassin.) *Pr. Ac. Philad.* 1848. p. 67. *Mus. Berol.*
ex Mexico, *Cosamalua pan.* *Olivaceus*: tectrici-
bis alarum corpore proximioribus, uropygio, abdomine que ci-
nereis: facie nigra.

3. **LOXIA CANADENSIS!** *L.* (**cayanensis**, Br. - Coccothrau-

tes viridis, Vieill. - *Fringilla cayanensis*, *Licht.* - *Pity-*
lus canadensis! *Cuv.* - *P. personatus*, *Less.* 1839.) *Pl.*
enl. 152. *2. ex Brasil. Cayenna*, nec Canada! *Oli-*
vaceus; pileo, corporeque subtus flavis: facie nigra.

1034. **Coccoborus**, Cabanis ex Sw. (Guiraca et Pitylus, p. Gr.

Phœnicus, Reich. 1850.)

America mer. 3.

1. **PITYLUS aureiventris**, Lafr. (Fringilla aureiventris,

Licht. - *Coccoborus aureiventris*, *Caban.*) *Orb. Voy.*
Am. m. Ois. t. 49. ex Columbia, Peru, Chili.
Nigricans; uropygio (in junioribus), abdomine, humeris, tec-
tricibusque alarum inferioribus aureis: speculo clari, gut-
tulis tectricum, maculisque rectricum lateralius albis.

2. **COCOTHRAUSTES chrysopeplus**, Vig. 1832. (Pitylus

chrysogaster, *Less.* - *dorsigerus*, *Jard.* - *chrysopeplus*,
Gr.) *Less. Cent. Zool. t. 67. - Jard. et Selb. Ill. Orn.*
n. s. t. 44. ex Mexico. Aureus: dorso medio nigro-no-
tato: alis, allo-variiis et aureo-maculatis, caudaque nigris:
rectricibus lateralibus utrinque quatuor interne ad apicem
albis.

Faem. et juv. flavidus, capite colloque fuso striatis: dorso oliva-
eo, fusco notato: alis, caudaque fusco-olivaceis vix maculatis.

3? **GUIRACA magnirostris**, Bp. nec Sw. (Pitylus magni-

rostris, *Gr.*) *Proc. Zool. Soc. 1837. p. 120. ex Peru,*
Bras. occ. *Griseo-flavida nigro-maculata; subtus et in*
superciliosis flava: criso albo: remigibus, rectricibusque fus-
cis: tectricibus alarum majoribus, scapularibusque apice al-
bo-notatis.

Quid Coccothraustes chrysocephalus, Hartl, ex Vieilli (Spermo-
phila chrysocephala, Gr.) Enc. p. 1012. - Azara 122?

SUBFAM. 136. FRINGILLINAE.

1035. **Mycerobas**, Caban. 1847. p. (Strobilophaga, Hodgs.

Coccothraustes, p. Gr.) Rostrum immane!

Asia centr. I.

Coccothraustes melanoxanthus, Hodgs. 1836. (for-
tirostris, Laf.) Journ. As. Soc. Beng. 1844. p. 950.
sp. 1. - Gr. et Mitch. Gen. B. t. 88. ex Asia centr.
Niger; abdomine fasciisque duplice alarum luteis; rostro ni-
gricante.

Faem. fusca, alis albido-variegatis; subtus albida, nigro-guttulata.

1036. **Hesperiphona**, Bp. 1849. (Coccothraustes, p. Caban.

Gr.) Cauda longula.

Amer. s. Asia. 6.

a. Americanae. Alis longioribus. Typicae.

1. **FRINGILLA vespertina**, Cooper. (Coccothraustes ver-
pertinus, Audub. - C. bonapartii, Less. faem. - Hespe-
riphona vespertina, Bp.) Am. Orn. t. 15. 1. mas. - Less.
Ill. Zool. t. 31. faem. - Aud. Am. t. 373. 1. mas adult.
et 424. 5. faem. 6. mas juv. ex Am. bor. et occ. Mexico!
Mas flava; dorso, gula, pectoreque rufo-olivaceis: pileo,
corvico, alis, caudaque nigris; fronte, superciliisque flavis-
simis: scapularibus late albis.

Faem. pileo ut dorsum griseo-olivaceo: colli lateribus tantum
flavocollis: alis, caudaque albo-variegatis.

* Jun. ex Mexico griseo-olivaceo; subtus sordide flavo-albida: pileo
ex toto, alis, caudaque nigris; scapularibus griseis: remig-
ibus basi, rectricibus apice albis.

2. **GUIRACA abeillii**, Less. Rev. Zool. 1839. p. 41. ex
Mexico. Minor; lutea; capite, collo, alis, caudaque ni-
gerrimis; remigibus secundariis albocantibus: rostro flavo-
marginato; pedibus carneis.

b. Asiatica. Alis brevioribus. Haud typicae.
Ad Mycerobantem accedunt; nec ab eo forsitan disjungendae.

3. **COCOTHRAUSTES icteroides**, Vig. 1830. - Gould, Cent.
Himal. B. t. 45. ex Nepal. Flava, capite, jugulo,
interscapilio, alis, caudaque nigris: rostro albo-virescente.

4. **Coccothraustes speculigerus**, Brandt. (albispectalis, Mercatorum) Bull. Ac. Mosc. et Anim. Vert. Sib. occ. in Tchihatcheff Voy. p. 25. sp. 88. ex Persia boreali. Similis praecedenti; sed rostro nigrante, speculo alari, et pectoris nigredine diversa.

Mas flave; capite, collo, dorsi pectorisque parte antica, alis caudaeque nigris: speculo alari albo.

* Faem. ardesiaci, capite fuscenscente; dorso virescente, plumis pectoris et genarum rachidibus albidiis: uropygio abdomine quo viridi-flavisi; alis, caudaque fuscis; remigibus albido-limbatis; primariis basi externe albis speculum constituentibus: tectricibus et tertiaris apice late albo-flavidiis: rectricibus flavo-viridi limbatis. Long. 8-poll. Rostr. 1-poll. Alae 5-poll. Caud. 4-poll.

Quid Coccothraustes carnipes, Hodgs. As. Res. xix. p. 150. sp. 2. et Journ. As. Soc. Beng. 1844. p. 950. cum fig. 4. rostri, ex Asia centrali, pedibus rubellis?

5. **LOXIA melanura**, Gm. (Coccothraustes melanurus, Jard.) Selb. Ill. Orn. t. 63. ex Asia or. China. Rufo-grisea; capite toto, alis, caudaque nigris; speculo alarum parvo, basali, remigibusque apice albis: rostro flavissimo.

6. **Coccothraustes personatus**, Schleg. (nippon, Temm.) Faun. Japon. t. 52. ex Japonia. Sericeo-grisea, abdome crisoque albicoantibus: pileo et capistro, alis, caudaque nigerrimis: speculo alarum magno, subapicali, candido: rostro flavissimo.

Faem. capite ex toto cinereo, sine nigredine; remigibus apice nigris.

1037. **Coccothraustes**, Cuv. 1800. ex Br. Alae remigibus secundariis apice rhombensis. Cauda brevis.

Eur. Asia. 2.

1. **LOXIA coccothraustes**, L. (Fringilla coccothraustes, Illig. - Coccothraustes vulgaris, Br. - europeus, Selby. deformati, Koch. - atrigularis, Macgill. - C. sanguinum, cerasorum et flaviceps, Brehm.) Pl. ent. 99. 100. - Gould, Eur. t. 199. ex Eur. Afr. s. Asia etiam quam maxime orientali, China. Brunneus; subtus vinaceus: cervice et fascia alarum griseis: fronte albida: occipite genis que rufis: capistro, toris, alis, caudaque nigris: remigibus macula magna media, rectricibus apicali, alba.

2? **C. VULGARIS JAPONICUS**, Schlegel, Faun. Japon. t. 51. mas et faem. adult. ex Japon. vix coloribus dilutioribus distinctus!

* 1038. **Callacanthis**, Reichenb. 1840. (*Carduelis*! *hinc Fringilla*, p. *Gould*. - *Fringilla*, p. *Gr.*) *Rostrum validissimum!* vix *Fringillae*!! minime *Carduelis*!!! Asia central. 1.

CARDUELIS burtoni, *Gould*, 1830. (*Fringilla erythrophrys*, *Blyth*, 1846. - *Fr. burtoni*, *Gould*, 1840. - *Burtonia erythrophrys*, *Bp.* in lit.) *As. Journ. Beng.* 1846. p. 38. - *Gould, Birds of Asia* t. 1. t. 13. mas et faem. ex *Asia centrali*. *Ex rubescente brunneus; sincipite vittaque transoculari arcuata rubris; occipite, nucha, genique nigris; alis, caudaque nigris, albo-maculatis; rostro flavo.*

Quid Fringilla rubrifrons, Hay, As. Journ. 1836, p. 38. ex Simla?

1039. **Fringilla**, L. (*Caelobs*, *Cuv.* - *Struthus*, *Boie*. - *Fringilla et Passer*, p. *Gr.*) Eur. As. Afr. s. 5.

1. **F. montifringilla** et *lulensis*, L. (*flammea*, *Beseke*. *septentrionalis*, *Brehm*. - *Struthus montifringilla*, *Boie*. *Loxia hamburgia?* *Gm.*) *Pl. enl. 54. 2.* - *Gould, Eur. t. 188.* ex *Eur. As. etiam or.* *Niger*, *plumarum marginae saepius rufo-pruinoso; pectore, crissoque rufis; abdomine albo; genis nigris; alis nigris rufisque variis; rectricibus nigris, extima externe basi albida.*

2. **Fr. caelebs**, L. (*sylvia*, *Scopoli*. - *nobilis*, *Schrank*. *Passer spiza*, *Pall.* - *Struthus caelebs*, *Boie*. - *Frin. hortensis*, *sylvestris et nobilis*, *Brehm*) *Pl. enl. 54. 1.* *Gould, Eur. t. 187.* ex *Eur. As. etiam or.* *Vi-*
ridis; subtus cum genis vinaceis; pilo, cerviceque plumbeo-
caeruleoscentibus; alis, caudaque albo nigroque variis.

3. **Fr. spodiogenia**, *Bp.* 1841. (*caelebs* var. *Malherbe*. *africana*, *Lev. jun.*) *Exp. Alg. Ois. t. 7. 1.* mas. 2. faem. ex *Afr. s.* *Viridis; subtus albido-vinacea; pilo, corvico,*
genisque cinereo-plumbeis; alis caudaque albo nigroque variis.

4. **Fr. canariensis**, *Vieill.* (*tintillon*, *Webb et Berth.*) *Voy. Canar. Ois. t. 4. 1.* ex *Ins. Canarii s.* *Viridi-*
caeruleans; corpore toto subtus et genis ochraceis; alarum fas-
cia duplicit, rectricibusque lateribus apice, latissime albis.

5. **Fr. teydea**, *Webb et Berth.* (*Passer*! *tedia*, *Gr.*) *Voy. Canar. Orn. t. 1. 1.* mas. 2. faem. ex *Ins. Canar.* *Ma-*
jor: plumbeo-caeruleans: genis caeruleantibus; abdomine alarum-
que fascia duplicit albida: rostro crasso, elongato.

Faem. *fusco-viridis faeminae Fr. caelibus magis similis.*

1040. **Passer**, Ray. Br. ex Antiq. (Pyrgita, Cuv.-Fringilla, p. Auct.) Eur. As. Oc. Afr. 20.

1. **Pyrgitae**, Bp. ex Cuv. (Friquets) Graciliores: rostro exili.
Mas et Faemina simillimi. Europaei et Asiatici.

1. **FRINGILLA montana**, L. (campestris, Schrank. - Loxia hamburgia! Gm. - Passer montanina, Pall. - hamburgensis, Leach. - montanus, Steph. - Pyrgita montana, Cuv. - P. campestris et septentrionalis, Brehm.) Pl. col. 267. 2. - Edw. B. t. 269. - Naum. Vög. Deutschl. t. 116. Penn. Br. Zool. t. 59. 1. - Gould, Eur. t. 184. 2. ex Eur. As. Afr. s. Pileo (maris et faeminae) brunneo-castaneo; macula auriculari nigra; alarum fascia dupliciti angusta alba; rostro nigerrimo.

2. **FRINGILLA rutilans**, Temm. (russata, Aliq. - Passer russatus! Schlegel. - P. rutilans, Strickl.) Pl. col. 288. 2. Faun. Japon. t. 50. adult. et juv. ex Japonia. Similis P. montano; sed dilute castaneo-rufescens; macula auriculari nulla; rostro corneo, subtus flavescente.

3. **PYRGITA cinnamomea**, Gould. nec Licht. (Passer cinnamomeus, Blyth.) Proc. Zool. Soc. 1835. p. 185. ex Himal. s. et o. c. Minor: cinnamomeus, dorso nigro-maculato; subtus allido-cinerascens: alitis, caudaque fuscis; fascia humerali candida.
Simillim. P. rutilanti, sed genis, abdomineque flavescentibus.

* 4. **P. jugiferus**, Temm. Mus. Lugd. ex Ins. Philip. pinis. Dorsa, humeris et fascia lata pone oculos, cinnamomeis; capite supra nuchaque flavescenti-cinereis; fronte flavescenti; subtus luteus, clypeo gulari nigro.

2. **Passeres**. Robustiores: rostro valido. Mas et Faemina colore dissimiles.
a. Asiatici.

5. **P. flaveolus**, Blyth. Journ. As. Soc. XIII. p. 946. sp. 3. ex Arakan, Tenasserim. Similis Passeribus indicis et pyrrhonoto; sed magis flavescentis et minime maculatus: rostro minus robusto; genis flaveolis. Ad Gymnor. paulo accedens!

6. **P. pyrrhonotus**, Blyth. Journ. As. Soc. Beng. 1841. p. 948. sp. 2. ex Sinde. Similis P. indicis; sed minor; rostro, podibusque valde minoribus; uropygio castaneo, nec cinereo.

7. **FRINGILLA pyrrhoptera**, Less. (Passer pyrrhopterus, Blyth.) Belanger, Voy. Zool. p. 271. Mus. Paris. ex Asia m. Coromandel. Cinereo-isabellinus; subtus albo-isabellinus; macula pectorali nigra; gula securis medium flavescente: alarum tectricibus minoribus castaneis; mediis nigris rufo-marginatis; rostro flavicante.
Faem. macula pectorali nulla; humeris vix rufescens.

8. **P. indicus**, Jard. (domesticas, Blyth. - Fringilla indica?

Licht. - Pyrgita domestica, Gr. in Hodge, Cat. 1846.)

Selby, Ill. Orn. t. 118. ex Az. m. et or. Ceylon,
Cachemir. Simillimus P. domesticus; sed coloribus vegetioribus; dorso pulchre rufa maculis nigris distinctis; uro
pygo uti pileus dilute griseo.

b. Europaei.

9. **FRINGILLA domestica**, L. (candida, Sparr. var. alb.

leucura? Gm. var. - Passer domesticus, Leach. - Pyrgita
domestica, Cuv. - P. rustica et pagorum, Brehm.) Pl.
enl. 6. 1. mas nupt. temp. et 55. 1. mas autumn. - Penn.
Brit. Zool. t. 58. - Naum. Vög. Deutschl. t. 115.
Gould, Eur. t. 184. 1. ex Eur. s. et o.c. Pileo (maris)
cinereo: fascia alarum lata alba: lateribus immaculatis:
remigum prima longiore quam quarta, secundam subaequante;
tertia omnium longissima.

Quid Passer domesticus, Pall. ex Russia, Az. s. vertice
testaceo?

10. **FRINGILLA italicæ**, Vieill. (cisalpina, Temm. - Pyrgita

italiae, Bp. - Passer domesticus var. italicus, Keys. et Bl.
P. domesticus cisalpinus, Schleg. - P. italicus, Degland.)
Gerini, St. d. Ucc. t. 340. - Vieill. Gal. Ois. t. 63.
Gould, Eur. t. 185. 2. ex Italia, Gallia m. Az. occ.
Pileo (maris) castaneo: fascia alarum lata alba: lateribus im-
maculatis: remigum prima longiore quam tertia, secundam
omnium longissimam subaequante.

11. **FRINGILLA salicicola**, Vieill. (Fringilla hispaniolensi-

s! Temm. - sardoa, Savi. - hispanica, Aliq. - Passer
domesticus var. y salicarius, Keys. et Bl. - P. domesticus
var. hispanicus, Aliq. - P. hispaniolensis, Degland. - P.
salicarius, Schleg.) Roux, Orn. Prov. t. 84. mas adult.
Gould, Eur. t. 185. 1. ex Sardinia, Hispan. Afr. o.c.
Ins. Cap verde dictis, nec Malaisia! Pileo (maris) cas-
taneo: fascia alarum alba nigraque: lateribus nigro-guttatis:
remigum prima longiore quam quarta; secundam et tertiam
omnium longissimas subaequante.

c. Africani.

*12. **P. rufipectus**, Bp. (Fringilla hispaniolensis ex Aegypto,

Auct.) Expedit. Egypt. t. 5. ?? ex Aegypto. Me-
dius quasi inter P. italicæ et salicicolam! sed dorso pure casta-
neo, postice tantum maculato; et pectore (gutture nigro) cas-
taneo undulato; superciliis albis, angustissimis.

*13. *P. arboreus*, Licht. (domesticus ex Afr. or. Rüpp.)

Mus. Berol. Lugg. et Paris. ex Sennaar. A P. domesticus vix distinctus genis alii, nec cinereis: rostro graciliore; coloribus vegetioribus.

*14. *P. ruppeli*, Bp. (Pyrgita cislalpina ex Afr. or. Rupp.)

Mus. Senkenb. ex Afr. or. Cinereo-brunneus; pileo dilute rufo: alis fasciis duabus albido: gula alba, vitta hinc inde marginali nigricante.

*15. *P. erythrorynchus*, Temm. Mus. Lugd. ex Senegal.

Rostro producto, flavescens; capite supra brunnescente; fascia lata pone oculos humerisque rufis; subtus albus; clypeo gulari nigro.

1041. 16. *P. jagoensis*, Gould. (Moineau du Cap verd, Less.

Tr. Orn. p. 439. sp. 7.) Voy. Beagle, t. 31. Mus. Paris. ex Insula Cap Verde dictis. Minor; cinamomeo-rufus; subtus albidus: pileo, gula, maculis dorsalibus, alis, caudaque fuscis: macula utrinque frontali fasciisque humerali lata candida: teatricibus caudae superioribus griseis.

1042. P. 17. *P. motitensis*, Smith. (molitensis, Gr. - Pyrgita

cinnamomea? Licht, 1842. nec Gould.) ex Afr. m. Major: rufo-cinnamomeus, dorso nigro-striato: capite, cervice quo fuscocanescens: superciliis, postice valde dilatatis, cinamomeis; gula nigra; genis, pectore, abdomine que albido-rufescens: teatricibus caudae superioribus rufis.

Quid Pyrgita spadicea, Licht. ex Afr. Long. 6-poll. cano-cinerea, dorso medio aliquo clausis extus, rufis; uropygio ferrugineo; subtus albinos; pennis axillaribus ferrugineis apice albis; cauda rotundata; mandibula flava, apice nigra?

18. *FRINGILLA ARCUATA*, Gm. (Passer arcuatus, Gr.) Pl.

enl. 230. l. ex Afr. m. Rufo-cinnamomeus; subtus albidus: pileo, genis, gula, pectore que uigris: vitta postoculari in semitorque jugulari interrupto utrinque dilatata, alba: alis, caudaque nigricantibus, griseo-variiis.

Faem. pileo, gulaque cinereis, superciliis et semitorque obsoletis.

3. *Pyrgitopsis*. Robustiores: rostro validiusculo. Colores rufi et cinerei, haud variegati. Mas et faemina similes. Afric.

19. *Pyrgita SIMPLEX*, Sw. nec Licht. (*swainsoni*, Rüpp.

gularis, Less. 1839. - grisea! Laf. nec Vieill. - Passer simplex, Gr. nec Licht.) Faun. Abyss. t. 33. 2. ex Senegal, Abyssinia. Griseus, dorso postico rufescente; uropygio cinnamomeo: subtus cinerascens, gula albida: humeris rufo-cinnamomeis, fascia marginali obsoleta, alba: remigibus fuscis, rufo-marginatis.

20. PYRGITA *diffusa*, Smith. (Passer diffusus, Gr.) *Repos.*

S. Afr. Exped. p. 50. ex Afr. m. Similis P. swainsoni, sed minor: cinnamomeo-fuscus; subtus sordide griseo-cinnamomeus: humeris, uropygioque rufis: macula alarum antica alba. Quid Fringilla humilis, Lich. Mus. Berol. ex Afr. m. fuscus, cinereo-varius; subtus sordidissime albidos, gula minus obscura, nigricante punctulata: superciliis latis albidos: crissore rufescens?

*1041. COROSPIZA, Bp. (Pyrrhulauda! p. Gr.) Ad Erythros-pizas accedens! Africa. 1.

FRINGILLA *simplex*, Lich. nec Sw. (Pyrgita simplex, Less. - Pyrrhulauda! simplex, Gr. - Passer simplex, Bp. nec Gr.) *Pl. col. 358.* 1. mas. 2. faem. ex Afr. or. *Nubia. Cinereo-isabellina; subtus albicans: remigibus, rectricibusque fascis isabellino-limbatis: mandibula basi alba. Mas vitta oculari et guttura medio nigris; genis albicantibus. Faem. rufo-isabellina, guttura albo.*

1042. PYRRHULAUDA, Smith. 1829. (Megalotis, Sw. 1827. nec Desm. - Coraphites, Cabanis, 1847. - Pyrgilauda, Verr.)

Ob tarsos scutellatos potius ad Alaudidae pertinet! Afr. As. Ocean. 6.

1. *P. australis*, Smith. (melanosoma, Sw. - Megalotis australis, Smith. 1836.) *Ill. S. Afr. Zool. B. t. 24.*
a. mas b. faem. ex Afr. m. *Minima: rufo-fusca: subtus nigerrima: rostro exili albido: pedibus carneis.*

2. *P. verticalis*, Smith. (*Alauda verticalis*, Lich. *Cat. 1842. sp. 110.* - Megalotis verticalis, Smith, 1836. - Coraphites verticalis, Caban.) *Ill. S. Afr. Zool. B. t. 25.*
a. mas b. faem. e. jun. ex Afr. m. *Fusca albido-varia; subtus nigricans: vertice, cervice, genisque albis: rostro robusto, albidio.*

3. LOXIA *leucotis*, Stanley. (*Alauda melanocephala*, Lich. - Fringilla otoleuca, Temm. - Pyrrhulauda leucotis, Rüpp. - P. leucotis var. septentrionalis, Sundev.) *Salt's Abyss. App. p. 59.* - *Pl. col. 269.* 2. adult. 3. jun. ex Afr. or. et occ. *Senegal. Nubia. Minor: rufa, albido-varia: pileo, cervice, gula, pectore, abdomineque medio, nigris: genis, linea nuchali, uropygioque albis: rostro exili, albido.*

* 4. *P. leucotis*, Smith. (P. leuötis var. meridionalis, Sundev.

P. smithi, Bp.) Ill. S. Afr. t. 26, a mas b flem. c jun.
ex Afr. m. Similis praecedenti; sed major, rostro corneo,
valde robustiore: humeris obscuris nec albidis: macula hinc
inде pectorali candida.

5. *ALAUDA frontalis*, Licht. (Pyrrhulauda crucigera, Rüpp.
nec Temm. - P. nigriceps? Gould.) Zool. Beagle, B.
p. 87. Mus. Berol. ex Nubia. Sordide albo-pruinosus; sub-
tus canus loris, vertice, rectricibusque lateralis nigricans:
fronte, genisque albis: rostro validissimo.

6. *ALAUDA grisea*, Scopoli. (gingica, Gm. - Fringilla cru-
cigera, Temm. - Fr. melanoleuca? Vieill. - Pyrrhu-
lauda grisea, Gr.) Sonn. Voy. Ind. II. t. 113. 2. - Lath.
Hist. B. t. 97. - Pl. col. 269. 1. ex Asia m. Malai-
si a. Similis praecedenti; sed magis cinerea; rostro valde
minore: vertice vix fuscenter: fronte tantum albicans.
Quid Pyrgital concolor, Jerdon, Madr. Journ. 1840, xxvi. p. 28.
sp. 178. ex Asia m. ex toto uniformiter grisea subtus
albida; gula et criso albis?

1043. *Gymnoris*, Hodgs. (Xanthodina, p. Sundevall. - Frin-
gilla, p. Gr.)

Asia.

3.

* 1. *FRINGILLA xanthosterna*, Natter. (Tanagra! fringil-
lacea, Cuv.) Mus. Berol. ex Bengal. Cinerea; sub-
tus albida, macula pectorali flavissima: humeris rufis; fascia
alaris alba; rostro elongato, curvo, compresso, nigro.

2. *FRINGILLA flavigularis*, Frenkl. (jugularis, Licht. - Gym-
nornis flavirostris, Hodgs. - G. flavigularis, Blyth. 1844.
Ploceus flavigularis, Gr. apud Laf.) Proc. Zool. Soc.
1831. p. 120. Mus. Berol. ex As. m. et centr. Cine-
rea; subtus albida, macula pectorali flava, obsoleta: fascia
alaris alba; rostro flavidus.

3. *FRINGILLA superciliaris*, Hay, Journ. As. Soc.
Beng. xiv. p. 553. ex Asia m? Similis G. xanthes-
ternae; sed humeris concoloribus; fascia alaris alba angus-
tiore; superciliis albidis conspicuis; pilo genisque brunneis;
dorsu substriato.

1044. **Petronia**, Kaup. (Pyrgita, Keys. et Blas. - Fringilla, p. Gr.) Eur. As. Afr. 4.

a. *Xanthodina*, Sundev. Rostro graciliore Africanae.

*1. **Pyrgita petronella**, Mus. Berol. (despecta, Licht. jun. pullus! - *Xanthodina flavigula*, Sundev. - Pyrgita petronoides, Lafr.) Rev. Zool. 1850. e Afr. m. Major: rufo-fusca; pileo, alis, cauda, taurisque dorsalibus obscurioribus; subtus griseo-cinnamomea; gula, abdomineque albis; macula gulari flava: superciliis latis protractis, alarumque fascia duplice cinnamomeis: rostro gracili, inferne albido.

An a Gymn. superciliari distincta?

*2. **P. dentata**, Bp. (Xanthodina dentata? Sundevall.)

Mus. Paris. ex Nil. alb. Minor: rufo-cinerea, pilo obscuriori; subtus albida, pectore cinerascente: superciliis albidis: macula jugulari flava: rostro brevi, compresso; maxilla dento mediano instructa.

b. *Petronia*, Kaup. Rostro robusto. Europeae vel Africanae.

3. **Fringilla petronia**, L. (*stulta*, bononiensis, et leucura?

Gm. - *Passer sylvestris*, Br. - Coccothraustes petronia, Cuv. - *Petronia rupestris*, Bp. - *P. stulta*, Strickl. - Pyrgita petronia, Keys. et Bl.) Pl. enl. 225. - Gould, Eur. t. 186. ex Eur. As. Afr. s. Major; variegata: rostro magno.

4. **Fringilla brachydactyla**, Hempr. (Petronia brachydactyla, Bp.) Mus. Berol. ex Arabia, Abyssinia.

Vaide minor; rufo-cinerea, minus variegata, fere unicolor: rectricibus apice albis: rostro parvo!

1045. **Chlorospiza**, Bp. (Ligurinus! Koch nec Itatorum, Blyth, nec Briss. - Chloris, Moehring nec L. - Fringilla, p. Gr.) Eur. As. Afr. 5.

1. **Fringilla incerta**, Riso. (olivacea? Rafin. - Chlorospiza incerta, Bp. - Ligurinus incertus, Caban.) Roux, Orn. Provenc. t. 72. bis. fam. - Fann. Ital. t. 38. mas et faem. e Eur. m. Ex rufescente olivacea; subtus albida, pectore ochraceo striato-nebuloso; alarum fascia duplice albida; remigibus flavido-marginatis: cauda unicolori, rectricibus extimus flavido-limbatis: rostro corneo.

Quid Pyrrhula incerta, Degland, Orn. Eur. II. p. 640. capta 17. Sept. 1849. Lilliponate?

2. **LOXIA chloris**, L. (Fringilla chloris, Illig. - Coccothraustes chloris, Pall. - Serinus chloris, Boie. - Ligurinus chloris, Koch. - Chloris flavigaster, Sw. - Linaria! chloris, pinetorum, hortensis et septentrionalis, Brehm.) Pl. enl. 27. 2. - Gould, Eur. t. 200. ex Europa. Olivaceo-viridis: remigibus rectricibusque ad basin flavis.
Specimina meridionalia parum minoru, coloribus rividioribus.

* 3. **FRINGILLA chlorotica**, Licht. ex Ehrenb. (Ligurinus chloroticus, Caban.) Mus. Berol. et Paris. ex As. occ. Similis praecedenti: valde minor: pileo, pectoreque flavis.

4. **FRINGILLA kawariba**, Temm. (Fr. kawariba major, Schlegel.) Pl. col. 588. 1. - Faun. Jap. t. 48. mas et faem. adult. ex Japonia. Major (Long. 5½ poll. Al. 3½ poll. Caud. 2 poll.): pileo nuchaque cinerascentibus; dorso brunneco-flavescente: subtus fuscous, abdomine tantum flavo; crissu albido; rectricibus alarum nigris; remigibus pallido marginatis: speculo alari circumscripto.

5. **FRINGILLA sinica**, L. (sinensis, Br. nec Gm. - chlorion, Temm. - Loxia sinensis? Gm. - Fr. kawariba minor, Schleg. - Ligurinus sinicus, Blyth, Cat. 678.) Pl. enl. 157. 3. - Br. Orn. III. t. 7. 2. - Faun. Japon. t. 49. mas et faem. ex Asia orient. China, Japonia. Mus. Paris. ex Macao. Minor (Long. 4½ poll. Al. 2½. Cauda 1½ poll.) Simillima Chl. kawaribae, sed calde minor, et magis flavescentis, coloribus obscurioribus, vegetioribus.

Quid Ligurinus xanthogrammicus, Blyth, Journ. As. Soc. XIII. p. 956. et xvi. p. 470?

1046. **Chrysomitrīs**, Boie, 1828. (Spinus, Brehm. - Ligurinus, Italorum. - Fringilla, p. Gr.)

Eur. As. Am. 16.

a. Europaea et Asiatica e.

1. **CARDUELIS spinoides**, Vig. 1831. nec Temm. [(Chrysomitrīs spinoides, Blyth, 1844.) Gould, Cent. Himal. B. t. 33. 2. ex Asia centr. Nepal. Nigro-viridis; subtus flavissima: fronte, superciliis, cervice, humeris, alarum fascia duplice, remigum rectricumque lateralium basi, flavis: rostro robustissimo.

Rostro valido, subchlorospizino! est inter Chrysomitr. uti S. sulphuratus inter Serinos! uti P. albicularis inter Poliospizas!

2. FRINGILLA *spinus*, L. (*sinensis*, Gm. sp. 66. nro 20. - *Turin de la Chine*. - *Chinese Siskin*, Lath. ex L. - Fr. *spinoides*, ex Japon. Temm. nec Vig. - *Passer spinus*, Pallas. - *Carduelis spinus*, Steph. - *Linaria spinus*, Leach. - *Serinus! spinus*, Boie, 1822. - *Spinus viridis*, Koch. - Sp. *alnorum*; *medius et betularum*, Brehm. - *Acanthis spinus*, Keys. et Bl. - *Chrysomitrus spinus*, Boie, 1828.) Pl. enl. 485. 3. - Gould, Eur. t. 197. ex Eur. Asia. *Viridi-olivacea*: *uropygio*, *pectoreque flavis*: *abdomine albo*, *lateribus crissisque striatis*: *pileo*, *gulaque nigricantibus*; *remigibus*, *rectricibusque late et obtuse*, *basi flavis*.
- * 3. FRINGILLA *pistacina*, Eversmann, Mus. Berol. ex *Sibiria*. *Minor*: *rufo-olivacea*; *subtus olivaceo-flava*, *pectricibus alarum caudaeque inferioribus elbis*: *aliz*, *caudaeque fuscis*; *pectricibus omnibus*, *remigibus secundariis*, *rectricibusque interne opice albicanibus*.
- b. Americanae.
4. CARDUELIS *stanleyi*, Audubon, Syn. B. N. Am. p. 118. Am. B. 2da edit. t. 185, fem. ex Amer. occ. Califormia super. *Olivacea*; *subtus albo-virescens*: *alarum fascia duplo*, *altera lata flavissima*. Species aberrans *rostro valido ad Chr. spinoidem accedens!*
5. FRINGILLA *pinus*, Wils. (*Linaria! pinus*, Aud. - *Carduelis pinus*, Bp.) Am. Orn. t. 57. 1. - Aud. Am. t. 180. ex *Boreal. Am. s.* *Rufo-cinerea*, *subtus albida*, *unidique nigricante striata*: *remigibus*, *rectricibusque a basi fuscis*, *albido-limbatis*: *rostro exiti*, *presso*, *acutissimo*.
- * 6. C. *macroptera*, Dubus, Esq. Orn. t. 23. ex *Guatimala*, *Mexico*. *Simillima* praecedenti; *sod aliis valde elongatis*, *amplioribus*, *remigibus latioribus*: *pedibus longioribus*, *robustioribus*: *speculo alari*, *rectricum quo basi aureo-flavis*.
7. CARDUELIS *atratia*, Orb. (Fringilla atrata, Gr.) Voy. Am. m. t. 48. 2. ex *Am. m.* *Nigra*; *speculo alarum duplice maximo*, *abdomine*, *lateribus*, *rectribusquo ad basin latissime flavis*.

8. CARDUELIS *mexicanus*, Sw. 1827. Wagl. (columbianus? Lafr. 1843. - Ligurinus mexicanus niger, Br. ex Cocoxous, Hernand. - Fringilla catolot? Gm. Cacatotot? Fr. melanoxantha, Licht. Gr.) Aud. Am. t. 427. ex Mexico etiam s. Nigra. (Faem. olivacea); subtus flavus: remigibus ad basin, rectricibusque lateribus albis.

Quid Ligurinus mexicanus, Br. ex Acatechichicli, Hernand. 184. ed. Quarto?

N. B. Pl. enl. 386. t. et Edw. B. t. 44. ex quibus Passer mexicanus, Br. (Mexican Bunting, Lath. - Loxia et Emberiza minima vero Fringilla mexicana, L.) ad Euphizam capite flavo in mari americano captum spectant!

9. FRINGILLA *magellanica*, Vieill. (icterica, Licht. - campestris? Spix.) Ois. Chant. t. 30. - Aud. Am. t. 394. 2? Ac. Bras. t. 63. 3. ex Am. m. vix sept. nec Europ. San Paulo, Brasil. Long. 4½ poll. viridi-olivaceus; capite et gutture nigris; cervice, uropygii, pectore, abdomineque luteis: remigibus, rectricibusque ad basin aureis: tectricibus alarum, remigibusque tertiaris flavo-marginatis.

Rostrum nigrum, acuminatum, quam in Chr. spino robustius!

N. B. Fr. magellanica vel campestris, Reichenb. genus Sporagra! constitutus est Plocce in a species!!

10. CARDUELIS *notata*, Dubus. (Fringilla magellanica ex Mexico, Mus. Berol. - Chrysomitis notata, Bp.) Bull. Ac. Brux. et Rev. Zool. 1848. ex Mex. Simillima Chr. magellano Am. m. sed rostro valde longiore, graciliore, acuminate: coloribus vegetioribus; dorso nigro-vario: pectore medio, simul cum gutture, nigerrimo: tectricibus alarum remigibusque omnino nigris: speculo alari maximo, aureo-flavo.

11. FRINGILLA *psaltria*, Say. (Carduelis psaltria, Aliq. Chrysomitis psaltria, Bp.) Am. Orn. t. 6. 3. mas. - Aud. Am. t. 400. ex Am. s. occ. Mexico. Olivacea; subtus flava: pileo, aliis albo-variis, caudaque nigris: rectricibus tribus extimis pagonii interni medio aliis.

*12? C. *nana*, Bp. Mus. Paris. ex Columbia. Faem. minima ex olivaceo cinereo-virens, subtus flavescentes: aliis, caudaque fuscis.

- *13. **FRINGILLA SPINESCENS**, *Licht. Mus. Berol.*, ex S. t. Fe
de Bogota. *Viridi-olivacea*; *subtus cum genis et gula*
viridi-flava; *pileo, alis, caudaque nigris; tectricibus alarum*
viridi-marginatis; remigibus latissimo, rectricibusque basi
recte aurois; tertiaris marginibus externis albidis.
Simillima Chrys. spino, sed minor; pileo, alis, caudaque apice
migroribus; subtus ex toto magis flava, mento concolore (mi-
nime nigro, nec abdomine albo criso striato).
- *14. **C. marginalis**, *Bp.* (*Fringilla spinus var. δ. nec γ.*
Gm. - Fr. noveboracensis! Licht. Mus. Berol. et Paris.
ex Chilli. Major: olivaceo-viridis; subtus viridi-flava;
pileo, gulaque nigris: remigibus, rectricibusque fuscis, al-
bido-limbatis: rostro brevi, robusto.
Simillima Chr. spino, sed major, pileo et gula magis nigritate
saepe, nec supercilis postice, flava: rectricibus a basi fera
fusca: rostro valde robustiore ad Serinos accedens!
15. **FRINGILLA MEXICANA**, *Aud. 1835. nec Auct. (garrelli,*
Aud. 1845.) Am. t. 433. 4. 5. ex Amer. s. occ. Si-
millima Chrys. tristis; sed fasciis alarum flavissimis.
16. **FRINGILLA TRISTIS**, *L.* (Fr. spinus var. γ. Gm. - Car-
duelis americana, *Briss.* - Chardonneret jaune adult,
nupt. temp. et Tarin de la Nouvelle York autumn. *Buff.*
Fringilla tristis sp. 17. et Fringilla sp. 18. Gr. - Carduelis
tristis, Aliq. - Chrysomitris tristis, Bp.) Pl. enl. 202.
mas ad. nupt. temp. et t. 292. 1. 2. autumnal. - Catesby,
Carol. t. 43. - Edw. B. t. 274. - Wils. Am. Orn.
t. 1. 2. mas. - Bp. Am. Orn. t. 6. 4. faem. 5. var. - Aud.
Am. t. 274. - Hahn, Ausl. Vög. Am. t. 5 mas. ex
Am. s. Flava; pileo, alis, caudaque nigris: fasciis ala-
rum albis.
Faem. et Juv. olivacea, capite concolore; abdome albo.
Media quasi inter Chrysomitr. et Carduelis!
Quid Carduelis lawrencii, Cassin, ex Texas?
- *1047. **Pyrrhomitris**, *Bp.* (*Chrysomitr. rubrae, Auct. - Frin-*
gilla, p. Gr.) America. 1.
- CARDUELIS CUCULLATA**, *Sv.* (*Fringilla cubae, Gervais.*
cucullata, *Gr.* - *Chrysomitris cucullata, Caban.*) *Zool.*
Ill. t. 7. - Mag. Zool. 1834. Ois. t. 44. ex Antill.
Am. m. Cumana. Rubro-aurantia; capite, gutture,
alis, caudaque nigris: tectricibus alarum ad apicem, remigi-
bis ad basin, transverse aurantiacis.

1048. **Carduelis**, Briss. (Acanthis, p. Meyer. - Fringilla, p. Gr.) Eur. As. Afr. 3.

1. **FRINGILLA CARDUELIS**, L. (albo-ochracea, Jacquin var. ochracea, Gm. var. - Passer carduelis, Pall. - Spinus carduelis, Koch. - Acanthis carduelis, Keys. et Blas. C. germanicus et septentrionalis, Brehm. - **C. elegans**, Steph. Bp. - C. auratus, Eyton.) Pl. enl. 4. t. et 2. var. Gould, Eur. t. 196. ex Eur. As. occ. Afr. s. Albus; dorso et pectore lateribus cinereo-rufescens: facie coccinea: vittae utrinque cervicali, alis, caudaque nigrae: remigibus basi latissime aureis, apice albis: rectricibus mediis apice albis, lateralibus macula mediana alba.
2. **FRINGILLA ORIENTALIS**, Eversmann. (subulata, Illig. Mus. Berol. - Passer carduelis var. Pall. - Carduelis orientalis, Bp. - C. subulatus, Caban.) Addit. Zool. Ross. Asiat. II. t. 9. ex Sibiria occ. Similis praecedenti, sed major: rostro crasso, longo, subulato: coloribus valde pallidioribus: facie minus rubra: pilo, cervice, genique dorso concoloribus, absque nigro et albo.
3. **C. caniceps**, Vig. 1830. - Gould, Cent. Himal. B. t. 33. - Royle's Ill. Himal. Bot. t. 8. 2. ex Asia centr. Simillimus praecedent. sed valde minor et magis fuscocens: rostro etiam crassiore et productiore.

Quid species nondum descriptae ex Asia orientali?

1049. **Hypoloxias**, Licht. (Loxops, Caban. - Loxops, Reich.

ex fig. Vieill. - Byrseus, Reich. ex specimine. - Carduelis, p. Vieill. - Linaria! p. Gould. - Fringilla, p. Gr.) Oceania.

1.

FRINGILLA COCCINEA, Gm. (brevirostris! Gr. nec Gould. Carduelis coccinea, Vieill. - Linaria coccinea, Gould. Loxops coccinea, Caban. - Hypoloxias coccinea, Licht. Byrseus coccineus, Reich.) Ois. Chant. t. 31. rostro malo, Gould, Voy. Sulphur nec Beagle Av. fig. ex Ins. Sandwich.

Mas testaceo-coccinea.

* Faem. virens, subtus rubescens.

*1050. **Alario**, Bp. (*Serini rubri*, *Auct.* - *Fringilla*, p. *Licht.*
Loxia, p. *Gm.* - *Crithagra*, p. *Sie.* - *Pyrrhula*, p. *Temm.*
Spermophila, p. *Gr.*)

Africa. 1.

FRINGILLA alario, L. (*Fringilla personata*, *Licht.* - *Pas-*
serculus capitis bonae spei, *Br.* - *Loxia aurantia*, *Gm.*
Crithagra bistrigata, *Sie.* adult. - *C. ruficauda*, *Sie.* juv.
Pyrrhula brachyptera? *Temm.* - *Spermophila nigro-*
aurantia, *Gr. ex Bodd.* *Pl. enl.* 204. 2. - *Br. Orn.* III.
t. 5. 2. - Alb. Av. III. *t. 67. ex Afr. m.* *Rufo-casta-*
nus; subtus cum semitorquo albus: capite, pectori, remigi-
busque nigris: rectricibus rufis, rachidisbus nigris.

Quid Spermophila daubentonii, *Gr. Pl. enl.* 204. 1. *ex Ins.*
Madagascar?

*1051. **Auripasser**, Bp. (*Fringilla*, p. *Gr.* - *Passer et Serinus*,
p. Auct.) Genus inter *Passeres et Serinos me-*
dium! facie aliquantulum *Ploceina!*

Africa. 2.

1. **FRINGILLA lutea**, *Licht.* 1820. (*Serinus luteus*, *Mus.*
Senkenb. - *Pyrgita lutea*, *Mus. Berol.*) *Pl. col.* 365. 1.
ex Dongola, Nubia. *Flavidus: dorso, aliisque casta-*
neis; rectricibus alarum minoribus griseo-flavidis; mediis ni-
gris: remigibus, rectricibusque nigricantibus albido-margi-
natis: rostro, pedibusque pallidiis.

*2. **FRINGILLA eucalypha**, *Licht. Mus. Berol.* *ex Abyss.*
Arabia. *Flavissimus (Faem. luteo-cinnamomea): alis,*
caudaque albidis: remigibus, rectricibusque medio latissime
nigricantibus: rostro nigro: pedibus carneis.

*1052. **Poliospiza**, Schiff. (*Tephrospiza*? *Reich.* - *Serinus*,
p. Rüpp. - *Fringilla*, p. *Gr.*) *Ptilosa laxa.*

Africa. 4.

1. **SERINUS tristriatus**, Rüpp. (*Fringilla tristriata*, *Gr.*)
Faun. Abyss. t. 35. 2. *ex Afr. or.* *Fusco-cinerea;*
subtus flavido-grisea superciliis albidis.

2. **LINARIA gularis**, Smith. (*Moineau des buissons*, *Less.*
Tr. Orn. p. 439. sp. 6. - *Fringilla gularis*, *Gr.* - *Serinus*
gularis, *Auct.* - *Tephrospiza cinerea*, *Reichenb. ex Sc.*)
Rep. S. Afr. Exp. p. 49. *ex Afr. m.* *Fusco-cinerea;*
uropygo concolore; subtus cinereo-rufescens: superciliis, gu-
laque albidis.

3. LINARIA *atrigularis*, Smith. (Fringilla uropygialis, Licht. 1842. - Fr. atrogularis, Gr. - Citrinella uropygialis, Mercatorum.) Report S. Afr. Exped. p. 49. ex Afr. m. Cinerea, plumis mediofuscis, uropygio sulphureo; subtus albo-ferruginea; gula nigra.
 * Faun. (Long. 4½ poll.) Cineroso-rufescens, nigricante striata, uropygio auroeo: subtus ex rufo alba, abdomine medio lutescente, lateribus fuso-striatis: remigibus, rectricibusque albido, praecipue ad apicem, marginatis: rostro gracili, recto.
4. SERINUS *xanthopygius*, Rüpp. (Fringilla xanthopygia, Gr. - Fr. uropygialis? Hempr. et Ehr. ex Arabia or. nec Licht. - Citrinella uropygialis, Musaeorum.) Faun. Abyssin. t. 35. 1. ex Afr. or. Pallide cinerea; subtus albida, abdomine crissoque candidis: rostro crasso, subincurvo: pedibus robustis, digito medio longissimo.

1053. CITRINELLA, Bp. 1837. (Spinus, Koch. - Dryospiza, Keys. et Bl. 1840. - Serinus, Caban. 1847. - Fringilla, p. Gr.) Africa, Eur. m. 4.

1. LOXIA! *totta*, Gm. (Linaria totta, Smith. - Citrinella apicalis, in titteris, hinc C. totta, Bp.) Sparm. Mus. Carls. t. 18. ex Afr. m. Sulphureo-viridis, capite obscurò fuso-striato; dorso brunnescente: remigibus, rectricibusque nigricantibus, apice albo.
2. FRINGILLA *nigriceps*, Rüpp. (Serinus nigriceps, Aliq.) Faun. Abyss. t. 34. 2. ex Afr. or. Flavo-viridis; capite, alis, caudaque nigricantibus: remigibus, rectricibusque albido-marginatis; rectricibus claram minoribus ex toto, mediis et majoribus apice latissime, flavis.
3. FRINGILLA CITRINELLA, L. (*alpina*, Scopoli. - brumalis? Bechst. - Serinus citrinella, Boie. - Chlorospiza citrinella, Keys. et Bl. - Cannabina! citrinella, Degland. Citrinella serinus hinc C. alpina, Bp.) Pl. ent. 658. 2. Gould, Eur. t. 108. ex Eur. orient. in montosis. Viridis; cervice, juguloque cinereis; facie, uropygio, abdomineque viridi-flavis: fascia claram duplice flava.
4. SERINUS *citrinelloides*, Rüpp. (Fringilla citrinelloides, Gr.) Faun. Abyss. t. 34. 1. ex Afr. orient. Similis praecedenti sed magis flavescens, et jugulo corvicoque concoloribus.

1054. **Crithagra**, Sw. p. (Sycalis, Caban. ex Boie, 1848. - Fringilla, p. Gr.) Ad Spizinas accedens! Serinis autem nimium affinis!!

Amer. mer. 8.

1. **EMBERIZA! brasiliensis**, Gm. (Fringilla brasiliensis,

Spix, Wied. Licht. Gr. - Passerina flava, Vieill. - Linaria aurifrons, Less. Chardonneret à front d'or.) *Pl. enl.* 321. i. - *Av. Bras.* t. 61. 1. mas. 2. faem. - *Edw. B.* t. 351. i. - *Gosse*, Jam. Ill. t. 61. ex Brasil. *Vi-*
ridi-flava; *dorsus fuscus-substriatus*: *subtus cum genis flavissi-*
ma: *sincipite aureo-aurantio*: *remigibus, rectricibusque fus-*
cis viridi-marginatis: *remigum prima quartam vix superante*.

2. **FRINGILLA flaveola**, L. (Saffron-fronted Finch, Lath.)

Gm. Syst. Nat. t. p. 913. sp. 24. ex Am. mer. Flava;
fronte fulva: remigibus, rectricibusque nigris flavo-margi-
natis.

Avis brasiliana cum hybrida Serini canarii haud confundenda!

3. **FRINGILLA luteiventris**, Moyen. (Serinus ex Peru, Blyth,

Cat. Calc. Mus. sp. 680? - *Serinus luteiventris*, Mus.
Senk. - *Sycalis luteiventris*, Mus. Berol. - *Crithagra luteiventris*, Bp. Mus. Paris.) *Act. Nat. Curios. Bonn.*
xvi. *Suppl.* t. 12. 3. ex Chile. *Cinereo-virens*; *subtus viridi-flava*: *remigum prima quarta valde longiore*.

* 4. **Cr. hilaris**, Bp. Mus. Paris. ex Brasil. *Similis Cr. luteiventri*.

5. **EMBERIZA luteocephala**, Orb. Voy. Am. m. t. 44. 2.
Mus. Paris. ex Am. m. *Cinerea*: *sincipite, genis, gula, abdome medio, crasso, humeris, marginibusque remigum et rectricum ad basin flavissimis*: *rostro breve, crasso, compresso*.

* 6. **Cr. pentlandi**, Bp. Mus. Paris. ex Am. m. *Similis* praecedenti, sed *pilo toto nuchaque et uropygio viridilius, vitta oculari cinerea, abdomineque latissime flava*.

* 7. **Cr. chloropsis**, Bp. Mus. Paris. ex Bolivia. *Vi-*
ridi-flava; *subtus flavissima*: *remigibus, rectricibusque fus-*
cis, margine virescentibus: *rostro valido, recto, acuto*.

8. **FRINGILLA xanthorrhoa**, Bp. Journ. Acad. Nat. Sc.
Philad. 1825. iv. p. 450. ex Brasil. *Cinerea*; *subtus albida*: *uropygio flavo*: *remigibus virescente-marginatis*; *rec-*
tricibus apice albis.

* 1055. **Buserinus**, Bp. (Loxia, p. L. - Crithagra, p. Gr. Caban.

Serinus, p. Auct.) Rostrum coccothraustaceum. Africa.

2.

1. **LOXIA sulphurata**, L. (Fringilla sulphurata, Ill. - Critagras sulphurata, Sw. Caban. - Serinus sulphuratus, Boie. - Coccothraustes capitae bonae spei, Briss.) Orn. ill. t. 11. 2. - Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 109. 1. ex Afr. m. Viridis; subtus et in superciliis flavus: pectore, genisque olivaceous.

2. **LOXIA GULARIS**, Less. (Crithagra *albigularis* hinc selbyi, Smith. - Cr. cinerea, Sw, nec Reichenb. - Cr. sulphurata, p. et Cr. selbyi, Gr. - Cr. sulphurata jun. Jard. et Selb. Serinus albigularis, Bp.) Ill. Orn. t. 109, 2. Mus. Paris. ex Afr. m. Fusco-cinereus, nigricante striatus; uropygio virescente: subtus cinerascens, gula alba.

1056. **Serinus**, Boie, 1822. ex Cuv. (Crithagra! Sw. - Dryos-

piza!! et Crithagra, p. Caban. - Crithagra et Fringilla,

p. Gr.)

Afr. As Eur. m. 9.

a. Africani.

1. **PYRRHULA! striolata**, Rüpp. (Carpodacus! striolatus, Gr.) Faun. Abyss. t. 37, 1. faem. aut juv. quidquid Ruppelius dicat! ex Afr. r. Rostro brevi, subpyrrhaliceo, pallide corneo.

* *Mas adult. vires, albido nigroque varius; subtus flavidus, pectore lateribusque nigro-striolatis: superciliis latissimis, brevibus, flavidis: remigibus rectricibusque conspicue flavo-viridi externe limbatis.*

Faem. et juv. fuscus, plumis rufo-cinereo marginatis; subtus et in superciliis albus: pectore lateribusque nigricante guttulatis: remigibus rectricibusque limbo tenui flavo-viridissimo.

2. **FRINGILLA butyracea**, L. (lineolata, Licht. jun. - Loxia flaviventris, Gm. - Coccothraustes flava capitae bonae spei, Briss. - Chloris indica, Edw. - Pyrrhula viridis? Less. Crithagra flava, Sw. adult. - Cr. strigilata, Sw. jun. - Cr. butyracea, Gr. - Serinus butyraceus, Bp.) Pl. enl. 341. 1. fig. mala. - Edw. B. t. 84. ex Afr. m. Major: flavo-vires, dorso nigro-striato; subtus et in fronte et superciliis flavissimum: remigibus, rectricibusque fascis immaculatis, limbo externo virescente.
- Jun. viridi-olivaceus, abdomine flavissimo, undique nigro-striatus: remigibus, rectricibusque fuscis viridi-limbatis: rostro pedibusque carnis.

3. LOXIA! BUTYRACEA, L. (Fringilla canaria var. β . Gm. - Fr. **icteria**, Vieill. ex Buff; nec icterica, Caban. Licht. - Coccothraustes! butyracea, Vieill. ex L. - Crithagra chrysopyga, Sw. - Serinus chrysopygus, Aliq. - S. icterus, Bp.) Pl. enl. 304. 1. 2. mas et faem. - Sw. B. of west. Afr. t. 17. ex Ins. Mauritiis, Madag. Mozamb. Minor: cinereo-virens, nigro-striatus: capistro, superciliis, genis, corporeque subtus flavis; rectricibus apice albidis.
4. CRITHAGRA **canicollis**, Sw. (Loxia flavigaster, var. β . Gm. - L. flavigaster var. A. Lath. - Serinus flavigaster, Mus. Senkenb. - S. canicollis, Bp.) Two Cent. p. 317. sp. 110. ex Afr. m. Flavo-viridis, fronte flavo; occipite cerviceque caeruleo-roseo-canis: alis extus, remigibus interne, nigris: rectricibus flavo-marginatis.
5. FRINGILLA **canaria**, L. (Crithagra! canaria, Sw. Caban.) Webb et Berthol. Voy. Canar. Ois. t. 2. ex Ins. Madera. Rufo-cinereus nigricante maculatus; subtus cum facie, superciliis, humeris, uropygioque viridi-flavis; lateribus nigro-striatus; criso alido. Var. flava ubique culta hybrida parit cum Cardueli aurato, Linota cannabina, Chrysomitri spino, etc. Quid Crithagra angolensis, Gr. ex Gm. Edw. B. t. 129? Quid Crithagra leucopygia, Sundevall, ex Sennaeur? b. Asiatici.
- * 6. FRINGILLA **leucopygos**, Lichi. Mus. Berol. ex As. m. an adult? Cinereus; subtus albidus, maculis fuscouscentibus; uropygio albido. N. B. Crithagra hypoxantha, Gr. ex Sparrm. Mus. Carls. t. 71. est Plocens.
- * 7. FRINGILLA **syriaca**, Hempr. et Erh. (Serinus syriacus, Bp.) Mus. Berol. ex As. occ. Biseckerra. Similis S. meridionali, rix major, sed coloribus dilutioribus, et alis praecipue magis flavescentibus: rectricibus lateralibus dimidiatis interne albidis. c. Europei.
8. FRINGILLA SERINUS, L. (islandica! Faber. - Loxia serinus, Brunn. - Pyrrhula! serinus, Degland. - Serinus flavescens, Gould. - S. **meridionalis** et islandicus, Bp. S. bramalis! Strickl. - S. hortulanus, Koch. - Dryosperma serinus, Caban.) Pl. enl. 658. 1. - Bp. Faun. It. t. 5. 1. mas 2. faem. - Rouz, Orn. Prov. t. 94. 1. mas 2. faem. Gould, Eur. t. 195. ex Eur. m. As. occ. Afr. s. Minor: virens, fuso-maculatus: fronte, superciliis, torque cervicali, uropygio, gula, pectore, abdomineque flavissimis: ateribus fuso-striatis, crissaque albis: alarum fascia duplicita flavida.

9. **PASSER pusillus**, Pall. (Fringilla pusilla, Gr. - Pyrrhula pusilla, Degland. - Serinus pusillus, Brandt. - Emberiza! hinc Serinus aurifrons, Blyth.) *Zoogr. Ross.*

As. II. p. 28. cum fig. mala. ex Eur. or. *Asia occ.*
Caucas. *Altai,* *Himataya.* *Cinereus,* *plumis*
nigricantibus, *marginibus* *flavo alboque varitis;* *subtus*
albidus *flavo indutus,* *lateribus* *criosoque fusco-striatis:* *pileo,*
gulaque *nigricantibus;* *fronte* *aureo-rubra.*

Ad *Pyrrhulaceum* *genus* *Catamblyrhynchus* *accedens,*
etiam *macula* *frontali!*

1057. **Catamblyrhynchus**, Lafr. (Bustamantia, Bp.) America m. 1.

C. diadema, Lafr. (Bustamantia capitorea, Bp.) *Mag.*

Zool. 1843. t. 34. - *Gr. et Mitch. Gen. B. t. 93.* ex
A m. m. S. ta Fe de Bogota. *Fusco-plumbeus;* *subtus*
brunneocastaneus: *occipite nuchaque nigricantibus:* *syncipite*
flavo-holosericeo.

1058. **Pyrrhoplectes**, Hodgs. 1845. (*Pyrrhuloides*, *Blyth.*)

Pyrrhula, p. Gr.) Rostrum elongatum, vix turgescens; maxilla apice, mandibula medio, emarginatis; tomiis inflexis: nares basales, plumulis reflexis tectae: alae breves, rotundatae, remigibus secunda, tertia et quarta longissimis: cauda aequalis (minime emarginata): pedes elongati; digitis lateralis aequalibus; ungibus anticus recutieculis. *Ad* *Emberizas* *nec non ad Plocei-*

d a s *accedens!*

Asia centr. 1.

Pyrrhula epaulettta, Hodgs. 1836. (*Pyrrhoplectes epaulettta*, *Hodgs. 1843.* - *Pyrrhuloides epaulettta*, *Blyth, 1844.*) *As. Research. xix. p. 155.* ex *Nepal.*

Mas *nigricans,* *remigibus tertiaris interno albis;* *vertice,* *oc-*
cipite, *plumisque axillaribus flavo-sericeis.*

Facem. *rufo-brunnea,* *al's* *abdomineque dilutioribus:* *fronte collo-*
que cinereis: *macula* *verticis* *dilatata luteo-virecente:* *pla-*
mis *axillaribus* *flavidis.*

1059. **Pyrrhula**, Briss.

Eur. As. s. 5.

1. **Loxia pyrrhula**, L. (Emberiza *coccinea*, Sandb.

Pyrrhula major, Brehm. - *P. coccinea*, Selys. - *P. vulgaris major*, Schlegel.) *Graba*, Vog. Sept. figura optima. ex Eur. s. et centr. As. s. et iam or. Major: alis longioribus (2½ poll.); remigium prima quartam aequante: cano; subtus rubra (faem. cinereo-rubescens); pileo, alis, caudaque nigris: uropygio ventreque albis: fascia alarum albo cinerea.

2. **Loxia pyrrhula**, Lath. (Fringilla pyrrhula, Temm. 1815.

Pyrrhula rubicilla, Pall. - *P. europea*, Leach. *P. vulgaris*, Ray. Br. - *P. rufa*, Koch. - *P. pileata*, Macgill. - *P. germanica et peregrina*, Brehm. - *P. vulgaris minor*, Schleg. Pl. enl. 145. - Gould, Eur. t. 209. ex Eur. m. et occ. Media: alis brevioribus (bi-pollic.) ; remigium prima quintam aequante: canus subtus rubra (faem. cinereo-rubescens); pileo, alis caudaque nigris: uropygio ventreque albis; fascia alarum albo-cinerea.

3. **P. orientalis**, Temm. et Schleg. (griseiventris, Lafr.

1841. - *Spermophilus*! griseiventris, Gr.) Faun. Japon. t. 53. mas adult. aest. et hyem. et faem. ex Japon. Media: dorso cano; pileo alis, caudaque nigris: uropygio albo: subtus cinereus (vix rubro tincta nuptiarum tempore), gula tantum rubra (faem. vix rubescente); fascia alarum cinerea, nec albida: prima remigium secundariarum ex toto nigra.

4. **P. erythrocephala**, Vig. Pr. Zool. Soc. 1831. p. 174.

Gould, Cent. Himal. B. t. 32. ex Nepal s. Minor: pilo cerviceque rubris.

Faem. pileo flavo-rufescente.

5. **P. nepalensis**, Hodgs. 1836. As. Research. xix. p.

155. Mus. Senk. ex Nepal s. Major: fuscocardiaca; tergo, alis, caudaque emarginata nigro-coracinis: capistro cinerascente; macula suboculari, fascia uropygiali, abdomine, crissoque albis.

Mas remigibus tertiaris pogonio externo rubris.

Faem. remigibus tertiaris pogonio externo flavis.

SUBFAM. 137. LOXIINAE.

A. Loxiaceae.

* 1060. **Chaunoproctus**, Bp. et Schleg. ex Aristoph. (Papa, Bp., in litt. Reichenb. - Pyrenestes, p. Gr. - Mycerobas, p. Cabanis.) Anomalum! Ins. Bonin. 1.

FRINGILLA papa, Kittl. (Coccothraustes ferreirostris, Vig.

Papa ferreirostris, Bp. in litt. - Mycerobas papa, Caban. Chaunoproctus papa, Bp. et Schleg.) Nov. Act. Petersb. 1830. t. 15. - Kupferfaf. t. 32. 2. mas. - Beachey, Voy. Zool. t. 8. - Monogr. Loxiinar. t. 37, mas. t. 38. faem. fig. eximiae. ex Ins. Bonin Japoniae. Brunneonigrans; plumis margine sublivaceo; fronte, superciliis, gulaque rubris; subtus olivaceo-griseus; collari lato, obsoleto, fuscenscente; pectore rubro induto.

Faem. rubro colore destituta.

1061. **Haematospiza**, Blyth, 1844. (Propyrrhula, p. Hodgs.

Strobilophaga, p. Gr.) Rostrum robustum, emarginatum! Asia centr. 1.

CORYTHUS sipahi, Hodgs. (Loxia indica? Gm. nec Lath.

L. fulgens, Less. - Pitylus coccineus? Cuv. - Propyrrhula sipahi, Gr. - Strobilophaga sipahi, Hodgs. - Haematospiza boetonensis! Blyth, nec Lath. - H. sipahi, Bp.) Journ. As. Soc. Beng. 1844. p. 951. fig. 9. - Bp. et Schleg. Monogr. Loxiinar. t. 39. mas et t. 40. faem. ex Asia centr. Nepal.

Mas coccineus: alis, caudaque fuscis; remigibus rubro-indutis: rostro flavo.

Faem. olivacea, subtus canescens; plumis singulis fuscis-lunulatis: uropygio flavo-aurantiacus.

1062. **Loxia**, Briss. (Carvirostra, Scopoli. - Crucirostra, Cuv.) Eur. As. Am. s. 7.

a. Orbis antiqui.

1. **L. pityopsittacus**, Bechst. (L. curvirostra major, Gm.

Crucirostra pinetorum, Meyer. - subpitopitaculus,

Brehm.) Gould, Eur. t. 201. - Naum. Vog. t. 109.

Bp. et Schleg. Monogr. Loxiinar. t. 1, mas et faem. adult. ex Eur. et As. s. Maxima: rostro validissimo, uncis brevibus.

Mas rubra (jan. flava). Faem. et juv. cinereo-virens, subtus albida, plurimis omnibus fusco-striatis, uropygio flavescente.

2. **L. curvirostra**, L. (crucirostra, Pall. - Cr. abietum, Meyer. - major, Brehm.) Pl. enl. 218. - Gould, Eur. t. 202. - Naum. Vog. t. 110. - Bp. et Schleg. Mon. Loxiin. t. 2. mas ad. t. 3. faem. et juv. t. 4. mas ad. japon. ex Eur. et As. s. et occ. Media: rostro minus valido, uncis productis. Mas rubra (jvn. flava). Faem. et juv. cinereo-virens, subtus albida, plumis singulis fusco-striatis; uropygios flavescens.
- *3. **L. rubrifasciata**, Brehm. (L. curvirostra rubrifasciata, Schlegel.) Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin. t. 5. mas ad. et jun. Mus. Lugd. ex Eur. or. Simillima praecedenti; sed alarum fascia duplice rubescente.
4. **CRUCIROSTRA bifasciata**, Brehm, 1827. (taenioptera, Brehm. - leucoptera, Brandt. - Loxia taenioptera, Gloger, 1828. ex parte. - Loxia bifasciata, Selys.) Nilss. Illum. fig. Skand. Faun. Av. t. 20. - Faun. Belg. t. 4. 2. nec Gould. - Bp. et Schleg. Monogr. Lox. t. 8. mas et faem. adult. ex As. s. Eur. s. et or. Similis L. curvirostrae; sed aliis digitisque brevioribus, et alarum fascia duplice lata alba: corpore crasso; rostro robusto. Mas coloribus rubro-cinnabarinis.
5. **L. himalayana**, Hodg. (himalayensis, Blyth.) Journ. As. Soc. Beng. 1844. p. 952. fig. 11. et Proc. Zool. Soc. 1845. p. 206. - Bp. et Schleg. Mon. Lox. t. 7. mas ad. et jun. ex Nepa t. Nivicola ex Cashar tantum, et rara. Minima (Long. 5 $\frac{1}{2}$ poll. Rostr. 7 $\frac{1}{2}$. Cauda 2 $\frac{1}{2}$. Alas 3 $\frac{1}{2}$. ultra $\frac{1}{2}$ caudae protractae. Tarsus $\frac{3}{4}$. Digit. med. et ung. 1 $\frac{1}{2}$ poll. $\frac{1}{2}$): a sequenti vix distincta: aliis brevioribus. Mas fusco-cinerea, rubro induita: capite magna ex parte, collo, corporeque subtus ex roseo luride sanguineis. Faem. minor; fusco-cinerea, flavo-virescente lavatim induita; subtus griseo-virescens, plumis medio longitudinaliter nigritibus.
- b. Americae septentrionalis.
6. **L. americana**, Wils. (fusca? Vieill. - pusilla, Illig. curvirostra, Audubon.) Am. Orn. t. 31. 1. 2. - Aud. Am. t. 197. - Bp. et Schleg. Mon. Lox. t. 6. mas et faem. adult. ex Amer. sept. Similis L. curvirostrae, sed minor.
7. **L. leucoptera**, Gm. (falcirostra, Lath.) Dixon, Voy. t. 19. - Wils. Am. Orn. t. 15. 3. et t. 31. 3. - Bp. Am. Orn. t. 16. 2. - Aud. Am. t. 364. - Gould, Eur. t. 203. specim. haud Eur. - Bp. et Schleg. Monogr. Lox. t. 9. mas et faem. adult. t. 10. mas himalayensis? ex Amer. s. Corpore castigato; rostro graciliore, alaris fascia duplice alba, Mas coloribus rubro-puniceis; dorso nigricante!

1063. **Corythus**, Cu v. 1817. (Pinicola hinc Strobilophaga, Vieill.

Propyrrhula, p. Hodgs. - Pinicola et Spermopipes,
Caban. 1849.)

Eur. As. Am. s. 2.

a. *Pinicola*, Vieill. Ad *Loxias* accedens.

1. **LOXIA enucleator**, L. (psittacea, Pall. nec Lath. - flamen, Sparrm. var. - Coccothraustes enucleator, Auct. C. canadensis, Br. - Fringilla enucleator, Meyer. - Pyrrhula enucleator, Temm. - Strobilophaga enucleator, Vieill. - Corythus canadensis, Br. - C. splendens, Brehm. specim. americ. - C. enucleator, Cuv. - Pinicola enucleator et P. americana, Caban.) Pl. enl. 135. t. - Edw. B. t. 123, 124. - Mus. Carls. t. 17. var. accid. - Br. Orn. III. t. 12. 3. - Naum. t. 112. - Wils. Am. Orn. t. 5. 2. mas. - Bp. Am. Orn. Cont. t. 16, 3. faem. - Aud. Am. t. 358. - Richards. Faun. Bor. Am. Av. t. 53. faem. Gould, Eur. t. 204. - Bp. et Schleg. Mon. Lox. t. 11. mas ad. t. 12. faem. ad. ex Eur. s. et alp. As. s. Am. maxime bor. Major: maxilla incurva: alis caudaque nigri: tectricibus alarum et remigibus tertiaris late albomarginatis.

Mas rubro-roseus. Faem. grisea; plumis partis anterioris corporis aurantiaco-marginatis.

Specimina americana et kamtschatkensis vegetiora.

b. *Spermopipes*, Caban. Ad *Carpodacos* accedens.

2. **C. subhimachalus**, Hodgs. (Propyrrhula subhima-chalana, Hodgs. - Strobilophaga subhimachala, Gr. Spermopipes subhimachalus, Caban.) Journ. As. Soc. Bengal. 1844. p. 952. fig. 8. - Bp. et Schleg. Monogr. Loxia. t. 13. mas et faem. adult. ex Asia centr. Minor: rostro vix adunc.

Mas rubro-testaceus; subtus griseo-fuliginosus: fronte, superciliis, gulaque coccineis: pectore roseo, plumarum macula parva, centrali, alba.

Faem. cinereo-virescens; fronte, dorso, juguloque flavo indutis.

1064. **Uragus**, Keys et Bl. 1840. (Pyrrhula, p. Pall. - Corythus, p. Keys. - Uragus, Strobilophaga, Carpodacus et Spermophila, p. Gr.) Rostrum pyrrhulaceum, turgidum: alae breves: cauda longissima, vix emarginata, lateribus valde rotundata. Analogiam cum Paridarum genere Megistura praebet!

Asia s. or. 2.

1. **Loxia sibirica**, Pall. Gm. (Pyrrhula caudata, Pall. Zoogr. - P. longicauda, Vieill. Temm. - Linaria longicauda rosea, Mus. Petr. - Corythus sibiricus, Bp. - C. longicaudus, Aliq. - Uragus sibiricus, Keys. et Bl. - Uragus sibiricus et Spermophila !!! longicauda, Gr.) Zoogr. Ross-As. t. 37. - Falckl. Voy. ill. t. 28. 1. 2. - Gould, Eur. t. 205. - Bp. et Schleg. Mon. Loxiin. t. 34. m. et f. t. 35. mar. adult. Major (Long. 6-poll. Cauda 3½ poll.)

Mas cinereus roseo indutus, plumis medio fuscis: capite roseo-ar genteo; fronto lorisque intenso, uropygia, tectricibus alarum minoribus, pectori, abdomineque rubro-roseis: remigibus, rectricibusque albo-nigris.

Faem. cinereo-lutescens, vix roseo induta.

2. **Pyrrhula sanguinolenta**, Temm. (Carpodacus saquiniolentus! Gr.) Schleg. Faun. Japon. t. 54. adult. t. 54. b. jun. - Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin. t. 36. mares adulti et juv. ex Japonia. Simillimus praeed. sed minor, et coloribus vividiioribus. (Long. 5-poll. Caud. 2½ poll.)

1065. **Pyrrha**, Caban. 1850. (Procarduelis, Hodgs. - Fringilla, p. Gr.) Rostrum parvum, compræssum, fringillaceum! pedes graciles, elongati: alae longae, remigium prima et quarta subaequalibus, vix brevioribus secunda et tertia omnium longissimis: cauda modica emarginata. *Colores obscuri.*

Asia centr. 1.

CARDUELIS NEPALENSIS, Hodgs. 1836. (Procarduelis nepalensis, Hodgs. - Fringilla nepalensis, Gr. - Linota saturata et fusca? Blyth. - Carpodacus saturatus, Bp. - Pyrrha nepalensis, Caban. - P. saturata, Schleg.) As. Res. xix.

p. 157. et Journ. As. Soc. xi. p. 92. et 93. - Cat. Mus.
Calc. sp. 657. - *Bp.* et Schleg. Monogr. *Loxin.* t. 29.
 mas et faem. - *Mus.* Senkenb. et Berol. ex *Himal.*
Nepal. Minor (*Long.* 5 $\frac{1}{2}$. *Alt.* 3' 4''. *Caud.* 2' 6'').
Rostr. 4' 1 $\frac{1}{2}$ long. 3' lat. 2 $\frac{1}{2}$ alt. *Tars.* 10''): roseo-nigri-
 cans; sincipite, superciliis protractis postice subconfluenti-
 bus, gula, abdomine longitudinaliter medio, crissaque intense
 rosaceis; remigibus rectricibus fuscis, marginibus externis
 obscure rosaceis: rostro gracili, compresso, obscuro: pedibus
 obscure carneis.

Faem. ex flavo saturate fusca, sine rubidine, plumis cinnamo-
 mo-limbatis.

1066. **Carpodacus**, Kaup. 1829. (*Erythrina*, 1828. hinc *Ery-*
throthorax, 1831. *Brehm.* - *Lanaria*, *p. Boie.* - *Pyrhula*, *p. Temm.* - *Erythospiza*, *p. Bp.* 1830. - *Haemor-*
rhouss, *Siv.* 1837. - *Propyrrhula*, *p. Propasser*, 1845.
Pyrrhulinota, 1845. *Pyrrhospiza*, *Hodgs.* - *Carpodacus*,
Fringilla, *Pyrrhula et Strobilophaga*, *p. Gr.*) Rostrum
fringillaceum, turgidulum: alae breves, subrotunda-
 te; remigium prima breviore quam secunda; tertia om-
 nium longissima: cauda longula, subaequalis. As. Eur. Am. s. 11.

a. *Pyrhospiza*, *Hodgs.*
 Alae longae: rostrum conico-elongatum.

1. **PROPYRRHULA RUBECULOIDES** nec *rubicilleoides*! *Hodgs.* (*Stro-*
bilophaga caucasica, *Gr. Hodgs. List. Mus. Lugd.* - *Pyr-*
rhospiza punicea, *Blyth. ex Hodgs. Ms.* - *Carpodacus*
puniceus, *Bp.*) *Journ. As. Soc. Beng.* 1844. p. 953. fig. 15.
Bp. et Schleg. Monogr. *Lox.* t. 27. mas. t. 28. faem.
Mus. Lugd. ex *Himal.* *Nepal.* *Thibet.* Major
 (*Long.* 7-poll. *Rostr.* 8'' long. 3'' lat. *Alt.* 4' 1 $\frac{1}{2}$. *Tars.*
 1' 10''): *rostro gracile*, *compresso*, *producto*.
Mas fuliginosus: facie, gula, pectoreque sanguineo-coccineis (co-
 lore rubro, coccineo et restricto), *plumarum rachidis argen-*
teis: uropygio roseo.
Faem. sturninal nigricans; in uropygia subtusque cinereo-
ochracea, pectore fulcescente; plumis striis mediis longitudi-
nalibus latis nigris.

b. *Propasser*, *Hodgs.* Alae breves: rostrum fringillaceum.

2. **FRINGILLA rhodopepla**, *Vig.* 1831. (*Propasser rhodopeplus*, *Hodgs.* 1845. - *Erythrosipa rhodopepla*, *Bp.* *Carpodacus rhodopeplus*, *Gr.*) *Gould*, *Cent. Himal. B.* t. 31, 1, fig. mala. - *Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin.* t. 22, mas et faem. adult. fig. eximia. *ex Asia centr. Nepal.* *in m. or. montosis.* Nivicola uti cengeneros, sed vere in subalpinis imo etiam in planitiae descendens! *Medius* (*Long.* 6 *poll.*) *rostro robusto*, *recto*: *dorsum obscure rubente* (*fere chocolatino*): *genis obscuris*: *subtus*, *cum gula*, *ex toto rubro-lateritus*; *alis bifasciatis et maculatis* (*ob teetricum medium macula apicali rosea*): *cauda brevi*.

Faem. s t u r n i a l nigricans, plumis cinereo-marginali; superciliis postice dilatatis albidi: subtus albo-testacea, plumis singulis medio longitudinaliter nigricantibus (hinc nigro-striata).

3. **FRINGILLA rhodochroa**, *Vig.* 1831. (*Propasser rhodochrous*, *Hodgs.* 1845. - *Erythrosipa rhodochrosa*, *Bp.* *Carpodacus rhodochrous*, *Gr.*) *Gould*, *Cent. Himal. B.* t. 31, 2, fig. pesima. - *Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin.* t. 31, mas et faem. adult. fig. eximia *ex Asia centr. Nepal.* in montosis. *Minor* (*Long. 6-poll.* *Al. 2½.* *Cauda 2½ rostri 4* long. *2½ lat. 3'' alt. Tars. 8½.*) *Rostro gracili*, *malla subareata*: *alis brevibus, immaculatis*.

Mas latus, plumis centro nigrist fronte, superciliis late et vivide, uropygio, corporeque subtus, roseo-argenteis: fasciis alaribus nullis: teetricibus caudae superioribus pure roseis, posticis apice castaneis.

* *Faem. nigricans, plumis singulis late cinereo-flavescente limbatis: subtus cinerascens, lituris brunneis.*

*Quid Propasser pulcherissimus, *Hodgs.* nisi mas nupt. tempore?*

*Quid Carpodacus sp. 659, faemina, *Blyth*, *Cat. Calo. Mus.* p. 122. *ex Asia centr. ultra Simla?**

4. **C. thura**, *Bp.* (*FRINGILLA rhodopepla*, *Mus. Lugg.* *ex Hodgs!* nec *Vig.*) *Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin.* t. 23, mas adult. *ex Himal.* *Medius* (*Long. 6½.* *Al. 3.* *Cauda 2.7.* *Rostr. 5. long. 3'' lat. 3½ lat. Tars. 11'''*) *rostro minus robusto*, *curvo*, *subpyrrhaluceo!* *dorsum brunnescens-olivaceo*: *genis roseis*; *gula argentea*: *subtus ex toto rosaceus*; *alis fascia duplicita* *alba*, *scapularium apicibus concoloribus* (*hinc alis praeter fascias bimaculatas, immaculatas*): *cauda elongata*.

Mas adult. ex rufescenti olivaceo, plumis singulis longitudinaliter medio nigris: fronte, superciliis late, uropygio, corporeque subtus roseo-argenteis: alaris fascia duplicita rosea: teetricibus caudae superioribus et inferioribus roseis, medio nigris.

Thurae, *Ornithophilae suavissimas filiae amicissimi Nilssoni*, *quam qui maximi Linnaei ex eadem stipe nati vestigia vera prementis!*

c. *Carpodacus*. Rostrum robustum, conicum, fringillaceum.

5. **LOXIA rubicilla**, Guldenst. nec *rosea*. (*Coccothraustes caucasicus*, Pall. Eversmann. – *Corythus caucasicus*, Keys. et Bl. ex Auct. – *C. rubicilla*, Brandt, ex specim. *Strobilophaga causica?* Gr. part. – *Carpodacus rubicilla*, Bp.) Nov. Comm. Petrop. xix. t. 12. - Bp. et Schleg. Monogr. *Loxiin.* t. 26. mas. ex Altai, Caucas. Maximus inter congeneres (Long. $7\frac{1}{2}$ poll. Rostr. 8 lin. long. 6 lat. Al. 4 $\frac{1}{2}$ poll. Cauda 3 $\frac{1}{2}$. Tars. 12''): rostro robusto, haud compresso.

Mas cinereo-roseus, pruinosis, uropygio vividiore; sincipite, genis, gulaque roseis (colore rubro, roseo et sparsa), plumis singulis puncto centrali albo; toris late nigricantibus: subtus albo et fuso-roseo undulatus; pectore abdomineque roseo-rubris, plumis medio albis: aliis immaculatis, caudaque fuscis; remigibus, rectricibusque externe roseo-limbatis: tectricibus caudae superioribus et inferioribus roseis.

Faem. minor: pallide cinerea, fuso-striata; subtus cinereo-alba striis fuscis.

6. **C. sophia**, mas et C. *rhodochlamys*, faem. Bp. et Schleg. (*Corythus him* Pyrrhula aut potius *Erythrospiza rhodochlamys?* Brandt.) Bull. Acad. Petersb. 1843. p. 27. Monogr. *Loxiin.* t. 24, mas adult. t. 25, faem. fig. eximia. ex Sibiria occid. Altai. Medius (Long. 7-poll. Rostr. 8'' long. 5'' lat. Al. 3 $\frac{1}{2}$. Caud. 2'' 7''. Tars. 10''): rostro validissimo, recto.

Mas cinereo-roseus, plumis medio fuscis: superciliis, genis, gulaque roseo-argentatis; uropygio, corporeque undique subtus roseis: aliis immaculatis, absque fasciis.

Faem. minor (Long. 6 $\frac{1}{2}$ poll. Rostr. 6'' long. 4'' lat. Al. 3 $\frac{1}{2}$. Caud. 3'. Tars. 10'') cinerea haud fusca, fuso haud nigricante striata; subtus albida minime rufescens, striis fuscis. Modius inter C. rubicillam et C. roseum: rostro valido C. rubicillae: statura et coloribus C. rosei, sed aliis immaculatis et fasciis aliis destitutis.

Mulieri potius quam Reginae haec Avis sacra esto! Reginae libertatis amantissimae, praedita mente illuminata atque gubernandi facultate; Mulieri omni decore muliebri instructae!

Quid Carpodacus crassirostris, Blyth, Journ. As. Soc. Beng. 1847.

7. FRINGILLA *rosea*, Pall. Ill. (Passer roseus, Pall. Zoogr.

Pyrhula rosea, Temm. - *Erythropsiza rosea*, Bp. - *Erythrura albifrons*, Brehm. - *Gourcy-Droitaumont, Isis* 1829. p.725. sp.2. - *Carpodacus roseus*, Kaup. 1829.) Zoogr. Ross. - As. II. t. p. 42. - Gould, Eur. t. 207. - Naum. Vög. Deutschl. t. 113. mas adult. - Bp. et Schleg. Mon. *Loxiin.* t. 19. mas et faem. adult. t. 20. mas senesc. ex Eur. orient. As. centr. et occ. *Medius: fascia alarum duplice albo.*

Mas cinereo-roseus, plumis secus centrum nigris: fronte gulaque plumis acuminateis roseis argenteo-punctatis: uropygio, pectoraque rubro-roseis: alis fascia duplice rosea.
Faem. cinerea, albo nigroque varia, uropygio albido stramineo: subtus alba nigricante guttulata.

d. *Pyrrhulinota*, Hodgs. Minres: cauda modica, emarginata.

8. FRINGILLA *purpurea*, Gm. (*Pyrhula purpurea*, Temm.

Erythropsiza purpurea, Bp. - *Carpodacus purpureus*, Gr.) Catesb. Carol. I. t. 41. - Wils. Am. Orn. t. 7. 4. mas et t. 42. 3. faem. - Aud. Am. t. 4. mas et faem. Bp. et Schleg. Monogr. *Loxiin.* t. 15. mas et faem adult. ex Amer. s. or. err. Europ! *Medius: rostro valido; plumis verticis elongatis, erectilibus: cauda brevi, profunde emarginata.*

Mas rubro-roseus, plumis dorsi purpurascens fusco-striatis, capite uropygiisque viridioribus; gula, pectoraque roseis; abdome albo: remigibus, rectricibusque fusco-cinereis albido-marginalis.

Faem. olivacea nigricante striata: uropygio flavescente: subtus et in loris et superciliis albicans, lituris fuscis.

9. FRINGILLA *frontalis*, Say. (*haemorrhoa*, Wagl. ex

Licht. 1831. - *cruentata*, Less. 1839. - *Pyrhula frontalis*, Bp. 1825. - *Erythropsiza frontalis*, Bp. 1830. - *Carpodacus frontalis*, Gr. - C. rhodocolpus, Caban. 1850. jun. ex Mex. m. Cuernavaca.) Bp. Am. Orn. t. 6. 1. mas 2. faem. - Aud. Am. t. 424. - Bp. et Schleg. Monogr. *Loxiin.* t. 16. mares. t. 17. mas, faem. et var. ex Am. s. occ. Mexico, California. *Minor: cauda longicula, vix emarginata.*

Mas cinereo-fusca, plumis medio vix obscurioribus fronte, superciliis, jugulo, uropygiisque vivide et abrupto coccineis; tectricibus cauda superioribus fuscis: abdome crisoque albis, fusco conspicue striatis.

Faem. sine rubro, ex flavescente cinereo-fusca: subtus albida fusco-striolata.

Juven. praecipue meridionalis minor et roseo colore nec coccineo indutus (fronte, superciliis, gutture, uropygiisque roseis).

1087

10. PYRRHULA *erythrina*, Pall. (Fringilla erythrina, Meyer. - flammula, Reitz, an L? - cristata? Br. - cardinalis, Beske. - rubriceps! Cuv. ex India. - madagascariensis?? L. - Coccothraustes roseus, Vieill. - Loxia rosca, Vieill. - L. erythraea, Endler. - Linaria erythrina, Boie, 1822. - Erythrothorax rubrifrons, Brehm. Erythrosipa erythrina, Bp. Gould. - Carpodacus erythrinus, Kaup. Gr. - Pyrrhulinota rosaecolor, rosea et roseata! Hodgs. mas. - Propasser sordidus, Hodgs. faem.) Nov. Comm. Petrop. iv. t. 23. l. - Zoogr. Ross.-As. n. t. 36. - Meyer. Vög. Liron. et Esthon. tab. frontisp. Vieill. Ois. Chant. t. 65. fig. mala. - Naum. Vög. Deutschl. t. 113. 1. mas 2. faem. - Kittl. Kupf. Vog. t. 31. l. Gonld. Eur. t. 206. - Bp. et Schleg. Monogr. Lozin. t. 14. mas et faem. adult. europaei. ex Eur. or. As. occ. centr. et or. Nepal. Persia. Sibiria. Kamtschatka. Minor: rostro modico: cauda brevi profunde emarginata.

Mas olivaceo-brunneus, plumis medio vix obscuriore (hand striatus!); capite, jugulo, pectori, abdominisque parte roseo-puniceis: ventre albido minime striato: dorso fusco-rubente: alis obsolete bifasciatis (fasciis vix ulla).

Faem. cinereo-olivacea, uropygio cinereo; subtus spurco-albida, pectori obsolete striato: alarum fascia duplice parum conspicua albicante.

Specimina ex Kamtschatka a cl. Kittlitzo allata in Mus. Maguntiae vidimus, rostro latiore, magis incurvo; rubro colore vividiore nec roseo, nec coccineo, tergo magis rubente.

Specimina ex Persia pallidissima!

11. FRINGILLA *sinaaitica*, Licht. (Pyrrhula synoica, Temm.

Erythrosipa sinaitica, Bp. - Carpodacus synoicus, Gr.)

Pl. col. 375. 1. mas. 2. faem. - Bp. et Schleg. Monogr.

Loxin. t. 18. mas. 2. faem. adult. ex Afr. or. Arabia nec Eur. Medius: rostro fringillaceo, abbreviato, vix turgiduo: cauda medica, parum emarginata.

Mas roseo-cinnamomeus; ganis, uropygio, corporeque subtus roseis: plumis frontis acutis: remigibus, rectricibusque fusco-centibus.

Faem. pallide cinnamomea!

* 1067. **Erythrosپiza**, Bp. (Carpodacus, p. Gr. - Pyrrhula, p.

Temm.) Rostrum brevissimum, validum, exacte conicum, mandibulis aequalitis, tomis contractis: alae elongatae, acutae; remigium prima omnium longissima: cauda brevis, parum emarginata.

Afr. s. Eur. m. As. 3.

1. **FRINGILLA obsoleta**, Licht. 1822. (githaginea? Brandt.

Erythrosپiza obsoleta, Bp.) Eversm. Reise, p. 132.
Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin. t. 32. mas adult. ex
Deserto Bokharen si prope fontem calidam Karata
a dictam, Mena Martii. Media (Long. 5) poll. Cauda
2½ poll. Tars. 8-lin.) cinnamomeo-cinerea: remigibus, rec-
tricibusque fuscis albo-marginatis; secundariis, tectricibus
que alarum exterioribus margine roseis alas clausas pulchre
pingantibus: rostro modico, fringillaceo, abbreviato, nigrante:
pedibus pallidis. Rostro nigro ad genus praec-
cedit! accedit!

2. **E. phoenicoptera**, Bp. (Fringilla rhodoptera, Licht.

Mus. Lugd. - Montifringilla! sanguinea, Gould, 1837.)

Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin. t. 30. mas senesc. et
faem. adult. t. 31. mas adult. ex Syria, Persia bor.
in montosis prope Erzroum a medio Maji ad medium
Septembres. Major (Long. ultra 6-poll. Al. 4-poll. Cauda
ultra 2-poll. Rost. 5-lin. Tarsus 8-lin.): cinnamomea, ver-
tice nigricante, genis uropygiisque rubro-indutis: remigibus
nigris; secundariis apice albis, et cum tectricibus externis
marginie sanguineo-roseis; alas clausas perspicue pingentibus:
cauda nigra; tectricibus lateralibus epice extima utrinque
fere tota, albis: rostro ingente, rubro; pedibus sanguineis.
Faem. pileo uropygiisque concoloribus: rostro minus robusto.
Juv. coloribus dilutioribus; cute sanguinea!

3. **FRINGILLA githaginea**, Licht. 1822. (Pyrrhula pay.

raudaei, Audouin. - P. githaginea, Temm. - Carpoda-
cus githagineus, Gr. - C. payraudaei, Caban. - Erythro-
spiza githaginea, Bp.) Exped. Egypt. t. 5. 8. - Pl. col.
400. l. mas. 2. faem. - Roux, Orn. Prov. t. 74. bis. - Bp.
Faun. Ital. t. 35. 3. - Gould, Eur. t. 208. ex Afr. s.
As. occ. Eur. m. Melita Ins. Minor (Long. 4½ poll.):
ex flavicante griseo-roseo-induta, vertice concoloro; uropygi,
et corpore subtus obsolete, roseis: remigibus, rectricibusque
roseo vix marginatis: rostro brevi, turgido, pyrrhulaceo, au-
rantio: pedibus rubellis.
Faem. pallide fusco-flavescens, minime roseo induta.

†† Montifringillaceae.

Rostrum modicium, rectum, conicum, acutum: nares plurimilis recumbentibus tectae. Alae elongatae, acutae; remigium prima secundum omnium longissimam subaequante. Cauda valida, lata, elongata, emarginata. Pedes magni, robusti; unguibus protractis incurvis.

1067. **Leucosticte**, Sw. (Linaria, p. Brandt. - Fringilla, p. Gr.)

Rostrum flavum, nuptiarum tempore nigrum: nares plurimilis rigidis recumbentibus tectae: pedes robusti: cauda profunde emarginata. *Colores roseo indui. Arcticæ.*

Analogiam nec non affinitatem cum Linotis praebet. As. s. Am. s. 5.

1. **LINARIA tephrocotis**, Richards. (Leucosticte tephrocotis, Sw. - Erythrospiza tephrocotis, Bp. - Fringilla tephrocotis, Gr.) Faun. Bor. Am. Av. t. 50. - Aud. Am. t. 424. - Id. ed. 8vo. 1841. III. t. 128. - Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin. t. 42. mas adult. ex Amer. maz. boreal. Flum. Saskatchewan ad orient. Similis L. brunneinucha; sed minor, et cervice grisea: pileo nigro: dorso, genis, et abdomine cinnamomeis (concoloribus); plumulis nasalibus flavo-cinereis; rostro nigro.

2. **LINARIA brunneinucha**, Brandt 1842. (Passer arcatus, var. β . 2. curilia, Pall. - Fringilla brunneinucha, Gr.) Bullet. Acad. Petersb. 26 Nov. 1841. p. 35. - Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin. t. 42, mas adult. ex Kamtschatka et Ins. Kuriliis. Minor (Long. 6-poll.): brunnea, plumis ferrugineo-marginatis; cervice fuso-caerulea: uropygio late nigricante, plumis apice roseis. fronte cum plumulis nasalibus fuso-cinereis; gula fuso-cinerea: pectore et abdomine cum tectricibus alarum fuso-nigris plumis singulis purpureo-roseo terminatis: remigibus, rectricibusque fuso-nigris albido-limbatis, margine externo subrosaceis: rostro flavo, apice nigrante.

3. LINARIA *griseinucha*, Brandt, 1842. (Passer arctous var. *g.* Pall. - Leucosticte griseigenys, Gould. - Fringilla pustulata, Illig. - Fr. griseinucha et Fr. griseigenys, Gr. sp. 66. et sp. 71. - Montifringilla pustulata, Caban.) Bull. Ac. Petersb., 29 Nov. 1841, p. 36. - Icon. Av. Ross. t. 11. 2. - Sulphur Voy. Av. t. 23. - Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin. t. 41. mas adult. et juv. ex Amer. Rossie. Insul. Aleuticis. Major (Long. 7' 8" poll.): fusca, fronte gulaque nigricantibus; plumulis nasalibus semper albidi; genis et cervice griseis: interscapulopectoreum fusco-castaneis; plumis tenuissime ferrugineo limbatis: plenis laterum et abdominalis, tectricibusque alarum et caudae late roseo-marginatis: rostro flavo, apice nigricante. Faem. ex toto ferrugineo-olivaceis; remigibus rectricibusque fuscis pallido roseaco-limbatis; tectricibus alarum scapulariibus marginis late ferrugineis. Similis L. tephrocotus; sed obscurior, et subtus magis roseo-iaduta: genis et cervice griseis bene distincta!
4. PASSER *arctous*, Pall. var. *a.* (Fringilla flavirostris? L. Fr. gebleri, Brandt, 1841. - Fr. arctoa, Gr. - Linaria arctoa, Brandt, 1843. - Montifringilla arctoa, Caban.) Zoogr. Ross. As. II. p. 21. - Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin. t. 44. mas et faem. adult. t. 45. mares Kuril. et Kamtschatk. ex Sibiria; accidentaliter Eur. or. Minor (Long. 6-poll.) fuliginoso-purpurascens, cervice turide flavescente: fronte cum plumulis nasalibus (vix purpureo induitis) nigricantibus: pecten externo remigum et tectricum alarum majorum, rectricibus crassi et utroque plenis, griseo-argenteis, margine exteriori tenuissime roseo, rochide nigro: rostro minimo, cero, apice nigricante, nuptiarum tempore (Fr. gebleri, Brandt, 1841.) nigro.
- 5? FRINGILLA GEBLERI, Brandt, 1843, nec 1841! (Fringilla gebleri? Gr. - Montifringilla *brandti*, Bp. - M. arctoa? p. Schlegel.) Bull. Ac. Petersb. 3. Februar. 1843, p. 27. ex Sibiria or. Minor: aliis longioribus: cauda breviore: albedo-cineracea; cervice fusco-cinerascens: plumulis nasalibus albedo-fusco-crecentibus: fronte nigra: tectricibus alarum minoribus albo-cinerereis, marginibus tenuissimo roseo-indutis: rostro basi flavo, dein nigro.

1068. **Montifringilla**, Brehm. (Orospiza? Aliq. - Chionospiza, Kaup, 1836. - Orites, Keys. 1840. - Linaria, p. Brandt. - Plectrophanes, p. Boie, 1822.) Rostrum validum, *fringillaceum*: plumulae nasales breves, laeuae: pedes robusti; unguibus parum incurvis: cauda vix emarginata, lateribus subrotundata. *Colores minime rubri: uropygio albo nigroque vario.* Fringillis affinis! Analogiam cum Plectroph. praebet. Eur. As. s. 1.

FRINGILLA nivalis, L. (saxatilis, Koch. - Passer alpicola, Pall. - Plectrophanes fringilloides, Boie. - Montifringilla nivalis, Brehm, Caban.) Br. Orn. III. t. 15. I. Gould, Eur. t. 189. - Roux, Orn. Prov. t. 89. mas hyem. ex Eur. As. s. Alpibus, Pyrenaeis, Caucaso, Siberia, Japonia. Major (Long. 6½ poll.) Alba: pila, cervicque griseis: gula nigra: dorso fusco: tectricibus alarum, et remigibus secundariis alios: rectricibus albis, apice nigro, mediis duabus ex toto nigris.

1069. **Fringalauda**, Hodg. (Fringillauda, Blyth. - Montifringilla, Hodgs. - Fringilla, p. Gr.) Rostrum elongatum, haud robustum, plumulis nasalibus brevibus, sparsis: pedes debiles, digitis parvis, unguibus gracilibus: alae longissimae; remigum tribus primis eximie protractis: cauda valde emarginata. *Colores minime rubri: plumis uropygii albo-limbatis.* Nemorales. Analogicum Passeribus praebet! Asia centr. 1.

F. nemoricola, Hodgs. 1836. (Montifringilla nemoricola, Blyth. - Fringilla longipennis, Bp. in litt. 1819. Fr. nemoricola, Gr.) Journ. As. Soc. Beng. 1844. t. 16. Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin. t. 47. mas et faem. adult. ex Nepal. Minor (Long. 5¾ poll.) Mas et Faemina similiter faeminae Passeris domestici! plumis autem uropygii subcanecentibus albo-marginatis; tectricibus caudae superioribus nigricantibus, late albo-terminatis: remigibus tribus primis maxime elongatis.

††† Linotaceae.

Minores: rostrum parvum, rectum, conico-aculum: nares plumulis obsitae: pedes modici: alae brevicolae; remigibus prima et secunda omnium longissimis, tertiam parum superantibus: cauda emarginata. *Mares tantum rubro tincti.*

Genera potius Fringillina quam Loxiina; sed a Leu-
costictis et Erythrosplizis haud disjungenda!

1070. **Linota**, Bp. (Cannabina, *Brehm*, *Caban.* - *Acanthis*, *Blyth*, p. nec *Brehm*. - *Fringilla*, p. *Gr.*) Rostrum breve, rectum, acutum, basi turgidiusculum, tomiis inflexis: nares expositae, plumulis brevibus, laxis, raris: alae breves: cauda valde emarginata: pedes digitis modicis. Eur. As. s. 3.

1. **FRINGILLA CANNABINA**, L. (linota et argentoratensis, *Gm.* - *Linaria* et *Linaria rubra major*, *Br.* - *Passer canabina* et *papaverina*, *Pall.* - *Linaria cannabina*, *Boie*. *Cannabina linota*, *Gr.* - *Linota cannabina*, *Bp.* - *Ligurinus cannabinus*, *Koch.* - *Acanthis!* *cannabina*, *Blyth*. *Cannabina pinetorum* et *arbustorum*, *Brehm*.) Pl. enl. 151. 1. adult. 2. mas pennas mut. et t. 485. 1. mas nupt. temp. - *Naum.* t. 121. - *Gould*, Eur. t. 191. *Bp.* et *Schleg.* *Monogr. Loxiin.* t. 48, mas et faem. adult. ex *Eur. univers. As. occ. Afr.* s. *Rostro fuscum*: capite cinereo: dorso radio: uropygio albo: remigibus, rectri-*cibusque nigris*, *albo-marginatis*.

Mas fronde et pectore lacte rubris.

- *2. **L. FRINGILLIROSTRIS**, Bp. et Schleg. Mon. *Loxiin.* t. 49, mas adult. *Mus. Lugd.* ex *Asia centr.* Similis *L. cannabinae*; sed rostro robustiore, subfringillaceo! coloribus dilutiioribus, rubro vegetiore. Capite subroseo dorso que cinereis fulvescentibus:ucha et cervice cinerascentibus: uropygio albo nigro-striato: gula, crissoque albis: pectore pulchre carmesino: abdome albo, lateribus fulvescenti-griseo indutis.

Quid Linota brevirostris, *Gould*, 1837. ex *As. occ. Eur. or.* nec *Gr. err. quae Hypoloxias coccinea!*

3. **FRINGILLA montiana**, Gm. (flavirostris, Keys. et Bl. Gr.
nec L? - cannabina, p. Temm. 1815. - Linaria montana,
Willoughby. - L. montium, Leach. - L. flavirostris,
Macgill. nec Brehm. - Linota montium, Bp. - Acanthis
montium, Blyth. - Cannabina flavirostris, Degland.
Caban. - C. montium, flavirostris et media, Brehm.)
Roux, Orn. Prov. t. 94. mas. - Penn. Br. Zool. t. 60. 2.
Naum. t. 122. - Gould, Eur. t. 192. - Bp. et Schleg.
Mon. Loxiin. t. 50. mas et faem. ex Eur. s. et o.c.
Major; flavo-fusca; dorso pectoreque striatis: uropygia rubro:
capite et pectore rufis sive rosaceis: alis rufo bifasciatis: ros:
tro brevi, flavescente: pedibus nigris!

1071. **Acanthis**, Keys. et Bl. p. (Linota, Caban. nec Bp. - Li:
naria, Degland. - Fringilla, p. Gr.) Rostrum parvum,
breve, rectum, acutissimum, a basi compressum, tomis
rectis; mandibula ad basin bidentata: nares rotundae,
plumulis rigidis longis recumbentibus tectae: pedes
debiles, digitis brevissimis, unguis depresso: alae,
cauda elongatae. Mares et faeminae semper pi:
leo rubro induiti.

Eur. As. Am. s. 4.

1. **FRINGILLA LINARIA**, Temm. 1835. (rufescens, Savi. - flavi:
rostris, Brehm. nec Auct. - Linaria **rufescens**, Vieill.
L. rubra, Gesn. - L. minima, Br. - Linota linaria, Bp.
1838. Caban. - L. flavirostris, Brehm. nec Auct. - L. sep:
tentriionalis et canicularis, Brehm. - Acanthis rufescens,
Schleg.) Pl. enl. 485. 2. - Roux, Orn. Prov. t. 99.
mas nupt. temp. t. 100. 1. faem. 2. mas autumn. - Yarr. Br.
B. fig. in p. 514. - Gould, Eur. t. 194. - Bp. et Schleg.
Monogr. Loxiin. t. 54. mas et faem. ex Eur. praeципe
o c e i d. migr. regular. Minor (Long. 4½ pollic.) uropygio plus
minus rufescente: cauda brevi (vix biplicari).

Mas nupt. temp. uropygio carmesino.

Faem. juv. et mas autumn. uropygio rufescente fuscō-striato.

2. FRINGILLA *linaria*, L. (*borealis*, Vieill. nec Temm. - *Linaria*, Sav., Temm. 1820. *Degland*. - *L. rubra minor*, Br. - *Passer linaria*, Pall. - *Acanthis linaria*, Keys. et Blas. - Blyth, Cat. sp. 684. - *Fringilla linaria* var. *b. betularum*, Sundev. *Vetensk. Acad. Handl.* 1840. p. 68-61. *Pl. enl.* 151. 2. - *Gal. Ois.* t. 65. - *Roux, Orn. Prov.* t. 101. mas. 102. faem. - *Wils. Am. Orn.* t. 30. 4. *Aud. Am.* t. 375. - *Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin.* t. 52. mas et faem. ex boreal. Amer. et Eur. irreg. migr. *Media* (Long. 4 $\frac{1}{2}$ poll.): *rostro parvo, ultra medium plumulis tecto: macula gulae pareo: loris fuscoscentibus: uropygio albo: cauda brevi* (3 $\frac{1}{2}$ poll.)
Mas *uropygic rubre induito.*
Faem. et juv. *uropygic fusco-striato.*
3. LINARIA BOREALIS, Schleg. nec Auct. (*A. holbölli* et alnorum? Brehm. - *Fringilla linaria* var. a. Sundev. p. 59. *Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin.* t. 53. mas et faem. ex Eur. s. et o.c. Major (Long. 5 $\frac{1}{2}$ poll.): *rostro flavissimo, maximo! robustissimo, elongato* (4 poll.) *basi tantum plumuli tecto: maculae gulae extensa lorisque nigris: vertice rubre: pectore uropygique rosaceis.*
4. FRINGILLA BOREALIS, Temm. 1835. nec Vieill. (*Linaria canescens*, Gould. - hornemannii, Holböll, in Kroyer *Nat. Tidskr.* 1843. et *Isis*, 1845. p. nec Vieill. - *Linota canescens*, Bp. - *Acanthis canescens*, Schleg.) Gould, *Eur.* t. 193. - *Bp. et Schleg. Monogr. Loxiin.* t. 51. mas et faem. adult. ex *Groenlandia*. Major (Long. 5 $\frac{1}{2}$ poll.) *rostro brevi: unguibus protractis: uropygio candido, nunquam striato: cauda elongata* (3 $\frac{1}{2}$ poll.)
Mas nupt. temp. *uropygic roseo-induto.*
Faem. juv. et mas autumn. *uropygic albo.*

SUBFAM. 133. GEOSPIZINAE.

1072. CERTHIDEA, Gould.

Ins. Galapagos. 1.

- C. olivacea*, Gould, 1837. - *Voy. Beagle, Zool.* t. 44.
Brunneo-olivacea; subtus cinerea: rostro pedibusque carno-fusco-mentibus. Long. 4-poll.

1073. **Caetornis**, Gould.

Ins. Galap. et Cocos. 3.

1. **C. scandens**, Gould, 1837. (Ploceus gallapagoensis, Neboux, 1840.) *Voy. Beagle, Zool. t. 42.* Fuliginos-nigricans; criso albo: rostro pedibusque nigricantibus. Long. 5-pollic. Faem. fusca, subtus albida, plumis nigricante centralis.
2. **C. assimilis**, Gould, 1837. - *Voy. Beagle, Zool. t. 43.* Fuliginosa, plumis cinereo-marginatis: rostro carneo-fusco. Long. 5½ pollic. An adulta?
3. **C. inornata**, Gould, 1843. - *Sulph. Zool. fig. bona. ex Ins. Bao dicta.* Fusco-nigricans, plumis olivaceo-rufescente marginatis: subtus fulva plumis macula centralis fusca. Long. 4-pollic.

1074. **Camarhynchus**, Gould. (Piezorhina, Lafr.)

Ins. Galap. 3.

a. *Camarhynchus*, Gould.

1. **C. psittaculus**, Gould, 1837. - *Voy. Beagle, Zool. t. 40.* Fuscus, alis caudae nigricantibus; subtus albo-cinerascens, stramineo indutus: rostro fuso-flavido: pedibus fuscis.
2. **C. crassirostris**, Gould, 1837. - *Voy. Beagle, t. 41.* Faem. fusco-brunneus plumis cinereo-olivaceo marginatis: gula, pectoraque cinereo-olivaceis, plumis centro obscurioribus: abdome, lateribusque subflavescientibus.
- b. *Piezorhina*, Lafr.
3. **GUIRACA! cinerea**, Lafr. (*Camarhynchus cinereus*, Gr. 1844.) *Mag. Zool. 1843. - Av. t. 30.* Dilute cinereus; subtus cinereo-albidus: fronte nigra: gutture albo: rostro flavo: pedibus lutescentibus.

1075. **Geospiza**, Gould.

Ins. Galap. 8.

1. **G. magnirostris**, Gould, Proc. 1837. p. 5. - *Voy. Beagle, Zool. t. 36.* mas et faem. Nigrofuliginosa; criso cinereo: rostro nigricans: pedibus nigris. Long. 6-pollic. Faem. cinerea, fuso-maculata.
2. **G. strena**, Gould, 1837. - *Voy. Beagle, Zool. t. 37.* Nigrofuliginosa; criso albo: rostro fuso: pedibus nigris. Long. 5½ pollic. Faem. cinerea, fuso-maculata.

3. **G. fortis**, Gould, 1837. - *Voy. Beagle*, Zool. t. 38.

Nigricans; crasso albo: rostro minus robusto, fusco-rufescente: pedibus nigris.

4. **G. nebulosa**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1837. p. 5. *Fusco-nigricans, plumis cinereo-olivaceo marginatis: subtus pallidior, abdome crisoque cinerascentibus: rostro pedibusque nigricantibus. Longit. 5-pollic.*5. **G. fuliginosa**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1837. p. 5. *Nigricans, crasso albo: rostro fusco: pedibus nigricantibus. Longit. 4½ pollic.*


Faem. fusca, plumis cinereo-rufa marginatis; subtus cinerea plumis medio obscurioribus.


6. **G. dentirostris**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1837. p. 6. *Maxilla dento instructa remigium secundariarum tectricum que alarum margine stramineo. Long. 3½ pollic.*7. **G. parvula**, Gould, Proc. Zool. Soc. 1837. p. 16. - *Voy. Beagle*, Zool. t. 39. *Minima; fuliginosa; uropygio cinereo-olivaceo; lateribus olivaceis fusco-guttatis; abdome et crasso albis: alis caudaque nigricantibus, pennis plumisque cinereo-marginatis. Long. 4-poll. rostro parvulo.*

Faem. fusco-olivacea; subtus et in superciliis albida.

8. **G. dubia**, Gould, Pr. Zool. Soc. 1837. p. 6. *Rostro sordide albo! Longit. 3½. Nonne saemina praecedentis?*

H





Zoolog. 826^c

