


P I T T A

PAR

H. S C H L E G E L.

Janvier 1863.



I. Espèces à queue courte et très peu arrondie.

A. Taille forte, égalant environ celle du pluvier doré.

PITTA COERULEA, Vigors ; Schlegel, *Vogels van Nederl. Indië*, 4^o, Haarlem, chez Kruseman, *Pitta*, 1863, pl. 1, fig. 1, 2 et 3. — *Myiothera coerulea*, Raffles. — *Pitta gigas*, Temminck, *Pl. col.* 217.

Dos, ailes et queue d'un bleu de cobalt dans les adultes, brun dans le plumage imparfait. — Aile 5 pouces 4 lignes; queue 2 pouces 2 lignes; tarse 22 lignes; bec 14 lignes.

Habite l'île de Sumatra.

1. Mâle adulte, Bencoelen à Sumatra, voyage de Diard et Duvauzel: individu fig. dans Schlegel, *Vogels van Nederlandsch Indie*, *Pitta*, pl. 1, fig. 1. — 2. Mâle, livrée parfaite, même origine que le N^o. 1. — 3. Femelle, livrée de passage, même origine que les N^o. 1 et 2: individu figuré dans Schlegel, *l. c.*, pl. 1, fig. 2. — 4. Jeune mâle, en grande partie au premier

Pitta, pl. 2, fig. 1; île de Bangka, présenté en 1861, par Mr. J. F. R. S. van den Bossche. — 2. Idem, même origine.

PITTA CUCULLATA, Hartlaub. — *Pitta malaccensis*, Müller et Schlegel, Verh. Ned. O. Bez., Pitta, p. 115.

Semblable, par sa taille, à la *Pitta bangkana*, mais à bec d'un brun sale rougeâtre, au lieu de noir; et avec une calotte d'un brun-rouge occupant le sommet de la tête et l'occiput.

Observée dans la presqu'île de Malacca.

1. Adulte, Malacca. — 2. Adulte, Malacca: plumes du dos et en partie aussi les scapulaires, chacune, avec une tache longitudinale noirâtre.

b. Pennes de la queue d'un vert sale et foncé.

PITTA NOVAE GUINEAE, Müller et Schlegel, Verh. Ned. O. Bez., Pitta, p. 19. — *Pitta atricapilla*, Quoy et Gaimard, Astrol., Ois., pl. 8, fig. 3.

Teintes vertes très foncées et passant au bleu sur le ventre. Le bleu-blanc des couvertures supérieures de la queue très restreint ou nul. Taches blanches des rémiges très étroites. — Aile 5 pouces 5 lignes. Queue 14 lignes. Tarse 16 lignes.

Observée à la Nouvelle Guinée et aux îles Arou.

1. Adulte, figuré dans Schlegel, Vog. Nederl. Ind., Pitta, pl. 2, fig. 4: îles Arou, voyage de Wallace, acquis en 1860.

PITTA MELANOCEPHALA, Forsten (sed non Wagler), Müll. et Schlegel, Verh. O. Bez., Oiseaux, Pitta, p. 19; Westerman, Bijdragen, Amsterdam, I, 1854, p. 40, Pitta, pl. 2. — *Brachyurus Forsteni*, Bonap., Consp., I, p. 256, N^o. 22.

Rémiges d'un noir uniforme sans tache blanche. Taille plus forte que dans les autres espèces vertes à tête noire.

Observée dans les parties septentrionales de l'île de Célèbes.

1. Mâle adulte, figuré par Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 2, fig. 2; Kema à Célèbes, voyage du Dr. Forsten. —

Ajoutez : 5. Adulte, Nipaul, 1867. — 4. Mâle, Tabet, 1874. — 5, 6. Adultes, Bangka: P. bangkana 1865, N^o. 1 et 2. — 7. Femelle adulte, tuée en Mars 1864, Bangka, prés. p. M. J. Buddingh. — 8, 9. Mâle et femelle, tués le 28 Mai quelquefois 1872, Bangka, prés. par M. O. Vosmaer.

β . Grandes rémiges d'un noir souvent interrompu, mais quelquefois seulement suivant les individus, par une petite tache blanche, occupant la quatrième et souvent encore la cinquième rémige.

PITTA NOVAE GUINEAE. Voir Pitta, 1863, p. 4. — Pitta papuensis, Gray, Handlist, 1, p. 295.

C'est l'espèce dont le noir des rémiges est souvent, mais non pas constamment, interrompu par une ou deux petites taches blanches. Dessus des rectrices et des grandes suscaudales d'un vert sale passant au noir à leur base; petites couvertures n'offrant qu'une trace plus ou moins faible de bleu blanchâtre.

Observé dans la presqu'île occidentale de la Nouvelle Guinée, dans les îles de Waaighéou, Gagie, Batanta, Salawattie, Misool et dans le groupe d'Arou.

Individus de Dorey. — Rémiges tachetées de blanc. 1, 2, 5. Mâles adultes, tués en Janvier 1869, v. Rosenberg. — 4, 6. Femelles, tuées en Janvier 1869, von Rosenberg.

Individu d'Andaï, au Sud de Dorey. — 6. Femelle, tuée le 25 Février 1870, von Rosenberg.

Individus de Sorong. — a. Ailes tachetées de blanc. 7, 8. Mâles, tués en Février 1865, Bernstein. — 9. Femelle, tuée le 2 Février 1865, Bernstein. — 10, 11. Femelles, tuées en Janvier 1865, Bernstein. — b. Rémiges sans taches blanches. 12, 13. Mâles, tués en Janvier 1865, Bernstein. — 14. Femelle, tuée le 14 Janvier 1865, Bernstein.

Individu de Seléh, au Sud de Sorong. — 15. Mâle, tué le 19 Février, 1865, Bernstein: cinquième rémige pourvue d'une très petite tache blanche.

Individu de l'île de Waaighéou. — 16. Mâle, tué le 15 Mars 1863, Bernstein: aile gauche noire, aile droite avec une petite tache blanche.

Individus de l'île de Gagie. — a. Remiges avec une tache blanche: 17. Mâle, tué le 5 Mars 1863, Bernstein. — 18, 19. Mâle et femelle, tués le 15 Mai 1863, Bernstein. — 20, 21, 22, 23. Mâles, tués en Novembre 1864, Bernstein. — 24. Femelle, tuée le 14 Novembre 1864, Bernstein. — Individu sans taches blanches aux rémiges: 25. Femelle, tuée le 4 Mars 1863, Bernstein.

Individus de l'île de Batanta. — 26. Mâle, tué le 5 Avril 1865, Bernstein: aile tachetée de blanc. — 27. Mâle, tué le 1 Juillet 1869, von Rosenberg: aile sans taches blanches très sensibles.

Individus de l'île de Salawattie. — a. Ailes avec des taches blanches bien prononcées: 28, 29. Mâle et femelle, tués en Février 1865, Bernstein. — 30, 31. Mâles, tués en Mars 1865, Kalwal, Bernstein. — 32, 33. Femelles, tuées en Mars 1865, Côte Nord de Salawattie, Bernstein. — 34. Mâle, tué le 22 Juin 1867, Saïlolo, Hoedt. — 35, 36. Mâle et femelle, tués en Juillet 1867, Saïlolo, Hoedt. — b. Tache blanche des ailes très peu prononcée. 37. Mâle, tué le 27 Février 1865, Saïlolo, Bernstein. — 38. Mâle, tué le 30 Mars 1865, Côte Nord de Salawattie, Bernstein. — 39. Mâle, tué le 5 Juillet 1867, Saïlolo, Hoedt. — c. Ailes sans tache blanche: 40. Mâle, tué le 25 Mars 1865, Côte Nord de Salawattie, Bernstein. — 41. Mâle, tué le 25 Juin 1869, von Rosenberg.

Individus de Misool — 42, 43. Mâles, tués en Juillet 1867, Waaigama, Hoedt. — 44. Mâle, tué le 11 Août 1867, Waaigama, Hoedt. — 45. Femelle, tuée le 15 Juillet 1867, Waaigama, Hoedt. — 46. Mâle en mue, tué le 26 Mai 1867, Waaigama, Hoedt. — 47. Mâle, tué le 8 Juin 1867, Kasim, Hoedt. — 48. Femelle, tuée le 12 Juin 1867, Goë, Hoedt.

Individus du groupe d'Arou. — a. Aile avec une tache blanche plus ou moins sensible: 49. Adulte, voyage de Wallace;

c'est N^o. 1 du Catal. de 1865. — 50. Mâle, tué le 24 Avril 1870, Wokam, Hoedt. — 51, 52, 53, 54, 55. Femelles, tuées en Mai 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg. — b. Individus sans tache blanche aux rémiges: 56, 57, 58. Mâles, tués en Mai 1865, Wonoumbai, von Rosenberg.

PITTA NOVAE GUINEAE MEFOORANA, Schlegel.

Semblable à la *Pitta Novae Guineae*; mais aux rectrices noires terminées plus ou moins largement de vert sale, aux grandes suscaudales noires avec un fin liseré bleu, aux petites suscaudales d'un beau vert blanchâtre métallique, et au bleu de l'abdomen plus foncé. Rémiges sans taches blanches.

Observé dans la seule île de Méfoor située dans la baie de Geelvink.

1. Mâle, tué le 21 Janvier 1869, von Rosenberg. — 2. Femelle, tuée le 14 Février 1869, von Rosenberg. — 3, 4. Mâles, tués en Février 1869, von Rosenberg.

PITTA ROSENBERGII, Schlegel, Tijdschr. Dierkunde, vol. 4, p. 16.

Rappelant la *Pitta Novae Guineae* qu'elle remplace dans l'île de Soëk du groupe de Schouten; mais s'en éloignant par les traits suivants. Rectrices et grandes suscaudales d'un noir profond et n'offrant que rarement un fin liseré bleuâtre. Petites suscaudales comme dans la *Pitta Novae Guineae Mefoorana*. Tarse de 2 à 4 lignes plus longs. Mandibule supérieure beaucoup moins carénée et, à sa partie antérieure, arrondie et plus large. Plastron noir de la gorge s'étendant jusque sur le milieu du jabot. Le jaune-vert argenté et luisant qui occupe, dans la *P. N. Guineae*, le jabot et la poitrine, est remplacé par un vert foncé et non pas luisant. Tache noire de l'abdomen remplacée par du rouge. Bleu des flancs plus vif et plus brillant. Une tache blanche à l'aile.

Tarse 20 lignes et demie à 21 lignes et demie.

1, 2, 3. Mâles, tués en Mars 1869, Soëk, von Rosen-