

APR 23 1901

13,852.

Das Tierreich.

Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der
rezenten Tierformen.

In Verbindung mit der

Deutschen Zoologischen Gesellschaft

herausgegeben von der

Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Generalredakteur: Franz Eilhard Schulze.

„Πάντα ὄντ.“

„Sine systemate chaos.“

15. Lieferung.

Aves.

Redakteur: A. Reichenow.

Zosteropidae

bearbeitet von

Dr. Otto Finsch,

Abteilungs-Vorstand am Reichs-Museum für Naturgeschichte in Leiden.

Mit 32 Abbildungen.



Berlin.

Verlag von R. Friedländer und Sohn.

Ausgegeben im März 1901.

weiss. Ein schmaler weisser Augenring vorhanden, aber kein dunkler Zügelstrich. Schnabel und Füsse dunkel. Im Leben: Schnabel bleigrau, mit schwarzer Spitze, Füsse bleigrau. L. t. ca. 100, a. 51, c. 38, r. 9 mm.

Philippinen (Luzon).

42. **Z. grayi** Wall. 1857 *Z. citrinella* (err., non Bonaparte 1850!), Wallace in: Ann. nat. Hist., ser. 2 v. 20 p. 473 | 1863 *Z. grayi*, Wallace in: P. zool. Soc. London, p. 494 | 1865 *Z. g.*, G. Hartlaub in: J. Orn., v. 13 p. 23 | 1881 *Z. g.*, Salvadori, Orn. Papuas., v. 2 p. 366 | 1884 *Z. g.*, Sharpe in: Cat. B. Brit. Mus., v. 9 p. 162.

♂ ♀ ad. Oberseite dunkel olivengelb, kaum mit grünem Anfluge, hinterer Bürzel und Oberschwanzdecken lebhaft gelb; der Oberkopf hinter dem Gelb der Stirn etwas dunkler getrübt (schwach bräunlich verwaschen). Augenring gross, weiss. Stirnrand und Streifen über dem nur schwach angedeuteten schmalen dunklen Zügelstrich, Kinn, Kehle und Unterschwanzdecken (bis auf den Steiss) hoch citronengelb, ebenso die Schenkel und der Handrand; übrige Unterseite und Unterflügeldecken weiss, die Körperseiten zart grau; längs der Mitte ein verwaschener, mehr oder minder deutlicher gelber Mittelstreifen; das Gelb der Kehle verfließt allmählich in das Olivengelb der Kopf- und Halsseiten. Steuerfedern nur an der Wurzel sehr schmal olivengelb gesäumt, daher vorherrschend schwarz. Schnabel und Füsse dunkel. L. t. ca. 120, a. 62—64, c. 43—45, r. 11—12 mm.

Kei- und Aru-Inseln.

43. **Z. wallacei** Finsch*) 1863 *Z. aureifrons* (non *Z. aurifrons* Heuglin 1862!), Wallace in: P. zool. Soc. London, p. 493 | 1865 *Z. aurifrons* (Temminck in MS.), G. Hartlaub in: J. Orn., v. 13 p. 24 | 1884 *Z. aureifrons*, Sharpe in: Cat. B. Brit. Mus., v. 9 p. 159 | 1896 *Z. a.*, Hartert in: Nov. zool., v. 3 p. 582 | 1898 *Z. a.*, Hartert in: Nov. zool., v. 5 p. 464.

♂ ♀ ad. Oberseite dunkel olivengrünlichgelb, Oberkopf mehr gelb, Oberschwanzdecken deutlich gelb; Vorderkopf und Zügel fast bis zum Auge orange gelb, hinten mehr dunkelgelb und in die Färbung des Oberkopfes verfließend. Schmäler Zügelstrich schwarz; Augenring dunkel gelb (nicht weiss), ebenso Kopfseiten, Kinn, Kehle, Unterschwanzdecken und Handrand; übrige Unterseite aschgrau, längs der Mitte breit schmutzigweiss; Unterflügeldecken weiss. Schwingen aussen olivengelb gesäumt, ebenso aber sehr undeutlich die schwarzbraunen Steuerfedern. Sehr charakteristisch ist der gelbe Augenring. Schnabel und Füsse dunkel. Iris braun. L. t. ca. 110, a. 52—54, c. 35—40, r. 9—10 mm.

Kleine Sunda-Inseln Sumbawa, Flores, Sumba und Lomblen.

44. **Z. natalis** Lister 1889 *Z. n.*, J. J. Lister in: P. zool. Soc. London, 1888 p. 518 t. 27 | 1900 *Z. n.*, Sharpe in: C. W. Andrews, Monogr. Christmas Isl., p. 49 t. 6 (Lebens- u. Nistw.).

Oberseite olivengrün, Mantel schwach bräunlich verwaschen; Oberkopf und Nacken heller, mehr ins Gelbgrüne ziehend; Bürzel und Oberschwanzdecken noch heller, fast gelb. Augenring gross, weiss; Zügel schwarz, unten den Augenring säumend, über dem Zügel ein schmaler gelber Längsstrich; Ohrgegend düster grau. Unterseite weiss, Unterschwanzdecken blassgelb. Brustseiten blass isabellbräunlich verwaschen, Bauch- und Schenkelseiten blass zimmetbraun. Schnabel schwarz, Füsse dunkelgrau. L. t. ca. 120, a. 60, c. 48, r. 11 mm.

Weihnachts-Insel im Indischen Ozean (westlich von Java).

*) Nom. nov. Nach A. R. Wallace.

62. **Z. sumbavensis** Guillmd. 1885 *Z. s.*, Guillemard in: *P. zool. Soc. London*, p. 508 | 1896 *Z. sumbawensis*, Hartert in: *Nov. zool.*, v. 3 p. 567.

Oberseite olivengrüngelb („aureo-viridis“), Stirn lebhaft gelb. Augenring weiss, Zügelstrich schwarz, Ohrgegend bräunlich verwaschen. Unterseite lebhaft gelb. A. 56, c. 46, r. 11 mm.

Scheint *Z. chloris* sehr nahe zu stehen.

Kleine Sunda-Insel Sumbawa.

63. **Z. intermedia** Wall. 1863 *Z. i.*, Wallace in: *P. zool. Soc. London*, p. 493 | 1865 *Z. i.*, G. Hartlaub in: *J. Orn.*, v. 13 p. 16 | 1884 *Z. i.* (part.), Sharpe in: *Cat. B. Brit. Mus.*, v. 9 p. 185 | 1898 *Z. i.*, A. B. Meyer & Wigglesworth, *B. Celebes*, v. 2 p. 486 (Nest) | 1885 *Z. brunneicauda* (err., non Salvadori 1880!), Guillemard in: *P. zool. Soc. London*, p. 508.

♂ ♀ ad. Oberseite, Kopf- und Halsseiten olivengelbgrün, Bürzel und Oberschwanzdecken von derselben Färbung (nicht lichter). Ein schmaler Strich über dem schmalen schwärzlichen Zügelstrich schwefelgelb, ebenso die ganze Unterseite; Körperseiten gelbgrünlich verwaschen, Unterschwanzdecken sehr blass gelb. Augenring weiss, sehr schmal und nicht immer deutlich. Steuerfedern schwarz, mit sehr undeutlichen olivengrünen Aussensäumen. Schnabel dunkel, Unterschnabel hell; Füsse bleigrau. L. t. ca. 110, a. 52—56, c. 35—38, r. 9—10 mm.

Wie *Z. chloris*, aber Oberseite deutlich grün, Unterseite heller gelb.

Süd- und West-Celebes (nebst den benachbarten Inseln Saleijer, Djampea und Kalao), Lombok, Sumbawa, Insel Rusa Radja an der Nordküste von Flores.

64. **Z. buruensis** Salvad. 1878 *Z. b.*, Salvadori in: *Ann. Mus. Genova*, v. 12 p. 341 | 1881 *Z. b.*, Salvadori, *Orn. Papuas.*, v. 2 p. 371 | 1884 *Z. b.*, Sharpe in: *Cat. B. Brit. Mus.*, v. 9 p. 184 | 1900 *Z. b.*, Hartert in: *Nov. zool.*, v. 7 p. 237.

Wie *Z. intermedia*, aber Oberseite dunkler grün, Unterseite heller gelb, Körperseiten deutlicher grünlich. Mit deutlicherem schwarzen Zügelstreifen. A. 57, r. 11 mm.

Molukken-Insel Buru.

65. **Z. obstinata** Hart. 1860 *Z. chloris* (err., non Bonaparte 1850!), G. R. Gray in: *P. zool. Soc. London*, v. 28 p. 350 | 1881 *Z. intermedia* (err., non Wallace 1863!), Salvadori, *Orn. Papuas.*, v. 2 p. 369 | 1884 *Z. i.* (part.), Sharpe in: *Cat. B. Brit. Mus.*, v. 9 p. 185 | 1900 *Z. obstinatus*, Hartert in: *Nov. zool.*, v. 7 p. 238.

Stimmt in der dunklen grünen Färbung der Oberseite und der der Körperseiten ganz mit *Z. buruensis* überein, unterscheidet sich aber etwas durch ein wenig geringere Grösse, den minder goldig olivenfarbenen Ton der Oberseite, die mehr grün gefärbt ist, und die ebenfalls mehr grünliche und dunklere Färbung der Körperseiten.

Östliche Molukken-Inseln Batjan und Ternate.

66. **Z. cuicui** De Vis 1897 *Z. c.*, De Vis in: *Ibis*, ser. 7 v. 3 p. 384.

♂ ♀ ad. Oberseite grün; Zügel braungrau; Augenring gelb; Ohrdecken bräunlichgrün, mit weissen Schäften. Unterseite citronengelb, blasser an der Kehle und den Unterschwanzdecken; Handrand und Unterflügeldecken gelb. Oberschnabel schwarz (beim ♀ hornfarben), Unterschnabel und Füsse gelb. A. 78, c. 60, r. 10 mm.

Inneres von Britisch-Neu-Guinea (Boirave).